Mikroekonomia II - Zadania - lista 1 termin: 26 marca

Zadanie 1 (2.5p) Rozpatrzmy ściśle wypukłe¹ i racjonalne preferencje \succeq na zbiorze konsumpcyjnym $X = \mathbf{R}_{+}^{L}$. Udowodnij, że istnieje co najwyżej jeden optymalny wybór konsumenta przy zadanych cenach $p \in \mathbf{R}_{++}^{L}$.

Zadanie 2 (2p) Załóżmy, że użyteczność konsumenta przyjmuje postać $U(x_1, x_2) = u(x_1) + x_2$, gdzie $u : \mathbf{R}_+ \to \mathbf{R}$ jest rosnąca i ostro wlęsła. Ceny dóbr wynoszą odpowiednio p_1 i p_2 , a budżet oznaczymy przez I. Dla uproszczenia przyjmijmy $p_2 = 1$. Rozwiąż powyższy problem podając optymalne ilości dóbr w koszyku konsumenta².

Zadanie 3 (2p) Rozwiąż problem optymalnego wyboru czasu pracy i czasu wolnego jak analizowany na zajęciach dla funkcji użyteczności: $u(c,l) = \log(c - \frac{l^{\alpha+1}}{\alpha+1})$, gdzie $\alpha \geq 0$, a $l \in [0,1]$ to czas pracy. Jaki jest wpływ zmiany płacy realnej na podaż pracy? Ile wynosi efekt dochodowy, a ile substytucyjny?

Zadanie 4 (3.5p) W poniższym zadaniu rozwiążesz przykład, w którym przekonasz się, że maksymalizacja użytecznooci przy zadanym budżecie oraz minimalizacja wydatków przy zadanym poziomie użyteczności są dwoma sposobami rozwiązania problemu konsumenta (są względem siebie dualne).

Rozpatrzmy problem konsumenta czerpiącego użyteczność z dwóch dóbr. Jego funkcja użyteczności przyjmuje postać $u(x,y)=x^{\alpha}y^{1-\alpha}, \ \alpha\in(0,1),\ gdziex$ i y to odpowiednio ilości pierwszego i drugiego dobra. Dochód konsumenta wynosi m, zaś ceny odpowiednio p_x oraz p_y .

- (i) Zapisz problem maksymalizacji problemu konsumenta, przy zadanym budżecie. Zapisz odpowiadającą mu funkcję Lagrange'a.
- (ii) Rozwiąż powyższy problem podając optymalne ilości dóbr w koszyku. Zapisz funkcję popytu na każde z dóbr.
- (iii) Niech u* będzie poziomem użyteczności, który chce osiągnąć konsument. Zapisz problem minimalizacji wydatków konsumenta przy zadanym poziomie użyteczności. Zapisz odpowiadającą mu funkcję Lagrange'a.
- (iv) Rozwiąż problem z punktu (iii) i przez odpowiednie podstawienia udowodnij, że otrzymany wynik jest analogiczny do rozwiązania w problemie (ii).

 $^{^1}$ Definicja: $(\forall x,y,z\in X, x\neq y)x\succeq z$ ora
z $y\succeq z$ implikuje, że $(\forall t\in (0,1))tx+(1-t)y\succ x$

²Uważaj na rozwiązania brzegowe.