

§ 1.4 阶跃函数和冲激函数

函数本身有不连续点(跳变点)或其导数与积分有不连续点的一类函数统称为奇异信号或奇异函数。

- 阶跃函数
- 冲激函数

是两个典型的奇异函数。

- 阶跃序列和单位样值序列



一、单位阶跃函数

1. 定义

下面采用求函数序列极限的方法定义阶跃函数。

选定一个函数序列 $\gamma_n(t)$ 如图所示。




$$\varepsilon(t) \stackrel{\text{def}}{=} \lim_{n \rightarrow \infty} \gamma_n(t) = \begin{cases} 0, & t < 0 \\ \frac{1}{2}, & t = 0 \\ 1, & t > 0 \end{cases}$$



2. 延迟单位阶跃信号

$$\varepsilon(t - t_0) = \begin{cases} 0 & t < t_0 \\ 1 & t > t_0 \end{cases}, \quad t_0 > 0$$


$$\varepsilon(t + t_0) = \begin{cases} 0 & t < -t_0 \\ 1 & t > -t_0 \end{cases}, \quad t_0 > 0$$




3. 阶跃函数的性质

(1) 可以方便地表示某些信号


$$f(t) = 2 \varepsilon(t) - 3 \varepsilon(t-1) + \varepsilon(t-2)$$




(2) 用阶跃函数表示信号的作用区间



(a)



(b)



(c)

(3) 积分

$$\int_{-\infty}^t \varepsilon(\tau) d\tau = t\varepsilon(t)$$

二. 单位冲激函数

单位冲激函数是个奇异函数，它是对强度极大，作用时间极短一种物理量的理想化模型。


- 狄拉克 (Dirac) 定义
- 函数序列定义 $\delta(t)$
- 冲激函数与阶跃函数关系
- 冲激函数的性质

1. 狄拉克 (Dirac) 定义

$$\begin{cases} \delta(t) = 0 & (t \neq 0) \\ \int_{-\infty}^{+\infty} \delta(t) dt = 1 \end{cases}$$


$$\int_{-\infty}^{+\infty} \delta(t) dt = \int_{0_-}^{0_+} \delta(t) dt$$

- 函数值只在 $t = 0$ 时不为零;
- 积分面积为1;
- $t = 0$ 时, $\delta(t) \rightarrow \infty$, 为无界函数。



2. 函数序列定义 $\delta(t)$



对 $\gamma_n(t)$ 求导得到如图所示的矩形脉冲 $p_n(t)$ 。



$$\delta(t) \stackrel{\text{def}}{=} \lim_{n \rightarrow \infty} p_n(t)$$

高度无穷大，宽度无穷小，面积为1的对称窄脉冲。

3. $\varepsilon(t)$ 与 $\delta(t)$ 的关系



引入冲激函数之后，间断点的导数也存在



$$f(t) = 2 \varepsilon(t+1) - 2 \varepsilon(t-1)$$

$$f'(t) = 2 \delta(t+1) - 2 \delta(t-1)$$

三. 冲激函数的性质

- 取样性
- 冲激偶
- 尺度变换
- 复合函数形式的冲激函数


1. 取样性(筛选性)

如果 $f(t)$ 在 $t=0$ 处连续, 且处处有界, 则有

$$\delta(t)f(t) = f(0)\delta(t)$$

$$\int_{-\infty}^{\infty} \delta(t)f(t)dt = f(0)$$

证明




对于平移情况:

$$f(t)\delta(t-t_0) = f(t_0)\delta(t-t_0)$$


$$\int_{-\infty}^{\infty} \delta(t-t_0)f(t)dt = f(t_0)$$

举例



2. 冲激偶



$\tau \downarrow$



$\tau \rightarrow 0$



冲激偶的性质

$$\textcircled{1} \quad f(t) \delta'(t) = f(0) \delta'(t) - f'(0) \delta(t) \quad \text{证明}$$

$$\textcircled{2} \quad \int_{-\infty}^{\infty} \delta'(t) f(t) dt = -f'(0) \quad \text{证明}$$

$\delta^{(n)}(t)$ 的定义: $\int_{-\infty}^{\infty} \delta^{(n)}(t) f(t) dt = (-1)^n f^{(n)}(0)$

$\delta'(t)$ 的平移: $\int_{-\infty}^{\infty} \delta'(t-t_0) f(t) dt = -f'(t_0)$

$$\textcircled{3} \quad \int_{-\infty}^t \delta'(t) dt = \delta(t)$$

例 $\int_{-\infty}^{\infty} (t-2)^2 \delta'(t) dt = -\frac{d}{dt}[(t-2)^2] \Big|_{t=0} = -2(t-2) \Big|_{t=0} = 4$

3. 对 $\delta(t)$ 的尺度变换

$$\delta(at) = \frac{1}{|a|} \delta(t)$$

证明

举例

$$\delta'(at) = \frac{1}{|a|} \cdot \frac{1}{a} \delta'(t)$$

$$\delta^{(n)}(at) = \frac{1}{|a|} \cdot \frac{1}{a^n} \delta^{(n)}(t)$$

推论:


$$(1) \quad \delta(at) = \frac{1}{|a|} \delta(t) \quad \delta(2t) = 0.5 \delta(t)$$

$$(2) \text{ 当 } a = -1 \text{ 时 } \delta^{(n)}(-t) = (-1)^n \delta^{(n)}(t)$$

所以, $\delta(-t) = \delta(t)$ 为偶函数,
 $\delta'(-t) = -\delta'(t)$ 为奇函数

举例

已知 $f(t)$ ，画出 $g(t) = f'(t)$ 和 $g(2t)$



4. 复合函数形式的冲激函数



实际中有时会遇到形如 $\delta[f(t)]$ 的冲激函数，其中 $f(t)$ 是普通函数。并且 $f(t) = 0$ 有 n 个互不相等的实根 t_i ($i=1, 2, \dots, n$)

$$\frac{d}{dt}\{\varepsilon[f(t)]\} = \delta[f(t)] \frac{df(t)}{dt}$$

$$\delta[f(t)] = \frac{1}{f'(t)} \frac{d}{dt}\{\varepsilon[f(t)]\}$$

$\varepsilon[f(t)]$ 图示说明： 例 $f(t) = t^2 - 4$

$$\varepsilon(t^2 - 4) = 1 - \varepsilon(t+2) + \varepsilon(t-2)$$



$$\varepsilon(t^2 - 4) = 1 - \varepsilon(t+2) + \varepsilon(t-2)$$

$$\begin{aligned}\delta[t^2 - 4] &= \frac{1}{2t} \frac{d}{dt} [\varepsilon(t^2 - 4)] = \frac{1}{2t} [-\delta(t+2) + \delta(t-2)] \\ &= \frac{1}{2 \times 2} \delta(t+2) + \frac{1}{2 \times 2} \delta(t-2) = \frac{1}{4} \delta(t+2) + \frac{1}{4} \delta(t-2)\end{aligned}$$

一般地，

$$\delta[f(t)] = \sum_{i=1}^n \frac{1}{|f'(t_i)|} \delta(t - t_i)$$

这表明， $\delta[f(t)]$ 是位于各 t_i 处，强度为 $\frac{1}{|f'(t_i)|}$ 的 n 个冲激函数构成的冲激函数序列。

$$\delta(4t^2 - 1) = \frac{1}{4} \delta(t + \frac{1}{2}) + \frac{1}{4} \delta(t - \frac{1}{2})$$

注意：如果 $f(t)=0$ 有重根， $\delta[f(t)]$ 无意义。

冲激函数的性质总结

(1) 取样性

$$f(t)\delta(t) = f(0)\delta(t)$$

$$\int_{-\infty}^{+\infty} f(t)\delta(t) dt = f(0)$$

(2) 奇偶性

$$\delta(-t) = \delta(t)$$

(3) 比例性

$$\delta(at) = \frac{1}{|a|} \delta(t)$$

(4) 微积分性质

$$\delta(t) = \frac{d\varepsilon(t)}{dt} \quad \int_{-\infty}^t \delta(\tau) d\tau = \varepsilon(t)$$

(5) 冲激偶

$$f(t)\delta'(t) = f(0)\delta'(t) - f'(0)\delta(t)$$

$$\int_{-\infty}^{\infty} f(t)\delta'(t) dt = -f'(0)$$

$$\int_{-\infty}^t \delta'(t) dt = \delta(t)$$

$$\delta'(-t) = -\delta'(t)$$


$$\int_{-\infty}^{\infty} \delta'(t) dt = 0$$

四. 序列 $\delta(k)$ 和 $\varepsilon(k)$

这两个序列是普通序列。

1. 单位(样值)序列 $\delta(k)$

• 定义
$$\delta(k) \stackrel{\text{def}}{=} \begin{cases} 1, & k = 0 \\ 0, & k \neq 0 \end{cases}$$




• 取样性质: $f(k) \delta(k) = f(0) \delta(k)$

$$f(k) \delta(k - k_0) = f(k_0) \delta(k - k_0)$$

$$\sum_{k=-\infty}^{\infty} f(k) \delta(k) = f(0)$$

2. 单位阶跃序列 $\varepsilon(k)$ 定义

• 定义 $\varepsilon(k) \stackrel{\text{def}}{=} \begin{cases} 1, & k \geq 0 \\ 0, & k < 0 \end{cases}$



• $\varepsilon(k)$ 与 $\delta(k)$ 的关系

$$\delta(k) = \varepsilon(k) - \varepsilon(k-1)$$

或
$$\varepsilon(k) = \sum_{i=-\infty}^k \delta(i)$$

$$\varepsilon(k) = \sum_{j=0}^{\infty} \delta(k-j)$$

$$\varepsilon(k) = \delta(k) + \delta(k-1) + \dots$$

取样性质举例

$$\sin(t + \frac{\pi}{4})\delta(t) = \sin(\frac{\pi}{4})\delta(t) = \frac{\sqrt{2}}{2}\delta(t) \quad \int_{-\infty}^{\infty} \sin(t - \frac{\pi}{4})\delta(t) dt = -\frac{\sqrt{2}}{2}$$

$$\int_{-3}^0 \sin(t - \frac{\pi}{4})\delta(t-1) dt = ? \quad \mathbf{0} \quad \int_{-1}^9 \sin(t - \frac{\pi}{4})\delta(t) dt = ? \quad -\frac{\sqrt{2}}{2}$$

$$\int_{-1}^1 2\tau\delta(\tau-t) d\tau = ? \quad \begin{cases} 2t, & -1 < t < 1 \\ 0, & \text{其它} \end{cases} \quad \int_{-1}^t (\tau-1)^2 \delta(\tau) d\tau = ? \quad \mathbf{\varepsilon(t)}$$

$$\frac{d}{dt} [e^{-2t} \varepsilon(t)] = e^{-2t} \delta(t) - 2e^{-2t} \varepsilon(t) = \delta(t) - 2e^{-2t} \varepsilon(t)$$

冲激信号尺度变换举例

例1 $\int_{-\infty}^{\infty} \delta(5t)(t-2)^2 dt = ?$ $\frac{4}{5}$

例2 已知信号 $f(5-2t)$ 的波形，
请画出 $f(t)$ 的波形。

