

Lyell C Read

CH 13.3 Homework
pr. 11-27 odd, 37, 51-57

11/18/2018

$$11) z = 4 - x^2 - y^2 \quad \begin{cases} x = r \cos \theta \\ y = r \sin \theta \end{cases} = z = 4 - r^2 (\underbrace{\cos^2 \theta + \sin^2 \theta}_{=1}) = 4 - r^2$$

$$4 - r^2, \text{ on } \{(r, \theta): 0 \leq r \leq 1; 0 \leq \theta \leq 2\pi\} = \int_0^{2\pi} \int_0^1 (4 - r^2) r \, dr \, d\theta$$

$$1] \int_0^{2\pi} \int_0^1 (4 - r^2) r \, dr = \int_0^{2\pi} \left(4r - \frac{1}{2} r^3 \right) \Big|_0^1 d\theta = \int_0^{2\pi} \left(2 - \frac{1}{4} \right) d\theta = \frac{7}{4}$$

$$2] \int_0^{2\pi} \frac{7}{4} d\theta = \frac{7\theta}{4} \Big|_0^{2\pi} = \frac{7 \cdot 2\pi}{4} = \boxed{\frac{7\pi}{2}}$$

13) Ignored, as practically the same as #11)

$$15) z = 5 - \sqrt{1 + x^2 + y^2} \text{ on } \{(r, \theta): 0 \leq r \leq 2, 0 \leq \theta \leq 2\pi\}$$

$$z = 5 - \sqrt{1 + r^2 \cos^2 \theta + r^2 \sin^2 \theta} = z = 5 - \sqrt{1 + r^2} \leadsto A = \int_0^{2\pi} \int_0^2 (5 - \sqrt{1 + r^2}) r \, dr \, d\theta$$

$$1] \int_0^2 (5 - \sqrt{1 + r^2}) r \, dr = \int_0^2 \left(5r - r(1 + r^2)^{\frac{1}{2}} \right) dr = \left. \frac{5}{2} r^2 - \frac{2}{3} (1 + r^2)^{\frac{3}{2}} \right|_0^2$$

$$= \frac{20}{2} - \frac{2}{3} (\sqrt{125}) + \frac{2}{3} = \frac{60 - 10\sqrt{5} + 1}{6} = \boxed{\frac{61 - 10\sqrt{5}}{6}}$$

$$2] \int_0^{2\pi} \left[\frac{61 - 10\sqrt{5}}{6} \right] d\theta = \left[\frac{61 - 10\sqrt{5}}{6} \right] \theta \Big|_0^{2\pi} = \boxed{\left(\frac{61 - 10\sqrt{5}}{3} \right) \pi}$$

17) Same, if not messier, than 15); ignored

$$19) \text{ top: } z = 2 - x^2 - y^2 \leadsto \underline{z = 2 - r^2} \quad \text{Bottom: } z = x^2 + y^2 \leadsto \underline{z = r^2}$$

Curve C where top = bottom: $2 - r^2 = r^2 \rightarrow \underline{r = 1}$

$$A_{\text{between}} = \int_0^{2\pi} \int_0^1 ((2 - r^2) - r^2) r \, dr \, d\theta$$

$$1] \int_0^1 (2 - 2r^2) r \, dr = \int_0^1 (2r - 2r^3) dr = \left. r^2 - \frac{1}{2} r^4 \right|_0^1 = 1 - \frac{1}{2} = \underline{\frac{1}{2}}$$

cont'd next pg

cont'd from last pg

$$2] \int_0^{2\pi} \frac{1}{2} d\theta = \frac{\theta}{2} \Big|_0^{2\pi} = \frac{2\pi}{2} = \boxed{\pi}$$

21) TOP: $z = 2 - x^2 - y^2 = 2 - r^2$ | BOT: $z = 1$

Intersection curve $C \Rightarrow 2 - r^2 = 1 \Rightarrow -r^2 = -1 \Rightarrow r^2 = 1 \Rightarrow r = 1$


$$\int_0^{2\pi} \int_0^1 ((2 - r^2) - 1) r dr d\theta$$

NOTE: THE CURVE "C" IS THE UPPER LIMIT OF DIFFERENTIATION FOR THE DOUBLE INTEGRAL

$$1] \int_0^1 ((2 - r^2) - 1) r dr = \int_0^1 (r - r^3) dr = \frac{1}{2} r^2 - \frac{1}{4} r^4 \Big|_0^1 = \frac{1}{2} - \frac{1}{4} = \frac{1}{4}$$

$$2] \int_0^{2\pi} \frac{1}{4} d\theta = \frac{\theta}{4} \Big|_0^{2\pi} = \frac{2\pi}{4} = \boxed{\frac{\pi}{2}}$$

23) just a circle with rad 4 on x



$$R = \{(r, \theta) : 0 \leq r \leq 4; 0 \leq \theta \leq 2\pi\}$$

$$\iint_R (x^2 + y^2) dA = \int_0^{2\pi} \int_0^4 r^2 r dr d\theta$$

$$1] \int_0^4 r^3 dr = \frac{1}{4} r^4 \Big|_0^4 = 64 \rightarrow 2] \int_0^{2\pi} 64 d\theta = 64\theta \Big|_0^{2\pi} = \boxed{128\pi}$$

25) $\iint_R 2xy dA$ $R = \{(x, y) : x^2 + y^2 \leq 9, y \geq 0\}$

$$\int_0^{2\pi} \int_0^3 2r^3 (\cos\theta \sin\theta) dr d\theta$$

$$r^2 \leq 9 \Rightarrow r \leq 3$$

$$r \sin\theta \geq 0 \Rightarrow \sin\theta \geq 0 \Rightarrow \theta \in [0, \pi]$$

try identity $\sin(2\theta) = 2 \sin\theta \cos\theta$
USE GRAPH

$$1] \int_0^3 2r^3 dr = r^4 \Big|_0^3 = 81$$

$$2] \int_0^\pi 9 \cos\theta \sin\theta d\theta = \boxed{0}$$

$$27) \iint_R \frac{1}{\sqrt{16-x^2-y^2}} dA \quad R = \{(x,y) : x^2+y^2 \leq 4, x \geq 0, y \geq 0\}$$

$$\hookrightarrow \int_0^{\pi/2} \int_0^2 \frac{r}{\sqrt{16-r^2}} dr d\theta = \int_0^{\pi/2} \int_0^2 (16-r^2)^{-1/2} r dr d\theta$$

$$1] \int_0^2 (16-r^2)^{-1/2} r dr = (16-r^2)^{1/2} \Big|_0^2 = \frac{\sqrt{12}}{2\sqrt{3}} - 4$$

$$2] \int_0^{\pi/2} \frac{\sqrt{12}}{2\sqrt{3}} - 4 d\theta = \frac{2\sqrt{3}}{2\sqrt{3}} \theta - 4\theta \Big|_0^{\pi/2} = \sqrt{3} \cdot \pi - 2\pi = \boxed{\pi(\sqrt{3}-2)}$$

$$39) \text{ Annular Area of } 1 \text{ where } R = \{(r,\theta) : 1 \leq r \leq 2, 0 \leq \theta \leq \pi\}$$

$$\text{integral: } \int_0^{\pi} \int_1^2 r dr d\theta = \int_0^{\pi} \int_1^2 r dr d\theta$$

$$1] \int_1^2 r dr = \frac{1}{2} r^2 \Big|_1^2 = 2 - \frac{1}{2} = \frac{3}{2}$$

$$2] \int_0^{\pi} \frac{3}{2} d\theta = \frac{3\theta}{2} \Big|_0^{\pi} = \boxed{3\pi/2}$$

51-57) just integrals... might add later :)