

Lyell c Read

CH 11.4 Homework  
1-8 4K | K in 3..11

10/2/2018

1)  $|u \times v| = |u||v|\sin\theta$

2) Right-Hand Rule Fingers  $u \rightarrow v$  Thumb

3)  $|u \times v| = |u||v|\sin(0) = 0$

4)  $|u \times v| = |u||v|\sin(90) = |u||v|$

5)  $u \times v = \begin{vmatrix} i & j & k \\ u_1 & u_2 & u_3 \\ v_1 & v_2 & v_3 \end{vmatrix}$

6)  $T = |F||L|\sin\theta = F \times L$


7)  $\langle 0, 0, 15 \rangle$

8)  $\langle 0, 8, 0 \rangle$


12)  $u = \langle 0, -2, -2 \rangle$

$v = \langle 0, 2, -2 \rangle$

$u \times v = |u||v|\sin(90) = 2\sqrt{8} i$




16)



$i \times k = -j$

20)



2)  $x - 5i = 10K$

24)  $u = \langle 8, 2, -3 \rangle$  find A of  $\square$   
 $v = \langle 2, 4, -4 \rangle$

$A \square = u \times v = \square$

- doing #23 instead for ans

23)  $u = \langle 2, -1, -2 \rangle$   $v = \langle 3, 2, -1 \rangle$  find A of  $\square$

$u \times v = \begin{vmatrix} i & j & k \\ 2 & -1 & -2 \\ 3 & 2 & -1 \end{vmatrix} = i \begin{vmatrix} -1 & -2 \\ 2 & -1 \end{vmatrix} - j \begin{vmatrix} 2 & -2 \\ 3 & -1 \end{vmatrix} + k \begin{vmatrix} 2 & -1 \\ 3 & 2 \end{vmatrix} = 5i - 4j + 8k$


$\begin{vmatrix} a & b \\ c & d \end{vmatrix} = ad - bc$

$A = \langle 5, -4, 8 \rangle$

$= \sqrt{25 + 16 + 64} = \sqrt{105}$

27) (sub for 28)  $A = (5, 6, 2)$   $B = (7, 16, 4)$   $C = (6, 7, 3)$

$= \sqrt{49} = 7$



vectors used:  
 $\overrightarrow{AB}$   $\overrightarrow{AC}$

$\overrightarrow{AB} = B - A = \langle 7-5, 16-6, 4-2 \rangle = \langle 2, 10, 2 \rangle$

$\overrightarrow{AC} = C - A = \langle 6-5, 7-6, 3-2 \rangle = \langle 1, 1, 1 \rangle$

$A_{\square} = |\overrightarrow{AB} \times \overrightarrow{AC}| = \begin{vmatrix} i & j & k \\ 2 & 10 & 2 \\ 1 & 1 & 1 \end{vmatrix} = i \begin{vmatrix} 10 & 2 \\ 1 & 1 \end{vmatrix} - j \begin{vmatrix} 2 & 2 \\ 1 & 1 \end{vmatrix} + k \begin{vmatrix} 2 & 10 \\ 1 & 1 \end{vmatrix} = \langle 8, 0, -8 \rangle$   
 $= \sqrt{64 + 0 + 64} = \sqrt{128} = 8\sqrt{2}$




31) (sub for 32)  $u = \langle 2, 3, -9 \rangle$   $v = \langle -1, 1, -1 \rangle$

$$u \times v = \begin{vmatrix} i & j & k \\ 2 & 3 & -9 \\ -1 & 1 & -1 \end{vmatrix} = i \begin{vmatrix} 3 & -9 \\ 1 & -1 \end{vmatrix} - j \begin{vmatrix} 2 & -9 \\ -1 & -1 \end{vmatrix} + k \begin{vmatrix} 2 & 3 \\ -1 & 1 \end{vmatrix} = \langle 6, 11, 5 \rangle$$

$$v \times u = -\langle u \times v \rangle = \langle -6, -11, -5 \rangle$$

35) (sub for 36) find vec ortho to  $v = \langle 0, 1, 2 \rangle$   $w = \langle -2, 0, 3 \rangle$   
 - either  $u \times v$  or  $v \times u$  will do...

$$u \times v = \begin{vmatrix} i & j & k \\ 0 & 1 & 2 \\ -2 & 0 & 3 \end{vmatrix} = i \begin{vmatrix} 1 & 2 \\ 0 & 3 \end{vmatrix} - j \begin{vmatrix} 0 & 2 \\ -2 & 3 \end{vmatrix} + k \begin{vmatrix} 0 & 1 \\ -2 & 0 \end{vmatrix} = \langle 3, -4, 2 \rangle$$

36)   $\tau_{\text{hinge}} = |F| |L| \sin 90^\circ = |10| |1.5| = 15$

49) just another Torque problem... ↑