

# 离散数学作业 \_1

李云浩 241880324

2025 年 3 月 16 日

## 1 P60-62

### T12

$p$  表示今天是星期一,  $q$  表示碟子里有汤匙,  $r$  表示草地是湿的。

(a)  $p \wedge q$  (b)  $q \vee r$  (c)  $\neg p \wedge \neg r$  (d)  $\neg q \wedge r$

### T15

(a) 对于任意的整数, 都存在一个整数, 使它们之和为偶数。

(b) 存在一个整数, 使得它与任意的整数之和都为偶数。

### T16

(a) 所有的整数都不是素数 (b) 存在一个不是偶数的整数。

### T18

(a)  $\forall x \neg P(x)$  (b)  $\forall x \forall y R(x, y)$

(c)  $\neg(\exists x(P(x) \wedge Q(x)))$  (d)  $\forall x(P(x) \vee Q(x))$

### T28

$p$	$q$	$p \vee q$	$\neg q$	$(p \vee q) \vee \neg q$
$F$	$F$	$F$	$T$	$T$
$F$	$T$	$T$	$F$	$T$
$T$	$F$	$T$	$T$	$T$
$T$	$T$	$T$	$F$	$T$

### T30

$p$	$q$	$r$	$\neg p$	$\neg r$	$\neg p \vee q$	$(\neg p \vee q) \wedge \neg r$
$F$	$F$	$F$	$T$	$T$	$T$	$T$
$F$	$F$	$T$	$T$	$F$	$T$	$F$
$F$	$T$	$F$	$T$	$T$	$T$	$T$
$F$	$T$	$T$	$T$	$F$	$T$	$F$
$T$	$F$	$F$	$F$	$T$	$F$	$F$
$T$	$F$	$T$	$F$	$F$	$F$	$F$
$T$	$T$	$F$	$F$	$T$	$T$	$T$
$T$	$T$	$T$	$F$	$F$	$T$	$F$

**T32**

$p$	$q$	$r$	$p \downarrow q$	$p \downarrow r$	$(p \downarrow q) \wedge (p \downarrow r)$
$F$	$F$	$F$	$T$	$T$	$T$
$F$	$F$	$T$	$T$	$F$	$F$
$F$	$T$	$F$	$F$	$T$	$F$
$F$	$T$	$T$	$F$	$F$	$F$
$T$	$F$	$F$	$F$	$F$	$F$
$T$	$F$	$T$	$F$	$F$	$F$
$T$	$T$	$F$	$F$	$F$	$F$
$T$	$T$	$T$	$F$	$F$	$F$

**T35**

$p$	$q$	$p \wedge q$	$(p \wedge q) \triangle p$
$F$	$F$	$F$	$F$
$F$	$T$	$F$	$F$
$T$	$F$	$F$	$T$
$T$	$T$	$T$	$F$

## 2 P66-69

**T6**

(a)  $\neg r \rightarrow q$    (b)  $\neg q \wedge p$    (c)  $q \rightarrow \neg p$    (d)  $\neg p \rightarrow \neg r$

**T7**

- (a) 仅当我心情不好时，我会去看电影并且不学习离散数学结构。  
 (b) 如果我心情好，那么我会学习离散数学结构或者去看电影。  
 (c) 如果我心情不好，那么我不会去看电影或者我会学习离散数学结构。  
 (d) 当且仅当我心情很好，我会去看电影并且不学习离散数学结构。

**T12**

- (a) 不定式

$p$	$q$	$q \wedge p$	$\neg p$	$q \wedge \neg p$	$(q \wedge p) \vee (q \wedge \neg p)$
$F$	$F$	$F$	$T$	$F$	$F$
$F$	$T$	$F$	$T$	$T$	$T$
$T$	$F$	$F$	$F$	$F$	$F$
$T$	$T$	$T$	$F$	$F$	$T$

- (b) 重言式

$p$	$q$	$p \wedge q$	$(p \wedge q) \rightarrow p$
$F$	$F$	$F$	$T$
$F$	$T$	$F$	$T$
$T$	$F$	$F$	$T$
$T$	$T$	$T$	$T$

- (c) 不定式

$p$	$q$	$q \wedge p$	$p \rightarrow (q \wedge p)$
$F$	$F$	$F$	$T$
$F$	$T$	$F$	$T$
$T$	$F$	$F$	$F$
$T$	$T$	$T$	$T$

**T13**

$p \rightarrow q$  的真值表为：

$p$	$q$	$p \rightarrow q$
$F$	$F$	$T$
$F$	$T$	$T$
$T$	$T$	$T$
$T$	$F$	$F$
$T$	$T$	$T$

因此  $p \rightarrow q$  为假，即  $p = T, q = F$ ，此时：

$p$	$q$	$(p \wedge q)$	$\neg(p \wedge q)$	$(\neg(p \wedge q)) \rightarrow q$
$T$	$F$	$F$	$T$	$F$

$(\neg(p \wedge q)) \rightarrow q$  真值为假。

**T14**

$p \rightarrow q$  的真值表为：

$p$	$q$	$p \rightarrow q$
$F$	$F$	$T$
$F$	$T$	$T$
$T$	$F$	$F$
$T$	$T$	$T$

因此  $p \rightarrow q$  为假，即  $p = T, q = F$ ，此时：

$p$	$q$	$\neg p$	$(p \rightarrow q)$	$(\neg p) \vee (p \rightarrow q)$
$T$	$F$	$F$	$F$	$F$

$(\neg p) \vee (p \rightarrow q)$  真值为假。

**T15**

$p \rightarrow q$  的真值表为：

$p$	$q$	$p \rightarrow q$
$F$	$F$	$T$
$F$	$T$	$T$
$T$	$F$	$F$
$T$	$T$	$T$

因此  $p \rightarrow q$  为真，即  $(p = F) \vee (p = q = T)$ ，此时：

$p$	$q$	$p \wedge q$	$\neg q$	$(p \wedge q) \rightarrow \neg q$
$F$	$F$	$F$	$T$	$T$
$F$	$T$	$F$	$F$	$T$
$T$	$T$	$T$	$F$	$F$

$(p \wedge q) \rightarrow \neg q$  的真值可能为真可能为假，无法确定。

**T16**

$p \rightarrow q$  的真值表为：

$p$	$q$	$p \rightarrow q$
$F$	$F$	$T$
$F$	$T$	$T$
$T$	$F$	$F$
$T$	$T$	$T$

因此  $p \rightarrow q$  为真，即  $(p = F) \vee (p = q = T)$ ，此时：

$p$	$q$	$(p \rightarrow q)$	$\neg(p \rightarrow q)$	$\neg p$	$\neg(p \rightarrow q) \wedge \neg p$
$F$	$F$	$T$	$F$	$T$	$F$
$F$	$T$	$T$	$F$	$T$	$F$
$T$	$T$	$T$	$F$	$F$	$F$

$\neg(p \rightarrow q) \wedge \neg p$  的真值为假。

**T24**

- (a) 天气好或者我去上班。
- (b) 卡罗尔没有生病，去了野餐但卡罗尔玩得不愉快。
- (c) 我进入了比赛并且赢得了这场比赛。

**T27**

$p \wedge (q \vee r)$  的真值表为：

$p$	$q$	$r$	$q \vee r$	$p \wedge (q \vee r)$
$F$	$F$	$F$	$F$	$F$
$F$	$F$	$T$	$T$	$F$
$F$	$T$	$F$	$T$	$F$
$F$	$T$	$T$	$T$	$F$
$T$	$F$	$F$	$F$	$F$
$T$	$F$	$T$	$T$	$T$
$T$	$T$	$F$	$T$	$T$
$T$	$T$	$T$	$T$	$T$

$(p \wedge q) \vee (p \wedge r)$  的真值表为:

$p$	$q$	$r$	$p \wedge q$	$p \wedge r$	$(p \wedge q) \vee (p \wedge r)$
$F$	$F$	$F$	$F$	$F$	$F$
$F$	$F$	$T$	$F$	$F$	$F$
$F$	$T$	$F$	$F$	$F$	$F$
$F$	$T$	$T$	$F$	$F$	$F$
$T$	$F$	$F$	$F$	$F$	$F$
$T$	$F$	$T$	$F$	$T$	$T$
$T$	$T$	$F$	$T$	$F$	$T$
$T$	$T$	$T$	$T$	$T$	$T$

因此在  $p \ q \ r$  的不同的真值指派情况下, 两个命题的真值情况一致, 故两个命题等价。即  $p \wedge (q \vee r) \equiv (p \wedge q) \vee (p \wedge r)$

#### T28

$\neg(p \vee q)$  的真值表为:

$p$	$q$	$p \vee q$	$\neg(p \vee q)$
$F$	$F$	$F$	$T$
$F$	$T$	$T$	$F$
$T$	$F$	$T$	$F$
$T$	$T$	$T$	$F$

$(\neg p) \wedge (\neg q)$  的真值表为:

$p$	$q$	$\neg p$	$\neg q$	$(\neg p) \wedge (\neg q)$
$F$	$F$	$T$	$T$	$T$
$F$	$T$	$T$	$F$	$F$
$T$	$F$	$F$	$T$	$F$
$T$	$T$	$F$	$F$	$F$

因此在  $p \ q$  的不同的真值指派情况下, 两个命题的真值情况一致, 故两个命题等价。即  $\neg(p \vee q) \equiv (\neg p) \wedge (\neg q)$

**T29**

$$\begin{aligned}\neg(p \leftrightarrow q) &\equiv \neg((p \wedge q) \vee (\neg p \wedge \neg q)) \\ &\equiv \neg(p \wedge q) \wedge \neg(\neg p \wedge \neg q) \\ &\equiv (\neg p \vee \neg q) \wedge (p \vee q) \\ &\equiv ((\neg p \vee \neg q) \wedge p) \vee ((\neg p \vee \neg q) \wedge q) \\ &\equiv ((\neg p \wedge p) \vee (p \wedge \neg q)) \vee ((\neg p \wedge q) \vee (\neg q \wedge q)) \\ &\equiv (F \vee (p \wedge \neg q)) \vee ((\neg p \wedge q) \vee F) \\ &\equiv ((p \wedge \neg q) \vee (q \wedge \neg p))\end{aligned}$$

**T30**

$$\begin{array}{l} 1. \quad \exists x(P(x) \vee Q(x)) \\ 2. \quad P(a) \vee Q(b) \\ \hline 3. \quad \therefore \exists xP(x) \vee \exists xQ(x) \end{array}$$

因此  $\exists x(P(x) \vee Q(x)) \equiv \exists xP(x) \vee \exists xQ(x)$

**T31**

$$\begin{aligned}\forall x(P(x) \wedge Q(x)) &\equiv \neg(\exists x(P(x) \vee Q(x))) \\ &\equiv \neg(\exists xP(x) \vee \exists xQ(x)) \\ &\equiv \forall xP(x) \wedge \forall xQ(x)\end{aligned}$$

因此  $\forall x(P(x) \wedge Q(x)) \equiv \forall xP(x) \wedge \forall xQ(x)$

**T32**

$$\begin{aligned}(p \wedge q) \rightarrow p &\equiv \neg(p \wedge q) \vee (p \wedge q \wedge p) \\ &\equiv (\neg p \vee \neg q) \vee (p \wedge q) \\ &\equiv (\neg p \vee \neg q \vee p) \wedge (\neg p \vee \neg q \vee q) \\ &\equiv T \wedge T \\ &\equiv T\end{aligned}$$

**T33**

$$\begin{aligned} q \rightarrow (p \vee q) &\equiv \neg q \vee (p \vee q) \\ &\equiv \neg q \vee p \vee q \\ &\equiv T \end{aligned}$$

**T34**

$$\begin{aligned} (p \wedge (p \rightarrow q)) \rightarrow q &\equiv (p \wedge (\neg p \vee q)) \rightarrow q \\ &\equiv ((p \wedge \neg p) \vee (p \wedge q)) \rightarrow q \\ &\equiv \neg(p \wedge q) \vee q \\ &\equiv \neg p \vee \neg q \vee q \\ &\equiv T \end{aligned}$$

**T35**

$$\begin{aligned} ((p \rightarrow q) \wedge (q \rightarrow r)) \rightarrow (p \rightarrow r) &\equiv ((\neg p \vee q) \wedge (\neg q \vee r)) \rightarrow (\neg p \vee r) \\ &\equiv \neg((\neg p \vee q) \wedge (\neg q \vee r)) \vee (\neg p \vee r) \\ &\equiv (\neg(\neg p \vee q) \vee \neg(\neg q \vee r)) \vee (\neg p \vee r) \\ &\equiv (p \wedge \neg q) \vee (q \wedge \neg r) \vee \neg p \vee r \\ &\equiv (\neg q \vee \neg p) \vee (q \vee r) \\ &\equiv T \end{aligned}$$

### 3 P73-75

**T8**

$p$ 、 $q$ 、 $r$ 、 $s$  分别表示这个学期毕业、通过了物理考试、每星期花 10 个小时学习物理、打排球。

前提： $p \rightarrow q$ 、 $\neg r \rightarrow \neg q$ 、 $r \rightarrow \neg s$ 、 $s$  证明： $\neg p$

1.



**T12**

(a)

1.  $(p \rightarrow q) \wedge (q \rightarrow r)$
2.  $(\neg p \vee q) \wedge (\neg q \vee r)$
3.  $\neg q \wedge r$
4.  $\neg q$
5.  $\neg p \vee q$
6.  $\neg q$
7.  $\therefore p$

(b)

1.  $\neg(p \rightarrow q)$
2.  $\neg(\neg p \vee q)$
3.  $p \wedge \neg q$
4.  $p$
5.  $\therefore \neg q$

**T18** 证明:  $n^2$  是偶数当且仅当  $n$  是偶数。设  $p$  表示  $n$  为偶数,  $q$  表示  $n^2$  为偶数。证  $p \rightarrow q$ :不妨令  $n = 2k$ , 则  $n^2 = 4k^2$ , 因此  $n^2$  为偶数。  $p \rightarrow q$  成立。证  $q \rightarrow p$ :反证法: 不妨假设  $n$  为奇数, 且  $n^2$  为偶数, 即  $n = 2k + 1$ 。所以  $n^2 = (2k + 1)^2 = 4k^2 + 4k + 1$  $4k^2 + 4k$  为偶数, 故  $n^2$  为奇数, 与假设矛盾, 故假设不成立。  $q \rightarrow p$  成立。综上所述,  $n^2$  是偶数当且仅当  $n$  是偶数。**T20** 设  $A$  和  $B$  是全集  $U$  的子集, 证明  $A \subseteq B$  当且仅当  $\overline{B} \subseteq \overline{A}$ 证  $(A \subseteq B) \rightarrow (\overline{B} \subseteq \overline{A})$ :对于  $\forall x \in \overline{B}$ , 即  $x \notin B$ 。因为  $A \subseteq B$ , 所以  $x \notin A$ , 即  $x \in \overline{A}$ 。成立。证  $(\overline{B} \subseteq \overline{A}) \rightarrow (A \subseteq B)$ :对于  $\forall x \in A$ , 即  $x \notin \overline{A}$ 。因为  $\overline{B} \subseteq \overline{A}$ , 所以  $x \notin \overline{B}$ , 即  $x \in B$ 。成立。综上所述:  $A \subseteq B$  当且仅当  $\overline{B} \subseteq \overline{A}$ 。**T22** 证明:  $k$  为奇数是  $k^3$  为奇数的一个充要条件。证  $k$  为奇数  $\rightarrow k^3$  为奇数令  $k = 2n + 1$ , 所以  $k^3 = (2n + 1)^3 = 8n^3 + 12n^2 + 6n + 1$ 。此时  $k^3$  为奇

数，成立。

证  $k^3$  为奇数  $\rightarrow k$  为奇数

反证，假设  $k$  为偶数， $k^3$  为奇数。不妨令  $k = 2n$ ，所以  $k^3 = 8n^3$  为偶数，与假设矛盾。故假设不成立，原命题成立。

综上所述： $k$  为奇数是  $k^3$  为奇数的一个充要条件。

**T23** 证明或证伪： $n^2 + 41n + 41$  对每个整数  $n$  都是一个素数。

取  $n = 41$ ，此时  $n^2 + 41n + 41 = 2 \times 41 + 41 \times 41 + 41$ ，显然能被 41 整除，命题不成立。

**T24** 证明或证伪：任何 5 个连续整数之和能被 5 整除。

不妨设五个整数分别为  $n, n+1, n+2, n+3, n+4$ ，和为： $5n+10$  能被 5 整除，命题成立。

**T30**

论证大致正确，当其中可以强调  $b \neq 0$ ，使论证更为严谨。

## 4 P79-83

**T20**

(a) 当  $P(n)$  成立时，即  $2|(2n-1)$ ，因为  $2|2$ ，所以  $2|(2n-1+2)$ ，即  $2|(2n+1)$ ，所以  $P(k+1)$  也成立。当  $P(n)$  不成立时，同理  $P(n+1)$  也不成立。

$P(n) \rightarrow P(n+1)$  的真值表为：

$P(n)$	$P(n+1)$	$P(n) \rightarrow P(n+1)$
$F$	$F$	$T$
$T$	$T$	$T$

因此  $P(n) \rightarrow P(n+1)$  为重言式。

(b) 对于任意的整数  $n$ ， $2n-1$  为奇数，不能被 2 整除。因此  $P(n)$  对于任意整数  $n$  不为真。

(c) 不矛盾。分题 (a) 说明的是  $P(n)$  与  $P(n+1)$  的真值情况一致，说明可以从  $P(n)$  的真值情况推出  $P(n+1)$  那么数学归纳法的原理也是近似，先找出一两个例子，然后利用递推关系推出剩下的所有情况。因此并不矛盾。

**T22**

论证时指举出了  $P(0)$  一个例子，但是后续  $2^k$  以及  $2^{k-1}$  都使用了这个特例。

**T26 证明：** 设  $A$  和  $B$  是方阵，如果  $AB = BA$ ，那么  $(AB)^n = A^n B^n$  对  $n \geq 1$  成立。

当  $n = 1$  时， $AB = BA$  已由条件给出，成立。

假设  $n = k$  时成立，证明  $n = k + 1$  时也成立：

$$\begin{aligned}
 (AB)^{k+1} &= (AB)^k AB \\
 &= A^k B^k AB \\
 &= A^k B^{k-1} (BA) B \\
 &= A^k B^{k-1} AB^2 \\
 &\vdots \\
 &= A^{k+1} B^{k+1}
 \end{aligned}$$

证毕。

**T28 证明：** 每个比 27 大的整数都能写成  $5a + 8b$ ，其中  $a, b \in \mathbf{N}$

有：  $28 = 5 \times 4 + 8 \times 1$ ,  $29 = 5 \times 1 + 8 \times 3$ ,  $30 = 5 \times 6 + 8 \times 0$ ,  
 $31 = 5 \times 3 + 8 \times 2$ ,  $32 = 5 \times 0 + 8 \times 4$ . 根据数学归纳法，目前存在五个连续的大于 27 的整数满足条件。且  $P(n)$  成立时。  $P(n + 5)$  显然成立。  
 证毕。

**T30 证明：** 如果  $GCD(a, b) = 1$ ，那么对所有  $n \geq 1, GCD(a^n, b^n) = 1$ .

因为  $GCD(a, b) = 1$ ，即对  $a, b$  分别进行质因数分解时，只有 1 这一个共同的公因数。那么当  $a, b$  分别变为  $n$  次方后，分解出来的质因数与一开始的等同，因此仍然只会存在 1 这一个唯一的公因数。因此如果  $GCD(a, b) = 1$ ，那么对所有  $n \geq 1, GCD(a^n, b^n) = 1$ 。

**T34**

当循环尚未进行时（第 0 次循环）， $W_0 = Y, Z_0 = X$ ，有  $(Y \times W_0) + Z_0 = X + Y^2$ 。

假设进入了第  $n$  次循环，不变量成立。即：  $(Y \times W_n) + Z_n = X + Y^2$  成立。

那么第  $n + 1$  次时,  $W_{n+1} = W_n - 1, Z_{n+1} = Z_n + Y$   
因此

$$\begin{aligned}(Y \times W_{n+1}) + Z_{n+1} &= (Y \times (W_n - 1)) + (Z_n + Y) \\ &= (Y \times W_n) + Z_n \\ &= X + Y^2\end{aligned}$$

因此  $(Y \times W) + Z = X + Y^2$  在循环过程中始终成立。  
在循环结束时,  $W = 0$ , 因此  $Z = X + Y^2$ 。

### **T36**

当循环尚未进行时 (第 0 次循环),  $R_0 = 1, K_0 = 2M$ , 有  $R \times N^K = 1 \times N^{2M} = N^{2M}$ 。

假设进入了第  $n$  次循环, 不变量成立。即:  $R_n \times N^{K_n} = N^{2M}$ 。

那么第  $n + 1$  次时,  $R_{n+1} = R_n \times N, K_{n+1} = K_n - 1$

因此

$$\begin{aligned}R_{n+1} \times N^{K_{n+1}} &= (R_n \times N) \times (N^{K_n-1}) \\ &= R_n \times N^{K_n} \\ &= N^{2M}\end{aligned}$$

因此  $R \times N^K = N^{2M}$  在循环过程中始终成立。  
在循环结束时,  $R = N^{2M}, K = 0$ , 因此  $R = N^{2M}$ 。

## **5 P86-87**

### **T20**

有  $g_1 = 1, g_2 = 3, g_n = g_{n-1} + g_{n-2}$ , 因此  $g_3 = g_1 + g_2 = 4, g_4 = g_3 + g_2 = 7, g_5 = g_4 + g_3 = 11, g_6 = g_5 + g_4 = 18$ 。提出猜想  $\sum_i^n$

### **T21**

### **T22**

### **T23**

因为  $g_{2n} = g_{2n-1} + g_{2n-2}, g_{2n-1} = g_{2n-2} + g_{2n-3}$

有:  $g_{2n} = 2 \times g_{2n-2} + g_{2n-3}$ , 因此

**T24**

**T25**