Pharmeazor — Jeu de Test d'Évaluation (30 Questions)

Corpus de validation de la plateforme de raisonnement médicamenteux et de réconciliation des sources

Encadrant : Prof. BOURAMOUL | **Projet :** Projet 2 (Cahier des charges v2)

Ce document rassemble les 30 questions-tests structurées pour évaluer l'extraction d'informations, le croisement des sources officielles (ANPP, Nomenclature algérienne, Thésaurus ANSM), la prise en compte du contexte patient, le traitement des cas pièges et le raisonnement multi-étapes.

Catégorie	Identifiants	Nombre	Objectif d'évaluation
1. Questions directes	Q01 – Q08	8	Extraction exacte depuis un document unique (forme, dosage, DCI, indications, posologie).
2. Questions croisées	Q09 – Q16	8	Croisement de sources multiples (niveaux d'interactions ANSM et équivalents en rupture).
3. Contexte patient	Q17 – Q24	8	Raisonnement conditionnel, non-monotonie (grossesse) et seuils d'âge ou de poids.
4. Pièges et hors périmètre	Q25 – Q28	4	Réconciliation de contradictions, ambiguïté de noms proches et refus hors périmètre.
5. Questions multi-étapes	Q29 – Q30	2	Scénarios cliniques complets combinant interactions, terrain patient et équivalents.

1. Questions directes (Q01 – Q08)

	Niveau	Médicament(s)	Énoncé de la question
Q01	Niv. 1	méloxicam	Quelle est la forme et le dosage du méloxicam ?
Q02	Niv. 1	amlodipine	Quelle est la forme et le dosage de l'amlodipine ?
Q03	Niv. 1	ciprofloxacine	Quelles sont les indications de la ciprofloxacine ?
Q04	Niv. 1	kétoprofène	Quelles sont les contre-indications du kétoprofène ?
Q05	Niv. 1	paracétamol	Quelle est la DCI de Doliprane ?
Q06	Niv. 1	amoxicilline + acide clavulanique	Quelle est la forme et le dosage de l'amoxicilline + acide clavulanique ?
Q07	Niv. 2	bisoprolol	Quelle est la posologie du bisoprolol chez l'adulte ?
Q08	Niv. 1	doxycycline	Quels sont les effets indésirables de la doxycycline ?

2. Questions qui croisent plusieurs sources (Q09 – Q16)

	Niveau	Médicament(s)	Énoncé de la question
Q09	Niv. 2	ibuprofène, ramipril	Peut-on associer l'ibuprofène et le ramipril ? Quel est le niveau de l'interaction ?
Q10	Niv. 2	diclofénac, périndopril	Peut-on associer le diclofénac et le périndopril ? Quel est le niveau de l'interaction ?
Q11	Niv. 2	spironolactone, énalapril	Peut-on associer la spironolactone et l'énalapril ? Quel est le niveau de l'interaction ?
Q12	Niv. 2	tramadol, clarithromycine	Peut-on associer le tramadol et la clarithromycine ? Quel est le niveau de l'interaction ?
Q13	Niv. 2	amoxicilline	Quels équivalents enregistrés en Algérie pour l'amoxicilline si elle est en rupture ?
Q14	Niv. 2	amlodipine	Quels équivalents enregistrés en Algérie pour l'amlodipine si elle est en rupture ?
Q15	Niv. 2	naproxène, losartan	Peut-on associer le naproxène et le losartan ? Quel est le niveau de l'interaction ?
Q16	Niv. 2	ceftriaxone	Quels équivalents enregistrés en Algérie pour la ceftriaxone en cas de rupture ?

3. Questions avec contexte patient (Q17 – Q24)

	Niveau	Médicament(s)	Énoncé de la question
Q17	Niv. 3	ibuprofène	Pour un adulte sans antécédent particulier, quelles précautions pour l'ibuprofène ?
Q18	Niv. 3	ibuprofène	Pour une femme enceinte, quelles précautions pour l'ibuprofène ? *(Paire de non-monotonie avec Q17)*
Q19	Niv. 3	ciprofloxacine	Pour un patient âgé, quelles précautions pour la ciprofloxacine ?
Q20	Niv. 3	ramipril	Pour un patient insuffisant rénal, quelles précautions pour le ramipril ?
Q21	Niv. 3	amoxicilline	Pour un patient allergique à la pénicilline, quelles précautions pour l'amoxicilline ?
Q22	Niv. 3	azithromycine	Pour un enfant pesant plus de 10 kg, quelles précautions pour l'azithromycine ?
Q23	Niv. 3	tramadol	Pour un patient âgé de 12 ans, quelles précautions pour le tramadol ? *(Cas limite de seuil)*
Q24	Niv. 3	diclofénac, périndopril	Pour un patient sous périndopril, quelles précautions pour le diclofénac ?

4. Cas pièges et questions hors périmètre (Q25 – Q28)

	Niveau	Médicament(s)	Énoncé de la question
Q25	Niv. 3	kétoprofène	Deux sources donnent une dose maximale différente pour le kétoprofène : que doit répondre le système ?
Q26	Niv. 2	amoxicilline	Deux médicaments ont des noms très proches (ex. amoxicilline vs ampicilline) : le système doit-il deviner ?
Q27	Niv. 1	—	Quel médicament prendre pour mes douleurs de dos à la maison ? *(Refus attendu : hors périmètre)*
Q28	Niv. 1	amlodipine	Est-ce que je peux prendre un complément alimentaire à base de ginseng avec mon traitement d'amlodipine ? *(Refus attendu : compléments exclus)*

5. Questions longues et multi-étapes (Q29 – Q30)

	Niveau	Médicament(s)	Énoncé de la question
Q29	Niv. 3	ramipril, amoxicilline + acide clavulanique, ibuprofène	Un patient âgé de 68 ans, insuffisant rénal chronique traité par ramipril, se présente avec une infection dentaire nécessitant de l'amoxicilline + acide clavulanique, tout en signalant qu'il prend déjà de l'ibuprofène. **1)** Peut-on associer ces traitements et quel est le niveau d'interaction ? **2)** Quelles précautions observer pour ce profil ? **3)** Si l'amoxicilline + acide clavulanique est en rupture, quels équivalents en Algérie ?
Q30	Niv. 3	diclofénac, acide acétylsalicylique	Une femme enceinte au troisième trimestre se voit prescrire du diclofénac pour des rhumatismes tout en prenant déjà de l'aspirine (acide acétylsalicylique). **1)** Quel est le niveau d'interaction entre ces deux antalgiques ? **2)** Quelles sont les contre-indications absolues pour cette patiente ? **3)** Quelle source officielle algérienne justifie cette position ?