


数学地图

用联系读数学



李毅芃

2026-10-03

目录

本版信息	2
前言	4
为什么是「联系」，而不是「分支」	4
这本书里有什么	4
怎么读	4
它是怎么生成的	5
关于来源与限度	5
图版·全书导览	6
图版·全书导览	7
第一部分·五视角看数学	10
数学大地图	11
0. 五种视角（怎么读这张图）	11
1. 视角一·分支（经典分类）	11
2. 视角二·历史脉络	13
3. 视角三·方法母题（数学处处是联系）	13
4. 视角四·抽象层次	14
5. 视角五·应用与交叉	15
6. 交叉主线（桥）	15
7. 学习方法论（元层）	16
8. 如何扩展这张图	16
相关	16
第二部分·交叉主线	17
导数与线性化：分析的共同语言	18
概述	18
跨书对照	18
三条贯穿的主线	18
与其他概念的关系	18
深入问题	18
参考源	18
线性结构：从向量空间到切空间	20
概述	20
跨书对照	20
三条贯穿的主线	20
与其他概念的关系	20

深入问题	20
参考源	20
内积与正交：从范数到梯度	21
概述	21
跨书对照	21
三条贯穿的主线	21
与其他概念的关系	21
深入问题	21
参考源	21
本征值与谱：从矩阵到数据	22
概述	22
跨书对照	22
三条贯穿的主线	22
与其他概念的关系	22
深入问题	22
参考源	22
微积分基本定理的普适性	23
概述	23
各版本一览	23
不同结构上的微积分	23
大一统的四条线	24
与其他概念的关系	24
深入问题	24
参考源	24
向量分析三大定理	25
概述	25
统一的句式	25
直观	25
现代统一：广义斯托克斯定理	25
使用要点	25
与其他概念的关系	26
深入问题	26
参考源	26
拓扑与分析概念辨析	27
逐条辨析	27
与其他概念的关系	28
深入问题	28
参考源	28
不变量与对偶：从格拉斯曼到线性代数	29
一句话	29
三条对应	29
核心母题	29
为什么值得连起来读	29
相关	30
参考源	30
数系扩张与承袭性：从算术到四元数	31

一句话	31
扩张的阶梯	31
三条线索	31
为什么值得连起来读	31
相关	32
参考源	32
精确与近似：数学的两副面孔	33
一句话	33
两副面孔的对照	33
核心洞见	33
为什么值得连起来读	33
相关	33
参考源	34
几何的变换群视角：从欧几里得到爱尔朗根	35
一句话	35
群的层级与几何	35
核心母题	35
为什么值得连起来读	35
相关	36
参考源	36
概率与谱：从协方差到随机矩阵	37
一句话	37
三条对应	37
核心母题	37
为什么值得连起来读	37
相关	37
参考源	37
表示与近似：从浮点数到函数带	38
一句话	38
三条对应	38
核心母题	38
为什么值得连起来读	38
相关	38
参考源	39
概率、统计与重尾：三条不确定性路径	40
一句话	40
三条路径	40
核心母题	40
为什么值得连起来读	40
相关	40
参考源	40
形式语言与计算：编译器的数学骨架	41
一句话	41
三条对应	41
核心母题	41
为什么值得连起来读	41
相关	41

参考源	41
第三部分 · 各书导读	42
《代数》(Artin) 导读	43
概述	43
章节地图	43
三个转折点	43
与线性代数的关系	44
学习建议	44
参考源	44
《线性代数应该这样学》导读	45
概述	45
章节地图	45
三个转折点	45
学习建议	46
参考源	46
《托马斯微积分》导读	47
概述	47
章节地图	47
三个转折点	48
学习建议	48
参考源	48
《从微分观点看拓扑》导读	49
概述	49
章节地图	49
核心精神	49
学习建议	49
参考源	49
《高观点下的初等数学》导读	50
概述	50
章节地图	50
三个转折点	51
与已有书的互文	51
阅读建议	51
参考源	51
《概率导论》导读	52
概述	52
章节地图	52
三个转折点	52
与本库的联系	52
参考源	52
《随机过程》导读	53
概述	53
章节地图	53
三个转折点	53

与本库的联系	53
参考源	53
《统计学七支柱》导读	54
概述	54
七根支柱	54
三个有冲击力的点	54
与本库的联系	54
参考源	54
《贝叶斯思维》导读	55
概述	55
主线	55
三个转折点	55
与本库的联系	55
参考源	55
《肥尾效应》导读	56
概述	56
主线	56
三个转折点	56
与本库的联系	56
参考源	56
《深入理解计算机系统》导读	57
概述	57
章节地图	57
三个转折点	57
与本库的联系	57
参考源	57
《现代操作系统》导读	58
概述	58
章节地图	58
三个转折点	58
与本库的联系	58
参考源	58
《编译原理》导读	59
概述	59
主线	59
三个转折点	59
与本库的联系	59
参考源	59
第四部分 • 分支与概念清单	60
基础	61
代数	62
分析	63

几何与拓扑	64
初等数学（高观点）	65
概率与统计	66
离散数学与理论 CS	67
数值与计算	68
应用与交叉	69
 第五部分 • 学习方法论	 70
数学学习方法论	71
概述	71
核心要点	71
与其他概念的关系	72
深入问题	72
参考源	72

一本会随读书笔记库一起生长的数学导览：不是按分支罗列知识，而是按「联系」组织——同一母题在代数、分析、几何、概率、数值中反复出现。

本版信息

本 PDF 由 `build-book.mjs` 自动生成，构建日期 **2026-10-03**。

当前收录 **13** 本书、**167** 个概念节点：

- 《代数 Artin》（代数）
- 《线性代数应该这样学》（代数）
- 《托马斯微积分》（分析）
- 《从微分观点看拓扑》（几何与拓扑）
- 《高观点下的初等数学》（初等数学（高观点））
- 《概率导论》（概率与统计）
- 《随机过程》（概率与统计）
- 《统计学七支柱》（概率与统计）
- 《贝叶斯思维》（概率与统计）
- 《肥尾效应》（概率与统计）
- 《深入理解计算机系统》（离散数学与理论 CS）
- 《现代操作系统》（离散数学与理论 CS）
- 《编译原理》（离散数学与理论 CS）

增删书籍后，更新 `map.config.json` 与 `wiki/知识索引.md`，重新运行脚本即可刷新本 PDF。

前言

这是一本会长大的数学书。

它不是一个完成态的教材，而是一个读书笔记库的实时投影：每多读一本书、每多写一个概念页，重新生成一次，这本书就会多出新的分支、新的概念、新的导读。所以它读起来会像一张被不断修订的地图，而不是一座一次性封顶的建筑。

为什么是「联系」，而不是「分支」

传统的数学书按学科切块：先算术、再代数、再几何、再分析。这样清楚，但也掩盖了一件事——同一个想法会换上不同的外衣反复出现。

- 「线性化」在代数里是矩阵，在分析里是导数，在几何里是切空间；
- 「对偶」在代数里是对偶空间，在几何里是极线配极，在分析里是傅里叶变换；
- 「不变量」在群论里是共轭类，在几何里是交比与度数，在概率里是充分统计量；
- 「逼近」在数值里是插值，在分析里是泰勒级数，在克莱因的笔下是函数带。

这些横跨分支的「母题」(leitmotif)，才是把数学连成一个整体的东西。本书把地图与主线放在前面，把单书导读与概念清单放在后面：先给你一张网，再往网里挂具体的书。这样，即使某本书你还没读，也能从别的书里认出同一个想法。

这本书里有什么

部分	内容	作用
一·五视角看数学	分支 / 历史 / 方法母题 / 抽象层次 / 应用	全书的骨架与小地图
二·交叉主线	每一条把两三个分支缝起来的主题页	全书的核心，最值得先读的
三·各书导读	已收录教材的成书主线与章节地图	把网落到具体的书
四·分支与概念清单	分支 × 书 × 概念节点	自动生成，随书生长
五·学习方法论	史学 → 对抗 → 对话、线代基底、贝叶斯更新	读书方法本身

怎么读

1. 先读第二部分的交叉主线，建立「联系感」；
2. 再用第一部分的五视角把联系归类；
3. 挑一本你正在读的书，看第三部分的导读，回到笔记库里的概念页深入；

4. 读不动时翻第五部分的方法论。

它是怎么生成的

本 PDF 由 `build-book.mjs` 从笔记库自动编译: 读取 `数学大地图.md`、`map.config.json` 里登记的交叉主线与书目、以及 `wiki/知识索引.md` 的概念清单, 合并为书稿后交给 Pandoc + XeLaTeX + 思源/宋体排版。

增删书籍后, 更新 `map.config.json` 与 `wiki/知识索引.md`, 重新运行脚本即可刷新本书。版本信息见下一页「本版信息」。

关于来源与限度

- 本书是个人读书笔记的提炼, 概念页是索引与综述, 不替代原教材的完整证明;
- 所引教材版权归原作者与出版社, 本书仅供个人学习与分享, 请勿用于商业分发;
- 数学在生长, 本书也在生长: 它永远是一个版本, 而不是终点。

图版·全书导览

图版 · 全书导览

本页四幅图不是手绘，而是由 `build-figures.mjs` 从 `map.config.json` 与主题页自动生成——书目一变，图就跟着变。




图 1 概念网络：每个节点是一个概念页，颜色代表所属分支；边表示两个概念曾在同一篇交叉主线主题页中共同出现。这张图是全库的「夜空」，越靠中心越是跨分支的枢纽概念。




图 2 分支与书目：从「数学」出发，按九个分支组织。每个分支标注已收录书籍数与概念节点数；叶子节点是具体的书。




图 3 书与交叉主线：左侧为已收录教材，右侧为把它们缝在一起的桥接主题页。一张图就能看出哪些书是「孤岛」、哪些书已被主线串起来。



图 4 五种视角：分支、历史、方法母题、抽象层次、应用。它们不是并列的目录，而是同一批知识的五束不同灯光。

第一部分·五视角看数学

数学大地图

本库的顶层入口。分支只是看数学的一个视角；真正的价值在联系——同一母题反复出现在代数、分析、几何、概率、数值里。可视版：数学大地图（Canvas）。

0. 五种视角（怎么读这张图）

视角	回答的问题	在哪一节
一、分支	有哪些领域？	§1
二、历史	它是怎么长出来的？	§2
三、方法母题	什么东西处处复用？	§3
四、抽象层次	同一件事在不同高度长什么样？	§4
五、应用	谁在用它、用来做什么？	§5

读法建议：先用分支定位，再用母题跨域；看到两条不同分支里出现同一个词（对偶、谱、不变量、极限），就顺着 §3 的链接追过去。

1. 视角一·分支（经典分类）

基础 - 集合论·数理逻辑

- 公理化·范畴论
- 证明 / 类型论

代数

- 代数 **Artin** 一代数 Artin（导读）群·群同态与同构·陪集与拉格朗日定理·正规子群与商群·置换群·凯莱定理·群作用·类方程与共轭类·西罗定理·自由群与生成元关系·环与理想·商环与环同态·多项式环·欧几里得整环与主理想整环·唯一分解整环·域与域扩张·伽罗瓦理论·对称函数·双线性型·线性群·李代数·群表示与特征标·正交群与旋转·平面等距与晶体群·模·代数整数与理想类群·有限域·佐恩引理
- 线性代数应该这样学 一线性代数应该这样学（导读）复数·域·向量空间·组与 F^n ·子空间与直和·张成与线性无关·基与维数·线性映射·零空间与值域·线性映射基本定理·矩阵·可逆性与同构·积与商空间·对偶空间·多项式·本征值与本征向量·不变子空间·上三角化与对角化·内积与范数·规范正交基与格拉姆-施密特·正交补与极小化问题·伴随与自伴算子·谱定理·正算子、等距同构与极分解·奇异值分解·广义本征向量与幂零算子·特征多项式与极小多项式·若尔当形·复化·迹与行列式
- 抽象代数·表示论

- 交换代数 · 同调代数
- 数论

分析

- 托马斯微积分 — 托马斯微积分（导读）函数 · 极限 · 连续性 · 导数 · 求导法则 · 隐式微分与相关变化率 · 线性化与微分 · 中值定理 · 洛必达法则 · 牛顿法 · 极值与最优化 · 双曲函数 · 反导数与不定积分 · 定积分 · 微积分基本定理 · 代换法则 · 分部积分与三角代换 · 部分分式与积分表 · 数值积分 · 反常积分 · 定积分的应用 · 旋转体体积 · 弧长与旋转曲面面积 · 功与流体压力 · 矩与质心 · 指数变化与可分离方程 · 数列与无穷级数 · 级数审敛法 · 幂级数与泰勒级数 · 幂级数 · 泰勒级数与麦克劳林级数 · 极坐标与圆锥曲线 · 向量与空间几何 · 向量值函数与曲率 · 偏导数 · 方向导数与梯度 · 多元极值与拉格朗日乘数 · 二重积分 · 三重积分 · 线积分 · 路径独立与势函数 · 格林定理 · 曲面积分与通量 · 斯托克斯定理与散度定理
- 实分析 · 复分析 · 泛函
- 微分方程 · 调和分析

几何与拓扑

- 从微分观点看拓扑 — 从微分观点看拓扑（导读）光滑流形与光滑映射 · 切空间与导射 · 正则值与正则点 · Sard 定理 · 模 2 度 · 定向流形与度 · 向量场与欧拉数 · 标架式协边 · Pontryagin 构造 · 一维流形分类 · 代数基本定理-拓扑证明
- 点集拓扑 · 代数拓扑
- 微分几何 · 黎曼几何

初等数学（高观点）

- 高观点下的初等数学 — 高观点下的初等数学（导读）承袭性原则 · 数系扩张 · 实数完备性 · 超越数 · 四元数与超复数 · 对数函数与指数函数 · 角函数 · 带符号的几何量 · 格拉斯曼行列式原理 · 滑动矢量与自由矢量 · 不变量与相对不变量 · 导出的流形 · 仿射变换 · 投影变换与齐次坐标 · 反演变换 · 对偶变换与对偶原理 · 变换群与爱尔朗根纲领 · 几何学基础与非欧几何 · 精确数学与近似数学 · 函数带 · 一致连续性与可积性 · 魏尔斯特拉斯函数 · 合理函数 · 拉格朗日插值与切比雪夫逼近 · 傅里叶级数与三角展开 · 球函数 · 康托集与完备集 · 皮亚诺曲线与若当曲线 · 正则曲线与解析曲线
- 初等算术 · 数论
- 经典几何 · 尺规作图

概率与统计

- 概率导论 — 概率导论（导读）概率空间 · 条件概率与贝叶斯公式 · 大数定律与中心极限定理
- 随机过程 — 随机过程（导读）马尔可夫链 · 泊松过程 · 鞅 · 布朗运动
- 统计学七支柱 — 统计学七支柱（导读）描述统计与统计推断 · 似然 · 回归与回归均值
- 贝叶斯思维 — 贝叶斯思维（导读）贝叶斯推断 · 先验与后验 · 蒙特卡洛方法
- 肥尾效应 — 肥尾效应（导读）重尾分布 · 幂律分布 · 遍历性

- 信息论
- 因果推断

离散数学与理论 CS

- 深入理解计算机系统 — 深入理解计算机系统（导读）浮点数与 IEEE 754 • 存储层次与局部性 • 虚拟内存
- 现代操作系统 — 现代操作系统（导读）进程与线程 • 死锁与同步 • 虚拟内存
- 编译原理 — 编译原理（导读）形式语言与自动机 • 词法与语法分析 • 编译流程与中间表示
- 组合 • 图论
- 算法 • 可计算性

数值与计算 - 数值线性代数

- 最优化 • 科学计算

应用与交叉 - 数学物理 • 数据科学

- 金融数学 • 运筹学

2. 视角二 · 历史脉络

数学不是按分支长出来的，而是按问题长出来的。抓几个「衔接处」，那里正是反例密集区（呼应 §7 的对抗式学习）：

阶段	旧范式的失效	催生的新语言
算术 → 代数	“数”不够用、方程解不出	符号、未知量、域与复数
初等几何 → 解析几何	纯综合几何难以计算	坐标、向量与空间几何
微积分初创 → 严格化	无穷小“说不清”	极限、 ε - δ 、实分析
具体 → 结构	各领域“各行其是”	公理化：向量空间、群、拓扑空间
初等 → 高观点	初等对象孤立、缺动机	变换群、子行列式、函数带 (Klein)
结构 → 同调/范畴	结构之间关系难统一	函子、同调、层

3. 视角三 · 方法母题（数学处处是联系）

这是全图的核心。同一母题横跨几乎所有分支——顺着行读，就能从一门课跳到另一门课。

母题	代数	分析	几何 / 拓扑	概率 / 统计	数值 / 离散 / 数据
线性化 / 逼近	线性映射 · 矩阵	导数 · 泰勒级数与麦克劳林级数	切空间与导射 · 局部坐标	线性回归 · CLT 近似	牛顿法 · 迭代法 · 拉格朗日插值与切比雪夫逼近 · 浮点
对偶	对偶空间 · 转置	Fourier · 分布 · L^p-L^q	Poincaré 对偶 · 对偶变换与对偶原理	特征函数 · 对偶问题	拉格朗日对偶 · 伴随
不变量 / 分类	秩 · 迹与行列式 · Galois	守恒量 · 指标	模 2 度 · 向量场与欧拉数 · 同调 · 格拉斯曼行列式原理 · 变换群与爱尔兰根纲领	充分统计量	条件数 · 谱
对称 / 群作用	群 · 表示论	对称函数	对称空间 · Lie 群	可交换性	分块 · 置换群
极限 / 收敛	矩阵幂 · 谱半径	数列与无穷级数 · 一致收敛 · 实数完备性 · 一致连续性 · 可积性	紧性 · 同伦 · 极限	大数律 · CLT	迭代收敛 · 误差分析
分解 / 谱	谱定理 · 奇异值分解 · 若尔当形	特征函数 · Fourier · 球函数	Laplace 特征值	马尔可夫链谱 · PCA	QR / SVD · 特征值算法
计数 / 测度 优化 / 变分	组合恒等式 二次型 · 正定	定积分 · 测度 Euler-Lagrange · 最速下降	体积 · 度数 测地线 · 极小曲面	概率 · 期望 MLE · EM	求和 · 复杂度 凸优化 · 梯度下降

用法：遇到不熟的概念，先看它落在哪一行母题，再横向对照其他分支——「联系」本身就是学习杠杆。

4. 视角四 · 抽象层次

同一件事，在不同高度长得很不一样：

层次	关注	例子
L0 计算	怎么算	定积分、若尔当形、SVD 算法
L1 结构	对象是什么	向量空间、群、拓扑空间

层次	关注	例子
L2 映射	对象之间怎么连	线性映射、连续映射、切空间与导射
L3 联系本身	把“联系”当对象	函子、同调、层、范畴

你的「低维视角合成完整」 (§7) 对应这里：同一对象在 L0-L3 的投影各自片面，合起来才完整。

5. 视角五 · 应用与交叉

领域	用到的核心	本库相关
物理 / 工程	微积分 · 微分方程 · 线性代数	向量场与欧拉数 · 线积分 · 斯托克斯定理与散度定理
数据 / ML	线性代数 · 概率 · 最优化	奇异值分解 · 本征值与谱：从矩阵到数据
计算机图形	向量 · 线性变换 · 微积分	向量与空间几何 · 向量值函数与曲率
金融 / 运筹	概率 · 最优化 · 随机过程	概率论 · 最优化

6. 交叉主线（桥）

连接不同分支的同源思想，是本库区别于“孤立笔记堆”的关键。

- 导数与线性化：分析的共同语言—导数 / 线性映射 / 切空间是同一件事
- 线性结构：从向量空间到切空间—向量空间 / 基 / 线性映射的三书对照
- 内积与正交：从范数到梯度—内积、正交、最小二乘与梯度
- 本征值与谱：从矩阵到数据—本征值 / 谱定理 / Hessian / SVD
- 向量分析三大定理—格林 / 斯托克斯 / 散度（微积分内部的统一）
- 微积分基本定理的普适性—从 Newton-Leibniz 到 Stokes 到指标定理（各结构上的版本）
- 拓扑与分析概念辨析—紧致 / 正则 / 非退化等易混概念
- 微积分符号表—符号与中英术语对照
- 不变量与对偶：从格拉斯曼到线性代数—子式 / 对偶空间 / 不变量理论的几何原型
- 数系扩张与承袭性：从算术到四元数—数系 / 域 / 可除环的扩张阶梯
- 精确与近似：数学的两副面孔—函数带 / 合理函数 / 严格分析
- 几何的变换群视角：从欧几里得到爱尔朗根—变换群 / 不变量 / 流形
- 概率与谱：从协方差到随机矩阵—协方差 / 谱隙 / 随机矩阵
- 表示与近似：从浮点数到函数带—浮点数 / 函数带 / 数值分析
- 概率、统计与重尾：三条不确定性路径—概率 / 统计 / 重尾
- 形式语言与计算：编译器的数学骨架—正则 / CFG / 自动机 / 编译

7. 学习方法论（元层）

本库不只是知识，也固化了一套学习方法，详见 数学学习方法论（原始对话：学习方法论-对话）：

1. 史学 → 对抗 → 对话：在新旧阶段的衔接处收集反例（§2 的表就是这种衔接处）。
2. 理论以线性代数为基础：它是分析/几何/数值/数据的共同底座。
3. 因地制宜的对抗式训练：同题两种方法对刀，主动制造可控失败，要“决策报告”而非“结果”。
4. 贝叶斯更新：分不清时先读书、放下、沉淀；不固化认知，永远保留被新视角改写的空间。
5. 合发生在联系里：理解在联系中加深，没有终态——所以这张图永远会有下一条连线。

8. 如何扩展这张图

- 新书 → 在 §1 对应分支加一行，用双链指向该书实体页与「书名-导读」，并列出概念。
- 新联系 → 在 §3 母题表补一格，或（跨书更系统性时）在 §6 新增一条主题页，并登记主题索引。
- 新视角 → 若发现现有五个视角不够，可在 §0 增加第六个（本图欢迎被改写）。
- 可视版 数学大地图.canvas 同步加减节点（id 唯一、边不悬空）。
- 维护规范见 AGENTS 与 .pi/skills/build-wiki/。

相关

- 总索引 • 知识索引 • 素材索引 • 产出索引 • 主题索引

第二部分・交叉主线

导数与线性化：分析的共同语言

概述

「求导」在三本书里是同一个动作：用线性对象在局部逼近非线性对象。一元微积分叫导数，多元微积分叫梯度和全微分，线性代数叫线性映射（及其矩阵），微分拓扑叫导射。理解这层统一，比记住三套记号更有用。

跨书对照

视角	局部线性对象	相关概念
一元微积分	数 $f'(a)$ 、线性化 $L(x)$	导数 · 线性化与微分
多元微积分	梯度 ∇f 、雅可比矩阵	偏导数 · 方向导数与梯度
线性代数	线性映射 T 、矩阵 A	线性映射 · 矩阵
微分拓扑	切映射 $df_x : T_x M \rightarrow T_x N$	切空间与导射 · 正则值与正则点

三条贯穿的主线

1. 链式法则是同一个公式： $(f \circ g)' = f'(g)g'$ ；高维是雅可比矩阵相乘 $D(f \circ g) = Df \cdot Dg$ ；流形上是 $d(g \circ f)_x = dg_{f(x)} \circ df_x$ 。
2. 可逆 $\Leftrightarrow$ 不塌陷：一元 $f'(a) \neq 0$ ；多元雅可比可逆（可逆性与同构）；流形上导射可逆即局部微分同胚。
3. 线性化服务近似与方程：线性化与微分、牛顿法（一维）与多元牛顿法、隐函数/原像定理（拓扑）都是同一思想的产物。

与其他概念的关系

- 导数 · 线性映射 · 切空间与导射 · 偏导数 · 可逆性与同构

深入问题

- 为什么「导数」在一维是一个数，而在高维必须是线性映射而非一组数（梯度只是它的对偶表示）？
- 隐函数定理与商空间/第一同构定理在结构上如何对应？

参考源

- 托马斯微积分-第 03 章-微分法 · 托马斯微积分-第 12 章-偏导数

- 线性代数应该这样学-第 03 章-线性映射
- 从微分观点看拓扑-第 01 章-光滑流形和光滑映射

线性结构：从向量空间到切空间

概述

向量空间用八条公理抽掉「箭头」里与坐标无关的部分，于是函数、多项式、切空间都成了向量。这条抽象主线贯穿三本书：线性代数研究结构本身，微积分把它用在几何与运动上，微分拓扑把它用在流形的局部。

跨书对照

层次	对象	相关概念
线性代数（抽象）	向量空间、基、维数、线性映射	向量空间 • 基与维数 • 线性映射
微积分（坐标/几何）	三维向量、点积叉积、直线平面	向量与空间几何 • 组与 $\mathbf{F}^n$
微分拓扑（局部）	切空间、切映射	切空间与导射 • 光滑流形与光滑映射

三条贯穿的主线

1. 「基」给出坐标：抽象的基在 $\mathbf{R}^n$ 里就是坐标轴，在流形上就是局部坐标图。
2. 保结构 = 线性：线性映射在各处保持线性组合；在拓扑里它的推广（导射）保持切空间结构。
3. 维数与不变量： $\dim$ 、秩、行列式 是跨领域的不变量；流形上对应维数与定向。

与其他概念的关系

- 向量空间 • 基与维数 • 线性映射 • 向量与空间几何 • 切空间与导射

深入问题

- 为什么「公理化」让线性代数能同时处理箭头、函数与切空间？
- 从 $\mathbf{R}^n$ 到流形，哪些线性代数的结论可以原样搬运，哪些必须加拓扑条件？

参考源

- 线性代数应该这样学-第 01 章-向量空间 • 线性代数应该这样学-第 02 章-有限维向量空间
- 托马斯微积分-第 10 章-向量与空间几何学
- 从微分观点看拓扑-第 01 章-光滑流形和光滑映射

内积与正交：从范数到梯度

概述

内积是给向量空间装上「尺子和量角器」的工具。它在线性代数里定义正交与投影，在微积分里体现为梯度垂直于等值面、曲线积分中的功，在数据科学里化为 SVD 与最小二乘。

跨书对照

视角	内积/正交的体现	相关概念
线性代数	范数、Cauchy-Schwarz、正交补、规范正交基	内积与范数 • 正交补与极小化问题
微积分	点积、投影、梯度 $\perp$ 等值线、曲线的功	向量与空间几何 • 方向导数与梯度 • 线积分
数值/数据	最小二乘、正交对角化、主成分	奇异值分解 • 谱定理

三条贯穿的主线

1. 正交 = 独立：规范正交组必线性无关；正交基让坐标只需投影（规范正交基与格拉姆-施密特）。
2. 最短 = 投影：正交补与极小化问题的最优逼近就是正交投影，这正是最小二乘的几何。
3. 度量服务几何：梯度、法向量、曲面积分都靠内积定义方向与长度（曲面积分与通量）。

与其他概念的关系

- 内积与范数 • 正交补与极小化问题 • 方向导数与梯度 • 奇异值分解 • 向量与空间几何

深入问题

- 为什么「正交」比「线性无关」更强，却能换来如此简洁的坐标公式？
- 从有限维内积到函数空间内积（傅里叶展开），哪些直觉保持不变？

参考源

- 线性代数应该这样学-第 06 章-内积空间 • 线性代数应该这样学-第 07 章-内积空间上的算子
- 托马斯微积分-第 10 章-向量与空间几何学 • 托马斯微积分-第 12 章-偏导数

本征值与谱：从矩阵到数据

概述

本征值是「只被拉伸、不被转向」方向上的倍数。它把复杂算子拆成若干独立的伸缩：线性代数是谱定理与若尔当形，微积分里是多元极值的二次型判别，数据里是 SVD/PCA。

跨书对照

视角	本征值的体现	相关概念
线性代数	谱定理、若尔当形、正算子	本征值与本征向量 • 谱定理 • 若尔当形
微积分	Hessian 的特征值决定极值/鞍点	多元极值与拉格朗日乘数 • 偏导数
数值/数据	奇异值、正交对角化、主成分	奇异值分解 • 正算子、等距同构与极分解

三条贯穿的主线

1. 对角化 = 找本征方向：能拆则算子变成独立伸缩；不能拆的缺口由广义本征空间与若尔当形补上。
2. 对称带来正交：谱定理保证正规/自伴算子有正交本征基，因此数值稳定、可解释。
3. 正定性 = 极值：多元极值用二次型的本征值符号判断（多元极值与拉格朗日乘数），与正算子同源。

与其他概念的关系

- 本征值与本征向量 • 谱定理 • 奇异值分解 • 多元极值与拉格朗日乘数 • 迹与行列式

深入问题

- 为什么「对称 $\Rightarrow$ 可正交对角化」在理论与数值上都如此关键？
- 若尔当形（精确但脆弱）与 SVD（稳定但非谱不变）各适合什么场景？

参考源

- 线性代数应该这样学-第 05 章-本征值与本征向量 • 线性代数应该这样学-第 07 章-内积空间上的算子 • 线性代数应该这样学-第 08 章-复向量空间上的算子
- 托马斯微积分-第 12 章-偏导数

微积分基本定理的普适性

提炼自 微积分的结构推广与大一统-对话。它是 数学大地图 §3「方法母题·对偶」的样板。

概述

所有版本的同一句话：

$$\langle d\omega, c \rangle = \langle \omega, \partial c \rangle \quad (\text{内部微分} = \text{边界取值})$$

连续形式是广义 **Stokes** 定理 $\int_M d\omega = \int_{\partial M} \omega$ ；离散形式是「上链的余边界 d 」与「链的边界 ∂ 」的对偶。核心恒等式： $\partial\partial = 0 \iff dd = 0$ 。

各版本一览

版本	公式	所在结构
经典（一维）	$\int_a^b f' dx = f(b) - f(a)$	区间 $[a, b]$
Green	$\oint_{\partial D} P dx + Q dy = \iint_D (Q_x - P_y) dA$	平面区域
散度（Gauss）	$\oint_{\partial V} \mathbf{F} \cdot d\mathbf{S} = \iiint_V \nabla \cdot \mathbf{F} dV$	空间体
经典 Stokes	$\oint_{\partial \Sigma} \mathbf{F} \cdot d\mathbf{r} = \iint_{\Sigma} (\nabla \times \mathbf{F}) \cdot d\mathbf{S}$	曲面
微分形式 Stokes	$\int_M d\omega = \int_{\partial M} \omega$	带边定向流形
梯度定理	$\int_{\gamma} \nabla f \cdot d\mathbf{r} = f(q) - f(p)$	黎曼流形（路径无关）
Hodge 分解	$\omega = d\alpha + d^*\beta + \gamma_{\text{harm}}$	紧黎曼流形（调和代表元）
Cauchy / 留数	$\oint_{\gamma} f dz = 2\pi i \sum \text{Res}$	复流形（ $\bar{\partial}f = 0$ ）
Radon-Nikodym	$\nu(E) = \int_E \frac{d\nu}{d\mu} d\mu$	测度空间
de Rham	$H_{\text{dR}}^k(M) \cong H_{\text{sing}}^k(M; \mathbb{R})$	拓扑（闭 vs 恰当）
Atiyah-Singer	$\text{index}(D) = \int_M \hat{A}(M) \text{ch}(E)$	椭圆算子（分析 = 拓扑）
离散（求和/图）	$\sum_{k=a}^{b-1} \Delta f(k) = f(b) - f(a)$	图 / 单纯复形

不同结构上的微积分

- 拓扑结构：度量空间上的 Lipschitz 微积分、Sobolev 空间 $W^{1,p}$ ；Banach 流形上的无穷维微积分。
- 几何结构：光滑流形（ df 、微分形式、 $\star$ ） $\rightarrow$ 黎曼流形（Levi-Civita 联络、测地线、Laplace-Beltrami） $\rightarrow$ 辛流形（Hamilton 力学、Liouville、Floer） $\rightarrow$ 复/Kähler 流形（ $\partial, \bar{\partial}$ 、Hodge

分解) → 图上的离散微积分。

- 代数结构：交换代数的 **Kähler** 微分 $\Omega_{A/k}$ 、Connes 的非交换几何（谱三元组、循环上同调）、超流形（Berezin 积分）、形式幂级数 / p -进微积分、 D -模、量子群上的 q -导数。

大一统的四条线

1. 代数 ↔ 几何镜像对偶：Gelfand 对偶、Hilbert 零点定理、Grothendieck 概形。
2. 分析 ↔ 拓扑：de Rham 定理、Hodge 定理、谱几何（Weyl 定律）。
3. 数论 ↔ 几何：Weil 猜想 × Lefschetz 不动点、概形统一 $\mathbb{Z}$ 与曲线。
4. 表示论的中心地位：抽象结构 → 线性算子 → 谱 → 对称性（Langlands、Wigner）。

与其他概念的关系

- 微积分基本定理 • 格林定理 • 斯托克斯定理与散度定理 • 向量分析三大定理
- 线积分 • 路径独立与势函数 • 切空间与导射 • 模 2 度 • 向量场与欧拉数

深入问题

- 为什么 $\partial\partial = 0$ （边界的边界为空）是一切的代数根源？
- 「内部微分 = 边界取值」的对偶形式如何在任意范畴/函子语言中表述？
- 指标定理之后，「推广」还剩下哪些前沿（导出代数几何、镜像对称、动机理论）？

参考源

- 微积分的结构推广与大一统-对话

向量分析三大定理

概述

格林定理、斯托克斯定理、散度定理不是三个孤立结论，而是微积分基本定理沿“维度阶梯”的推广。共同句式：

边界上的积分 = 区域内部（导数）的积分。

统一的句式

定理	维度	边界积分	内部积分	导数算子
微积分基本定理	1D	$f(b) - f(a)$	$\int_a^b f' dx$	d/dx
格林定理	2D	$\oint_C M dx + N dy$	$\iint_R (N_x - M_y) dA$	旋度（z 分量）
斯托克斯定理	2D 曲面 / 3D	$\oint_C \mathbf{F} \cdot d\mathbf{r}$	$\iint_S (\nabla \times \mathbf{F}) \cdot \mathbf{n} dS$	旋度 $\nabla \times$
散度定理	3D	$\oiint_S \mathbf{F} \cdot \mathbf{n} dS$	$\iiint_D \nabla \cdot \mathbf{F} dV$	散度 $\nabla \cdot$

直观

- 旋度—环流：一个小水轮的转速，沿边界累积起来就是绕大圈的总环流（斯托克斯/格林）。
- 散度—通量：每个小体积内“冒出”或“吸入”的量，加起来就是穿出整个闭曲面的净流量（散度定理）。
- 左右两边是同一个物理量的两种数法：盯着边界数 vs 盯着内部数。

现代统一：广义斯托克斯定理

用微分形式写成一个公式：

$$\int_{\partial M} \omega = \int_M d\omega,$$

其中 ω 是微分形式， d 是外微分。格林、斯托克斯、散度都是它在不同维数与不同形式下的特例。这也解释了为什么三种“导数”（梯度、旋度、散度）其实都是同一个 d 。

使用要点

- 定向永远要一致：曲面正侧与边界正向满足右手法则；闭曲面取外侧。

- 定理要求场在区域内处处可导；遇奇点要挖洞或分段。
- 前提是区域单连通（对“无旋 $\Rightarrow$ 保守”类结论尤其关键，见路径独立与势函数）。

与其他概念的关系

- 微积分基本定理 • 格林定理 • 线积分 • 曲面积分与通量 • 斯托克斯定理与散度定理

深入问题

- 为什么“旋度 = 最大环流密度”“散度 = 通量密度”？局部定义如何从积分形式反推？
- 没有统一定理的话，四个定理各自证明的难点在哪里？
- 微分形式与 de Rham 上同调如何解释“旋度为零却不保守”的拓扑障碍？

参考源

- 托马斯微积分-第 14 章-向量场中的积分
- 托马斯微积分-第 14 章-向量场中的积分

拓扑与分析概念辨析

提炼自 概念辨析集-对话。用于澄清地图上几何与拓扑分支里最容易混淆的一组概念。

逐条辨析

非退化 (non-degenerate)

「退化」= 丢掉了本该给出的方向/维度。各领域表现：矩阵可逆且行列式 $\neq 0$ ；双线性型 $\det \neq 0$ ；二次曲线非退化（圆锥 vs 直线/点）；临界点 Hessian 非奇异；概率分布有密度、 σ -代数不塌缩。大多数场合「非退化」=「可逆 / 满秩」，个别场合更宽。

无边流形

流形每点邻域同胚于 $\mathbb{R}^m$ （不含半空间），因此没有「边缘」。 S^n 、环面 T^n 无边；闭圆盘 D^n 、 $[0, 1]$ 有边。无边性是 Stokes/散度定理、模 2 度、Poincaré 对偶等能成立的前提。

高斯映射 (Gauss map)

把超曲面上每点映到它的单位法向量 $\gamma : M^n \rightarrow S^{n-1}$ 。它把曲面的弯曲转成一个球面映射——曲率 = 高斯映射的导射（Weingarten 映射），其度给出 Gauss-Bonnet。

调和函数与唯一延拓

Dirichlet 问题（给定边界值求调和函数）在实分析里解存在且唯一；复分析里更强（Poisson 积分给出显式解）。真正的「复刚性」是解析延拓：一个解析函数在任一开集上的值完全决定它在连通区域上的值。

正则曲线 / 正则函数

- 正则曲线：只要求 $\mathbf{r}'(t) \neq \mathbf{0}$ （即 C^1 且切向量非零），不需要 C^∞ 。它保证曲线「不折返、不静止」。
- 「正则函数」是 19 世纪通用术语，不是 Klein 发明的；Klein 的相关贡献是几何函数论 / 自守函数。

紧致性 (compactness)

核心直觉：有限、不能逃逸、没有缺口。欧氏空间中由 Heine-Borel：有界 + 闭 $\iff$ 紧。本质定义：任意开覆盖有有限子覆盖。典型非紧： $(0, 1)$ （缺口）、 $\mathbb{R}$ （逃逸）、无限离散集（不有限）。

闭集 紧致

单向：紧致 $\Rightarrow$ 闭（在 Hausdorff 空间），反之不成立（ $\mathbb{R}$ 闭但不紧）。「闭包属于自身」只保证闭，不保证能用有限覆盖截住。

绕数 / 留数 / 莫比乌斯

- 绕数：曲线绕一点转的圈数（ $S^1 \rightarrow S^1$ 的度）；
- 留数：奇点处的局部贡献，留数定理 $\oint f dz = 2\pi i \sum \text{Res}$ 是 Stokes 定理在奇点处的版本；
- 莫比乌斯变换：负责把「洞 / 奇点」在复平面上「搬家」，使绕数与留数计算统一。

与其他概念的关系

- 光滑流形与光滑映射 • 切空间与导射 • 正则值与正则点 • 模 2 度 • 向量场与欧拉数 • 微积分基本定理的普适性

深入问题

- 「非退化」在各领域的统一含义是什么？为什么它是「可解/可逆」的同义词？
- 为什么复分析的「唯一延拓」比实分析强这么多？
- 紧致性在证明「存在性定理」（EVT、极值、不动点）里扮演什么角色？

参考源

- 概念辨析集-对话

不变量与对偶：从格拉斯曼到线性代数

一句话

克莱因第二卷的格拉斯曼行列式原理与对偶变换与对偶原理，是线性代数中子式、外代数、对偶空间的几何原型；「几何 = 变换群下的不变量」正是双线性型与迹与行列式的几何化身。

三条对应

克莱因（几何）	线性代数（Axler / Artin）	现代语言
点坐标矩阵的子行列式	行列式与子式	外代数 $\bigwedge^k V$ 的分量
带符号的几何量（面积、体积）	行列式的多重线性与反对称	微分形式、体积元
对偶变换与对偶原理（点 $\leftrightarrow$ 线）	对偶空间 V^* 、转置	配极、线性系统
不变量与相对不变量	群作用下的不变量、二次型	Hilbert 不变量理论
变换群与爱尔兰根纲领	线性群、群作用	齐性空间、表示论
滑动矢量与自由矢量（力、力矩）	向量 + 反对称张量	螺旋、Lie 代数 $\mathfrak{so}(3)$

核心母题

- 反对称 = 有向几何：行列式的交换变号，就是面积的定向；这条线索从 2×2 行列式一路走到微分形式。
- 对偶 = 配对：极线配极是二次型的极化配对 $v \mapsto q(v, \cdot)$ ；双线性型的非退化性保证它可逆。
- 不变量 = 群轨道上的函数：等距群 $\rightarrow$ 距离；仿射群 $\rightarrow$ 平行比；射影群 $\rightarrow$ 交比；一般线性群 $\rightarrow$ 秩与行列式。

为什么值得连起来读

- 读 从微分观点看拓扑 时，切空间与导射、模 2 度、Stokes 定理的本质都是「反对称 + 对偶 + 不变量」。
- 读 线性代数 应该这样学时，对偶空间 是抽象概念；在克莱因这里它有极线、力偶、力矩等实物。
- 读 代数 Artin 时，双线性型与线性群的几何来源就是这里的变换群与不变量。

相关

- 克莱因侧：格拉斯曼行列式原理 • 对偶变换与对偶原理 • 不变量与相对不变量 • 带符号的几何量 • 变换群与爱尔朗根纲领 • 滑动矢量与自由矢量 • 导出的流形
- 线性代数侧：对偶空间 • 双线性型 • 迹与行列式 • 本征值与本征向量 • 线性群 • 群作用
- 拓扑侧：切空间与导射 • 斯托克斯定理与散度定理

参考源

- 高观点下的初等数学-第 11 章-平面上的格拉斯曼行列式原理
- 高观点下的初等数学-第 13 章-直角坐标变换下空间基本图形的分类
- 高观点下的初等数学-第 18 章-空间元素改变而造成的变换

数系扩张与承袭性：从算术到四元数

一句话

每一次数系扩张，都是在保住旧运算律的前提下解决一个新方程；撑不住时，就牺牲一条最贵的定律——这就是承袭性原则，也是域扩张与群结构的代数原型。

扩张的阶梯

数系	解决的方程	保住的	牺牲的	代数结构
N	—	加乘结合、交换、分配	—	半环
Z	$x + a = b$	全部算术律	「减法受限」	整环
Q	$bx = a$	全部算术律	「可数对象」直觉	域
R	$x^2 = 2$	全部算术律 + 序 + 完备	—	完备有序域（实数完备性）
C	$x^2 + 1 = 0$	域公理	有序性	代数闭域（代数基本定理-拓扑证明）
H	三维旋转的代数	除法（可除环）	乘法交换律	可除环

三条线索

- 可数 **vs** 可量度：整数来自计数、分数来自测量——数系扩张 的两套来源。
- 承袭性：每步扩张都尽量保留旧定律；越往高维，能保的越少（Hurwitz定理）。
- 抽象化：把「数」换成「域元素」，扩张变成 域与域扩张；把「四元数」换成「非交换环」，得到 群、线性群 与 李代数。

为什么值得连起来读

- 线性代数应该这样学 从复数与域的公理出发；克莱因给出这些公理为什么长这样的历史与动机。
- 代数 Artin讲群、环与理想、域与域扩张；承袭性原则是「为什么要引入新结构」的答案。
- 超越数 与 实数完备性 说明「填满数轴」与「方程可解」是两件不同的事。
- 伽罗瓦理论 把「方程可解」翻译成群的可解性，是承袭性思想的代数终局。

相关

- 克莱因侧：数系扩张 · 承袭性原则 · 实数完备性 · 四元数与超复数 · 超越数 · 复数
- 代数侧：域 · 群 · 线性群 · 域与域扩张 · 代数基本定理-拓扑证明 · 伽罗瓦理论
- 分析侧：极限 · 实数完备性 · 幂级数

参考源

- 高观点下的初等数学-第 02 章-数的概念的第一个扩张
- 高观点下的初等数学-第 02 章-数的概念的第一个扩张
- 高观点下的初等数学-第 04 章-复数

精确与近似：数学的两副面孔

一句话

精确数学与近似数学 提醒我们：数学既处理理想对象之间的严格关系，也处理经验量之间「在幅度内成立」的精确关系；后者不是「不严格」，而是严格地研究误差本身。

两副面孔的对照

精确面孔	近似面孔	本库对应
点、实数、函数	函数带（宽度 δ ）	实数完备性 · 极限
柯西连续、一致连续	「经验曲线的连续程度」	一致连续性与可积性
可微、解析函数	合理函数（导数受控）	泰勒级数与麦克劳林级数
处处连续处处不可微	直观无法实现精确断言	魏尔斯特拉斯函数
定积分（黎曼）	数值积分与误差估计	数值积分 · 定积分
傅里叶级数（精确展开）	有尽三角插值、最小二乘	傅里叶级数与三角展开 · 拉格朗日插值与切比雪夫逼近
曲线（正则、解析）	逼近理想曲线、样条	正则曲线与解析曲线 · 皮亚诺曲线与若当曲线

核心洞见

1. 经验领域只有函数带：测量精度给出 δ ，理想函数是 $\delta \rightarrow 0$ 的极限。
2. 误差必须被精确处理：忽略傅里叶余项会得出完全错误的结论（气象学例子）。
3. 直观是发现之源，不是证明之据：魏尔斯特拉斯函数、皮亚诺曲线都击穿直观。
4. 近似本身值得成为严格课题：区间分析、数值分析、样条、机器学习的不确定性，都是它的后代。

为什么值得连起来读

- 托马斯微积分 讲极限、连续性、泰勒级数；克莱因补充「为什么经验世界逼出这些概念」。
- 拓扑与分析概念辨析 辨析连续、紧致、正则等；这里给出它们的「经验对应物」。
- 数学学习方法论 的「史学 → 对抗 → 对话」「贝叶斯更新」与克莱因「在经验与理想之间往返」的方法一致。

相关

- 克莱因侧：精确数学与近似数学 · 函数带 · 合理函数 · 魏尔斯特拉斯函数 · 一致连续性与可积性 · 拉格朗日插值与切比雪夫逼近 · 傅里叶级数与三角展开

- 分析侧：极限 · 连续性 · 定积分 · 数值积分 · 泰勒级数与麦克劳林级数 · 实数完备性
- 元层：拓扑与分析概念辨析 · 数学学习方法论

参考源

- 高观点下的初等数学-第 22 章-关于单个自变数 x 的阐释
- 高观点下的初等数学-第 23 章-单变数 x 的函数 $y=f(x)$
- 高观点下的初等数学-第 25 章-进一步阐述函数的三角函数表示

几何的变换群视角：从欧几里得到爱尔兰根

一句话

变换群与爱尔兰根纲领：几何学 = 给定变换群下不变量的理论。这条思想从欧氏几何一路贯通到线性群、李代数 与微分流形。

群的层级与几何

$$\begin{array}{ccccc} \text{等距} & \subset & \text{仿射} & \subset & \text{射影} \\ \text{度量几何} & & \text{仿射几何} & & \text{射影几何} \end{array}$$

再加 Möbius 群（共形几何）、同胚群（拓扑）、微分同胚群（微分几何）。群越大，不变量越少：

几何	变换群	基本不变量	本库概念
度量	等距群	距离、角度	正交群与旋转
仿射	仿射群	平行、线段比、面积比	仿射变换
射影	射影群	交比、共线	投影变换与齐次坐标
反演/共形	Möbius 群	角度、圆族	反演变换
拓扑	同胚群	连通、紧致	拓扑与分析概念辨析
微分	微分同胚群	光滑结构	光滑流形与光滑映射 • 切空间与导射

核心母题

- 不变量取代图形：几何对象 = 群轨道；几何命题 = 不变量的关系（不变量与相对不变量）。
- 绝对形：射影几何是「全部几何」，其余几何由无穷远处的绝对形（圆锥曲线）界定——凯莱原理。
- 从群到 Lie：连续变换群 → 李代数；几何的无穷小版本即切空间与导射。
- 平行公理与群：非欧几何可用不同的运动群刻画（几何学基础与非欧几何）。

为什么值得连起来读

- 从微分观点看拓扑 的流形、切空间、度数都是「微分同胚群下的不变量」。
- 代数 Artin 的线性群、正交群与旋转、李代数 是变换群的代数骨架。
- 线性代数应该这样学 的群作用与对偶空间给出变换群和不变量的抽象语言。

相关

- 克莱因侧：变换群与埃尔朗根纲领 · 仿射变换 · 投影变换与齐次坐标 · 反演变换 · 几何学基础与非欧几何 · 不变量与相对不变量 · 导出的流形
- 代数侧：群 · 群作用 · 线性群 · 正交群与旋转 · 李代数 · 双线性型
- 几何/拓扑侧：光滑流形与光滑映射 · 切空间与导射 · 正交补与极小化问题 · 拓扑与分析概念辨析

参考源

- 高观点下的初等数学-第 20 章-系统的讨论
- 高观点下的初等数学-第 21 章-几何学基础
- 高观点下的初等数学-总结-几何全卷总结

概率与谱：从协方差到随机矩阵

一句话

概率论里最有力的工具往往是线性的：把随机变量看成向量、把协方差看成内积、把马尔可夫链的收敛看成谱问题。

三条对应

概率对象	线性代数对象	本库概念
随机变量 X, Y	向量	向量空间 • 概率空间
协方差 $\text{Cov}(X, Y)$	内积	内积与范数
协方差矩阵 Σ	半正定矩阵	正算子 • 谱定理
马尔可夫转移矩阵 P	随机矩阵（行和 1）	马尔可夫链
收敛速度 / 混合时间	谱隙 λ_2	谱定理
PCA / 降维	特征分解 / SVD	奇异值分解 • 本征值与谱：从矩阵到数据

核心母题

- 内积 = 相关：协方差是「去均值后的内积」；相关系数是单位化后的夹角余弦。
- 谱 = 收敛：马尔可夫链收敛由 P 的第二大特征值决定，谱隙越大越快。
- 谱 = 结构：随机矩阵理论描述「大量随机」的普适谱形（Wigner 半圆律），是重尾与 CLT 之外的另一类极限。

为什么值得连起来读

- 概率导论 的协方差与 线性代数应该这样学 的内积与范数 是同一件事的两种语言。
- 随机过程 的平稳分布就是转移矩阵的特征向量；遍历定理是谱分解的概率版本。
- 本征值与谱：从矩阵到数据 讲 PCA/SVD；这里补充它背后的概率模型。

相关

- 概率侧：概率空间 • 大数定律与中心极限定理 • 马尔可夫链 • 布朗运动
- 代数侧：向量空间 • 内积与范数 • 谱定理 • 奇异值分解 • 本征值与谱：从矩阵到数据

参考源

- 概率导论-伴读
- 随机过程-伴读

表示与近似：从浮点数到函数带

一句话

IEEE 754浮点数是「用有限位表示实数」，函数带是「用有限精度表示经验函数」——两者都是有限逼近无限，也都必须面对舍入、误差与稳定性。

三条对应

计算机系统	精确 / 近似数学	本库概念
浮点数舍入（就近偶数）	实数的有限表示	精确数学与近似数学 • 实数完备性
$0.1 + 0.2 \neq 0.3$	0.1 的二进制不可终止	数系扩张
浮点非结合 / 误差累积	函数带宽度 δ 与误差传播	函数带
数值稳定性	逼近的余项控制	合理函数 • 拉格朗日插值与切比雪夫逼近
缓存分块 / 局部性	分块算法与数值线性代数	存储层次与局部性
数值积分实现	Riemann 和的近似	数值积分 • 定积分

核心母题

- 有限表示必然有误差：实数不可数、机器可数，误差不是 bug 而是结构。
- 误差必须被精确处理：克莱因的「近似数学是关于近似关系的精确数学」，正是浮点误差分析的哲学。
- 稳定性 = 良态：条件数刻画「输入扰动放大到输出」的程度，与数值分析的余项估计同源。

为什么值得连起来读

- 深入理解计算机系统 第 2 章的浮点数，为托马斯微积分的泰勒展开提供一个「落地场景」。
- 高观点下的初等数学 第三卷的「精确 vs 近似」在这里获得工程化身。
- 数值积分、拉格朗日插值与切比雪夫逼近是二者交汇处的方法。

相关

- 计算机侧：浮点数与 IEEE 754 • 存储层次与局部性 • 虚拟内存
- 数学侧：精确数学与近似数学 • 函数带 • 合理函数 • 数值积分 • 拉格朗日插值与切比雪夫逼近 • 泰勒级数与麦克劳林级数

参考源

- 深入理解计算机系统-伴读
- 高观点下的初等数学-第 22 章-关于单个自变数 x 的阐释

概率、统计与重尾：三条不确定性路径

一句话

面对同一个未知，概率问「模型给出什么分布」，统计问「数据反推什么结论」，重尾问「当经典定理失效时还剩什么」。三者层层递进，缺一不可。

三条路径

路径	核心问题	关键工具	本库概念
概率（演绎）	已知分布，事件的概率是多少？	公理、条件期望、极限定理	概率空间 • 大数定律与中心极限定理
统计（归纳）	已知数据，参数/模型是什么？	似然、贝叶斯、设计	似然 • 贝叶斯推断 • 回归与回归均值
重尾（边界）	当方差/均值不存在会怎样？	极值理论、遍历性	重尾分布 • 幂律分布 • 遍历性

核心母题

- 从「已知正演」到「未知反演」：概率正演，统计反演，贝叶斯把反演写成概率本身。
- 从「平均」到「尾部」：经典统计围绕均值与方差；重尾世界要求转向极值。
- 从「集合平均」到「时间平均」：遍历性提醒期望并不等于长期命运。

为什么值得连起来读

- 概率导论 与 随机过程 提供演算与模型；
- 统计学七支柱 与 贝叶斯思维 提供推断的两大范式（频率 / 贝叶斯）；
- 肥尾效应 提供「模型失效」的清醒剂；
- 与 概率与谱：从协方差到随机矩阵一起，构成概率—线代—统计的三角。

相关

- 概率导论 • 随机过程 • 统计学七支柱 • 贝叶斯思维 • 肥尾效应
- 概率空间 • 似然 • 贝叶斯推断 • 重尾分布 • 遍历性 • 大数定律与中心极限定理

参考源

- 统计学七支柱-伴读
- 肥尾效应-伴读

形式语言与计算：编译器的数学骨架

一句话

编译器不是在「猜」程序的意思，而是在用自动机识别语言：正则语言搭配有限自动机、上下文无关语言搭配下推自动机、再到 SSA 与数据流分析。

三条对应

语言 / 计算	数学结构	编译中的角色	本库概念
正则语言	有限自动机	词法分析	形式语言与自动机 • 词法与语法分析
上下文无关语言	下推自动机	语法分析	词法与语法分析
数据流不动点	格与单调函数	优化	编译流程与中间表示
寄存器分配	图着色	后端	编译流程与中间表示
指令执行	有限状态 + 存储	运行	深入理解计算机系统

核心母题

- 识别能力 = 记忆能力：有限状态 < 栈 < 带 < 无止境——计算能力层级。
- 分层解耦：前端（语言）与后端（机器）通过 IR 分离。
- 自动化理论：从正则到 DFA 的构造，是「把规格变成算法」的范例。

为什么值得连起来读

- 编译原理 把形式语言与自动机 从定义带到工地；
- 深入理解计算机系统 展示编译产物如何在硬件上运行；
- 现代操作系统 提供运行时（栈、内存、系统调用）的另一半。

相关

- 形式语言与自动机 • 词法与语法分析 • 编译流程与中间表示 • 编译原理
- 深入理解计算机系统 • 现代操作系统 • 存储层次与局部性

参考源

- 编译原理-伴读
- 编译原理-伴读

第三部分·各书导读

《代数》（Artin）导读

概述

整理自 代数 Artin-伴读。主线：具体（矩阵）→ 结构（群/环/域）→ 统一（同态、商、对应）。Artin 的独特之处是先讲矩阵与对称，再抽象，并把几何（对称、旋转、晶体）与现代代数（表示、模、类群）都纳入。

章节地图

章	主题	关键概念
1	矩阵	矩阵 · 迹与行列式
2	群论	群 · 群同态与同构 · 陪集与拉格朗日定理 · 正规子群与商群
3	向量空间	向量空间 · 基与维数
4	线性变换	线性映射 · 零空间与值域
5	正交性	正交群与旋转
6	对称	平面等距与晶体群 · 群作用 · 置换群
7	群论进阶	凯莱定理 · 类方程与共轭类 · 西罗定理 · 自由群与生成元关系
8	双线性型	双线性型
9	线性群	线性群 · 李代数
10	群表示	群表示与特征标
11	环	环与理想 · 商环与环同态 · 多项式环
12	因子分解	欧几里得整环与主理想整环 · 唯一分解整环
13	代数整数	代数整数与理想类群
14	模	模
15	域	域与域扩张 · 有限域
16	伽罗瓦理论	对称函数 · 伽罗瓦理论 · 佐恩引理

三个转折点

- 第 2 章：群——从“具体对称”跃到“抽象运算”。

2. 第 7 章：西罗定理——用算术 (p -幂、计数) 分类有限群； A_n 单伏笔五次方程。
3. 第 16 章：伽罗瓦理论——群与域的完美对偶，解决“方程根式可解性”。

与线性代数的关系

Artin 与 线性代数应该这样学 (Axler) 同讲向量空间与算子，但：

- Axler：结构优先，从公理出发，行列式压轴；
- Artin：具体优先，从矩阵与群出发，几何与表示贯穿。

两者互补，见跨书主线 本征值与谱：从矩阵到数据、线性结构：从向量空间到切空间。

学习建议

- 先把 群、群同态与同构、陪集与拉格朗日定理 打通，后面处处复用。
- 环与理想 与 模 抓住“理想 = 群论的正规子群”这一类比。
- 伽罗瓦理论 建议配合 对称函数 与 置换群 一起读。
- 对抗式训练：用 西罗定理 证“某阶群必非单”，用 非 UFD 的 $\mathbb{Z}[\sqrt{-5}]$ 制造反例。

参考源

- 代数 Artin-伴读

《线性代数应该这样学》导读

概述

整理自 线性代数应该这样学-伴读。主线：从具体到抽象，结构优先，行列式压轴。

章节地图

章	主题	关键概念
1	向量空间	复数 · 域 · 向量空间 · 子空间与直和
2	有限维向量空间	张成与线性无关 · 基与维数
3	线性映射	线性映射 · 零空间与值域 · 线性映射基本定理 · 矩阵 · 可逆性与同构 · 积与商空间 · 对偶空间
4	多项式	多项式
5	本征值	本征值与本征向量 · 不变子空间 · 上三角化与对角化
6	内积空间	内积与范数 · 规范正交基与格拉姆-施密特 · 正交补与极小化问题
7	内积空间上的算子	伴随与自伴算子 · 谱定理 · 正算子、等距同构与极分解 · 奇异值分解
8	复空间算子	广义本征向量与幂零算子 · 特征多项式与极小多项式 · 若尔当形
9	实空间算子	复化
10	迹与行列式	迹与行列式

三个转折点

1. 第 3 章：线性映射基本定理。
2. 第 5、8 章：从对角化到若尔当形。
3. 第 10 章：行列式 = 本征值之积 = 体积缩放。

学习建议

- 先读 向量空间 与 线性映射。
- 第 5、8 章配合“链条”直观；第 6、7 章配合 SVD 的几何直觉。

参考源

- 线性代数应该这样学-伴读

《托马斯微积分》导读

概述

整理自 托马斯微积分-伴读。全书有两条交织的主线：

- 微分线：函数 → 极限 → 连续性 → 导数 → 中值定理 → 极值与最优化。
- 积分线：定积分 → 微积分基本定理 → 代换法则 / 分部积分与三角代换 → 定积分的应用。

二者由 微积分基本定理 连成一体：积分是微分的逆运算。进入多维后，这一思想升级为 格林定理、斯托克斯定理与散度定理。

章节地图

章	主题	关键概念
1	函数	函数 · 双曲函数
2	极限与连续	极限 · 连续性
3	微分法	导数 · 求导法则 · 隐式微分与相关变化率 · 线性化与微分
4	导数的应用	极值与最优化 · 中值定理 · 洛必达法则 · 牛顿法
5	积分法	反导数与不定积分 · 定积分 · 微积分基本定理 · 代换法则
6	定积分的应用	旋转体体积 · 弧长与旋转曲面面积 · 功与流体压力 · 矩与质心 · 指数变化与可分离方程
7	积分方法	分部积分与三角代换 · 部分分式与积分表 · 数值积分 · 反常积分
8	无穷级数	数列与无穷级数 · 级数审敛法 · 幂级数 · 泰勒级数与麦克劳林级数
9	极坐标与圆锥曲线	极坐标与圆锥曲线
10	向量与空间几何	向量与空间几何
11	向量值函数与运动	向量值函数与曲率
12	偏导数	偏导数 · 方向导数与梯度 · 多元极值与拉格朗日乘数
13	多重积分	二重积分 · 三重积分

章	主题	关键概念
14	向量场中的积分	线积分 · 路径独立与势函数 · 格林定理 · 曲面积分与通量 · 斯托克斯定理与散度定理

三个转折点

- 1. 第 2 章：极限的精确定义 (ϵ - δ) 把直观提升为严格。
- 2. 第 5 章：微积分基本定理使积分从“求和的极限”变为“求反导数”。
- 3. 第 12-14 章：从一元到多元，最终由 斯托克斯与散度定理把三大定理统一为“边界积分 = 内部导数积分”。

学习建议

- 先打通一元：极限 $\rightarrow$ 导数 $\rightarrow$ 定积分 $\rightarrow$ 微积分基本定理。
- 计算能力靠求导法则与代换法则、分部积分与三角代换反复练习。
- 多维部分抓住“降维”直觉：二重积分化累次、线积分化参数、格林定理化二重。
- 三大积分定理见统一视角 向量分析三大定理；符号不清时查 微积分符号表。

参考源

- 托马斯微积分-伴读

《从微分观点看拓扑》 导读

概述

整理自 从微分观点看拓扑-伴读。主线：用微分（光滑逼近、正则值、度）照亮拓扑。

章节地图

章	主题	关键概念
1	光滑流形与映射	光滑流形与光滑映射 • 切空间与导射 • 正则值与正则点 • 代数基本定理-拓扑证明
2	Sard 与 Brown 定理	Sard 定理
3	Sard 定理的证明	Sard 定理
4	模 2 度	模 2 度
5	定向流形	定向流形与度
6	向量场与 Euler 数	向量场与欧拉数
7	标架式协边	标架式协边 • Pontryagin 构造
8	练习	—
附录	1 维流形分类	一维流形分类

核心精神

不直接死磕拓扑对象，而是用光滑映射的通有性（Sard）与度把问题化为可计算的形状，再读出拓扑不变量。

学习建议

- 先掌握第 1 章的流形与正则值。
- 第 4、5 章的两种度是对照重点。
- 第 6、7 章看“局部微分量 → 全局拓扑量”的两条路径（Euler 数、协边）。

参考源

- 从微分观点看拓扑-伴读

《高观点下的初等数学》导读

概述

整理自 高观点下的初等数学-伴读。主线有三条：

1. 统一：用变换群统一几何，用承袭性统一数系扩张，用格拉斯曼行列式原理统一几何量与力学量。
2. 高等观点回看初等：初等对象（面积、对数、三角函数、方程）都应放到高等框架里重新理解。
3. 精确 **vs** 近似：第三卷提出精确数学与近似数学的二分法，把「经验曲线的数学」提升为严格课题。

章节地图

章	主题	关键概念
1	自然数的运算	承袭性原则 · 运算定律
2	数的第一个扩张	数系扩张 · 实数完备性 · 承袭性原则
3	整数的特殊性质	数论、超越数、尺规作图
4	复数	复数 · 四元数与超复数 · 承袭性原则
5-6	实方程与复方程	代数基本定理-拓扑证明 · 临界点
7-8	对数、指数与角函数	对数函数与指数函数 · 角函数
9	无穷小演算	泰勒级数与麦克劳林级数 · 微积分基本定理
附 I-II	e 、 π 的超越性；集合论	超越数 · 康托集与完备集
10-13	几何量与变换	带符号的几何量 · 格拉斯曼行列式原理 · 不变量与相对不变量
14	导出的流形	导出的流形 · 直线几何 · Lie 球面几何
15-18	几何变换	仿射变换 · 投影变换与齐次坐标 · 反演变换 · 对偶变换与对偶原理
19-21	虚数理论与几何基础	虚圆点 · 变换群与爱尔兰根纲领 · 几何学基础与非欧几何

章	主题	关键概念
22	精确与近似	精确数学与近似数学 · 实数完备性
23	函数与经验曲线	函数带 · 合理函数 · 魏尔斯特拉斯函数 · 一致连续性与可积性
24-25	近似表示	拉格朗日插值与切比雪夫逼近 · 傅里叶级数与三角展开
26	二元函数	球函数 · 混合偏导
27-28	平面曲线的自由几何	康托集与完备集 · 皮亚诺曲线与若当曲线 · 正则曲线与解析曲线
第九部分	作图与模型	可视化 · 观察自然

三个转折点

1. 第 2、4 章：承袭性原则——数系每扩张一步，都要问「牺牲了哪条运算律」。
2. 第 11-12 章：格拉斯曼行列式原理——把线段、面积、体积、力偶写成同一类子行列式，几何代数化。
3. 第 20 章：变换群与爱尔朗根纲领——几何 = 变换群下的不变量理论，几何统一。

与已有书的互文

- 线与线性：不变量与对偶：从格拉斯曼到线性代数 把格拉斯曼原理接到 对偶空间、迹与行列式。
- 数与结构：数系扩张与承袭性：从算术到四元数 把数系扩张接到 复数、域、群。
- 严格分析：精确与近似：数学的两副面孔 把经验曲线接到 极限、连续性、泰勒级数与麦克劳林级数。
- 几何的群：几何的变换群视角：从欧几里得到爱尔朗根 把变换群接到 线性群、正交群与旋转、光滑流形与光滑映射。

阅读建议

- 第一卷重「数系与函数」，可对照 线性代数应该这样学、托马斯微积分。
- 第二卷重「几何量与变换群」，是本书精华，可对照 从微分观点看拓扑 的现代观点。
- 第三卷重「近似数学」，可对照 托马斯微积分 的严格化章节与 拓扑与分析概念辨析。

参考源

- 高观点下的初等数学-伴读
- 高观点下的初等数学-总结-几何全卷总结

《概率导论》 导读

概述

整理自 概率导论-伴读。主线：样本空间与概率 → 随机变量与分布 → 期望与方差 → 极限定理。
这本书的力量在于「建模直觉」：每个抽象都先有现实对应。

章节地图

章	主题	关键概念
1	样本空间与概率	概率空间
2	离散随机变量	期望、方差、二项/几何/泊松
3	一般随机变量	分布函数、密度、条件期望
4	进一步论题	条件概率与贝叶斯公式 • 协方差
5	极限定理	大数定律与中心极限定理

三个转折点

1. 概率公理：把「等可能」提升为「可加性 + 归一化」。
2. 期望线性性：不要求独立——概率论中最「划算」的工具。
3. 中心极限定理：解释为什么正态分布无处不在。

与本库的联系

- 与 数值积分、定积分：连续型概率就是积分；蒙特卡洛是概率的数值方法。
- 与 内积与范数、本征值与谱：从矩阵到数据：协方差矩阵、PCA。
- 与 随机过程：本书末尾的马尔可夫链是随机过程的入口。

参考源

- 概率导论-伴读

《随机过程》导读

概述

整理自 随机过程-伴读。随机过程 = 带时间标签的随机变量族；本书用四类核心模型覆盖离散/连续、状态空间大/小：

时间	状态	离散状态	连续状态
离散时间	马尔可夫链	时间序列	
连续时间	泊松过程	布朗运动	

贯穿四者的是鞅（公平游戏）与马尔可夫性（未来只依赖现在）两条主线。

章节地图

1 基本概念 → 有限维分布、平稳性 2 泊松过程 → 计数与间隔的等价刻画 3 马尔可夫链 → 转移矩阵、平稳分布、遍历定理 4 鞅 → 停时、可选停时定理 5 布朗运动 → 连续不可微轨道、二次变差

三个转折点

1. 马尔可夫性：把「历史」压成一个状态。
2. 平稳分布：动态的终点是静止的概率分布；MCMC由此而来。
3. 布朗运动：连续时间随机性的原型，通向随机分析。

与本库的联系

- 与 大数定律与中心极限定理：遍历定理是时间版本的「大数定律」。
- 与 魏尔斯特拉斯函数：布朗运动轨道处处连续、处处不可微。
- 与 实数完备性、一致连续性与可积性：随机变量与期望的严格化需要测度与积分。

参考源

- 随机过程-伴读

《统计学七支柱》导读

概述

整理自 统计学七支柱-伴读。Stigler 的主张是：统计学有自己的思想史，不是概率的应用分支。七根支柱彼此交织，构成统计推断的方法论骨架。

七根支柱

#	支柱	核心	本库概念
1	聚合	均值比单个观测更准	描述统计与统计推断
2	信息	信息量、 $\sqrt{n}$ 收益递减	—
3	似然	数据反推参数	似然
4	相互比较	相对尺度、显著性	—
5	回归	回归均值、最小二乘	回归与回归均值
6	设计	随机化、对照	—
7	残差	拟合之后剩下的信息	—

三个有冲击力的点

1. 聚合的悖论：汇总丢失信息，却换来精度——「少即是多」。
2. 回归均值：大量「因果」其实是统计假象。
3. 设计先于分析：数据怎么来，决定能问什么问题。

与本库的联系

- 概率导论 给概率工具；本书给统计思维。
- 贝叶斯思维 是「似然 + 先验」的另一条路。
- 肥尾效应 提醒：聚合与 CLT 在重尾下会失灵。

参考源

- 统计学七支柱-伴读

《贝叶斯思维》导读

概述

整理自 贝叶斯思维-伴读。核心公式只有一个——贝叶斯定理；核心思想也只有一个——把未知量当随机变量，用数据更新其分布。Downey的贡献是用代码让它可算、可感。

主线

1. 贝叶斯定理 → 条件概率与贝叶斯公式
2. 先验与后验 → 先验与后验
3. 计算 → 网格近似、蒙特卡洛方法、MCMC
4. 决策 → 损失函数、可信区间、预测分布
5. 模型比较 → 贝叶斯因子、层次模型

三个转折点

1. 从公式到计算：无法解析求解时，采样也能得到后验。
2. 序列更新：后验 → 先验，天然适合在线学习。
3. 先验即假设：先验的选择必须被审视与讨论。

与本库的联系

- 概率导论 提供概率语言；本书提供推断范式。
- 统计学七支柱 的「似然」在这里与先验结合。
- 马尔可夫链 是 MCMC 的引擎。

参考源

- 贝叶斯思维-伴读

《肥尾效应》导读

概述

整理自 肥尾效应-伴读。当分布是重尾时，方差甚至均值可能不存在，中心极限定理与大数定律的结论不再可靠。Taleb 用「前渐进」提醒：真实数据几乎从不处于渐近区。

主线

1. 重尾 → 重尾分布、幂律分布
2. 渐近失效 → 大数定律与中心极限定理
3. 极值理论 → GEV / GPD，专治尾部
4. 遍历性 → 集合平均 $\neq$ 时间平均（遍历性）
5. 决策 → 稳健、凸性、可承受尾部

三个转折点

1. 方差不是万能的：方差无穷时，用方差度量风险毫无意义。
2. 极值主导：总和由最大项决定，平均值失去代表性。
3. 遍历性破缺：期望为正 $\neq$ 长期存活。

与本库的联系

- 是 概率导论 与 大数定律与中心极限定理 的「反面教材」。
- 与 布朗运动、鞅 的重尾推广（Lévy 过程）相关。
- 与 精确数学与近似数学：模型选择本身就是近似数学问题。

参考源

- 肥尾效应-伴读

《深入理解计算机系统》导读

概述

整理自 深入理解计算机系统-伴读。主线：程序如何被表示（第 2 章）→ 如何跑得快（第 6 章局部性）→ 如何被隔离（第 9 章虚拟内存）→ 如何并发（第 12 章）。

章节地图

章	主题	关键概念
2	信息的表示	浮点数与 IEEE 754
6	存储层次	存储层次与局部性
9	虚拟内存	虚拟内存
12	并发	死锁与同步

三个转折点

1. 补码与 **IEEE 754**：把「数怎么存」讲清楚，解释 $0.1+0.2 \neq 0.3$ 。
2. 局部性：性能优化的第一性原理。
3. 虚拟内存：隔离与共享的统一。

与本库的联系

- 与 精确数学与近似数学：浮点数是「有限精度逼近实数」的工程版本。
- 与 存储层次与局部性：缓存与分块让人想起数值线性代数里的分块算法。
- 与 现代操作系统：同一套内存/进程抽象的两个视角。

参考源

- 深入理解计算机系统-伴读

《现代操作系统》导读

概述

整理自 现代操作系统-伴读。操作系统的四大抽象：进程（执行）→ 地址空间（内存）→ 文件（持久化）→ 设备（I/O）；而并发与死锁贯穿其中。

章节地图

章	主题	关键概念
1-2	进程与线程	进程与线程
3	内存管理	虚拟内存
4-5	文件与 I/O	抽象与缓冲
6	死锁	死锁与同步

三个转折点

1. 进程 **vs** 线程：隔离与并发的分工。
2. 虚拟内存：把物理内存变成可编程的地址空间。
3. 死锁四条件：把「卡住」变成可分析的逻辑结构。

与本库的联系

- 与 深入理解计算机系统：系统视角互参。
- 与 存储层次与局部性：OS 与硬件共同管理层次。
- 与 离散结构：资源分配图、依赖图是离散建模的典型工具。

参考源

- 现代操作系统-伴读

《编译原理》 导读

概述

整理自 编译原理-伴读。编译器是「把一种形式语言翻译成另一种」的系统工程，它的每一步都有对应的数学结构：正则语言 $\leftrightarrow$ 有限自动机，上下文无关语言 $\leftrightarrow$ 下推自动机。

主线

编译流程：

源程序 $\rightarrow$ 词法分析 $\rightarrow$ 语法分析 $\rightarrow$ 语义分析 $\rightarrow$ 中间代码 $\rightarrow$ 优化 $\rightarrow$ 目标代码
正则/DFA CFG/LR 类型系统 三地址码/SSA 寄存器分配

- 词法与语法分析
- 形式语言与自动机
- 编译流程与中间表示

三个转折点

1. 正则 $\rightarrow$ **DFA**：词法分析的自动化。
2. **CFG $\rightarrow$ LR** 分析：语法分析的自动化。
3. 中间表示 (**SSA**)：优化的通用语言。

与本库的联系

- 与 深入理解计算机系统：程序如何被翻译与执行。
- 与 形式语言与自动机：Chomsky 层级是计算能力的分层。

参考源

- 编译原理-伴读

第四部分 • 分支与概念清单

基础

（本库暂未收录）

代数

《代数 Artin》一群 · 群同态与同构 · 陪集与拉格朗日定理 · 正规子群与商群 · 置换群 · 凯莱定理 · 群作用 · 类方程与共轭类 · 西罗定理 · 自由群与生成元关系 · 环与理想 · 商环与环同态 · 多项式环 · 欧几里得整环与主理想整环 · 唯一分解整环 · 域与域扩张 · 伽罗瓦理论 · 对称函数 · 双线性型 · 线性群 · 李代数 · 群表示与特征标 · 正交群与旋转 · 平面等距与晶体群 · 模 · 代数整数与理想类群 · 有限域 · 佐恩引理

《线性代数应该这样学》—复数 · 域 · 向量空间 · 组与 $\mathbf{F}^n$ · 子空间与直和 · 张成与线性无关 · 基与维数 · 线性映射 · 零空间与值域 · 线性映射基本定理 · 矩阵 · 可逆性与同构 · 积与商空间 · 对偶空间 · 多项式 · 本征值与本征向量 · 不变子空间 · 上三角化与对角化 · 内积与范数 · 规范正交基与格拉姆-施密特 · 正交补与极小化问题 · 伴随与自伴算子 · 谱定理 · 正算子、等距同构与极分解 · 奇异值分解 · 广义本征向量与幂零算子 · 特征多项式与极小多项式 · 若尔当形 · 复化 · 迹与行列式

分析

《托马斯微积分》—函数·极限·连续性·导数·求导法则·隐式微分与相关变化率·线性化与微分·中值定理·洛必达法则·牛顿法·极值与最优化·双曲函数·反导数与不定积分·定积分·微积分基本定理·代换法则·分部积分与三角代换·部分分式与积分表·数值积分·反常积分·定积分的应用·旋转体体积·弧长与旋转曲面面积·功与流体压力·矩与质心·指数变化与可分离方程·数列与无穷级数·级数审敛法·幂级数与泰勒级数·幂级数·泰勒级数与麦克劳林级数·极坐标与圆锥曲线·向量与空间几何·向量值函数与曲率·偏导数·方向导数与梯度·多元极值与拉格朗日乘数·二重积分·三重积分·线积分·路径独立与势函数·格林定理·曲面积分与通量·斯托克斯定理与散度定理

几何与拓扑

《从微分观点看拓扑》—光滑流形与光滑映射 • 切空间与导射 • 正则值与正则点 • Sard 定理 • 模 2 度 • 定向流形与度 • 向量场与欧拉数 • 标架式协边 • Pontryagin 构造 • 一维流形分类 • 代数基本定理-拓扑证明

初等数学（高观点）

《高观点下的初等数学》—承袭性原则·数系扩张·实数完备性·超越数·四元数与超复数·对数函数与指数函数·角函数·带符号的几何量·格拉斯曼行列式原理·滑动矢量与自由矢量·不变量与相对不变量·导出的流形·仿射变换·投影变换与齐次坐标·反演变换·对偶变换与对偶原理·变换群与爱尔兰根纲领·几何学基础与非欧几何·精确数学与近似数学·函数带·一致连续性与可积性·魏尔斯特拉斯函数·合理函数·拉格朗日插值与切比雪夫逼近·傅里叶级数与三角展开·球函数·康托集与完备集·皮亚诺曲线与若当曲线·正则曲线与解析曲线

概率与统计

《概率导论》— 概率空间 · 条件概率与贝叶斯公式 · 大数定律与中心极限定理

《随机过程》— 马尔可夫链 · 泊松过程 · 鞅 · 布朗运动

《统计学七支柱》— 描述统计与统计推断 · 似然 · 回归与回归均值

《贝叶斯思维》— 贝叶斯推断 · 先验与后验 · 蒙特卡洛方法

《肥尾效应》— 重尾分布 · 幂律分布 · 遍历性

离散数学与理论 CS

《深入理解计算机系统》—浮点数与 IEEE 754 • 存储层次与局部性 • 虚拟内存

《现代操作系统》—进程与线程 • 死锁与同步 • 虚拟内存

《编译原理》—形式语言与自动机 • 词法与语法分析 • 编译流程与中间表示

数值与计算

（本库暂未收录）

应用与交叉

（本库暂未收录）

第五部分·学习方法论

数学学习方法论

提炼自 学习方法论-对话。它是 数学大地图 的「元层」——地图怎么读、怎么生长，都从这里来。

概述

一套自学的闭环，而不是课程设计：先拿到脉络，在最容易出反例的地方对抗，再通过外化（对话/记录）把理解「合」起来。

核心要点

1. 三步：史学 → 对抗 → 对话

1. 史学：学一个新领域，先看它的发展历史与脉络，按自己的理解划分阶段。
2. 对抗：在新旧阶段的衔接处收集反例（失效案例）——那里正是旧范式解释不了新现象的地方。
3. 对话：反复练习并把理解外化（与人/与 AI 聊、写成笔记），像「对话」一样逼出核心。

2. 反转：联系才是核心

最后一步不是「对话」，而是联系——是联系让「忘记、重开视角」产生意义。理解在联系中加深，且没有终态：只要还有下一次对话、下一个视角，合就会被继续改写。

3. 理论以线性代数为基础

线性代数提供向量空间、线性映射、内积、谱的语言，是分析、几何、数值、数据的共同底座（见 导数与线性化：分析的共同语言、本征值与谱：从矩阵到数据）。

4. 实践：因地制宜的对抗式训练

- 对照实验：同一问题至少两种工具对刀（正规方程 vs QR vs SVD），解释「为什么结果不同」。
- 故意失效：主动制造可控的失败（病态矩阵、共线数据），失败是判断力的养料。
- 要决策报告：不只要结果，要「选了什么 / 为什么不选别的 / 预判什么风险 / 实测是否印证」。
- 审查 AI 方案：给一段「能跑但选错方法」的代码，让学生指出并修正——现代更值钱的是判断力而非操作能力。

5. 认识论：贝叶斯更新

- 分不清时先读书、主动放下、让时间沉淀，不靠有限理解死磕。
- 前沿领域反而更轻松：没有已确立的理论，就不必固化认知，持续贝叶斯更新即可。
- 「忘记」不是争论，而是清空先入为主、从新路径重新生长；多个低维视角最终「合」出更完整的东西。
- 合发生在联系里（对话当下），不在某个持续的主体身上。

与其他概念的关系

- 数学大地图 • 微积分学习路线 • 线性代数学习路线 • 向量分析三大定理

深入问题

- 「对抗式训练」反人性（人本能回避失败），如何在自学中持续执行？
- 如果「合」没有终态，如何判断一次学习「足够」了？
- 这套方法论在前沿领域（无历史断层）与非前沿领域的适用性差异在哪？

参考源

- 学习方法论-对话