
Mathematische Method der Physik I

Übungsserie 7

Dr. Agnes Sambale
agnes.sambale@uni-jena.de

Version: 28. Mai 2018
Abgabe: 6. Dezember 2017
Wintersemester 17/18

Aufgabe 1 *Die Methode der unbestimmten Koeffizienten*

Lösen Sie die folgenden Differentialgleichungen mithilfe der Methode der unbestimmten Koeffizienten für die nebenstehenden Anfangsbedingungen. Führen Sie eine Probe durch.

- (i) $3y'' - 6y' - 24y = 72x^2 - 12x - 6$, $y(0) = -1$, $y'(0) = 8$
- (ii) $y'' + y' + y = (2 + x) \cos x$, $y(0) = -1$, $y'(0) = 1$
- (iii) $y'' + y' + y = 2 + x + \cos x$, $y(0) = -7$, $y'(0) = 8$
- (iv) $y^{(3)} - 12y' + 16y = 32x - 8$, $y(0) = -$, $y'(0) = 1$, $y''(0) = -28$
- (v) $y'' - 9y = e^{3x}$, $y(0) = 3$, $y'(0) = \frac{55}{6}$

Hinweis:

zu (ii): Verwenden Sie einen Ansatz der Form

$$y_p = (a_0 + a_1 x) \sin x + (b_0 + b_1 x) \cos x$$

zu (iii): Bestimmen Sie nur eine neue Partikulärlösung. Die homogene Lösung kann aus (ii) übernommen werden.

zu (iv): Überlegen Sie sich, wie der Ansatz für Differentialgleichungen zweiter Ordnung auf solche dritter Ordnung erweitert werden kann.

Aufgabe 2 *Gekoppelte Differentialgleichungen*

Betrachten Sie folgendes System von miteinander gekoppelten Differentialgleichungen erster Ordnung für die Funktionen $x(t)$ und $y(t)$.

$$\dot{x} = \frac{dx(t)}{dt} = x + y + t , \quad \dot{y} = \frac{dy(t)}{dt} = 3x - y$$

bitte wenden

Bestimmen Sie die Lösungen, indem Sie die beiden Gleichungen erster Ordnung in eine Gleichung zweiter Ordnung überführen. Finden Sie die spezielle Lösung mit den Anfangsbedingungen $x(0) = -\frac{1}{4}$ und $y(0) = 1$ und führen Sie eine Probe durch.

Hinweis: Eliminieren Sie dazu y .

Aufgabe 3 *Die Variation der Konstanten*

Betrachten Sie die folgende Differentialgleichung.

$$y'' + 5y' + 4y = \cos 2x$$

Zur Bestimmung der allgemeinen Lösung soll nicht die Methode des Koeffizientenvergleichs benutzt werden, sondern nach einem allgemeineren Verfahren vorgegangen werden:

- (a) Bestimmen Sie zunächst die Fundamentallösungen y_1 und y_2 der homogenen Gleichung.
- (b) Variieren Sie die beiden Konstanten in

$$y_h = c_1 e^{-4x} + c_2 e^{-x} ,$$

indem Sie diese durch Funktionen $u(x)$ und $v(x)$ ausdrücken. Berechnen Sie die erste und die zweite Ableitung.

- (c) Setzen Sie die dadurch erhaltenen Funktionen in die inhomogene Differentialgleichung ein und vereinfachen Sie die daraus resultierende Gleichung, indem Sie benutzen, dass y_1 und y_2 die homogene Differentialgleichung lösen.
- (d) Vereinfachen Sie die Gleichung weiter, indem Sie fordern, dass

$$u'(x)e^{-4x} + v'(x)e^{-x} = 0 \tag{1}$$

gilt. Begründen Sie, warum diese Forderung zulässig ist.

- (e) Leiten Sie aus der Gleichung 1 eine weitere Bedingung ab, die Ihnen bei der Vereinfachung hilft.
- (f) Sie erhalten nun eine einfachere Form der ursprünglichen Differentialgleichung

$$-4u'(x)e^{-4x} - v'(x)e^{-x} = \cos 2x \tag{2}$$

Bestimmen Sie ausgehend von den Gleichungen (1) und (2) die Funktionen u und v .

- (g) Führen Sie eine Probe für die so erhaltene allgemeine Lösung durch.