
Mathematische Methoden der Physik II

Übungsserie 7

Dr. Agnes Sambale
agnes.sambale@uni-jena.de

Version: 28. Mai 2018
Sommersemester 2018

Aufgabe 1 *Differentialoperatoren in Zylinderkoordinaten*

Gegeben seien das skalare Feld U und das Vektorfeld \vec{V} . Berechnen Sie in Zylinderkoordinaten

- (i) $\operatorname{div} \vec{V}$
- (ii) ΔU .

Aufgabe 2 *Zylinderkoordinaten und Feldlinien*

Es sei U die skalare Funktion

$$U = \rho \cos \phi$$

der Zylinderkoordinaten ρ und ϕ .

- (a) Skizzieren Sie in der $(x - y)$ -Ebene die Linien $U = \text{const.}$
- (b) Berechnen Sie die radiale Komponente V_ρ und die azimuthale Komponente V_ϕ von $\vec{V} = \operatorname{grad} U$ in Zylinderkoordinaten.
- (c) Die Feldlinien von $\vec{V} = \operatorname{grad} U$ können durch die Funktion $\rho = \rho(\phi)$ beschrieben werden. Zeigen Sie, dass diese Funktion der Differentialgleichung

$$\frac{d\rho(\phi)}{d\phi} = \frac{\rho V_\rho}{V_\phi}$$

genügt.

- (d) Lösen Sie diese Differentialgleichung für $\rho(\phi)$ und tragen Sie die \vec{V} -Feldlinien in Ihre Skizze mit den Linien $U = \text{const.}$ ein.

bitte wenden

Aufgabe 3 *Laplaceoperator in 3 Dimensionen*

Der LAPLACE-Operator wird u.a. in der Elektrodynamik auch auf Vektoren angewendet. Im kartesischen wird die Definition aus der Vorlesung einfach komponentenweise gebraucht, d.h. es ist

$$\Delta \vec{a} = (\Delta a_1) \vec{e}_1 + (\Delta a_2) \vec{e}_2 + (\Delta a_3) \vec{e}_3$$

wobei die a_i die Komponenten von \vec{a} sind und $\Delta = \sum_{i=1}^3 \frac{\partial^2}{\partial x_i^2}$. Berechnen Sie nun $\Delta \vec{a}$ in Zylinderkoordinaten und zeigen Sie, dass – im Gegensatz zu kartesischen Koordinaten –

$$\Delta a_i \neq (\Delta \vec{a})_i.$$