

ОКАЗАНИЕ ПЕРВОЙ ПОМОЩИ ПРИ НАРУЖНЫХ КРОВОТЕЧЕНИЯХ И ТРАВМАХ

ПОНЯТИЕ «КРОВОТЕЧЕНИЕ»

Оказание первой помощи при наружных кровотечениях и травмах



Под **кровотечением** понимают ситуацию, когда кровь по разным причинам покидает сосудистое русло, что приводит к острой кровопотере.

Основные признаки острой кровопотери:

- ☐ резкая общая слабость;
- ☐ чувство жажды;
- ☐ головокружение;
- ☐ мелькание «мушек» перед глазами;
- ☐ обморок, чаще при попытке встать;
- ☐ бледная, влажная и холодная кожа;
- ☐ учащённое сердцебиение;
- ☐ частое дыхание.

ПРИЗНАКИ РАЗЛИЧНЫХ ВИДОВ НАРУЖНОГО КРОВОТЕЧЕНИЯ

Оказание первой помощи при наружных кровотечениях и травмах

Артериальное
кровотечение



Венозное
кровотечение



Капиллярное
кровотечение



ОБЗОРНЫЙ ОСМОТР ПОСТРАДАВШЕГО

Оказание первой помощи при наружных кровотечениях и травмах




Обзорный осмотр производится
очень быстро, в течение **1-2 секунд**, с
ГОЛОВЫ ДО НОГ


СПОСОБЫ ВРЕМЕННОЙ ОСТАНОВКИ НАРУЖНОГО КРОВОТЕЧЕНИЯ

Оказание первой помощи при наружных кровотечениях и травмах

Прямое давление на рану



Наложение давящей повязки



СПОСОБЫ ВРЕМЕННОЙ ОСТАНОВКИ НАРУЖНОГО КРОВОТЕЧЕНИЯ

Оказание первой помощи при наружных кровотечениях и травмах

Пальцевое прижатие артерии



Общая сонная артерия прижимается на передней поверхности шеи снаружи от гортани на стороне повреждения.



Давление в указанную точку может осуществляться четырьмя пальцами одновременно по направлению к позвоночнику, при этом сонная артерия придавливается к нему.




Другим вариантом пальцевого прижатия сонной артерии является давление в ту же точку большим пальцем по направлению к позвоночнику.


СПОСОБЫ ВРЕМЕННОЙ ОСТАНОВКИ НАРУЖНОГО КРОВОТЕЧЕНИЯ

Оказание первой помощи при наружных кровотечениях и травмах


Пальцевое прижатие артерии



Подключичная артерия прижимается в ямке над ключицей к первому ребру



Осуществлять давление в точку прижатия подключичной артерии можно с помощью четырех выпрямленных пальцев




Другим способом пальцевого прижатия подключичной артерии является давление согнутыми пальцами


СПОСОБЫ ВРЕМЕННОЙ ОСТАНОВКИ НАРУЖНОГО КРОВОТЕЧЕНИЯ

Оказание первой помощи при наружных кровотечениях и травмах

Пальцевое прижатие артерии



Плечевая артерия прижимается к плечевой кости с внутренней стороны между бицепсом и трицепсом в средней трети плеча




Давление на точку прижатия осуществляется с помощью четырех пальцев кисти, обхватывающей плечо пострадавшего сверху или снизу

СПОСОБЫ ВРЕМЕННОЙ ОСТАНОВКИ НАРУЖНОГО КРОВОТЕЧЕНИЯ

Оказание первой помощи при наружных кровотечениях и травмах

Пальцевое прижатие артерии

Подмышечная артерия прижимается к плечевой кости в подмышечной впадине при кровотечении из раны плеча ниже плечевого сустава. Давление в точку прижатия подмышечной артерии производится прямыми, жестко зафиксированными пальцами с достаточной силой в направлении плечевого сустава. При этом область плечевого сустава пострадавшего следует придерживать другой рукой





СПОСОБЫ ВРЕМЕННОЙ ОСТАНОВКИ НАРУЖНОГО КРОВОТЕЧЕНИЯ

Оказание первой помощи при наружных кровотечениях и травмах

Пальцевое прижатие артерии

Бедренная артерия прижимается ниже паховой складки при кровотечении из ран в области бедра. Давление выполняется кулаком, зафиксированным второй рукой, весом тела участника оказания первой помощи




СПОСОБЫ ВРЕМЕННОЙ ОСТАНОВКИ НАРУЖНОГО КРОВОТЕЧЕНИЯ

Оказание первой помощи при наружных кровотечениях и травмах

Максимальное сгибание конечности

11



Для остановки кровотечения из предплечья в локтевой сгиб вкладывают валик, конечность максимально сгибают в локтевом суставе и предплечье фиксируют к плечу в таком положении, например, ремнем



При повреждении сосудов стопы, голени и подколенной ямки в последнюю вкладывают несколько бинтов или валик из ткани, после чего конечность сгибают в коленном суставе и фиксируют в этом положении бинтом



Для остановки кровотечения при травме бедра сверток из ткани или несколько бинтов вкладывают в область паховой складки, притягивают колено к груди и фиксируют руками или бинтом



СПОСОБЫ ВРЕМЕННОЙ ОСТАНОВКИ НАРУЖНОГО КРОВОТЕЧЕНИЯ

Оказание первой помощи при наружных кровотечениях и травмах

Наложение кровоостанавливающего жгута

$t_{\max} \leq 60$ мин. в теплое время года
30 мин. в холодное

12




СПОСОБЫ ВРЕМЕННОЙ ОСТАНОВКИ НАРУЖНОГО КРОВОТЕЧЕНИЯ

Оказание первой помощи при наружных кровотечениях и травмах

В качестве импровизированного жгута можно использовать подручные средства:

- ☐ тесьму,
- ☐ платок,
- ☐ галстук
- ☐ и другие подобные вещи.



ОКАЗАНИЕ ПЕРВОЙ ПОМОЩИ ПРИ НОСОВОМ КРОВОТЕЧЕНИИ

Оказание первой помощи при наружных кровотечениях и травмах

Шаг 1



Шаг 2



Шаг 3



Шаг 4



ПОНЯТИЕ О ТРАВМАТИЧЕСКОМ ШОКЕ, ПРИЧИНЫ И ПРИЗНАКИ

Оказание первой помощи при наружных кровотечениях и травмах

Травматический шок – состояние, причинами развития которого являются тяжелые травмы и сильные кровотечения.

Признаками травматического шока являются:

- ☐ наличие тяжелой травмы и сильного кровотечения;
- ☐ нарушения дыхания и кровообращения (учащенное дыхание и сердцебиение);
- ☐ бледная холодная влажная кожа;
- ☐ возбуждение, сменяющееся апатией.



МЕРОПРИЯТИЯ, ПРЕДУПРЕЖДАЮЩИЕ РАЗВИТИЕ ТРАВМАТИЧЕСКОГО ШОКА

Оказание первой помощи при наружных кровотечениях и травмах

К этим мероприятиям относятся:


- ☐ остановка кровотечения;
- ☐ придание пострадавшему оптимального положения тела;
- ☐ иммобилизация травмированных конечностей;
- ☐ защита от переохлаждения (укутывание подручными средствами или покрывалом спасательным изотермическим).



ПОДРОБНЫЙ ОСМОТР ПОСТРАДАВШЕГО

Оказание первой помощи при наружных кровотечениях и травмах

Шаг 1 Осмотр головы



Шаг 2 Осмотр
шеи



Шаг 3 Осмотр груди




ПОДРОБНЫЙ ОСМОТР ПОСТРАДАВШЕГО

Оказание первой помощи при наружных кровотечениях и травмах


Шаг 4 Осмотр живота и таза



Шаг 5 Осмотр ног




Шаг 6 Осмотр рук




ОКАЗАНИЕ ПЕРВОЙ ПОМОЩИ ПРИ ТРАВМЕ ГОЛОВЫ

Оказание первой помощи при наружных кровотечениях и травмах

Придание пострадавшему с травмой головы и находящемуся без сознания, устойчивого бокового положения.



Остановка кровотечения при ранении головы путем прямого давления на рану. Нельзя применять этот способ при открытых черепно-мозговых травмах.



Остановка кровотечения при травме головы наложением давящей повязки.



ОКАЗАНИЕ ПЕРВОЙ ПОМОЩИ ПРИ ТРАВМАХ ГЛАЗА И НОСА

Оказание первой помощи при наружных кровотечениях и травмах

При травме глаза:



Наложить стерильную повязку на оба глаза.

При травме носа:



Усадить пострадавшего со слегка наклоненной вперед головой, зажать нос, приложить холод на переносицу.

ОКАЗАНИЕ ПЕРВОЙ ПОМОЩИ ПРИ ТРАВМЕ ШЕИ

Оказание первой помощи при наружных кровотечениях и травмах


Шаг 1 Остановка кровотечения



Шаг 2 Фиксация шеи при перемещении



Шаг 3 Фиксация шейного отдела





ОКАЗАНИЕ ПЕРВОЙ ПОМОЩИ ПРИ ТРАВМЕ ГРУДИ

Оказание первой помощи при наружных кровотечениях и травмах

Шаг 1 Придать полусидячее положение

Шаг 2 Наложить герметизирующую (окклюзионную) повязку

Шаг 3 Обложить инородный предмет салфетками или бинтами, наложив поверх них давящую повязку



ОКАЗАНИЕ ПЕРВОЙ ПОМОЩИ ПРИ ТРАВМЕ ЖИВОТА И ТАЗА


Оказание первой помощи при наружных кровотечениях и травмах

Закрытая травма живота

Шаг 1 Вызвать скорую помощь



Шаг 2 Положить холод на живот



Шаг 3 Придать положение на спине с валиком под полусогнутыми разведенными в стороны ногами



ОКАЗАНИЕ ПЕРВОЙ ПОМОЩИ ПРИ ТРАВМЕ ЖИВОТА И ТАЗА

Оказание первой помощи при наружных кровотечениях и травмах

Открытая травма живота

Шаг 1 Поверх валиков
наложить повязку, не
прижимая выпавшие органы



Шаг 2 Положить холод на живот




Шаг 3 Вызвать скорую помощь



ОКАЗАНИЕ ПЕРВОЙ ПОМОЩИ ПРИ ТРАВМЕ КОНЕЧНОСТЕЙ

Оказание первой помощи при наружных кровотечениях и травмах

Шаг 1 Остановить кровотечение



Шаг 2 Иммобилизация с
обездвиживанием двух соседних суставов
с помощью шин, наложенных поверх
одежды



Шаг 3 При открытых переломах
нельзя прикладывать шину к местам,
где выступают наружу костные
отломки.



В качестве иммобилизирующего средства можно использовать шины или плоские узкие предметы: палки, доски, линейки, прутья, фанеру, картон и др.


ОКАЗАНИЕ ПЕРВОЙ ПОМОЩИ ПРИ ТРАВМЕ КОНЕЧНОСТЕЙ

Оказание первой помощи при наружных кровотечениях и травмах

26




Иммобилизация – это создание неподвижности поврежденной части тела с помощью подручных средств, готовых транспортных шин или используя здоровые части тела пострадавшего (**аутоиммобилизация**).



ОКАЗАНИЕ ПЕРВОЙ ПОМОЩИ ПРИ ТРАВМЕ ПОЗВОНОЧНИКА

Оказание первой помощи при наружных кровотечениях и травмах



При перемещении пострадавший должен находиться на ровной, жесткой, горизонтальной поверхности



Перемещение или перекладывание пострадавшего следует осуществлять с помощью нескольких человек, особое внимание следует уделить фиксации шейного отдела позвоночника

БЛАГОДАРИМ ЗА ВНИМАНИЕ

ЦЕЛЬ И ПОРЯДОК ОБЗОРНОГО ОСМОТРА ПОСТРАДАВШЕГО

ОБЗОРНЫЙ ОСМОТР ПОСТРАДАВШЕГО

Оказание первой помощи при наружных кровотечениях и травмах



Обзорный осмотр производится
очень быстро, в течение **1-2 секунд**, с
ГОЛОВЫ ДО НОГ

БЛАГОДАРИМ ЗА ВНИМАНИЕ

**ПОНЯТИЯ «КРОВОТЕЧЕНИЕ», «ОСТРАЯ
КРОВОПОТЕРЯ». ПРИЗНАКИ РАЗЛИЧНЫХ ВИДОВ
НАРУЖНОГО КРОВОТЕЧЕНИЯ**

ПОНЯТИЕ «КРОВОТЕЧЕНИЕ»

Оказание первой помощи при наружных кровотечениях и травмах



Под **кровотечением** понимают ситуацию, когда кровь по разным причинам покидает сосудистое русло, что приводит к острой кровопотере.

Основные признаки острой кровопотери:

- ☐ резкая общая слабость;
- ☐ чувство жажды;
- ☐ головокружение;
- ☐ мелькание «мушек» перед глазами;
- ☐ обморок, чаще при попытке встать;
- ☐ бледная, влажная и холодная кожа;
- ☐ учащённое сердцебиение;
- ☐ частое дыхание.

ПРИЗНАКИ РАЗЛИЧНЫХ ВИДОВ НАРУЖНОГО КРОВОТЕЧЕНИЯ

Оказание первой помощи при наружных кровотечениях и травмах

Артериальное
кровотечение



Венозное
кровотечение



Капиллярное
кровотечение




БЛАГОДАРИМ ЗА ВНИМАНИЕ

СПОСОБЫ ВРЕМЕННОЙ ОСТАНОВКИ НАРУЖНОГО КРОВОТЕЧЕНИЯ


СПОСОБЫ ВРЕМЕННОЙ ОСТАНОВКИ НАРУЖНОГО КРОВОТЕЧЕНИЯ

Оказание первой помощи при наружных кровотечениях и травмах

Прямое давление на рану



Наложение давящей повязки



СПОСОБЫ ВРЕМЕННОЙ ОСТАНОВКИ НАРУЖНОГО КРОВОТЕЧЕНИЯ

Оказание первой помощи при наружных кровотечениях и травмах

Пальцевое прижатие артерии



Общая сонная артерия прижимается на передней поверхности шеи снаружи от гортани на стороне повреждения.



Давление в указанную точку может осуществляться четырьмя пальцами одновременно по направлению к позвоночнику, при этом сонная артерия придавливается к нему.




Другим вариантом пальцевого прижатия сонной артерии является давление в ту же точку большим пальцем по направлению к позвоночнику.


СПОСОБЫ ВРЕМЕННОЙ ОСТАНОВКИ НАРУЖНОГО КРОВОТЕЧЕНИЯ

Оказание первой помощи при наружных кровотечениях и травмах


Пальцевое прижатие артерии



Подключичная артерия прижимается в ямке над ключицей к первому ребру



Осуществлять давление в точку прижатия подключичной артерии можно с помощью четырех выпрямленных пальцев




Другим способом пальцевого прижатия подключичной артерии является давление согнутыми пальцами


СПОСОБЫ ВРЕМЕННОЙ ОСТАНОВКИ НАРУЖНОГО КРОВОТЕЧЕНИЯ

Оказание первой помощи при наружных кровотечениях и травмах

Пальцевое прижатие артерии



Плечевая артерия прижимается к плечевой кости с внутренней стороны между бицепсом и трицепсом в средней трети плеча




Давление на точку прижатия осуществляется с помощью четырех пальцев кисти, обхватывающей плечо пострадавшего сверху или снизу

СПОСОБЫ ВРЕМЕННОЙ ОСТАНОВКИ НАРУЖНОГО КРОВОТЕЧЕНИЯ

Оказание первой помощи при наружных кровотечениях и травмах

Пальцевое прижатие артерии

Подмышечная артерия прижимается к плечевой кости в подмышечной впадине при кровотечении из раны плеча ниже плечевого сустава. Давление в точку прижатия подмышечной артерии производится прямыми, жестко зафиксированными пальцами с достаточной силой в направлении плечевого сустава. При этом область плечевого сустава пострадавшего следует придерживать другой рукой




СПОСОБЫ ВРЕМЕННОЙ ОСТАНОВКИ НАРУЖНОГО КРОВОТЕЧЕНИЯ

Оказание первой помощи при наружных кровотечениях и травмах

Пальцевое прижатие артерии

Бедренная артерия прижимается ниже паховой складки при кровотечении из ран в области бедра. Давление выполняется кулаком, зафиксированным второй рукой, весом тела участника оказания первой помощи




СПОСОБЫ ВРЕМЕННОЙ ОСТАНОВКИ НАРУЖНОГО КРОВОТЕЧЕНИЯ


Оказание первой помощи при наружных кровотечениях и травмах

Максимальное сгибание конечности

8



Для остановки кровотечения из предплечья в локтевой сгиб вкладывают валик, конечность максимально сгибают в локтевом суставе и предплечье фиксируют к плечу в таком положении, например, ремнем



При повреждении сосудов стопы, голени и подколенной ямки в последнюю вкладывают несколько бинтов или валик из ткани, после чего конечность сгибают в коленном суставе и фиксируют в этом положении бинтом



Для остановки кровотечения при травме бедра сверток из ткани или несколько бинтов вкладывают в область паховой складки, притягивают колено к груди и фиксируют руками или бинтом



СПОСОБЫ ВРЕМЕННОЙ ОСТАНОВКИ НАРУЖНОГО КРОВОТЕЧЕНИЯ

Оказание первой помощи при наружных кровотечениях и травмах

Наложение кровоостанавливающего жгута

$t_{\max} \leq 60$ мин. в теплое время года
30 мин. в холодное

9




СПОСОБЫ ВРЕМЕННОЙ ОСТАНОВКИ НАРУЖНОГО КРОВОТЕЧЕНИЯ

Оказание первой помощи при наружных кровотечениях и травмах

В качестве импровизированного жгута можно использовать подручные средства:

- ☐ тесьму,
- ☐ платок,
- ☐ галстук
- ☐ и другие подобные вещи.



БЛАГОДАРИМ ЗА ВНИМАНИЕ

ОКАЗАНИЕ ПЕРВОЙ ПОМОЩИ ПРИ НОСОВОМ КРОВОТЕЧЕНИИ

ОКАЗАНИЕ ПЕРВОЙ ПОМОЩИ ПРИ НОСОВОМ КРОВОТЕЧЕНИИ

Оказание первой помощи при наружных кровотечениях и травмах

Шаг 1



Шаг 2



Шаг 3



Шаг 4



БЛАГОДАРИМ ЗА ВНИМАНИЕ