

LA-1 二阶行列式与三阶行列式

对应 1.1 二阶 · 三阶行列式 (P1, 28.7min) · 本材料为自写学习整理：基于宋浩《线性代数》3.0 课程的学习索引，不含原课程素材 · 本节目标：20 分钟读懂 + 40 分钟练完

① 本节定位与前置

行列式是线性代数的"第一块砖"：后面求矩阵的逆、解线性方程组（克拉默法则）都要算行列式。**前置要求**：会解二元一次方程组（加减消元）、会算简单乘法。

本节学完你会：手算二阶/三阶行列式，一眼看出上三角、下三角、对角型行列式的值，并知道"行列式 vs 矩阵"的符号区别——这个区别贯穿全书，是最大的扣分点之一。

② 概念与定义

二阶行列式：从方程组"长"出来的新运算

求解二元一次方程组时，把 X 和 Y 的表达式整理后，分子分母都长成"四个数，两两相乘再相减"的样子。数学家就把这种形式定义成一个新运算：

$$\begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} \\ a_{21} & a_{22} \end{vmatrix} = a_{11} \cdot a_{22} - a_{12} \cdot a_{21}$$

其中 a_{ij} 叫**元素**：i 表示第 i 行、j 表示第 j 列。读作"a 一 一、a 一 二"，不是"a 十 一"。**行的位置比念法重要**——后面学矩阵时，位置错一个就全错。

易错提示 1 (符号)：外面是**两条竖线**才是行列式；**小括号 / 中括号**是矩阵。同一个数字表：竖线=行列式（结果是一个数），括号=矩阵（是一张数表）——全书最容易混的符号，第一印象必须立对。

易错提示 2 (中间是减号)：二阶行列式 = 主对角线相乘 **减去** 副对角线相乘，减号不能丢。例： $\begin{vmatrix} 1 & 2 \\ 3 & 4 \end{vmatrix} = 1 \times 4 - 2 \times 3 = -2$ （不是 2×3 加 1×4 ）。

行列式的本质：是一个数

二阶、三阶、乃至 n 阶行列式，**最终都是一个数**——它把所有元素"算"成一个数。这一点先记住，后面学"矩阵"时对比更明显：矩阵是一张表，行列式是一个数。

三阶行列式：对角线法则（三正三负）

三行三列共 9 个元素。展开式共 **6 项：3 个正项 + 3 个负项**，每一项都是"取三个数相乘"。取法按下面六条线走：

项	取法
正项 1	主对角线： $a_{11} \cdot a_{22} \cdot a_{33}$ （左上↘右下）
正项 2	$a_{12} \cdot a_{23} \cdot a_{31}$ （右上方向撇下来）
正项 3	$a_{13} \cdot a_{21} \cdot a_{32}$
负项 1	$a_{13} \cdot a_{22} \cdot a_{31}$ （左上方向撇到右下）
负项 2	$a_{11} \cdot a_{23} \cdot a_{32}$
负项 3	$a_{12} \cdot a_{21} \cdot a_{33}$

记忆：正项从左上往右下方向撇，负项从右上往左下方向撇。每次取**恰好 3 个数**——连线撇过头取到 4 个数就错了。注意"正项/负项"只是记号：具体数值可正可负（元素里有负数时），别把记号当结果。

③ 定理与适用条件

结论	内容	适用条件
上三角行列式	主对角线左下方全为 0，值 = 主对角线元素相乘	三阶及以上都成立（本章先用三阶）
下三角行列式	主对角线右上方全为 0，值 = 主对角线元素相乘	同上
对角型行列式	只有主对角线有元素，值 = 主对角线元素相乘	同上

易错提示 3（方向）：只有"左上↘右下"这条方向上的非零元素才叫对角型；元素在"右上↗左下"方向上的**不是**对角型，不能直接相乘，要老老实实按对角线法则展开。

④ 例题（含易错提示）

例 1：二阶行列式求未知数 (λ)

计算 $\begin{vmatrix} \lambda-1 & 2 \\ 3 & \lambda+4 \end{vmatrix} = 0$ ，解 λ 。

解： $(\lambda-1)(\lambda+4) - 2 \times 3 = \lambda^2 + 3\lambda - 4 - 6 = \lambda^2 + 3\lambda - 10 = 0 \rightarrow (\lambda+5)(\lambda-2) = 0 \rightarrow \lambda = -5 \text{ 或 } \lambda = 2$ 。

套路：先按对角线法则展开成普通方程，再解——行列式只是"包装"，算完就是一元二次方程。

例 2：三阶行列式直接展开（课后 123/231/312 型）

按对角线法则展开 $\begin{vmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 2 & 3 & 1 \\ 3 & 1 & 2 \end{vmatrix}$ ：

正项： $1 \cdot 3 \cdot 2 + 2 \cdot 1 \cdot 3 + 3 \cdot 2 \cdot 1 = 6 + 6 + 6 = 18$ ；负项： $3 \cdot 3 \cdot 3 + 1 \cdot 1 \cdot 1 + 2 \cdot 2 \cdot 2 = 27 + 1 + 8 = 36$ ；

结果 $= 18 - 36 = -18$ 。

例 3：特殊型一眼出答案

上三角 $\begin{vmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 0 & 6 & 9 \\ 0 & 0 & 3 \end{vmatrix} = 1 \times 6 \times 3 = 18$ ；对角型 $\begin{vmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 2 & 0 \\ 0 & 0 & 3 \end{vmatrix} = 1 \times 2 \times 3 = 6$ 。

反例： $\begin{vmatrix} 0 & 0 & 2 \\ 0 & 3 & 0 \\ 4 & 0 & 0 \end{vmatrix}$ 这种"右上↗左下"方向有元素的**不是**对角型——按对角线法则展开，正项全带 0，负项 $-2 \cdot 3 \cdot 4 = -24$ （视频中的例子，结果是负的）。

易错提示 4（计算量大易错）：三阶直接展开 6 项，数字一复杂就错。做题策略：**元素里有 2 个或以上 0**，直接展开（很多项自动消失，只剩 3 项左右）；**全不为 0** 且数字复杂，等学了行列式性质（1.3）再化简，不硬算。

⑤ 一分钟自测

自测（想清楚再翻答案）：

1. 二阶行列式 $\begin{vmatrix} 2 & 5 \\ 1 & 4 \end{vmatrix} = ?$
2. 三阶行列式 $\begin{vmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 2 & 0 \\ 0 & 0 & 3 \end{vmatrix} = ?$
3. 判断题： $\begin{vmatrix} 1 & 2 \\ 3 & 4 \end{vmatrix}$ 用小括号写成矩阵形式后，值还是 $1 \times 4 - 2 \times 3$ 。（对/错）
4. 上三角 $\begin{vmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 0 & 6 & 9 \\ 0 & 0 & 3 \end{vmatrix} = ?$

答案：1. $2 \times 4 - 5 \times 1 = 3$ 2. 对角型 $\rightarrow 1 \times 2 \times 3 = 6$ 3. **错**——行列式才是"算值"的数，矩阵是数表，没有"值"；符号不能混 4. $1 \times 6 \times 3 = 18$

⑥ 练习指引

- **必做：**课后 123/231/312 类三阶展开 3 题（练熟六条线的走向）；二阶含 λ 方程 2 题（展开后解方程）。
- **选做：**上/下三角、对角型各 1 题（练"一眼出答案"）；含两个 0 的三阶行列式 2 题（练展开技巧）。
- **连线题：**1.6 克拉默法则（P6）会用到本节系数行列式——现在就把"系数 $\rightarrow$ 行列式"的对应记住：系数矩阵的行列式做分母，常数项替换某一列做分子。

本节关键词：主对角线 / 副对角线 / 两条竖线 / 元素 a_{ij} / 对角线法则（三正三负） / 上三角 · 下三角 · 对角型

本材料为自写学习整理：基于宋浩《线性代数》3.0 课程的学习索引，不含原课程素材。LA-1 讲义 v1.0