


# MAT110 - Obligatorisk innlevering 1

Gruppemedlemmer:

Stephen Neba Fuh, Tord Johan Melheim,  
Ebubekir Siddik Yuksel, Casper Eide Özdemir-Børretzen

## Oppgave 1

a)



b)

$$\begin{aligned}
 z_1 &= e^{i\frac{\pi}{4}} \text{ (eksponentialform)} \rightarrow r = 1, \quad \theta = \frac{\pi}{4} \\
 &= 1(\cos \theta + i \cdot \sin \theta) \\
 &= \cos \frac{\pi}{4} + i \cdot \sin \frac{\pi}{4} \\
 &= x_1 + i \cdot y_1 \\
 \Rightarrow x_1 &= \cos \frac{\pi}{4} = \frac{1}{\sqrt{2}} = \frac{\sqrt{2}}{2} \\
 \Rightarrow y_1 &= \sin \frac{\pi}{4} = \frac{1}{\sqrt{2}} = \frac{\sqrt{2}}{2} \\
 z_1 &= \frac{\sqrt{2}}{2} + i \cdot \frac{\sqrt{2}}{2} \text{ (standardform)}
 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
 z_2 &= -1 - i \text{ (standardform)} \\
 &= x_2 + i \cdot y_2 \rightarrow x_2 = -1, \quad y_2 = -1 \\
 r &= \sqrt{x_2^2 + y_2^2} = \sqrt{(-1)^2 + (-1)^2} = \sqrt{2} \\
 \theta &= \tan^{-1}\left(\left|\frac{y}{x}\right|\right) \text{ (Generelt)}
 \end{aligned}$$

Men ettersom det komplekse tallet er i 3. kvadrant  $\rightarrow \theta = \alpha + \pi$

$$\begin{aligned}
 \alpha &= \tan^{-1}\left(\left|\frac{-1}{-1}\right|\right) = \tan^{-1}(1) = \frac{\pi}{4} \\
 \theta &= \pi + \frac{\pi}{4} = \frac{5\pi}{4} \\
 z_2 &= r(\cos \theta + i \cdot \sin \theta) \\
 z_2 &= \sqrt{2}\left(\cos \frac{5\pi}{4} + i \cdot \sin \frac{5\pi}{4}\right) \\
 z_2 &= \sqrt{2} \cdot e^{i\frac{5\pi}{4}} \text{ (eksponentialform)}
 \end{aligned}$$

## Oppgave 1

c)

$$\begin{aligned}
 z_1 + z_2 &= \left(\frac{\sqrt{2}}{2} + \sqrt{2} \cdot i\right) + (-1 - i) \\
 &= \left(\frac{\sqrt{2}}{2} - 1\right) + \left(\frac{\sqrt{2}}{2} - 1\right) \cdot i \\
 &= (0.7071 - 1) + (0.7071 - 1) \cdot i \\
 &= -0.29 - 0.29i
 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
 \frac{z_1}{z_2} &= \frac{e^{i\frac{\pi}{4}}}{\sqrt{2}e^{i\frac{5\pi}{4}}} = \frac{1}{\sqrt{2}}e^{i\frac{\pi}{4} - i\frac{5\pi}{4}} = \frac{1}{\sqrt{2}}e^{-i\pi} \\
 &= \frac{1}{\sqrt{2}}(\cos(-\pi) + i\sin(-\pi)) = \frac{1}{\sqrt{2}}(-1 + i(0)) = -\frac{1}{\sqrt{2}} + i0 \\
 &= -\frac{\sqrt{2}}{2}
 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
 z_1 &= \frac{\sqrt{2}}{2} + i\frac{\sqrt{2}}{2} \\
 \bar{z}_1 &= \frac{\sqrt{2}}{2} - i\frac{\sqrt{2}}{2} \\
 -\bar{z}_1 &= -1\left(\frac{\sqrt{2}}{2} - i\frac{\sqrt{2}}{2}\right) = -\frac{\sqrt{2}}{2} + i\frac{\sqrt{2}}{2}
 \end{aligned}$$

d)  $z^6 = 1 + i$ . La  $w = 1 + i$ , da må vi finne den 6. roten av  $w$ .

Først konverterer vi  $w$  til eksponentialform.

$$r = \sqrt{1^2 + 1^2} = \sqrt{2}$$

$$\theta = \tan^{-1}(1) = \frac{\pi}{4}$$

$$w = 1 + i = \sqrt{2}e^{i\frac{\pi}{4}}$$

Videre tar vi i bruk De Moivres thm. for røtter:

Hvis  $z^n = w = re^{i\theta}$ , da er røttene gitt ved  $z_k = \sqrt[n]{r}e^{i(\frac{\theta+2\pi k}{n})}$ , for  $k = 0, 1, 2, \dots, n-1$ .

I dette tilfellet blir  $n = 6, r = \sqrt{2}$  og  $\theta = \frac{\pi}{4}$ .

$$\sqrt[6]{r} = \sqrt[6]{\sqrt{2}} = \sqrt[6]{2^{\frac{1}{2}}} = 2^{(\frac{1}{2})(\frac{1}{6})} = 2^{\frac{1}{12}} = \sqrt[12]{2}.$$

Videre finner vi argumentene for  $k = 0, 1, 2, 3, 4, 5$ :

$$\text{Det generelle argumentet er } \phi_k = \frac{\frac{\pi}{4} + 2\pi k}{6} = \frac{\pi}{24} + \frac{2\pi k}{6} = \frac{\pi}{24} + \frac{\pi k}{3}.$$

$$\begin{aligned}
 k = 0 : \phi_0 &= \frac{\pi}{24} \\
 k = 1 : \phi_1 &= \frac{\pi}{24} + \frac{\pi}{3} = \frac{9\pi}{24} \\
 k = 2 : \phi_2 &= \frac{\pi}{24} + \frac{2\pi}{3} = \frac{17\pi}{24} \\
 k = 3 : \phi_3 &= \frac{\pi}{24} + \pi = \frac{25\pi}{24} \\
 k = 4 : \phi_4 &= \frac{\pi}{24} + \frac{4\pi}{3} = \frac{33\pi}{24} \\
 k = 5 : \phi_5 &= \frac{\pi}{24} + \frac{5\pi}{3} = \frac{41\pi}{24}
 \end{aligned}$$

Det er seks løsninger:

$$z_k = 2^{\frac{1}{12}} \cdot e^{i\phi_k}, \text{ for } k = 0, 1, 2, 3, 4, 5.$$

## Oppgave 2

$$a) \quad \begin{bmatrix} 1 & 0 & 2k & k & 2 \\ 1 & 1 & (2k-1) & 0 & 1 \\ -2 & 0 & -4k & k & 5 \end{bmatrix} \sim R_2 - R_1 \begin{bmatrix} 1 & 0 & 2k & k & 2 \\ 0 & 1 & -1 & -k & -1 \\ -2 & 0 & -4k & k & 5 \end{bmatrix} \sim R_3 + 2R_1 \begin{bmatrix} 1 & 0 & 2k & k & 2 \\ 0 & 1 & -1 & -k & -1 \\ 0 & 0 & 0 & 3k & 9 \end{bmatrix}$$

$$(1) \quad x_1 + 2kx_3 + kx_4 = 2$$

$$(2) \quad x_2 - x_3 - kx_4 = -1$$

$$(3) \quad 3kx_4 = 9$$

$$b) \quad \text{Fra (3)} \quad 3kx_4 = 9$$

Case 1:

$$k \neq 0 \Rightarrow x_4 = \frac{3}{k}$$

Vi setter  $x_4 = \frac{3}{k}$  inn i (2):

$$x_2 = x_3 + k\frac{3}{k} - 1 = x_3 + 2$$

Så vi trenger verdien til  $x_3$  for å beregne  $x_2$ .

Vi setter  $x_4 = \frac{3}{k}$  inn i (1):

$$x_1 + 2kx_3 + k\frac{3}{k} = x_1 + 2kx_3 + 3 = 2$$

$$\Rightarrow x_1 = -1 - 2kx_3$$

For  $x \neq 0$ ,  $x_1$  og  $x_2$  er uttrykt med bruk av den frie variabelen  $x_3$ .

Derfor er det uendelig mange løsninger for alle  $k \neq 0$ .

Case 2:

$$k = 0 \Rightarrow (3) \text{ blir } 0 \cdot x_4 = 9 \Rightarrow 0 = 9.$$

Dette er umulig og vi kan konkludere at det er ingen løsning for  $k = 0$ .

Utifra dette kan vi slå fast at det kan ikke være akkurat en eller akkurat to løsninger i dette tilfelle, enten uendelig mange løsninger (for  $k \neq 0$ ) eller ingen løsning (for  $k = 0$ ).

c)

$$(3) \quad (3)(6)x_4 = 9 \Rightarrow 18x_4 = 9 \Rightarrow x_4 = \frac{1}{2}$$

$$(2) \quad x_2 - x_3 - 6\left(\frac{1}{2}\right) = -1 \Rightarrow x_2 - x_3 - 3 = -1 \Rightarrow x_2 = x_3 + 2$$

$$(1) \quad x_1 + 2(6)x_3 + 6\left(\frac{1}{2}\right) = 2 \Rightarrow x_1 + 12x_3 + 3 = 2 \Rightarrow x_1 = -1 - 12x_3$$

$$\therefore (x_1, x_2, x_3, x_4) = (-1 - 12t, t + 2, t, \frac{1}{2}), t \in \mathbb{R} \quad (\text{Uendelig mange løsninger})$$

### Oppgave 3

$$A = \begin{bmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 1 & 2 & -1 \\ 2 & 3 & 3 \end{bmatrix}, \quad B = \begin{bmatrix} 1 & 1 \\ 1 & -1 \\ -1 & 2 \end{bmatrix}$$

a)  $A + B$  er ikke mulig ettersom matrisene har ulike dimensjoner.

$$3A = \begin{bmatrix} 3 & 3 & 3 \\ 3 & 6 & -3 \\ 6 & 9 & 9 \end{bmatrix}, \quad B^T = \begin{bmatrix} 1 & -1 & 2 \\ 1 & 1 & -1 \end{bmatrix}$$

$3A - B^T$  er ikke mulig ettersom matrisene har ulike dimensjoner.

$$AB = \begin{bmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 1 & 2 & -1 \\ 2 & 3 & 3 \end{bmatrix} \cdot \begin{bmatrix} 1 & 1 \\ 1 & -1 \\ -1 & 2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1*1 + 1*1 + 1(-1) & 1*1 + 1(-1) + 1*2 \\ 1*1 + 2*1 - 1(-1) & 1*1 + 2(-1) - 1*2 \\ 2*1 + 3*1 + 3(-1) & 2*1 + 3(-1) + 3*2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 & 2 \\ 4 & -3 \\ 2 & 5 \end{bmatrix}$$

$BA$  er ikke mulig ettersom dimensjonene på matrisene må være  $m \times p \cdot p \times n$  for å gjennomføre multiplikasjon.

$$B^T A = \begin{bmatrix} 1 & 1 & -1 \\ 1 & -1 & 2 \end{bmatrix} \cdot \begin{bmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 1 & 2 & -1 \\ 2 & 3 & 3 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1(1) + 1(1) - 1(2) & 1(1) + 1(2) - 1(3) & 1(1) + 1(-1) - 1(3) \\ 1(1) - 1(1) + 2(2) & 1(1) - 1(2) + 2(3) & 1(1) - 1(-1) + 2(3) \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 & 0 & -3 \\ 4 & 5 & 8 \end{bmatrix}$$

$$\text{b)} \quad \det(A) = 1 \cdot \begin{vmatrix} 2 & -1 \\ 3 & 3 \end{vmatrix} - 1 \cdot \begin{vmatrix} 1 & -1 \\ 2 & 3 \end{vmatrix} + 1 \cdot \begin{vmatrix} 1 & 2 \\ 2 & 3 \end{vmatrix} = 1 \cdot (6 + 3) - 1(3 + 2) + 1(3 - 4) = 9 - 5 - 1 = 3$$

$$\begin{aligned} \text{c)} \quad & \sim \left[ \begin{array}{ccc|ccc} 1 & 1 & 1 & 1 & 0 & 0 \\ 1 & 2 & -1 & 0 & 1 & 0 \\ 2 & 3 & 3 & 0 & 0 & 1 \end{array} \right] \sim R_2 - R_1 \left[ \begin{array}{ccc|ccc} 1 & 1 & 1 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & -2 & -1 & 1 & 0 \\ 2 & 3 & 3 & 0 & 0 & 1 \end{array} \right] \\ & \sim R_3 - 2R_1 \left[ \begin{array}{ccc|ccc} 1 & 1 & 1 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & -2 & -1 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 1 & -2 & 0 & 1 \end{array} \right] \sim R_3 - R_2 \left[ \begin{array}{ccc|ccc} 1 & 1 & 1 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & -2 & -1 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 3 & -1 & -1 & 1 \end{array} \right] \\ & \sim \frac{1}{3}R_3 \left[ \begin{array}{ccc|ccc} 1 & 1 & 1 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & -2 & -1 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & -\frac{1}{3} & -\frac{1}{3} & \frac{1}{3} \end{array} \right] \sim R_2 + 2R_3 \left[ \begin{array}{ccc|ccc} 1 & 1 & 1 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & -\frac{5}{3} & \frac{1}{3} & \frac{2}{3} \\ 0 & 0 & 1 & -\frac{1}{3} & -\frac{1}{3} & \frac{1}{3} \end{array} \right] \\ & \sim R_1 - R_2 \left[ \begin{array}{ccc|ccc} 1 & 0 & 1 & \frac{8}{3} & -\frac{1}{3} & -\frac{2}{3} \\ 0 & 1 & 0 & -\frac{5}{3} & \frac{1}{3} & \frac{2}{3} \\ 0 & 0 & 1 & -\frac{1}{3} & -\frac{1}{3} & \frac{1}{3} \end{array} \right] \sim R_1 - R_3 \left[ \begin{array}{ccc|ccc} 1 & 0 & 0 & 3 & 0 & -1 \\ 0 & 1 & 0 & -\frac{5}{3} & \frac{1}{3} & \frac{2}{3} \\ 0 & 0 & 1 & -\frac{1}{3} & -\frac{1}{3} & \frac{1}{3} \end{array} \right] \end{aligned}$$

$$A^{-1} = \begin{bmatrix} 3 & 0 & -1 \\ -\frac{5}{3} & \frac{1}{3} & \frac{2}{3} \\ -\frac{1}{3} & -\frac{1}{3} & \frac{1}{3} \end{bmatrix}$$

### Oppgave 3

d)

$$A\vec{x} = \vec{b}$$

$$\vec{b} = \begin{bmatrix} 1 \\ 4 \\ 2 \end{bmatrix}$$

$$\Rightarrow \vec{x} = A^{-1}\vec{b} = \begin{bmatrix} 3 & 0 & -1 \\ -\frac{5}{3} & \frac{1}{3} & \frac{2}{3} \\ -\frac{1}{3} & -\frac{1}{3} & \frac{1}{3} \end{bmatrix} \cdot \begin{bmatrix} 1 \\ 4 \\ 2 \end{bmatrix}$$

$$3(1) + 0(4) - 1(2) = 3 - 2 = 1$$

$$-\frac{5}{3}(1) + \frac{1}{3}(4) + \frac{2}{3}(2) = -\frac{5}{3} + \frac{4}{3} + \frac{4}{3} = 1$$

$$-\frac{1}{3}(1) - \frac{1}{3}(4) + \frac{1}{3}(2) = -\frac{1}{3} - \frac{4}{3} + \frac{2}{3} = -1$$

$$\Rightarrow x_1 = 1, \quad x_2 = 1, \quad x_3 = -1$$

e)

```
from sympy import Matrix

A = Matrix([
    [ 1, 1, 1],
    [ 1, 2, -1],
    [ 2, 3, 3]
])

b = Matrix([
    [1],
    [4],
    [2]
])

x = A.inv() * b

print(f'Løsning: x_1 = {x[0]}, x_2 = {x[1]}, x_3 = {x[2]}')

# Dette gir utputt: "Løsning: x_1 = 1, x_2 = 1, x_3 = -1"
```

### Oppgave 4

$$\vec{u} = \left[ \frac{1}{\sqrt{2}}, \frac{1}{2}, \frac{1}{2} \right], \quad \vec{v} = \left[ -\frac{1}{\sqrt{2}}, \frac{1}{2}, \frac{1}{2} \right], \quad \vec{w} = \left[ -\frac{1}{\sqrt{2}}, 0, \frac{1}{\sqrt{2}} \right]$$

a)

$$|\vec{u}| = \sqrt{(1/\sqrt{2})^2 + (1/2)^2 + (1/2)^2} = \sqrt{1/2 + 1/4 + 1/4} = \sqrt{1} = 1$$

$$|\vec{v}| = \sqrt{(-1/\sqrt{2})^2 + (1/2)^2 + (1/2)^2} = \sqrt{1/2 + 1/4 + 1/4} = \sqrt{1} = 1$$

$$|\vec{w}| = \sqrt{(-1/\sqrt{2})^2 + 0^2 + (1/\sqrt{2})^2} = \sqrt{1/2 + 1/2} = \sqrt{1} = 1$$

## Oppgave 4

b)

$$\vec{u} \cdot \vec{v} = 1/\sqrt{2} \cdot (-1/\sqrt{2}) + 1/2 \cdot 1/2 + 1/2 \cdot 1/2 = -1/2 + 1/4 + 1/4 = 0$$

$$\vec{u} \cdot \vec{v} = |\vec{u}| \cdot |\vec{v}| \cos \theta = 1 \cdot 1 \cdot \cos \theta = \cos \theta = 0$$

$$\cos \theta = 0 \Rightarrow \theta = 90^\circ \quad (\vec{u} \perp \vec{v})$$

$$\vec{u} \cdot \vec{w} = \frac{1}{\sqrt{2}} \cdot \left(\frac{-1}{\sqrt{2}}\right) + \frac{1}{2} \cdot 0 + \frac{1}{2} \cdot \frac{1}{\sqrt{2}} = -\frac{1}{2} + \frac{1}{2\sqrt{2}}$$

$$\Rightarrow \cos \theta = \frac{1}{2\sqrt{2}} - \frac{1}{2}$$

$$\Rightarrow \theta = \cos^{-1}\left(\frac{1}{2\sqrt{2}} - \frac{1}{2}\right) \approx 98,4^\circ$$

c)

$$\vec{u} \times \vec{v} = \begin{bmatrix} i & j & k \\ \frac{1}{\sqrt{2}} & \frac{1}{2} & \frac{1}{2} \\ -\frac{1}{\sqrt{2}} & \frac{1}{2} & \frac{1}{2} \end{bmatrix}$$

$$i: \frac{1}{2} \cdot \frac{1}{2} - \frac{1}{2} \cdot \frac{1}{2} = 0$$

$$j: -\left(\frac{1}{\sqrt{2}} \cdot \frac{1}{2} - \frac{1}{2} \cdot \left(-\frac{1}{\sqrt{2}}\right)\right) = -\frac{1}{\sqrt{2}}$$

$$k: \frac{1}{\sqrt{2}} \cdot \frac{1}{2} - \frac{1}{2} \cdot \left(-\frac{1}{\sqrt{2}}\right) = \frac{1}{\sqrt{2}}$$

$$\vec{u} \times \vec{v} = \left[0, -\frac{1}{\sqrt{2}}, \frac{1}{\sqrt{2}}\right]$$

d)  $\vec{u} \times \vec{v}$  er vinkelrett til både  $\vec{a}$  og  $\vec{b}$ , så vinkelen mellom  $\vec{a}$  og  $\vec{u} \times \vec{v}$  er  $90^\circ$ .

e)

$$\vec{a} \left[ 5\vec{a} + \vec{b} + (\vec{a} \times \vec{b}) \right] = 5(\vec{a} \cdot \vec{a} + \vec{a} \cdot \vec{b} + \vec{a} \cdot (\vec{a} \times \vec{b}))$$

Vi vet at:

$$(i) \vec{a} \cdot \vec{a} = |\vec{a}|^2 = 2^2 = 4$$

$$(ii) \vec{a} \cdot \vec{b} = 0 \text{ (ettersom } \vec{a} \text{ og } \vec{b} \text{ står vinkelrett på hverandre)}$$

$$(iii) \vec{a} \cdot (\vec{a} \times \vec{b}) = 0 \text{ (ettersom kryssproduktet til to vektorer står vinkelrett på begge vektorer)}$$

$$\therefore \vec{a} \left[ 5\vec{a} + \vec{b} + (\vec{a} \times \vec{b}) \right] = 5(4) + 0 + 0 = 20$$

## Oppgave 5

a)

$$50x_1 + 25x_2 + 75x_3 + 100x_4 = 4200$$

$$75x_1 + 100x_2 + 50x_3 + 25x_4 = 3800$$

$$75x_1 + 75x_2 + 75x_3 + 50x_4 = 4400$$

$$50x_1 + 50x_2 + 50x_3 + 75x_4 = 3600$$

$x_1$  er antall produserte Floral Fusion blandinger.

$x_2$  er antall produserte Burgundy Bonanza blandinger.

$x_3$  er antall produserte Morgensol blandinger.

$x_4$  er antall produserte Ahh Svart! blandinger.

b)

$$A = \begin{bmatrix} 50 & 25 & 75 & 100 \\ 75 & 100 & 50 & 25 \\ 75 & 75 & 75 & 50 \\ 50 & 50 & 50 & 75 \end{bmatrix}$$

```
# Utregning av determinant (Python):
```

```
from sympy import Matrix
```

```
A = Matrix([\n    [ 50, 25, 75, 100],\n    [ 75, 100, 50, 25],\n    [ 75, 75, 75, 50],\n    [ 50, 50, 50, 75]\n])
```

```
print(f'det(A) = {A.det()}')
```

```
# Dette gir utputt: "det(A) = 0"
```

Hvis  $A$  har en invers  $A^{-1}$  kan inversen brukes for å løse likningssystemet ( $\vec{b} = A^{-1}\vec{x}$ ), men  $\det(A) = 0$  forteller oss at  $A$  ikke har invers.

c) *# Gauss-Jordan-eliminering for å løse likningssystemet (Python):*

```
from sympy import Matrix
```

```
A = Matrix([\n    [ 50, 25, 75, 100],\n    [ 75, 100, 50, 25],\n    [ 75, 75, 75, 50],\n    [ 50, 50, 50, 75]\n])
```

```
b = Matrix([\n    [4200],\n    [3800],\n    [4400],\n    [3600]\n])
```

```
x, params, free_vars = A.gauss_jordan_solve(b, freevar=True);\nx = [str(row).replace('tau0', 'x_'+str(free_vars[0]+1)) for row in x]\nprint(f'Løsning: (x_1, x_2, x_3, x_4) = ({x[0]}, {x[1]}, {x[2]}, {x[3]})')
```

```
# Dette gir utputt: "Løsning: (x_1, x_2, x_3, x_4) = (56 - 2*x_3, x_3 - 8, x_3, 16)"
```

Ettersom  $x_1, x_2, x_3, x_4$  representerer antall produserte blandinger må verdiene være 0 eller positivt heltall.

Løsningen forteller oss at  $x_3$  er en fri variabel, i tillegg til at  $x_3 \geq 8$  for å hindre at  $x_2$  blir negativ, og  $x_3 \leq 26$  for å hindre at  $x_1$  blir negativ.

Dette gir  $x_1 = 56 - 2t$ ,  $x_2 = t - 8$ ,  $x_3 = t$ ,  $x_4 = 16$ ,  $t \in \{8 \dots 26\}$ .