

Dokumentacja
Zadanie 1.11

Ciesielski Mateusz
Kasztelan Damian
Matyjas Sebastian
Grupa 1

Treść:

Wejście: przedział $[a,b]$, liczba naturalna n , n liczb rzeczywistych y_0, \dots, y_{n-1}

Zadanie:

- Stworzyć siatkę równoległą n elementów
- podać wielomian interpolacyjny w postaci Newtona interpolujący dane wejściowe

$$P(x) = f[x_0] + f[x_0, x_1](x - x_0) + [x_0, x_1, x_2](x - x_0)(x - x_1) \\ + \dots + [x_0, x_1, \dots, x_n](x - x_0) \cdot \dots \cdot (x - x_{n-1})$$

- Wypisać ilorazy różnicowe
- Narysować wielomian interpolacyjny
- zezwolić użytkownikowi na dodanie kolejnego węzła x_n i wartości y_n
- Wyznaczyć metodą Newtona (bez ilorazów różnicowych) wielomian interpolujący dane wejściowe y_0, \dots, y_n
- Narysować obydwa wielomiany na jednym wykresie

Postać Newtona I - jedna z metod przedstawiania wielomianu. Dla wielomianu stopnia n wybiera się $n+1$ punktów x_0, x_1, \dots, x_n i buduje wielomian postaci:

$$w(x) = \sum_{i=0}^n a_i \prod_{j=0}^{i-1} (x - x_j) = a_0 + a_1(x - x_0) + a_2(x - x_1)(x - x_0) + \dots + a_n(x - x_{n-1}) \dots (x - x_1)(x - x_0)$$

Postać Newtona II – jedna z metod przedstawiania wielomianu. Jest to metoda, którą używamy w momencie gdy chcemy dołożyć dodatkowy węzeł x_{n+1} (różne od pozostałych) i wartość y_{n+1}

$$Q(x) = P(x) + b_{n+1}(x - x_0) \cdot \dots \cdot (x - x_{n-1})(x - x_n),$$

gdzie:

$$b_{n+1} = \frac{y_{n+1} - P(x_{n+1})}{\omega_n(x_{n+1})}.$$