



Suivi de l'évolution de l'épidémie de COVID-19 et des besoins hospitaliers au Québec

Samedi, 25 avril 2020

Sommaire

Évolution à court terme de l'épidémie et des besoins hospitaliers

Objectif

Suivre l'évolution de l'épidémie de SARS-CoV-2 pour évaluer les besoin en ressources de soins de santé.

Résumé méthodologique

1^{ère} étape: Un modèle de transmission du COVID-19 a été développé et calibré aux données de vigie épidémiologique pour prédire quotidiennement le nombre de nouvelles hospitalisations.

2^e étape: Les trajectoires d'utilisation des soins sont modélisées afin d'évaluer à court terme les besoins en ressources hospitalières (basé sur les prédictions ci-haut) .

Modèle de transmission de type SEIR


1^{ère} étape: estimer le $R(t)$ et prédire nouvelles admissions

Modèle semi-mécanistique

L'impact des interventions est capturé indirectement à l'aide d'un taux de reproduction $R(t)$ qui varie dans le temps.

Permet

- D'estimer l'impact des interventions passées et de faire des projections.
- D'élaborer des scénarios en variant le $R(t)$.



Taux de reproduction $R(t)$

Le nombre moyen de transmissions secondaires par personne infectée.


Modèle de demande des ressources

2^e étape: prédire les besoins en ressources


**Admissions
passées**
(observations) **et**
futures (du modèle
transmission)

Day	Arrivals
2/27	3
2/2	13
...	...
6/	

**Trajectoires
d'utilisation**



**Estimation de
la demande en
ressources**



Modèle de Markov

les trajectoires d'utilisations
des soins pour les personnes
atteintes de COVID-19
nouvellement admises en
centres hospitaliers.





Permet

- Une estimation de l'utilisation des ressources sur un horizon de 4 semaines.
- D'examiner l'impact de différentes politiques d'utilisation des ressources.

Évolution et besoins (25 avril)

Scénario où le $R(t)$ demeurerait constant

Québec (25 avril 2020)



Interprétation


- Le taux de reproduction semble être légèrement supérieur à la valeur unitaire. On s'attend à ce que le nombre d'admissions augmente légèrement.

Stratification régionale plus fine

1) Montréal et Laval, 2) régions proches de Montréal, 3) autres


RSS 06 et 13

Montréal et Laval (25 avril 2020)







RSS 04, 05, 14, 15 et 16

Régions proches Montréal (25 avril 2020)



RSS 01, 02, 03, 07, 08, 09, 10, 11, 12, 17 et 18

Autres régions (25 avril 2020)



Interprétation

- La transmission dans les région de Montréal et de Laval a diminuée, mais le $R(t)$ pourrait être supérieur à 1.
- Un constat similaire s'applique aux régions proches de Montréal.
- Les autres régions devraient voir leur transmission décroître (mais large incertitude).

Note: Les modèles régionaux sont sensibles à la qualité des données d'hospitalisation.

Avantages et limites

Un outil pour suivre l'épidémie et anticiper les besoins

Limites

- Les séries temporelles sont courtes (incertitude).
- Le modèle reflète principalement la transmission hors CHSLD.
- Les projections de la capacité hospitalière se base sur un un taux de reproduction constant. L'impact de potentielles mesures de déconfinement et/ou de changements comportementaux n'est pas pris en compte.
- Nos résultats dépendent de la qualité des données de vigie épidémiologique et sont sensibles à leur qualité.

Avantages

- Modèle simple requérant peu de données mais assez flexible pour en intégrer de nouvelles.
- Possibilité d'explorer divers scénarios et politiques d'utilisation des ressources ainsi que des projections plus détaillées.
- Résultats mis à jour régulièrement.

Précisions méthodologiques

Équations, paramètres et statistiques


Modèle de transmission du COVID-19

Étape 1

Précisions méthodologiques

Schéma du modèle mathématique

Diagramme du modèle



Note

- Le nombre de cas importés ($Z(t)$) provient du V10.
- Les périodes de latence et d'infectiosité suivent des distributions d'Erlang-2.

Précisions méthodologiques

Principaux paramètres du modèle

Table 1. Liste des paramètres du modèle

Paramètres	Symboles	Valeurs	Références
Taux de transmission	$\beta(t)$	Calibré	Non-applicable
Durée de la période d'incubation	$1 / \varepsilon$	5.2 jours	[1]
Proportion d'infections symptomatiques	κ_s	82%	[2]
Proportion d'infections symptomatiques requérant une hospitalisation (sévère)	κ_h	6.1% / κ_s	[3]*
Durée de la période infectieuse (communauté)	$1/\sigma_c$	5 jours	[4]
Durée de l'hospitalisation	$1/\sigma_d$	18.8 - $1/\sigma_c$ jours	[3]
Proportion des hospitalisations qui vont décéder	μ	1.3% / $(\kappa_s * \kappa_h)$	[3]*
Délai entre l'apparition des symptômes et le dépistage	$1/\pi$	2.5 jours	Prémisse
Proportion des cas symptomatiques qui seront dépistée	$\omega(t)$	60%	Prémisse

*Paramètres standardisées à la distribution d'âge du Québec.

1. Li Q, Guan X, Wu P, Wang X, Zhou L, Tong Y, et al. Early Transmission Dynamics in Wuhan, China, of Novel Coronavirus-Infected Pneumonia. *N Engl J Med* 2020; 382(13):1199-1207.
2. Mizumoto K, Kagaya K, Zarebski A, Chowell G. Estimating the asymptomatic proportion of coronavirus disease 2019 (COVID-19) cases on board the Diamond Princess cruise ship, Yokohama, Japan, 2020. *Euro Surveill* 2020; 25(10).
3. Verity R, Okell LC, Dorigatti I, Winskill P, Whittaker C, Imai N, et al. Estimates of the severity of coronavirus disease 2019: a model-based analysis. *Lancet Infect Dis* 2020.
4. Davies N, Kucharski A, Eggo R, Gimma A, CMMID COVID-19 Working Group, Edmunds W. The effect of non-pharmaceutical interventions on COVID-19 cases, deaths and demand for hospital services in the UK: a modelling study. In: Centre for Mathematical Modelling of Infectious Diseases, LSHTM; 2020.

Calibration aux données

Sources des données

Nombre de cas confirmés

- Ces données ne sont pas utilisées pour le moment en raison des variations importantes des critères d'éligibilité et des efforts de dépistage.

Nombre d'hospitalisations journalier

- Données MED-ECHO.
 - Les transferts provenant des CHSLD ne sont pas pris en compte pour calculer le $R(t)$. Cependant, le modèle de projections des hospitalisations comptabilise les transferts passés.

Nombre de décès par jour

- Ces données ne sont pas utilisées.

Calibration aux données

Cadre Bayésien – fonction de vraisemblance

Fonction de vraisemblance

Le nombre observé de nouvelles hospitalisations ($Hosp_t$) au temps t suit une loi binomial négative :

$$Hosp_t \sim NB \left(H_t, H_t + \frac{H_t^2}{r} \right)$$

où H_t est le nombre d'hospitalisations prédit par le modèle et r est le paramètre de « *sur-dispersion* ». Pour ce dernier, une distribution gamma est utilisée :

$$r \sim \text{Gamma}(10, 0.01)$$

Note

- Le modèle peut facilement être calibré aux autres types de données épidémiologiques. Par exemple, à de futures enquêtes de séroprévalence.

Calibration aux données

Cadre Bayésien – distributions *a priori*

Distributions *a priori*

- Le nombre d'individus infectieux au début de la simulation (28 février 2020) est entre 1 et 30.

$$Z_{t=0} \sim \text{Uniform}(1, 30)$$

- Le paramètre de transmission $R(t)$ au début de l'épidémie correspond à un R_0 de 2.2 (95%CI: 1.2-4.0).

$$\log(\beta_{t=0}) \sim \text{Normal}(\log(2.2/\sigma_c), 0.3)$$

- Les facteurs de réduction de la transmission, s'appliquant sur une période de 7 jours, prennent une valeur entre 0 et 1 :

$$\beta_t = \beta_{t=0} \times \text{impact}_t$$
$$\text{impact}_t \sim \text{Uniform}(0, 1)$$

Calibration aux données

Cadre Bayésien – Inférences statistiques

Procédure d'estimation

- Le modèle est calibré aux données en utilisant des méthodes de *Monte-Carlo par chaînes de Markov*.
- Ces méthodes permettent d'obtenir des échantillons de la distribution postérieure du vecteur de paramètres. L'avantage de l'utilisation de méthodes Bayésiennes est la propagation efficace de l'incertitude aux résultats.
- La librairie *Nimble* de R est utilisé. Des algorithmes adaptatifs de marche aléatoire de type *Metropolis-Hasting* et *Automated Factor Slice Sampling* permettent une bonne convergence des chaînes.

Précisions méthodologiques

Équations, paramètres et statistiques

Modélisation des besoins en ressources hospitalières

Étape 2

Modélisation des trajectoires

Modèle de Markov – indices et états

Indices

- I états de Markov (besoin courant en ressources)
- J états de Markov (besoin en ressources après la transition)
- T jours de la simulation ($t = 1, \dots, T$)

États (niveau des besoins en ressources)

1. Lits en soins actif avant les soins intensifs (SI) (actifs 1)
2. Aux SI
3. Aux SI et ventilé
4. Lits en soins actif avant les SI (actifs 2)
5. Congé hospitalier
6. Décès

Modélisation des trajectoires

Modèle de Markov – intrants, paramètres et indicateurs

Intrants

- $\mathbf{n}^0$, un vecteur avec la distribution initiale de longueur I pour laquelle n^0_l est le nombre d'individus nécessitant l .
- $\mathbf{A}$, une matrice de dimension $I \times T$ qui décrit les nouvelles admissions en centre hospitalier et nécessitant des ressources spécifique (obtenu du modèle de transmission).

Paramètres

- $\mathbf{P}^*$, est une matrice de transition de dimensions $I \times J$ où $p^*_{i,j}$ est la probabilité de transition (par jour) de l'état i à l'état j , conditionnellement à son état actuel (diapo suivante).

Indicateurs

- $\mathbf{N}$, est une matrice $I \times T$ contenant le nombre d'individus nécessitant les ressources de l'état l au jour t .

Précisions méthodologiques

Transitions et précisions

P_{ij}^* - Transitions au au prochain état en fonction de l'état actuel

p_{ij}^*	1 (actifs 1)	2 (SI)	3 (SI + respirateur)	4 (actifs 2)	5 (congé)	6 (décès)
1 (actifs 1)	$p_{1,1}^*$	$p_{1,2}^*$	$p_{1,3}^*$	0	$p_{1,5}^*$	$p_{1,6}^*$
2 (SI)	0	$p_{2,2}^*$	0	$p_{2,4}^*$	$p_{2,5}^*$	$p_{2,6}^*$
3 (SI + respirateur)	0	0	$p_{3,3}^*$	$p_{3,4}^*$	$p_{3,5}^*$	$p_{3,6}^*$
4 (actifs 2)	0	0	0	$p_{4,4}^*$	$p_{4,5}^*$	$p_{4,6}^*$
5 (congé)	0	0	0	0	1	0
6 (décès)	0	0	0	0	0	1

Notes

- Les décès et les congés sont des états "absorbants".
- Les personnes hospitalisées requerront des SI avec ou sans ventilation et ne transitionnent pas entre ces états (les données actuelles ne permettant pas un suivi longitudinal de l'utilisation des respirateurs).
- Les individus ne peuvent pas passer du stade de soins actifs 1 (état 1) au stade de soins actifs 2 (état 4).
- Les probabilités de transition (p_{ij}^*) sont estimées à partir de données hospitalières (MED-ECHO Live).

Collaborateurs

Équipes de modélisation

Université McGill

Mathieu Maheu-Giroux et David Buckeridge

Alexandra Schmidt

Dimitra Panagiotoglou

Nicole Basta

Arnaud Godin

Yiqing Xia

Dirk Douwes-Schultz

Alton Russell

Maxime Lavigne

Yannan Shen

Aman Verma

Collaborateurs à l'Université Laval

Marc Brisson, Guillaume Gingras, Mélanie Drolet

Contexte

Travaux réalisés dans le cadre d'un mandat confié par l'INESSS, avec la collaboration d'une équipe scientifique constituée de scientifiques de l'INESSS et de l'INSPQ.


<https://www.inspq.qc.ca/covid-19/donnees/projections/hospitalisation>

Remerciements

Soutien financier

Université McGill

M[i]⁴ Initiative interdisciplinaire en infection et immunité



M[i]⁴ Interdisciplinary Initiative in
Infection and Immunity



Chaires
de recherche
du Canada

Canada
Research
Chairs

Canada