

Janus 颗粒阵列作为经典罗盘自旋系统的取向有序

Zhijie Fan¹、Myeonggon Park²、Marija Vucelja^{3,4}、Gia-Wei Chern³

¹ 中国科学技术大学 上海量子科学研究中心、中国科学院量子信息与量子科技创新研究院, 上海 201315

² 中国科学技术大学 合肥国家实验室, 合肥 230088

³ 布兰迪斯大学 马丁·A·费希尔物理学院, Waltham, MA 02453, 美国

⁴ 弗吉尼亚大学 物理系, Charlottesville, VA 22904, 美国

⁵ 弗吉尼亚大学 数学系, Charlottesville, VA 22904, 美国

摘要

Janus 颗粒阵列是一块软物质平台：颗粒的取向充当经典自旋，彼此之间带着各向异性、键依赖的相互作用。近期在三角阵列上的实验用金属-介质 Janus 颗粒观察到了六重取向有序，以及直接可数的涡旋与反涡旋 [1]，本文的工作就由这组实验引出，研究的模型超出各向同性的 XY 描述。一个经典的 120° 罗盘模型抓住键方向相互作用的最小成分；一个有效 Kern–Frenkel 模型则更直接地照搬 Janus 表面相互作用的几何。蒙特卡洛模拟显示，两个模型都有低温六重有序相、高温无序相，中间还夹着一段准长程序区间，与两次 Berezinskii–Kosterlitz–Thouless 转变的图像吻合。两种情形下，六重有序都是从连续简并的铁磁流形经热涨落的无序致序机制产生的。我们还说明， 120° 相互作用的高阶展开能够改变取向选择的结果：二次项把涨落诱导的六重各向异性反号，三次项则直接从能量上解除简并，选出的正是实验观测到的那几个沿晶格的方向。这些结果把 Janus 颗粒相互作用的微观各向异性与涌现出来的 XY 型涡旋物理接了起来，也显示出不同的微观机制可以产生十分相近的六重取向有序。

1 引言

胶体系统长期以来都是探索统计物理与凝聚态物理基本问题的实验平台。介观的尺度让单个颗粒能被直接分辨和追踪，结晶、熔化、玻璃化以及缺陷介导的相变这些集体现象因此可以在显微镜下一一看清 [2], [3], [4], [5]。颗粒合成与外场控制这两条线进步之后，这套范式从相互作用近乎各向同性的球形颗粒，扩展到带内部取向自由度的各向异性胶体 [6], [7], [8], [9]。Janus 颗粒的两半具有不同的物理或化学性质，是最灵活的一种实现：相互作用可以强烈依赖颗粒取向，又能通过表面组分、溶剂条件以及外加电场或磁场调节 [6], [7], [8], [10], [11]。特别地，交变电场驱动的金属-介质 Janus 颗粒表现出可调的静电与电流体力学相互作用 [12], [13], [14]。

有意思的区间出现在 Janus 颗粒既排成晶体阵列、又保留着活跃取向自由度的时候 [1], [15], [16]。平移运动一旦被压下去，颗粒取向就成了相关的低能自由度，可以用经典自旋表示。这样就把 Janus 颗粒阵列接到更宽的一类胶体系统上——它们的取向有序可由有效自旋哈密顿量描述 [17], [18], [19], [20]。这类系统把经典自旋模型的统计力学和胶体的实验可达性合到了一起：每个有效自旋都能直接成像，相互作用可由外部控制，拓扑缺陷能逐个颗粒地追踪。电致极化 Janus 颗粒三角阵列的最新实验是一个很突出的例子 [1]。随着相互作用增强，颗粒取向之间发展出强关联，同时出现清晰可见的涡旋与反涡旋图 1。实测的关联函数与缺陷行为带着 Berezinskii–Kosterlitz–Thouless (BKT) 物理的特征，人们自然会拿它去和二维 XY 模型对照 [1]。

然而 Janus 颗粒之间的微观相互作用，与 XY 模型各向同性交换有根本差别。偶极及相关的电磁相互作用把颗粒取向和连接一对颗粒的空间方向耦合起来，于是有效相互作用不只取决于两个“自旋”的相对取向，还取决于它们相对所在晶格键的取向。自旋自由度与空间自由度这样纠缠，正是罗盘型相互作用的定义性特征 [21]。在 Janus 颗粒阵列里，这种键依赖来自颗粒各向异性的电磁响应本身，而不是给一个各向同性自旋模型额外强加的各向异性。关系很近的取向依赖相互作用，也是补片颗粒与 Kern–Frenkel 型 Janus 胶体描述的基础 [9], [10], [16], [22], [23], [24], [25]。

罗盘模型是一大类各向异性自旋哈密顿量，最出名的例子是 120° 模型与 Kitaev 模型 [21], [26], [27]。键依赖相互作用会自然出现在过渡金属化合物轨道自由度的有效描述 [26], [28], [29], [30]、受控轨道系统 [31] 以及自旋-轨道耦合 Mott 绝缘体 [32], [33] 之中。它们的经典对应同样有丰富的统计行为，包括涨落诱导有序与无序致序现象 [29], [30], [34], [35]。

所以说，Janus 颗粒阵列是罗盘模型里键方向相互作用的一块软物质实现——这类相互作用过去主要出现在轨道与磁性体系的固体物理中。与固体体系不同的是，这里的有效自旋能在单颗粒尺度上直接成像，罗盘型自旋系统的畴、涨落和拓扑缺陷都可以在真实空间、真实时间里观察。Janus 阵列由此成为研究经




图1 Janus 颗粒阵列的实验实现与有效自旋表示。(a) 实验装置示意, 标出 Janus 颗粒的金属半球与介质半球, 以及处于交变电场中的二维胶体单层的方位。(b) Janus 颗粒阵列的一个代表区域, 颗粒取向用有效经典自旋 (红色箭头) 表示。比例尺 10 μm 。(c) 某一取向组态的有效自旋表示, 红点标涡旋、蓝点标反涡旋。比例尺 10 μm 。本图转录自文献 [1]。

典罗盘模型统计力学与动力学的实验可达平台。这一视角对最近的 Janus 晶格实验尤其贴切: 颗粒取向虽然定义出有效 XY 自旋, 取向分布却长出与三角晶格绑定的六个优先方向 [1]。自由度是 XY 型的, 底层相互作用却不具备 XY 哈密顿量的连续旋转对称性。

本文用一组层次分明的有效模型研究三角 Janus 颗粒阵列的取向有序, 把微观的键依赖各向异性逐级装进去。先取经典 120° 模型作为这类耦合的最小实现 [21], [26], [29], [30]。120° 模型在轨道物理与罗盘物理里已有相当长的历史, 但据我们所知, 其三角晶格经典实现的有限温度统计力学还没有被系统地研究过。我们发现热无序致序会解除它铁磁基态流形的偶然连续简并, 产生六重取向有序, 并留下一段与两次 BKT 转变相符的中间准长程序区间。接着构造一个有效 Kern–Frenkel 模型, 它更直接地表示 Janus 颗粒之间补片式的相互作用 [16], [22], [23], [24], [25]。微观形式很不一样, 均匀铁磁态却仍然保持能量上的连续简并, 热涨落照旧通过无序致序挑出六个分立取向。

最后我们考察 120° 相互作用的高阶展开, 说明非线性项能定性改变取向选择的机制与结果。二次修正保住基态的连续简并, 但越过某个临界耦合后会把涨落诱导的六重各向异性反号, 从而选出与实验观测一致的沿晶格方向; 三次修正则直接解除简并, 同样从能量上选出这批取向。合起来看, 这些结果说明不同的微观相互作用与解除简并的机制, 如何在三角 Janus 阵列中产生密切相关的六重有序和 XY 型涡旋物理 [1]。

余文安排如下。第 2 节回顾实验中的 Janus 颗粒系统, 讨论其有效取向相互作用的物理来源与对称性。第 3 节引入三角晶格 120° 模型, 给出有限温度下有序行为与拓扑缺陷的蒙特卡洛结果。第 4 节为 Janus 颗粒相互作用建立有效 Kern–Frenkel 模型, 分析其涨落诱导的取向有序与热力学行为。第 5 节考察 120° 相互作用的高阶展开, 比较涨落诱导与能量主导这两种六重取向选择机制。第 6 节是讨论与展望。

2 Janus 颗粒阵列与有效相互作用

本文研究的出发点, 是文献 [1] 中实验考察的二维 Janus 胶体晶体。颗粒是直径 3 μm 的二氧化硅球, 一半表面镀一层薄钛, 从而分出金属侧与介质侧 图 1(a)。颗粒悬浮在水系电解质溶液中, 在重力作用下沉降到形成单层。密度足够高时, 颗粒位置在三角晶格上发展出晶体序, 而单个颗粒仍保留转动自由。于是颗粒中心构成一个近似固定的晶格, 涨落的自由度就只剩取向。

交变电场沿 z 方向垂直加在胶体单层上 图 1(a)。文献 [1] 的实验固定在 100 kHz 的驱动频率上进行, 而感应出的颗粒间相互作用一般是随频率变化的。电场除了诱发颗粒间的相互作用, 还有效地约束了颗粒取向: 颗粒倾向于把分隔金属半球与介质半球的界面摆到沿 z 方向的方位上, 于是该界面的法线落在 xy 平面内。剩下的那个取向自由度, 在很好的近似下由一个有效自旋描述, 它定义为从介质半球指向金属半球, θ_i 从水平 x 轴 (三角晶格的一个基矢方向) 起量, 如图 2 所示:

$$\mathbf{S}_i = (\cos \theta_i, \sin \theta_i) \quad (1)$$

加大外加电场会增强近邻颗粒间的相互作用, 并把取向自由度推向集体有序。实验中看到平滑变化的自旋织构, 其中有绕数为 +1 与 -1 的涡旋和反涡旋 图 1(b),(c)。取向关联、磁化率与涡旋密度都显出 BKT 物理的特征, 可以再拿二维 XY 模型作参照 [1]。把各向同性的近邻 XY 哈密顿量记为

$$\mathcal{H}_{\text{XY}} = J_{\text{XY}} \sum_{\langle ij \rangle} \mathbf{S}_i \cdot \mathbf{S}_j \quad (2)$$




图2 Janus 颗粒取向到有效 XY 自旋的映射，以及键依赖相互作用的由来。沿 z 方向的交变电场把金属/介质半球界面法线约束在 xy 平面内，只剩下一个方位角 θ ，用一个有效自旋 $\mathbf{S}$ 表示，方向由介质半球（灰白）指向金属补片（蓝）。对近邻的一对颗粒：(a) 的反平行构型在能量上不利；(b) 与 (c) 虽然都是平行构型，能量却不等价，因为能量还依赖自旋相对颗粒连线的取向。(c) 这种沿键的构型最有利，这正是第 3 节引入铁磁 120° 相互作用的理由。（原图为三维渲染加二维示意，此处以 CeTZ 重画为统一的二维示意。）

其中的相互作用只取决于近邻自旋的相对取向。按这个符号约定， $J_{XY} < 0$ 就是通常的铁磁 XY 模型。但耦合再强一些，Janus 阵列的取向分布会因三角晶格对称性而长出六个分立的峰。可见取向自由度虽适合用 XY 自旋表示，其微观相互作用却不能只靠式 (2) 的各向同性哈密顿量来描述。

这份额外的各向异性来自金属-介质 Janus 颗粒的极化。在外加电场下，金属半球与介质半球的介电响应不同，感应电荷分布也就不同 [12], [13], [14]。这样产生的相互作用不只取决于近邻颗粒的相对取向，还取决于它们相对连接二者的键的方向。就本文考虑的平面内自由度而言，这种键依赖可以示意性地写成

$$V_{ij} = \nu \mathbf{S}_i \cdot \hat{\mathbf{r}}_{ij}, \mathbf{S}_j \cdot \hat{\mathbf{r}}_{ij} \quad (3)$$

其中 $\hat{\mathbf{r}}_{ij}$ 是键方向单位矢量。这样的键方向项把 Janus 颗粒的有效相互作用同各向同性 XY 模型区分开来，也是下文罗盘型哈密顿量的微观动机。

颗粒取向与键方向之间的这种耦合，是罗盘型相互作用的本质结构 [21]。在三角晶格上，三条对称性等价的近邻键方向天然带出这种键依赖耦合，并最终让取向有序锁定到底层晶格上。金属-介质 Janus 颗粒的细节相互作用还涉及非均匀感应电荷、电解质屏蔽与电流体力学效应，本文不打算从实验参数出发推导微观对势，而是考虑一组互补的有效描述构成的层次：作为三角晶格上罗盘型哈密顿量最小实现的 120° 模型、更直接表示 Janus 颗粒取向依赖表面相互作用的有效 Kern-Frenkel 模型，以及 120° 相互作用的高阶展开——后者用来探索取向选择的不同机制。

3 三角晶格 120° 模型

近邻 Janus 颗粒之间的有效相互作用，可以从交变电场下它们的极化定性理解。金属半球与绝缘半球介电响应不同，极化与电荷分布既不对称又随时间振荡，其中金属侧的响应明显更强 [12], [13], [14]。因此把两个强极化的金属半球凑到近处的构型在能量上不利。图 2(a) 的反平行构型正是被压制的一个，于是有效的取向相互作用整体呈铁磁特征。但相互作用对取向仍强烈敏感。图 2(b) 与 (c) 都是平行自旋，(c) 那种沿键的构型把两个金属半球隔得更开，能量更低。

为把键方向成分单独挑出来，考虑最小的纯罗盘双线性相互作用，即 120° 模型，

$$\mathcal{H}_{120^\circ} = -J \sum_{\langle ij \rangle} \mathbf{S}_i \cdot \hat{\mathbf{r}}_{ij} \mathbf{S}_j \cdot \hat{\mathbf{r}}_{ij} \quad (4)$$

其中 $J > 0$ ， $\mathbf{S}_i$ 是式 (1) 定义的有效 XY 自旋， $\hat{\mathbf{r}}_{ij}$ 是连接格点 i 、 j 的近邻键单位矢量。式 (4) 可以改写为

$$\mathcal{H}_{120^\circ} = -\frac{3NJ}{2} + \frac{J}{2} \sum_{\langle ij \rangle} [(\mathbf{S}_i - \mathbf{S}_j) \cdot \hat{\mathbf{r}}_{ij}]^2 \quad (5)$$




图3 三角晶格 120° 模型在尺寸至 $L = 256$ 时的蒙特卡洛结果。(a) 比热 C 、(b) 磁化率 χ 、(c) 磁化强度平方 M^2 、(d) 关联长度比 ξ/L 随温度的变化。最大两个尺寸曲线的交点给出下、上 BKT 温度的粗略估计， $T_{\text{BKT}}^{\text{lower}} \simeq 0.46$ 、 $T_{\text{BKT}}^{\text{upper}} \simeq 0.63$ 。紫色阴影是估计出的中间准长程序区间，插图中的灰色带标出交点的大致范围。有限尺寸修正——尤其靠近低温那一端转变时——还可能进一步移动转变温度。

这里用到三角晶格上单位 XY 自旋的一个与角度无关的恒等式： $\sum_{\{j \in \text{n.n.}(i)\}} (\mathbf{S}_i \cdot \hat{\mathbf{r}}_{ij})^2 = 2 \sum_{\{\gamma=1\}}^3 (\mathbf{S}_i \cdot \hat{\mathbf{e}}_\gamma)^2 = 3$ 。这一形式把下界 $\mathcal{H} \geq -3N\frac{J}{2}$ 摆到了明处。

孤立的一对颗粒上，沿键方向平行的自旋使相互作用最小。放到三角晶格上，三条对称性等价的近邻键方向可由互成 120° 的三个投影矢量表示，模型由此得名。 120° 模型最初是为过渡金属化合物的轨道有序提出的，包括三角晶格镍酸盐 NaNiO_2 一类 [26]，后来成为罗盘模型的原型 [21], [29], [30]；烧绿石晶格上的受挫轨道系统也出现同类相互作用 [31]。不过它在三角晶格上的经典有限温度统计力学，至今仍少有人研究。

有意思的是，尽管模型显式地带着键各向异性，其铁磁基态流形内部却存在偶然的连续简并。对任一均匀组态 $\mathbf{S}_i = \mathbf{S} = (\cos \Theta, \sin \Theta)$ ，式 (5) 的第二项为零，于是下界 $E_g = -3N\frac{J}{2}$ 被取到，且与共同取向角 Θ 无关。所有均匀极化态因此完全简并，尽管整体 $\text{SO}(2)$ 旋转并不是哈密顿量的对称操作。这种偶然简并正是涨落诱导有序的天然舞台 [21], [26], [29], [30]。

式 (4) 的纯 120° 模型应当看成更一般相互作用里的最小键方向成分。双线性层面上，对称性允许的近邻哈密顿量可以同时含式 (2) 的各向同性 XY 相互作用与式 (4) 的罗盘项。事实上，附录 A 用一个简单的多极描述说明：Janus 颗粒在交变场下感应极化会同时生成这两项——一个反铁磁的各向同性交换 ($J_{\text{XY}} > 0$) 和一个更强的铁磁 120° 罗盘相互作用，外加更高阶的键依赖项。本节取 $J_{\text{XY}} = 0$ ，只研究纯罗盘模型，好把键方向各向异性及其无序致序物理单独隔离出来。

下面用经典蒙特卡洛模拟研究式 (4) 的有限温度行为，格点为 $L \times L$ 的三角晶格、施加周期边界条件。自旋按顺序用标准局域 Metropolis 算法更新：每次试探移动把单个自旋随机转动一个角度，再辅以全局的整体自旋旋转。单自旋试探转动的幅度在热化阶段调整，使接受率保持在 50% 左右。系统尺寸最大到 $L = 256$ ，温度范围 $T = 0.05$ 到 1.00 ，并在转变区附近加密温度点。热化之后每 20 个蒙特卡洛步 (sweep) 测量一次，每个温度、每个尺寸累计约 $2 \times 10^5 - 2 \times 10^6$ 个生产测量值。统计误差用分箱法与刀切法估计。

图 3 用比热、磁化强度、磁化率与关联长度汇总磁态随温度的演化。比热

$$C = \frac{\langle E^2 \rangle - \langle E \rangle^2}{NT^2} \quad (6)$$

在 $\frac{T}{J} \sim 0.7$ 附近有一个宽峰，说明降温过程中磁关联在迅速建立，而不是出现了尖锐的热力学转变。这一交叉行为伴随明显的有限尺寸效应。特别是磁化强度平方

$$M^2 = \left| \frac{1}{N \sum_i \mathbf{S}_i} \right|^2 \quad (7)$$

在高温下随尺寸增大而迅速下降，正是只有短程关联的无序相该有的样子；温度足够低时， M^2 随 L 增大趋于非零值，与铁磁长程序的发展相符。对应的磁化率

$$\chi = \frac{N}{T} \langle M^2 \rangle - \langle |M| \rangle^2 \quad (8)$$

在中间那段温度区间被显著抬高，同样指示磁涨落很大。

中间这一区间的性质，从二阶矩关联长度比 $\frac{\xi}{L}$ 看得更清楚。我们计算

$$\xi = \frac{1}{2 \sin(\frac{k_{\min}}{2})} \sqrt{\frac{\langle M^2 \rangle}{\langle M^2(k_{\min}) \rangle} - 1} \quad (9)$$

其中 $M^2(\mathbf{k}) = \left| \frac{1}{N \sum_i \mathbf{S}_i e^{-i\mathbf{k} \cdot \mathbf{r}_i}} \right|^2$ [36], [37]。该估计对两个对称等价的非零最小波矢 $\mathbf{k}_{\min} = (0, 4\frac{\pi}{\sqrt{3}L})$ 与 $(2\frac{\pi}{L}, -2\frac{\pi}{\sqrt{3}L})$ 取平均。 $\frac{\xi}{L}$ 的曲线并没有像孤立连续转变那样交于一点，而是在一段相当宽的温度区间里彼此重合。再配上 M^2 持续存在的尺寸依赖，这一行为与“中间相是具有准磁长程序的临界相”的判断一致 [38], [39], [40], [41], [42]。

这套相结构正是二维六态 clock 模型、更一般地说带六重各向异性的 XY 模型两次 BKT 转变场景的典型特征 [43], [44], [45], [46], [47], [48]。在中间临界相里，六重各向异性是无关算符，自旋关联按代数衰减，

$$\langle \mathbf{S}(0) \cdot \mathbf{S}(\mathbf{r}) \rangle \sim r^{-\eta(T)} \quad (10)$$

指数 $\eta(T)$ 连续变化。上端 BKT 转变通过涡旋-反涡旋对解绑把临界相与高温无序相分开；下端转变则是六重各向异性变成相关算符、系统被锁进六个对称等价有序态之一的时刻 [45]。两个转变处的反常指数分别是 $\eta = \frac{1}{4}$ （上端）与 $\eta = \frac{1}{9}$ （下端）。两阶段 BKT 有序在其他带有效六重序参量的受挫自旋系统中也出现过 [49]。

蒙特卡洛数据的有限尺寸行为与这一图像相符。临界相内 $M^2 \sim L^{-\eta(T)}$ ，因此当 η 取到正确的值时 $M^2 L^\eta$ 应几乎不依赖尺寸。代入预期的 $\eta = \frac{1}{4}$ 与 $\frac{1}{9}$ 做粗略的有限尺寸估计，得 $\frac{T_{\text{BKT}}^{\text{upper}}}{J} \simeq 0.63$ 、 $\frac{T_{\text{BKT}}^{\text{lower}}}{J} \simeq 0.46$ 。标度修正——尤其下端 BKT 转变附近——还可能把热力学极限的值再挪一挪。 $\frac{\xi}{L}$ 的行为也指出同一段中间区间：不同 L 的曲线在两个转变温度之间彼此靠拢。模拟因此支持这样一幅图景：高温无序相、中间带准长程序的 BKT 相、低温破缺六重取向对称性的铁磁相。

微观自旋组态提供另一幅互补的图像。图 4(a) 是 $T = 0.01J$ 时蒙特卡洛弛豫过程中的一个代表组态。尽管 120° 模型显式带键依赖相互作用，有效 XY 自旋织构里的涡旋与反涡旋仍然清楚可辨。这一低温下缺陷主要以束缚的涡旋-反涡旋对形式存在，与上端 BKT 转变之下自由涡旋被压制相符。不过这张快照取自弛豫过程而非平衡系综，其中残存的涡旋-反涡旋对只能当作模型所支持之拓扑缺陷的示意，不能用作涡旋统计的平衡测量。

六重取向偏好在图 4(b) 的角度分布 $P(\theta)$ 里看得见。这里 θ_i 是单个自旋的角度， $\mathbf{S}_i = (\cos \theta_i, \sin \theta_i)$ ，从三角晶格的一条主对称轴起量。分布是把各格点、各采样组态的局域自旋角度合并得到的，在 $\theta = \frac{\pi}{6} + n\frac{\pi}{3}$ ($n = 0, \dots, 5$) 处出现六个峰。均匀经典基态里所有自旋共享同一角度 Θ ，能量与 Θ 无关，所以这六个取向的偏好正符合热无序致序：热涨落解除了偶然的连续简并。有意思的是，对应的量子轨道 120° 模型里，量子涨落选出的却是另外六个态，取向为 $\Theta = n\frac{\pi}{3}$ [26]。热与量子两种无序致序，于是在同一个经典简并流形里挑出两组互相交错、相差 $\frac{\pi}{6}$ 的取向。

4 有效 Kern-Frenkel 模型

120° 模型给出键依赖相互作用的双线性最小描述，但 Janus 颗粒之间的相互作用未必适合用二次型表示。另一条路来自 Kern-Frenkel (KF) 框架，它最初是为带局域表面补片的颗粒提出的 [22]，此后被广泛用于描述补片颗粒与 Janus 颗粒的自组装和相行为 [10], [16], [23], [24], [25]。KF 型相互作用的标志，是显式依赖表面补片相对两颗粒连线的取向，恰好适合这里的各向异性相互作用。

我们为 Janus 颗粒金属半球的排斥作用构造一个有效 KF 型相互作用。既然颗粒取向被限制在 xy 平面内，金属半球的朝向就能用式 (1) 引入的同一个有效自旋 $\mathbf{S}_i$ 表示。对近邻的一对 i, j ，颗粒 i 的金属区是否正对着颗粒 j ，取决于 $\mathbf{S}_i$ 在键方向 $\hat{\mathbf{r}}_{ij}$ 上的投影。引入角函数

$$f(x; \theta_0) = \begin{cases} 1 & x > \cos \theta_0 \\ 0 & \text{其他} \end{cases} \quad (11)$$

其中 θ_0 给出金属补片的角范围。本文取 $\cos \theta_0 = 0.01$ ，即 θ_0 略小于 $\frac{\pi}{2}$ ，对应一个近似半球形的金属补片。因子 $f(\mathbf{S}_i \cdot \hat{\mathbf{r}}_{ij}; \theta_0)$ 与 $f(\mathbf{S}_j \cdot \hat{\mathbf{r}}_{ji}; \theta_0)$ 就是两颗粒的金属区彼此正对所应满足的角度条件。




图4 三角晶格 120° 模型在 $L = 24$ 、 $T = 0.05J$ 下的低温组态与角分布。(a) 弛豫过程中残存涡旋-反涡旋对的代表自旋组态，红点标涡旋、蓝点标反涡旋。快照用来说明缺陷的拓扑特征，不是平衡涡旋统计的测量。(b) 单个自旋角度分布 $P(\theta)$ ，由 10^4 次独立初始化的运行在平衡后对所有格点累加得到。分布在 $\theta = \frac{\pi}{6} + n\frac{\pi}{3}$ 、 $n = 0, \dots, 5$ 附近有六个优先取向，虚线标出。

要把排斥作用的取向依赖纳入这套补片构造，考虑有效哈密顿量

$$\mathcal{H}_{\text{KF}} = J \sum_{\{\langle ij \rangle\}} f(\mathbf{S}_i \cdot \hat{\mathbf{r}}_{ij}; \theta_0) f(\mathbf{S}_j \cdot \hat{\mathbf{r}}_{ji}; \theta_0) \mathbf{S}_i \cdot \hat{\mathbf{r}}_{ij} \mathbf{S}_j \cdot \hat{\mathbf{r}}_{ji} \quad (12)$$

其中 $J > 0$ 。两个 f 因子负责几何补片条件，键投影则让排斥强度连续依赖颗粒取向。补片条件没有同时满足时，相互作用为零。可见式 (12) 只保留两颗粒金属区彼此相对时的那部分排斥作用，可以理解成针对本文 Janus 阵列取向自由度改造过的 KF 型有效相互作用。

在 $\cos \theta_0 = 0.01$ 的取值下，KF 模型呈现一个重要却略显意外的简并。考虑空间均匀的铁磁组态，所有 i 都有 $\mathbf{S}_i = \mathbf{S}$ 。任一条键上，两个补片条件要求同时满足

$$\mathbf{S} \cdot \hat{\mathbf{r}}_{ij} > \cos \theta_0, \quad -\mathbf{S} \cdot \hat{\mathbf{r}}_{ji} > \cos \theta_0 \quad (13)$$

由于 $\cos \theta_0 > 0$ ，这两个不等式不可能同时成立；于是在完全铁磁的组态里，金属补片永远碰不到一起，每条键对相互作用能的贡献都是零。所有均匀铁磁态精确简并，与自旋的整体取向无关。

低温下观察到的六重取向选择，因此只能来自围绕这条连续简并铁磁流形的热涨落。偏离完全平行可以把相邻的金属补片送进彼此接触，把排斥相互作用激活起来，而这类涨落可用的谱又取决于有序态相对三角晶格的整体取向。热涨落于是从熵上解除简并，选出一组分立取向。尽管微观相互作用与双线性的 120° 模型很不一样，有效 KF 模型照样给出热无序致序的一个独立实现。

我们用与 120° 模型相同的 Metropolis 蒙特卡洛方法研究式 (12)。热化之后每 20 个蒙特卡洛步测量一次： $L = 16$ 时每个温度累计约 5×10^5 个测量值，更大尺寸至少 4×10^6 个。独立运行按方差倒数加权合并，统计误差用分箱法与刀切法估计。图 5 给出 $L = 16, 32, 64, 128, 256$ 下的比热 C 、磁化率 χ 、磁化强度平方 M^2 与关联长度比 ξ/L 。微观形式差别如此之大，热力学行为却与 120° 模型十分相近：高温相是无序




图5 有效 Kern-Frenkel 模型在尺寸至 $L = 256$ 时的蒙特卡罗结果。(a) 比热 C 、(b) 磁化率 χ 、(c) 磁化强度平方 M^2 、(d) 关联长度比 ξ/L 随温度的变化。(c) 左下与右上插图分别画 $L^{1/4} M^2$ 与 $L^{1/9} M^2$ ，标度分析与 120° 模型相同。最大两个尺寸曲线的交点给出下、上 BKT 温度的粗略估计， $\frac{T_{\text{BKT}}^{\text{lower}}}{J} \simeq 0.009$ 、 $\frac{T_{\text{BKT}}^{\text{upper}}}{J} \simeq 0.02$ 。紫色阴影是估计出的中间准长程序区间，插图中的灰色带标出交点的大致范围。

的，低温下 M^2 的行为与铁磁长程序一致；夹在中间的是 M^2 明显的尺寸依赖与 ξ/L 在一段宽温度区间上的近似重合，指向准长程序。

这一行为与“XY 系统受一个涌现的六重各向异性扰动”的两 BKT 转变场景相符。如第 3 节所述，六重扰动允许两次 BKT 转变，中间夹一段关联代数衰减的临界相 [45], [46], [47], [48]。上端转变对应涡旋-反涡旋解绑、准长程序丧失；下端转变标志着涨落生成的六重各向异性变成相关算符，真正的长程序随之出现。图 5 中的阴影区间就是由 M^2 与 ξ/L 的有限尺寸行为推出的中间 BKT 区间，两个 BKT 温度约为 $\frac{T_{\text{BKT}}^{\text{lower}}}{J} \simeq 0.02$ 与 $\frac{T_{\text{BKT}}^{\text{upper}}}{J} \simeq 0.009$ 。可见 120° 模型与 KF 模型虽然微观相互作用很不相同，都拥有连续简并的均匀铁磁态流形，简并都被热涨落解除，因而给出密切相关的两阶段有序行为。

微观组态则显出两个模型之间一个重要差别。KF 模型里，近邻自旋只有当涨落把它们的金属补片送进相互重叠时才发生作用，取向相互作用因此是高度间歇的：许多局域组态——尤其是严格均匀的铁磁态——对应键的相互作用干脆为零。结果是取向在空间上缓慢变化所付出的能量代价相当小，低温组态明显不如 120° 模型平滑。图 6(a) 的快照里，即使在整体有序的区域内部也有可观的角度起伏，同时仍能清楚辨认涡旋-反涡旋织构。与图 4(a) 一样，这张弛豫快照只用来说明模型支持的涡旋结构，不用来推断平衡涡旋密度或定位 BKT 转变。

与此同时，图 6(b) 的单自旋角分布 $P(\theta)$ 却显出很强的六重结构，峰位于 $\theta = \frac{\pi}{6} + n\frac{\pi}{3}$ ($n = 0, \dots, 5$)，与 120° 模型中热无序致序选出的取向完全一致。这种角度偏好与相当粗糙的局域自旋织构并存：单个组态可以有明显的空间起伏，而对格点与平衡运行累加出来的分布只偏好六个方向。两个模型由此以不同的微观相互作用和不同的有序温度尺度，实现了同一种六重无序致序选择和彼此相近的有限温度 BKT 现象学。

5 高阶相互作用决定的取向选择

双线性 120° 模型代表近邻自旋之间主导的键依赖耦合，但更一般的光滑相互作用可以在同一个对称性允许的键变量上出现更高次幂。附录 A 的推导说明：把 Janus 颗粒在交变场下的两极化描述做多极展开，在局域平行扇区里会进一步生成键变量的二次与三次幂。为考察这类非线性修正怎样影响取向选择，考虑广义哈密顿量

$$\mathcal{H}_{\text{eff}} = - \sum_{\{\langle ij \rangle\}} [J_1 q_{ij} + J_2 q_{ij}^2 + J_3 q_{ij}^3 + \dots] \quad (14)$$

其中

$$q_{ij} = \mathbf{S}_i \cdot \hat{\mathbf{r}}_{ij} \mathbf{S}_j \cdot \hat{\mathbf{r}}_{ij} \quad (15)$$




图 6 有效 Kern-Frenkel 模型在 $L = 24$ 、 $T = 0.01J$ 下的低温组态与角分布。(a) 弛豫过程中带取向织构与残存涡旋-反涡旋对的代表组态，用来说明缺陷结构，不是平衡涡旋统计的测量。与 120° 模型相比，局域自旋织构明显不那么平滑，与 KF 相互作用的补片依赖性相符。(b) 单个自旋角度分布 $P(\theta)$ ，由 10^4 次独立初始化的运行在平衡后累加得到， θ 从三角晶格的一条主对称轴起量。 $\theta = \frac{\pi}{6} + n\frac{\pi}{3}$ 、 $n = 0, \dots, 5$ 处的显著峰说明：涨落诱导选出的，仍是 120° 模型里那六个优先取向。

J_1 项回到原来的 120° 相互作用， J_2 、 J_3 则是用同一个键依赖变量 q_{ij} 构造的主阶非线性推广。这些高阶项保持底层三角晶格的对称性，但对连续简并的铁磁流形的影响在性质上完全不同。

对空间均匀的铁磁态 $\mathbf{S}_i = \mathbf{S} = (\cos \Theta, \sin \Theta)$ ，键变量成为 $q_{ij} = \cos^2(\Theta - \varphi_\gamma)$ ， φ_γ 取三角晶格的三个键方向之一。对三个键方向求和， $\sum_{\{\gamma=1\}}^3 \cos^2(\Theta - \varphi_\gamma) = \frac{3}{2}$ 、 $\sum_{\{\gamma=1\}}^3 \cos^4(\Theta - \varphi_\gamma) = \frac{9}{8}$ ，两者都与 Θ 无关。于是当 $J_3 = 0$ 时，每个格点的能量为

$$\frac{E_{\text{FM}}}{N} = -\frac{3J_1}{2} - \frac{9J_2}{8} \quad (16)$$

铁磁基态的连续角度简并即使在二次 J_2 项存在时仍然精确保持。 J_1 - J_2 模型里任何分立的取向选择，因此只能来自涨落，而不能来自经典基态能量。

J_2 相互作用仍会改变围绕这条简并流形不同成员的涨落谱。附录 B 的简谐展开给出一个依赖取向的涨落自由能，其主要角度依赖可写成

$$F_{\text{fl}}(\Theta) = F_0 + K_6 \left(T, \frac{J_2}{J_1} \right) \cos 6\Theta + \dots \quad (17)$$

纯 J_1 模型有 $K_6 > 0$ ，热无序致序因此偏好 $\cos 6\Theta = -1$ ，对应六个取向

$$\Theta = \frac{\pi}{6} + n\frac{\pi}{3}, \quad n = 0, \dots, 5 \quad (18)$$

简谐计算显示，增大 J_2 会改变这一涨落生成的六重各向异性的符号，变号发生在

$$\frac{J_2}{J_1} \simeq 0.032 \quad (19)$$

之上。超过该值后 $K_6 < 0$ ，热涨落转而偏好

$$\Theta = n\frac{\pi}{3}, \quad n = 0, \dots, 5 \quad (20)$$




图7 高阶 120° 模型在 $L = 24$ 、 $T = 0.05J_1$ 下的取向选择。 $P(\theta)$ 由 10^4 次独立初始化的运行在平衡后对所有格点的单个自旋角度累加而成， θ 从晶格主轴起量。(a) $J_1 = 1$ 、 $J_2 = 0.1$ 、 $J_3 = 0$ 。 J_2 项保持均匀铁磁态的简并，但改变其涨落谱，把热学优先取向移到 $\theta = n\frac{\pi}{3}$ 、 $n = 0, \dots, 5$ ，相对纯 120° 模型错开。(b) $J_1 = 1$ 、 $J_3 = 0.1$ 、 $J_2 = 0$ 。三次项显式解除连续简并，从能量上选出同一批取向。峰明显更锐、峰间概率更低，说明取向锁定更强。

也就是与三角晶格主轴重合的六个方向。于是非线性 J_2 项给出一个少见的例子：高阶项丝毫没有解除经典基态简并，却把热无序致序生成的各向异性反了号。

图7(a)用 $J_1 = 1$ 、 $J_2 = 0.1$ 、 $J_3 = 0$ 、 $T = 0.05J_1$ 演示这一行为。 $\frac{J_2}{J_1} = 0.1$ 远在简谐变号值之上，角分布在 $\Theta = n\frac{\pi}{3}$ 处形成六个极大。这六个方向与纯 120° 模型选出的相差 $\frac{\pi}{6}$ ，而且——值得注意的是——正与实验观测到的沿晶格取向重合 [1]。选择机制仍是纯熵的：所有均匀铁磁组态的经典能量完全相同，只是沿晶格的那些态有更大的涨落熵。

三次项 J_3 的表现则根本不同。利用

$$\sum_{\{\gamma=1\}}^3 \cos^6(\Theta - \varphi_\gamma) = \frac{15}{16} + \frac{3}{32} \cos 6\Theta \quad (21)$$

均匀铁磁态的能量成为

$$\frac{E_{\text{FM}(\Theta)}}{N} = -\frac{3J_1}{2} - \frac{9J_2}{8} - J_3 \frac{15}{16} + \frac{3}{32} \cos 6\Theta \quad (22)$$

$J_3 > 0$ 时，连续简并在零温就被解除，能量在 $\cos 6\Theta = 1$ 处取极小，即 $\Theta = n\frac{\pi}{3}$ 。这时六重各向异性显式写在基态能量里，而不是由热涨落生成。

图7(b)给出 $J_1 = 1$ 、 $J_3 = 0.1$ 、 $J_2 = 0$ 时对应的角分布。虽然选出的仍是 (a) 中 J_1 - J_2 模型的那六个沿晶格取向，峰却尖锐得多，相邻优先方向之间的概率被强烈压低。差别来自取向锁定的来源不同： J_1 - J_2 模型的六重各向异性是熵生的，只存在于涨落自由能里； J_3 项却对不同 Θ 给出有限的能量差，温度越低，不利取向的相对统计权重就被压得越狠。

这些结果说明，优先的六重取向并不是单由三角晶格的对称性决定的。被选中的方向、以及选择所用的机制，都敏感地依赖键依赖相互作用的微观形式。纯 J_1 模型通过热无序致序选出 $\theta = \frac{\pi}{6} + n\frac{\pi}{3}$ ；加上足够强的 J_2 项之后，涨落诱导的各向异性反号，改选 $\theta = n\frac{\pi}{3}$ ，而零温简并一点也没被解除；正的 J_3 项则直接靠基态能量选出同一批沿晶格取向。

高阶模型因此在涨落诱导各向异性与显式能量各向异性之间搭起一座桥，展示两种对称性允许、都能产生沿晶格六重取向有序的机制。实验的 Janus 阵列究竟实现的是哪一种，或者两者都不是，需要相互作用的第一性微观计算才能判定。

6 讨论与展望

我们从金属-介质 Janus 颗粒的键依赖相互作用出发，用各向异性经典自旋模型研究了 Janus 颗粒阵列的取向有序。三角晶格 120° 模型里，热无序致序解除偶然的连续基态简并，选出六个有序态。有效 Kern-Frenkel 模型虽然微观形式很不一样，同样保留连续简并的铁磁流形，并通过热涨落完成六重选择。两个模型的热力学行为相似：低温六重有序相与高温无序相之间，隔着一段与两次 BKT 转变相符的准长程序区间。相应的涡旋-反涡旋激发与实验中观察到的拓扑缺陷直接接上了 [1]。

120° 相互作用的高阶展开进一步揭示出两种不同的取向选择机制。二次项在保住连续基态简并的同时，可以把涨落诱导的六重各向异性反号；三次项则直接解除简并，从能量上选出沿晶格的取向。更宽一点看，这些结果说明不同的微观相互作用如何在保留中间尺度 XY 型行为的前提下，分别产生涨落诱导与能量主导的六重有序。

自然的下一步是给有效相互作用一个更定量、更微观的描述。本文研究的模型是刻意简化的： 120° 模型只留主导的罗盘型键各向异性，有效 Kern-Frenkel 模型用几何方式表示取向依赖的表面相互作用，高阶展开则说明非线性键依赖耦合如何同时改变取向选择的机制与方向。但就实验所用的金属-介质颗粒而言，相互作用最终来自交变电场产生的空间非均匀极化与感应电荷分布。两颗粒相互作用的直接电磁计算——连同它们对颗粒取向、间距、场频以及电解质性质的依赖——将给出一条通向定量导出有效自旋哈密顿量的路。这样的相互作用未必要化成简单的双线性罗盘形式，反而可能天然生成本文探索过的非线性乃至更复杂的键依赖项。Janus 阵列由此不只是一个实现已知经典罗盘模型的平台，也是探索常规磁性材料里难以实现各向异性自旋相互作用的平台。

非平衡动力学是另一个重要方向。单个颗粒的取向能被实时成像，意味着在外场改变之后，可以直接追踪畴的形成、涡旋的运动与湮灭以及弛豫过程。贴近实际的动力学描述应当同时考虑转动布朗运动、依赖外场的颗粒间相互作用，以及可能的电流体力学效应。实验上改变场的幅度就是在改变相互作用能与热能之比，从而直接控制有效耦合强度；快速改变这一控制参数，是研究非平衡有序与缺陷动力学的天然设置。Janus 阵列的初步实验也提示，场强突变之后的弛豫很慢、可能带玻璃化特征，这为系统研究老化、缺陷动力学与非平衡有序提供了动机。

特别地，涡旋与反涡旋能被直接可视化追踪，使 Janus 颗粒阵列成为研究 Kibble-Zurek 机制 (KZM) 的理想平台；KZM 把拓扑缺陷的产生密度同一系统被驱动穿过连续相变的速率联系起来 [50], [51], [52]。二维胶体单层上已经做过 Kibble-Zurek 标度的实验 [4]，说明胶体系统能在真实空间分辨非平衡的成畴与缺陷形成。在本文的系统里，转变的 BKT 特征让涡旋动力学格外要紧；二维 XY 模型的淬火研究表明，涡旋湮灭与转变后的粗化会改动最简形式的 Kibble-Zurek 图像 [53], [54]。

最后，Janus 颗粒阵列还可能提供一个随弛豫动力学变化的 Kibble-Zurek 机制的研究场景。常规 KZM 里，穿过连续相变越快，产生的拓扑缺陷密度一般越高 [50], [51], [52]。把 Janus 阵列的真实空间、真实时间成像同理论建模与模拟结合起来，就有机会研究弛豫动力学与拓扑缺陷形成之间的这种相互影响。

致谢

Z. F. 受量子科学与技术国家科技重大专项（批准号 2021ZD0301900）与国家自然科学基金（批准号 12504265）资助。M. P. 感谢美国国家科学基金会批准号 DMR-2214590 的资助。M. V. 感谢美国国家科学基金会批准号 DMR-1944539 的资助。G. W. C. 部分受美国能源部科学办公室基础能源科学处 DE-SC0026087 资助。

附录 A Janus 颗粒的有效相互作用

这里为正文采用的有效相互作用给出一个简明的微观动机，并说明高阶罗盘项如何从颗粒内部极化响应中心的有限空间分离中产生。

沿 z 轴的交变电场会在 Janus 颗粒的金属半球与介质半球中诱导出不同的复极化响应。为把这一响应中“两半球互换时变号”的部分单独挑出来，用一对沿颗粒面内方向相互错开、方向相反的面外偶极来表示它：

$$\mathbf{R}_{\{i,\pm\}} = \mathbf{R}_i \pm a\mathbf{S}_i, \quad p_{\{i,\pm\}} = \pm p_\omega \hat{z} \quad (23)$$

其中 a 是极化中心的有效位移，复振幅 p_ω 收敛对交变电场的频率依赖响应。这一反对称分量净偶极矩为零，所以其远场主导多极是电四极。

对一个交变周期取平均后，颗粒 i 与 j 之间的相互作用可写成

$$U_{ij} = \mathcal{A}_\omega \sum_{\{s,t=\pm 1\}} stG|\mathbf{r}_{ij} + a(t\mathbf{S}_j - s\mathbf{S}_i)| \quad (24)$$

其中 $\mathbf{r}_{ij} = \mathbf{R}_j - \mathbf{R}_i$, $G(r)$ 是两个面外感应偶极之间的径向相互作用核, $\mathcal{A}_\omega > 0$ 收纳取周期平均后的偶极振幅。线性响应下 $\mathcal{A}_\omega \propto |p_\omega|^2$, 因而随外加电场幅度的平方标度。

在 $\frac{a}{r_{ij}} \ll 1$ 时, 式 (24) 可按位移展开。零阶与一阶贡献对 $s, t = \pm 1$ 求和后彼此抵消, 首个非零项为

$$U_{ij}^2 = -4\mathcal{A}_\omega a^2 (\mathbf{S}_i \cdot \nabla)(\mathbf{S}_j \cdot \nabla)G(r_{ij}) \quad (25)$$

对径向核, 方向导数可分解为

$$(\mathbf{S}_i \cdot \nabla)(\mathbf{S}_j \cdot \nabla)G = \frac{G'}{r} \mathbf{S}_i \cdot \mathbf{S}_j + G'' - \frac{G'}{r} \mathbf{S}_i \cdot \hat{\mathbf{r}}_{ij} \mathbf{S}_j \cdot \hat{\mathbf{r}}_{ij} \quad (26)$$

取作无屏蔽偶极核 $G(r) = r^{-3}$, 得

$$U_{ij}^2 = \frac{12\mathcal{A}_\omega a^2}{r_{ij}^5} [\mathbf{S}_i \cdot \mathbf{S}_j - 5q_{ij}], \quad q_{ij} = \mathbf{S}_i \cdot \hat{\mathbf{r}}_{ij} \mathbf{S}_j \cdot \hat{\mathbf{r}}_{ij} \quad (27)$$

于是主导相互作用同时含一个反铁磁的各向同性交换与一个更强的铁磁罗盘相互作用。在固定的近邻晶格上, 相应的光滑有效哈密顿量自然写成

$$\mathcal{H}_{\text{eff}} = J_{XY} \sum_{\{ij\}} \mathbf{S}_i \cdot \mathbf{S}_j - \sum_{\{ij\}} J_1 q_{ij} + J_2 q_{ij}^2 + J_3 q_{ij}^3 + \dots \quad (28)$$

其中 $J_{XY} > 0$ 、 $J_1 > 0$ 。按式 (27) 的主导阶, $\frac{J_1}{J_{XY}} = 5$ 。各向同性部分虽是反铁磁的, 更强的罗盘项仍使沿键的平行构型在能量上有利。数值比 $\frac{5}{2}$ 不应视作对实验系统的定量预言——屏蔽、两半球极化率不等以及电流体力学效应都会重整化有效耦合。

极化中心之间的有限间距还会生成更高阶的角度依赖, 这一点在局域平行的一对 ($\mathbf{S}_i = \mathbf{S}_j = \mathbf{S}$) 上看得最清楚。此时式 (24) 化为

$$U_{\text{parallel}} = \mathcal{A}_\omega [2G(r) - G(|\mathbf{r} + 2a\mathbf{S}|) - G(|\mathbf{r} - 2a\mathbf{S}|)] \quad (29)$$

记 $q = (\mathbf{S} \cdot \hat{\mathbf{r}})^2$, 展开式中 q 、 q^2 、 q^3 依次出现在 $\frac{a}{r}$ 的二阶、四阶与六阶。取向部分因此可以组织成

$$U_{\text{parallel}} = U_0 - J_1 q - J_2 q^2 - J_3 q^3 + \dots \quad (30)$$

其中 U_0 与取向无关, 每个系数同时也会收到更高阶的修正。

对 $G(r) = r^{-3}$, 把每一幂次的主导贡献配上系数, 得

$$\frac{J_2}{J_1} \simeq \frac{21}{4} \left(2\frac{a}{r}\right)^2, \quad \frac{J_3}{J_1} \simeq \frac{1001}{40} \left(2\frac{a}{r}\right)^4 \quad (31)$$

这些估计说明: 只要把颗粒内部的极化结构分辨出来, 非线性罗盘项就会从光滑的微观相互作用中自然生成。它们同样不是对密排实验阵列的定量预言。离开局域平行扇区后, 微观展开还会生成其他对称性允许的混合项。因此式 (28) 应当理解为一个最小的光滑有效哈密顿量, 只保留各向同性交换与键依赖变量 q_{ij} 的前几个幂次。

附录 B 简谐近似的取向选择

分析 J_1 - J_2 模型的涨落诱导取向选择时, 先取 $J_{XY} = J_3 = 0$, 并围绕均匀铁磁态展开: $\theta_i = \Theta + \delta\theta_i$ 。用 $\mathbf{a}_\gamma$ 记三角晶格的三个独立近邻矢量, 键角 $\varphi_\gamma = 0, \frac{\pi}{3}, 2\frac{\pi}{3}$ 。到二阶,

$$\mathcal{H}^2 = \frac{1}{2} \sum_{\{\mathbf{r}, \gamma\}} B_\gamma(\Theta) [\delta\theta_{\{\mathbf{r}\}} - \delta\theta_{\{\mathbf{r}+\mathbf{a}_\gamma\}}]^2 \quad (32)$$

其中

$$B_\gamma(\Theta) = \sin^2(\Theta - \varphi_\gamma) [J_1 + 4J_2 \cos^2(\Theta - \varphi_\gamma)] \quad (33)$$

于是, 尽管均匀铁磁的经典能量与 Θ 无关, 其涨落的刚度却依赖整体取向。

傅里叶变换后,

$$\lambda_\Theta(\mathbf{k}) = 2 \sum_{\{\gamma=1\}}^3 B_\gamma(\Theta) [1 - \cos(\mathbf{k} \cdot \mathbf{a}_\gamma)] \quad (34)$$

除去均匀的零模, 简谐自由能差为

$$F_{\text{fl}}(\Theta) - F_{\text{fl}(0)} = \frac{T}{2} \sum_{\{k \neq 0\}} \ln \left(\lambda_{\Theta} \frac{k}{\lambda_0}(k) \right) \quad (35)$$

只要比较两组交错六重取向, J_2 的作用就已一目了然: $\Theta = 0$ 时 $(B_1, B_2, B_3) = (0, (\frac{3}{4})(J_1 + J_2), (\frac{3}{4})(J_1 + J_2))$; $\Theta = \frac{\pi}{6}$ 时 $(B_1, B_2, B_3) = ((\frac{1}{4})(J_1 + 3J_2), J_1, (\frac{1}{4})(J_1 + 3J_2))$, 差别只是键方向的置换。对式 (35) 在布里渊区上数值积分, 得到重新取向的位置在

$$\frac{J_2}{J_1} \simeq 0.0323 \quad (36)$$

$\frac{J_2}{J_1}$ 小于该值时, 热无序致序偏好 $\Theta = \frac{\pi}{6} + n\frac{\pi}{3}$; 大于该值时偏好 $\Theta = n\frac{\pi}{3}$ 。二次罗盘项因此在不解除经典均匀铁磁流形连续简并的前提下, 把涨落生成的六重各向异性反了号。严格地说, $T = 0$ 时流形仍然连续; 这里的分立选择指的是平衡态 $T \rightarrow 0^+$ 的 Gibbs 测度。

与主导罗盘项一同生成的各向同性交换本身并不选择绝对自旋方向, 因为它对每个均匀铁磁态贡献同样的能量。对 $J_3 = 0$ 、 $J_2 \geq 0$ 的近邻模型, 能量满足

$$\mathcal{H} - E_{\text{FM}} \geq \frac{J_1 - 4J_{\text{XY}}}{8} \sum_{\{i,j\}} |S_i - S_j|^2 \quad (37)$$

其中 $\frac{E_{\text{FM}}}{N} = 3J_{\text{XY}} - 3\frac{J_1}{2} - 9\frac{J_2}{8}$ 。可见微观估计 $\frac{J_{\text{XY}}}{J_1} = \frac{1}{5}$ 落在连续简并铁磁流形得以保留的区间内。在简谐阶上, 计入 J_{XY} 相当于把 $B_{\gamma}(\Theta)$ 换成 $B_{\gamma}(\Theta) - J_{\text{XY}}$ 。取 $\frac{J_{\text{XY}}}{J_1} = \frac{1}{5}$, $J_2 = 0$ 时选出的仍是 $\Theta = \frac{\pi}{6} + n\frac{\pi}{3}$, $\frac{J_2}{J_1} = 0.1$ 时仍是 $\Theta = n\frac{\pi}{3}$, 只是重新取向的位置移到 $\frac{J_2}{J_1} \simeq 0.0527$ 。正文引用的 0.0323 对应模拟所用的纯罗盘情形 $J_{\text{XY}} = 0$ 。

参考文献

- [1] M. Park 和 S. Granick, 《Spin vortices and antivortices of Janus colloidal crystals》, Physical Review E, 卷 112, 期 065424, 2025, doi: 10.1103/rpqj-wr12.
- [2] C. A. Murray 和 D. H. V. Winkle, 《Experimental observation of two-stage melting in a classical two-dimensional screened Coulomb system》, Physical Review Letters, 卷 58, 页 1200, 1987, doi: 10.1103/PhysRevLett.58.1200.
- [3] Z. Wang, F. Wang, Y. Peng, Z. Zheng, 和 Y. Han, 《Imaging the homogeneous nucleation during the melting of superheated colloidal crystals》, Science, 卷 338, 页 87, 2012, doi: 10.1126/science.1224763.
- [4] S. Deutschländer, P. Dillmann, G. Maret, 和 P. Keim, 《Kibble–Zurek mechanism in colloidal monolayers》, Proceedings of the National Academy of Sciences, 卷 112, 页 6925, 2015, doi: 10.1073/pnas.1500763112.
- [5] A. L. Thorneywork, J. L. Abbott, D. G. A. L. Aarts, 和 R. P. A. Dullens, 《Two-dimensional melting of colloidal hard spheres》, Physical Review Letters, 卷 118, 页 158001, 2017, doi: 10.1103/PhysRevLett.118.158001.
- [6] J. Hu, S. Zhou, Y. Sun, X. Fang, 和 L. Wu, 《Fabrication, properties and applications of Janus particles》, Chemical Society Reviews, 卷 41, 页 4356, 2012, doi: 10.1039/C2CS35032G.
- [7] J. Zhang, E. Luijten, 和 S. Granick, 《Toward design rules of directional janus colloidal assembly》, Annual Review of Physical Chemistry, 卷 66, 页 581, 2015, doi: 10.1146/annurev-physchem-040214-121241.
- [8] J. Zhang, B. A. Grzybowski, 和 S. Granick, 《Janus particle synthesis, assembly, and application》, Langmuir, 卷 33, 页 6964, 2017, doi: 10.1021/acs.langmuir.7b01123.
- [9] E. Bianchi, B. Capone, I. Coluzza, L. Rovigatti, 和 P. D. J. van Oostrum, 《Limiting the valence: advancements and new perspectives on patchy colloids, soft functionalized nanoparticles and biomolecules》, Physical Chemistry Chemical Physics, 卷 19, 页 19847, 2017, doi: 10.1039/C7CP03149A.
- [10] F. Sciortino, A. Giacometti, 和 G. Pastore, 《Phase diagram of Janus particles》, Physical Review Letters, 卷 103, 页 237801, 2009, doi: 10.1103/PhysRevLett.103.237801.
- [11] A. Kumar, B. J. Park, F. Tu, 和 D. Lee, 《Amphiphilic Janus particles at fluid interfaces》, Soft Matter, 卷 9, 页 6604, 2013, doi: 10.1039/C3SM50239B.

- [12] S. Gangwal, O. J. Cayre, M. Z. Bazant, 和 O. D. Velev, 《Induced-charge electrophoresis of metallodielectric particles》, *Physical Review Letters*, 卷 100, 期 058302, 2008, doi: 10.1103/PhysRevLett.100.058302.
- [13] J. Yan, M. Han, J. Zhang, C. Xu, E. Luijten, 和 S. Granick, 《Reconfiguring active particles by electrostatic imbalance》, *Nature Materials*, 卷 15, 页 1095, 2016, doi: 10.1038/nmat4696.
- [14] D. Nishiguchi, J. Iwasawa, H.-R. Jiang, 和 M. Sano, 《Flagellar dynamics of chains of active janus particles fueled by an AC electric field》, *New Journal of Physics*, 卷 20, 期 015002, 2018, doi: 10.1088/1367-2630/aa9f81.
- [15] S. Jiang, J. Yan, J. K. Whitmer, S. M. Anthony, E. Luijten, 和 S. Granick, 《Orientationally glassy crystals of Janus spheres》, *Physical Review Letters*, 卷 112, 页 218301, 2014, doi: 10.1103/PhysRevLett.112.218301.
- [16] Z. Preisler, T. Vissers, F. Smalenburg, 和 F. Sciortino, 《Crystals of Janus colloids at various interaction ranges》, *The Journal of Chemical Physics*, 卷 145, 期 064513, 2016, doi: 10.1063/1.4960423.
- [17] A. S rlah, E. Frey, 和 T. Franosch, 《Spin models for orientational ordering of colloidal molecular crystals》, *Physical Review E*, 卷 75, 期 021402, 2007, doi: 10.1103/PhysRevE.75.021402.
- [18] Y. Han, Y. Shokef, A. M. Alsayed, P. Yunker, T. C. Lubensky, 和 A. G. Yodh, 《Geometric frustration in buckled colloidal monolayers》, *Nature*, 卷 456, 页 898, 2008, doi: 10.1038/nature07595.
- [19] A. Ortiz-Ambriz 和 P. Tierno, 《Engineering of frustration in colloidal artificial ices realized on microfeatured grooved lattices》, *Nature Communications*, 卷 7, 页 10575, 2016, doi: 10.1038/ncomms10575.
- [20] A. Lib l 等, 《Ice rule fragility via topological charge transfer in artificial colloidal ice》, *Nature Communications*, 卷 9, 页 4146, 2018, doi: 10.1038/s41467-018-06631-1.
- [21] Z. Nussinov 和 J. van den Brink, 《Compass models: Theory and physical motivations》, *Reviews of Modern Physics*, 卷 87, 页 1, 2015, doi: 10.1103/RevModPhys.87.1.
- [22] N. Kern 和 D. Frenkel, 《Fluid-fluid coexistence in colloidal systems with short-ranged strongly directional attraction》, *The Journal of Chemical Physics*, 卷 118, 页 9882, 2003, doi: 10.1063/1.1572461.
- [23] F. Sciortino, A. Giacometti, 和 G. Pastore, 《A numerical study of one-patch colloidal particles: From square-well to Janus》, *Physical Chemistry Chemical Physics*, 卷 12, 页 11869, 2010, doi: 10.1039/C0CP00504E.
- [24] A. Giacometti, C. G gelein, F. Lado, F. Sciortino, S. Ferrari, 和 G. Pastore, 《From square-well to Janus: Improved algorithm for integral equation theory and comparison with thermodynamic perturbation theory within the Kern-Frenkel model》, *The Journal of Chemical Physics*, 卷 140, 期 094104, 2014, doi: 10.1063/1.4866899.
- [25] Z. Preisler, T. Vissers, G. Muna , F. Smalenburg, 和 F. Sciortino, 《Equilibrium phases of one-patch colloids with short-range attractions》, *Soft Matter*, 卷 10, 页 5121, 2014, doi: 10.1039/C4SM00505H.
- [26] M. V. Mostovoy 和 D. I. Khomskii, 《Orbital ordering in frustrated Jahn–Teller systems with 90  exchange》, *Physical Review Letters*, 卷 89, 页 227203, 2002, doi: 10.1103/PhysRevLett.89.227203.
- [27] A. Kitaev, 《Anyons in an exactly solved model and beyond》, *Annals of Physics*, 卷 321, 页 2, 2006, doi: 10.1016/j.aop.2005.10.005.
- [28] H. F. Pen, J. van den Brink, D. I. Khomskii, 和 G. A. Sawatzky, 《Orbital ordering in a two-dimensional triangular lattice》, *Physical Review Letters*, 卷 78, 页 1323, 1997, doi: 10.1103/PhysRevLett.78.1323.
- [29] Z. Nussinov, M. Biskup, L. Chayes, 和 J. van den Brink, 《Orbital order in classical models of transition-metal compounds》, *Europhysics Letters*, 卷 67, 页 990, 2004, doi: 10.1209/epl/i2004-10134-5.

- [30] M. Biskup, L. Chayes, 和 Z. Nussinov, 《Orbital ordering in transition-metal compounds: I. The 120° model》, Communications in Mathematical Physics, 卷 255, 页 253, 2005, doi: 10.1007/s00220-004-1272-7.
- [31] G.-W. Chern, N. Perkins, 和 Z. Hao, 《Quantum 120° model on pyrochlore lattice: Orbital ordering in MnV_2O_4 》, Physical Review B, 卷 81, 页 125127, 2010, doi: 10.1103/PhysRevB.81.125127.
- [32] G. Jackeli 和 G. Khaliullin, 《Mott insulators in the strong spin-orbit coupling limit: From Heisenberg to a quantum compass and Kitaev models》, Physical Review Letters, 卷 102, 期 017205, 2009, doi: 10.1103/PhysRevLett.102.017205.
- [33] J. Chaloupka, G. Jackeli, 和 G. Khaliullin, 《Kitaev–Heisenberg model on a honeycomb lattice: Possible exotic phases in iridium oxides A_2IrO_3 》, Physical Review Letters, 卷 105, 期 027204, 2010, doi: 10.1103/PhysRevLett.105.027204.
- [34] A. Mishra, M. Ma, F.-C. Zhang, S. Guertler, L.-H. Tang, 和 S. Wan, 《Directional ordering of fluctuations in a two-dimensional compass model》, Physical Review Letters, 卷 93, 页 207201, 2004, doi: 10.1103/PhysRevLett.93.207201.
- [35] S. Wenzel 和 W. Janke, 《Monte Carlo simulations of the directional-ordering transition in the two-dimensional classical and quantum compass model》, Physical Review B, 卷 78, 期 064402, 2008, doi: 10.1103/PhysRevB.78.064402.
- [36] S. Caracciolo, R. G. Edwards, A. Pelissetto, 和 A. D. Sokal, 《Wolff-type embedding algorithms for general nonlinear σ -models》, Nucl. Phys. B, 卷 403, 页 475, 1993, doi: 10.1016/0550-3213(93)90044-P.
- [37] R. G. Edwards 和 A. D. Sokal, 《Dynamic critical behavior of Wolff's collective-mode Monte Carlo algorithm for the two-dimensional $O(n)$ nonlinear sigma model》, Phys. Rev. D, 卷 40, 页 1374, 1989, doi: 10.1103/physrevd.40.1374.
- [38] D. X. Viet 和 H. Kawamura, 《Monte Carlo studies of chiral and spin ordering of the three-dimensional Heisenberg spin glass》, Phys. Rev. B, 卷 80, 期 064418, 2009, doi: 10.1103/PhysRevB.80.064418.
- [39] C. Ding, W. Guo, 和 Y. Deng, 《Reentrance of Berezinskii-Kosterlitz-Thouless-like transitions in a three-state Potts antiferromagnetic thin film》, Phys. Rev. B, 卷 90, 页 134420, 2014, doi: 10.1103/PhysRevB.90.134420.
- [40] L. M. Tuan, T. T. Long, D. X. Nui, P. T. Minh, N. D. T. Kien, 和 D. X. Viet, 《Binder ratio in the two-dimensional q -state clock model》, Phys. Rev. E, 卷 106, 期 034138, 2022, doi: 10.1103/PhysRevE.106.034138.
- [41] D. Yao, T. Xiao, C. Zhang, Y. Deng, 和 Z. Fan, 《Nonclassical regime of the two-dimensional long-range XY model: A comprehensive Monte Carlo study》, Phys. Rev. B, 卷 112, 页 144429, 2025, doi: 10.1103/yghs-p5mg.
- [42] T. Xiao, D. Yao, C. Zhang, Z. Fan, 和 Y. Deng, 《Two-dimensional XY ferromagnet induced by long-range interaction》, Chin. Phys. Lett., 卷 42, 期 070002, 2025, doi: 10.1088/0256-307X/42/7/070002.
- [43] J. M. Kosterlitz 和 D. J. Thouless, 《Ordering, metastability and phase transitions in two-dimensional systems》, J. Phys. C: Solid State Phys., 卷 6, 页 1181, 1973, doi: 10.1088/0022-3719/6/7/010.
- [44] J. M. Kosterlitz, 《The critical properties of the two-dimensional XY model》, J. Phys. C: Solid State Phys., 卷 7, 页 1046, 1974, doi: 10.1088/0022-3719/7/6/005.
- [45] J. V. José, L. P. Kadanoff, S. Kirkpatrick, 和 D. R. Nelson, 《Renormalization, vortices, and symmetry-breaking perturbations in the two-dimensional planar model》, Phys. Rev. B, 卷 16, 页 1217, 1977, doi: 10.1103/PhysRevB.16.1217.
- [46] J. Tobochnik, 《Properties of the q -state clock model for $q=4, 5$, and 6 》, Phys. Rev. B, 卷 26, 页 6201, 1982, doi: 10.1103/PhysRevB.26.6201.
- [47] M. S. S. Challa 和 D. P. Landau, 《Critical behavior of the six-state clock model in two dimensions》, Phys. Rev. B, 卷 33, 页 437, 1986, doi: 10.1103/PhysRevB.33.437.
- [48] Y. Tomita 和 Y. Okabe, 《Probability-changing cluster algorithm for two-dimensional XY and clock models》, Phys. Rev. B, 卷 65, 页 184405, 2002, doi: 10.1103/PhysRevB.65.184405.

- [49] G.-W. Chern 和 O. Tchernyshyov, 《Magnetic charge and ordering in kagome spin ice》, *Philos. Trans. R. Soc. A*, 卷 370, 页 5718, 2012, doi: 10.1098/rsta.2011.0388.
- [50] T. W. B. Kibble, 《Topology of cosmic domains and strings》, *J. Phys. A: Math. Gen.*, 卷 9, 页 1387, 1976, doi: 10.1088/0305-4470/9/8/029.
- [51] W. H. Zurek, 《Cosmological experiments in superfluid helium?》, *Nature*, 卷 317, 页 505, 1985, doi: 10.1038/317505a0.
- [52] A. del Campo 和 W. H. Zurek, 《Universality of phase transition dynamics: Topological defects from symmetry breaking》, *Int. J. Mod. Phys. A*, 卷 29, 页 1430018, 2014, doi: 10.1142/S0217751X1430018X.
- [53] G. Biroli, L. F. Cugliandolo, 和 A. Sicilia, 《Kibble-Zurek mechanism and infinitely slow annealing through critical points》, *Phys. Rev. E*, 卷 81, 页 050101(R), 2010, doi: 10.1103/PhysRevE.81.050101.
- [54] A. Jelic 和 L. F. Cugliandolo, 《Quench dynamics of the 2d XY model》, *J. Stat. Mech.*, 卷 2011, 页 P02032, 2011, doi: 10.1088/1742-5468/2011/02/P02032.