

超出确定因果序的量子信道 Stein 定理

Quantum Channel Stein Theorem beyond Definite Causal Order

Chengkai Zhu Xin Wang

C. Zhu: QudeLeap Research, 中国上海 200030。

X. Wang: 香港科技大学 (广州) 信息枢纽人工智能主题, 中国广州 511453 (通讯作者)。

2026 年 9 月

摘要 可区分性是信息论的核心概念, 可自然推广到量子体系。本文证明: 对任意两个有限维无记忆量子信道, 在任意固定的第一类错误容限 $\varepsilon \in (0, 1)$ 下, 并行、自适应与一般检验策略都达到同一个 Stein 指数, 即正则化信道相对熵。只要该速率有限, 任何更大的第二类指数都会使正确接受原假设的概率指数衰减, 自适应因此不带来渐近优势。关键一步是证明正则化夹逼 Rényi 信道散度在阶 1 处的连续性。我们还给出一般检验器的精确强逆指数。

1 引言

要判别两个量子信道, 实验者可把探针系统送入若干次信道使用, 再对输出的量子态加以判别。并行策略将多次信道使用同时作用于一个联合探针: 重复一个固定区块得到相互独立的输出态对, 可直接套用态的 Stein 引理 [1], [2]。对区块取最优, 即得以正则化的参考辅助信道相对熵 $D^\infty(\mathcal{N} \parallel \mathcal{M})$ 给出的可达速率 [3], [4]。当第二类指数受约束时, Fawzi 与 Fawzi 刻画了并行与自适应策略下正确接受原假设概率的衰减指数, 见 [5] 定理 5.5。其公式用到阶大于 1 的正则化夹逼 Rényi 散度, 故其为正阈值为 $\inf_{p>1} \tilde{D}_p^\infty(\mathcal{N} \parallel \mathcal{M})$ 。这一阈值是否等于 $D^\infty(\mathcal{N} \parallel \mathcal{M})$, 正是 [5] 注 5.3 与注 5.6 提出的端点问题。相关工作把强逆命题、平滑与连续性联系在一起, 并研究了无量子存储的信道判别 [6]。有限次自适应并行化 [7] 与后选择判别下的等价性 [8] 针对的是另一类操作比较任务, 后者的错误概率以得出确定性结果为条件。更早基于摊销散度的界已对经典-量子信道建立了强形式 Stein 引理 [9]。

除并行与顺序策略外, 不定因果序允许把信道使用嵌入一个不含预定因果序的高阶过程, 并能在有限次最小错误信道判别中带来严格优势 [10], [11]。但这一层级结构并不能决定非对称误差指数。非对称检验要求以至少 $1 - \varepsilon$ 的概率接受原假设信道 $\mathcal{N}$, 同时最小化信道为 $\mathcal{M}$ 时的接受概率。已有的并行与自适应结果也未覆盖没有确定因果序的超过程。由此引出一个基本问题:

不定因果序能否改善非对称信道判别中的误差指数?

本文证明, 对任意有限维信道对, 并行、自适应与一般检验器具有相同的定误差 Stein 速率 $D^\infty(\mathcal{N} \parallel \mathcal{M})$ (定理 2.4)。只要该速率有限, 在任何更大的第二类指数下, 正确接受原假设的概率都指数衰减。证明把检验器归一化损失与 Rényi 端点问题分开处理。

第一步, 把加权二元检验得分表示为最小的归一化正 Choi 松弛量。固定边缘的 de Finetti 归约 (见 [12] 推论 1.1) 仅付出多项式量级的损失, 就把这一松弛量化为独立同分布信道 Choi 算符的混合。将由此得到的序不等式与一般检验器缩并, 即得逆命题所用的加权得分界 (第 4 节)。多项式因子不影响指数速率。附录 A 给出了把一般检验显式转化为并行检验的构造。

第二步, 证明正则化夹逼 Rényi 信道散度在阶 1 处的连续性 (定理 5.1)。一个初等的支撑逆分解把同一个正松弛量提升为对一切输入都成立的单一幅值逼近; 随后一次张量矩估计即可控制任意纠缠的探针。把两种代价的逼近合并到三个幅值上, 端点随之闭合。检验归约与这一端点恒等式一起给出主定理。

借助 Stein 定理, 我们进一步展开两点结果。其一, 锐化定阶检验界, 并将其与 [5] 定理 5.5 的并行可达性结合, 得到一般检验器的精确强逆指数 (第 6 节)。其二, 同一正松弛量视角给出检验与平滑在有限拷贝下的联系。相关背景包括有限码长量子任务的平滑熵框架 [13]、这一框架与假设检验的联系 [14], 以及 [15] 中修改后的态对偶。并行检验器恰与对全体信道 Choi 算符的平滑对偶; 一般检验器则与乘积信道 Choi 算符仿射包的正部对偶 (定理 3.1)。这些集合、凸乘积混合以及相同张量幂的混合, 在固定预算下都有同一渐近极限 $D^\infty(\mathcal{N} \parallel \mathcal{M})$ (推论 5.4)。有限拷贝恒等式来自 SDP 对偶; 渐近等分性则用端点定理把正松弛量压至指数小。

2 信道判别

全文涉及的体系都是有限维的, 对数一律取自然对数。用 $\mathcal{L}(A)$ 与 $\mathcal{D}(A)$ 分别表示 A 上的算符全体与态全体, 记 $d_A = \dim A$ 。信道指完全正、迹保持 (CPTP) 映射。对 Hermite 算符 X , X_+ 表示它的正部, $\|X\|_\infty$ 表示算符范数; 纯态写作 $\psi = |\psi\rangle\langle\psi|$ 。Choi 算符采用非归一化约定

$$J_{AB}^C = (\text{id}_A \otimes \mathcal{C})(|\Gamma\rangle\langle\Gamma|), \quad |\Gamma\rangle = \sum_{i=1}^{d_A} |i\rangle_A |i\rangle_{A'}, \quad \text{Tr}_B J^C = \mathbb{1}_A \quad (2.1)$$

其中 $A' \simeq A$, 转置一律相对于这组取定的基。除非显式写出时序上的槽位顺序, 张量因子都按 $A^n B^n$ 分组排列。

对态, 假设检验的相对熵定义为

$$D_H^{\varepsilon(\rho\|\sigma)} = -\log \inf_{0 \leq \Lambda \leq 1, \text{Tr}[(1-\Lambda)\rho] \leq \varepsilon} \text{Tr}(\Lambda\sigma), \quad 0 \leq \varepsilon < 1 \quad (2.2)$$

一个 n 槽二元检验器是 $A^n B^n$ 上的一对正算符 T_1, T_2 : 结果 1 接受 $\mathcal{N}$, 结果 2 接受 $\mathcal{M}$ 。按式 (2.1) 的非归一化 Choi 约定, 两个错误概率分别是

$$\text{Tr}[T_2(J^{\mathcal{N}})^{\otimes n}] \quad (\text{第一类}), \quad \text{Tr}[T_1(J^{\mathcal{M}})^{\otimes n}] \quad (\text{第二类}). \quad (2.3)$$

$T_1 + T_2$ 容许的归一化方式决定了策略类别 [16]。下面给出显式定义。

定义 2.1。 对 $0 \leq \varepsilon < 1$, 令

$$\begin{aligned} \beta_\varepsilon^{\text{par}(\mathcal{N}^{\otimes n}, \mathcal{M}^{\otimes n})} &= \inf \text{Tr}[T_1(J^{\mathcal{M}})^{\otimes n}] \\ \text{s.t. } T_1, T_2 &\geq 0, \quad \text{Tr}[T_2(J^{\mathcal{N}})^{\otimes n}] \leq \varepsilon, \\ T_1 + T_2 &= \sigma_{A^n} \otimes \mathbb{1}_{B^n}, \quad \sigma_{A^n} \geq 0, \quad \text{Tr} \sigma_{A^n} = 1. \end{aligned} \quad (2.4)$$

态 σ 称为检验器的归一化因子, 它的转置就是信道输入的边际算符。事实上, 探针 $(\sqrt{\sigma} \otimes \mathbb{1}) |\Gamma\rangle^{\otimes n}$ 就实现了这一约定。

定义 2.2。 对 $0 \leq \varepsilon < 1$, 令

$$\begin{aligned} \beta_\varepsilon^{\text{ada}(\mathcal{N}^{\otimes n}, \mathcal{M}^{\otimes n})} &= \inf \text{Tr}[T_1(J^{\mathcal{M}})^{\otimes n}] \\ \text{s.t. } T_1, T_2 &\geq 0, \quad \text{Tr}[T_2(J^{\mathcal{N}})^{\otimes n}] \leq \varepsilon, \\ T_1 + T_2 &= R^{(n)} \otimes \mathbb{1}_{B_n}, \quad R^{(k)} \geq 0 \quad (1 \leq k \leq n), \\ \text{Tr}_{A_k} R^{(k)} &= R^{(k-1)} \otimes \mathbb{1}_{B_{k-1}} \quad (2 \leq k \leq n), \\ \text{Tr} R^{(1)} &= 1. \end{aligned} \quad (2.5)$$

槽位按从 1 到 n 的顺序使用, 中间的归一化因子作用于 $R^{(k)} \in \mathcal{L}(A_1 B_1 \dots A_{k-1} B_{k-1} A_k)$ 。这些正是确定性检验器 (余梳) 约束 [17]; 分组张量序 $A^n B^n$ 与时序之间只差一个固定的置换。它们刻画的是顺序实验: 中间可以插入任意信道, 并保留量子存储。 $n = 1$ 时退化为并行约束。

定义 2.3。 对 $0 \leq \varepsilon < 1$, 令

$$\begin{aligned} \beta_\varepsilon^{\text{gen}(\mathcal{N}^{\otimes n}, \mathcal{M}^{\otimes n})} &= \inf \text{Tr}[T_1(J^{\mathcal{M}})^{\otimes n}] \\ \text{s.t. } T_1, T_2 &\geq 0, \quad \text{Tr}[T_2(J^{\mathcal{N}})^{\otimes n}] \leq \varepsilon, \\ \text{Tr}[(T_1 + T_2)(J_1^C \otimes \dots \otimes J_n^C)] &= 1 \\ \text{对每一组 CPTP 映射 } C_1, \dots, C_n &: A \rightarrow B. \end{aligned} \quad (2.6)$$

这就是正的过程-检验器模型, 它允许不定因果序。归一化施加在任意局域信道的乘积上, 而不是施加在从 A^n 到 B^n 的任意联合信道上。我们在这一整个数学类别上作优化, 并不要求每个可行的检验器都有某种特定的线路实现。因此逆命题对它所含的任何物理可实现的子类同样成立。

对 $S \in \{\text{par}, \text{ada}, \text{gen}\}$, 定义假设检验的信道相对熵

$$D_H^{\varepsilon, S}(\mathcal{N}^{\otimes n} \parallel \mathcal{M}^{\otimes n}) = -\log \beta_\varepsilon^S(\mathcal{N}^{\otimes n}, \mathcal{M}^{\otimes n}), \quad (2.7)$$

其中 $-\log 0 = +\infty$ 。每个归一化因子在两个假设下的总概率都是 1, 所以第一类错误的约束等价于以至少 $1 - \varepsilon$ 的概率接受原假设。

检验器类的包含关系。 式 (2.4) 中的并行归一化因子满足式 (2.5) 的自适应约束, 只要取

$$\Xi^{(k)} = \text{Tr}_{A_{k+1} \dots A_n} \sigma_{A^n} \otimes \mathbb{1}_{B_1 \dots B_{k-1}}$$

这一构造允许 σ_{A^n} 纠缠。对自适应归一化因子, 先用 $\text{Tr}_{B_n} J_n^C = \mathbb{1}_{A_n}$ 缩并最后一个 Choi 算符, 再套用式 (2.5) 中的递推; 反复缩并后只剩 $\text{Tr} \Xi^{(1)} = 1$ 。于是每个自适应检验器都满足式 (2.6), 这就证明了 $\text{par} \subseteq \text{ada} \subseteq \text{gen}$ 。

一般检验器集合是紧的。在每个槽位插入完全去极化信道即得 $\text{Tr}(T_1 + T_2) = d_B^n$, 两个正效应因此都有界; 而归一化条件又是闭的线性约束。由式 (2.4) 可知并行检验器集合同样紧, 所以它们在固定误差下的最小值都能取到。证明中把确定性归一化因子记作 $W = T_1 + T_2$ 。检验器 (T_1, T_2) 的接受对 (a, b) , 是插入信道分别为 $\mathcal{N}$ 与 $\mathcal{M}$ 时它接受原假设 $\mathcal{N}$ 的两个概率:

$$a = \text{Tr}[T_1 (J^{\mathcal{N}})^{\otimes n}], \quad b = \text{Tr}[T_1 (J^{\mathcal{M}})^{\otimes n}]. \quad (2.8)$$

于是 $1 - a$ 是第一类错误, b 是第二类错误。

可达速率。 反复使用一个固定的区块探针, 就把信道判别化成了态判别, 其速率就是两个输出态的相对熵。对满足 $\text{supp } \rho \subseteq \text{supp } \sigma$ 的态, 定义

$$D(\rho \parallel \sigma) = \text{Tr}[\rho(\log \rho - \log \sigma)], \quad (2.9)$$

其余情形取 $+\infty$ 。对探针优化这一速率, 就得到参考辅助的信道散度。记 $\mathbb{D} = D$, 令

$$\mathbb{D}(\mathcal{N} \parallel \mathcal{M}) = \sup_{\psi_{RA} \text{ 纯态}, R \simeq A} \mathbb{D}((\text{id}_R \otimes \mathcal{N})(\psi) \parallel (\text{id}_R \otimes \mathcal{M})(\psi)). \quad (2.10)$$

纯化、Schmidt 压缩与数据处理不等式说明这一参考维度已经足够。乘积输入加上态相对熵的可加性, 使区块序列具有超可加性, 于是 Fekete 引理给出

$$\mathbb{D}^\infty(\mathcal{N} \parallel \mathcal{M}) = \lim_{k \rightarrow \infty} \frac{1}{k} \mathbb{D}(\mathcal{N}^{\otimes k} \parallel \mathcal{M}^{\otimes k}) = \sup_{k \geq 1} \frac{1}{k} \mathbb{D}(\mathcal{N}^{\otimes k} \parallel \mathcal{M}^{\otimes k}). \quad (2.11)$$

特别地, 沿任一固定区块长度的整数倍取极限, 所得的极限相同。对正算符, 最大相对熵为 $D_{\max}(\rho \parallel \sigma) = \log \inf \{c \geq 0 : \rho \leq c\sigma\}$, 不存在有限的 c 时取 $+\infty$ 。它的信道版本是

$$D_{\max}(\mathcal{N} \parallel \mathcal{M}) = D_{\max}(J^{\mathcal{N}} \parallel J^{\mathcal{M}}) = \log \inf \{c \geq 0 : J^{\mathcal{N}} \leq cJ^{\mathcal{M}}\}. \quad (2.12)$$

它有限当且仅当 $\text{supp } J^{\mathcal{N}} \subseteq \text{supp } J^{\mathcal{M}}$ 。Choi 序与完全正序等价, 所以这一数值对一切输入和参考系统都给出输出的最大相对熵的上界。最大纠缠探针即可取到它, 因为相应的输出是 $J^{\mathcal{N}}/d_A$ 与 $J^{\mathcal{M}}/d_A$ 。它与信道最大相对熵的参考辅助输出定义也一致。

定理 2.4. 信道 Stein 定理与指数强逆命题。对任意有限维 CPTP 映射对 $\mathcal{N}, \mathcal{M} : A \rightarrow B$ 、任意固定的第一类错误容限 $\varepsilon \in (0, 1)$ 以及任意 $S \in \{\text{par}, \text{ada}, \text{gen}\}$,

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{n} D_H^{\varepsilon, S}(\mathcal{N}^{\otimes n} \parallel \mathcal{M}^{\otimes n}) = D^\infty(\mathcal{N} \parallel \mathcal{M}). \quad (2.13)$$

速率为无穷时等式依然成立。若速率有限, 则对每个 $r > D^\infty(\mathcal{N} \parallel \mathcal{M})$, 都存在只依赖于信道与 r 的 $c > 0$ 和 n_0 , 使一切满足 $b \leq e^{-nr}$ 的一般检验器在 $n \geq n_0$ 时都有 $a \leq e^{-cn}$ 。

一般情形下必须要求 $\varepsilon > 0$ 。例如, 对两个输出是不同的满秩交换态 ρ 与 σ 的重置信道, 零第一类错误意味着在 $\rho^{\otimes n}$ 的整个支撑上都要接受, 于是尽管 $D(\rho \parallel \sigma) > 0$, 仍有 $D_H^{0, \text{par}} = 0$ 。

该定理既给出最佳的定误差速率, 也刻画超过该速率后的行为: 一旦要求更大的第二类指数, 正确接受原信道的概率就必然指数衰减, 即使允许一般的超过程也不例外。我们先证明并行可达性, 并在第 4 节把一般逆命题归约成一个标量检验界; 第 5 节确定该界的阈值, 并完成整个证明。

3 精确的单时对策

本节找出与每种检验器归一化相对偶的平滑集合。这一节独立于渐近逆命题: 所得的对偶稍后给出平滑 AEP 中的下界。本节统一使用 Choi 缩写 $N_n = (J^{\mathcal{N}})^{\otimes n}$ 与 $M_n = (J^{\mathcal{M}})^{\otimes n}$ 。

令

$$\mathcal{P}_n = \{J_1^C \otimes \dots \otimes J_n^C : \mathcal{C}_1, \dots, \mathcal{C}_n : A \rightarrow B \text{ CPTP}\}.$$

考虑下面几类 Choi 算符集合:

$$\begin{aligned} \mathcal{K}_{\text{all}, n} &= \{Q \geq 0 : \text{Tr}_{B^n} Q = \mathbb{1}_{A^n}\}, \\ \mathcal{K}_{\text{aff}, n} &= \text{aff}_{\mathbb{R}}(\mathcal{P}_n) \cap \{Q : Q \geq 0\}, \\ \mathcal{K}_{\text{prod}, n} &= \text{conv}(\mathcal{P}_n), \\ \mathcal{K}_{\text{iid}, n} &= \text{conv} \{(J^{\mathcal{C}})^{\otimes n} : \mathcal{C} : A \rightarrow B \text{ CPTP}\}. \end{aligned} \quad (3.1)$$

这里 $\text{aff}_{\mathbb{R}}$ 表示实仿射包。这些集合都是非空的凸紧集，并且满足

$$\mathcal{K}_{\text{iid},n} \subseteq \mathcal{K}_{\text{prod},n} \subseteq \mathcal{K}_{\text{aff},n} \subseteq \mathcal{K}_{\text{all},n}. \quad (3.2)$$

事实上，式 (3.1) 中每个仿射组合的偏迹都是 $\mathbb{1}_{A^n}$ ，其中的正元素因此落在紧集 $\mathcal{K}_{\text{all},n}$ 内，而有限维空间中的仿射包是闭集。另外两个集合是有限维空间中紧集的凸包，因而也是紧的。仿射约束只是线性归一化约束，并不强加槽位之间的可分性。IID 集合由相同张量幂的混合构成，混合本身未必是乘积算符。

对 $\bullet \in \{\text{all}, \text{aff}, \text{prod}, \text{iid}\}$ 与 $0 \leq \delta < 1$ ，定义修正平滑最大相对熵

$$\tilde{D}_{\text{max},\bullet}^{\delta}(\mathcal{N}^{\otimes n} \parallel \mathcal{M}^{\otimes n}) = \log \inf \{ \lambda \geq 0 : N_n \leq \lambda M_n + \delta Q, \quad Q \in \mathcal{K}_{\bullet,n} \}, \quad (3.3)$$

若不存在可行的有限 λ ，取值规定为 $+\infty$ 。预算 δ 乘在指定集合内的一个归一化 Choi 算符上，因此度量的是一个可加的正修正。该定义既不要求存在接近的 CPTP 逼近，也不对分别平滑后的输出态施加距离约束。这一约定推广了 [15] 在态情形对偶中所用的修正平滑。

两边取迹即知每个可行的 λ 都满足 $\lambda \geq 1 - \delta$ 。在 Choi 支撑包含条件下，直接控制还给出

$$1 - \delta \leq \exp [\tilde{D}_{\text{max},\bullet}^{\delta}(\mathcal{N}^{\otimes n} \parallel \mathcal{M}^{\otimes n})] \leq e^{n D_{\text{max}}(\mathcal{N} \parallel \mathcal{M})}. \quad (3.4)$$

于是下确界可以取到：把 λ 限制在这一紧区间内，并利用 Choi 集合的紧性即可。特别地，该熵可以为负。由集合的包含关系，在相同的参数与预算下，

$$\tilde{D}_{\text{max},\text{all}}^{\delta} \leq \tilde{D}_{\text{max},\text{aff}}^{\delta} \leq \tilde{D}_{\text{max},\text{prod}}^{\delta} \leq \tilde{D}_{\text{max},\text{iid}}^{\delta}. \quad (3.5)$$

与态的情形类似，假设检验相对熵与修正平滑最大相对熵之间有如下对偶。

定理 3.1. 精确的单时态对偶。设有限维 CPTP 映射 $\mathcal{N}, \mathcal{M} : A \rightarrow B$ 满足 $\text{supp } J^{\mathcal{N}} \subseteq \text{supp } J^{\mathcal{M}}$ 。对每个 $n \geq 1$ 与 $q \in (0, 1)$,

$$D_H^{1-q,\text{par}}(\mathcal{N}^{\otimes n} \parallel \mathcal{M}^{\otimes n}) = \inf_{0 \leq \delta < q} \{ \tilde{D}_{\text{max},\text{all}}^{\delta}(\mathcal{N}^{\otimes n} \parallel \mathcal{M}^{\otimes n}) - \log(q - \delta) \}, \quad (3.6)$$

$$D_H^{1-q,\text{gen}}(\mathcal{N}^{\otimes n} \parallel \mathcal{M}^{\otimes n}) = \inf_{0 \leq \delta < q} \{ \tilde{D}_{\text{max},\text{aff}}^{\delta}(\mathcal{N}^{\otimes n} \parallel \mathcal{M}^{\otimes n}) - \log(q - \delta) \}. \quad (3.7)$$

这里 q 是所要求的原假设接受概率， δ 是平滑预算。

证明。 在本证明中记 $\beta_n^S(q) = \beta_{1-q}^S(\mathcal{N}^{\otimes n}, \mathcal{M}^{\otimes n})$ 。对并行检验器， $\sigma \geq 0$ 由 $T_1 + T_2 = \sigma \otimes \mathbb{1} \geq 0$ 自动成立，无须另行施加。把 σ 视作 Hermite 算符，式 (2.4) 的 SDP 对偶为

$$\beta_n^{\text{par}}(q) = \sup_{u \geq 0, Z \geq 0, v \in \mathbb{R}, u N_n \leq M_n + Z, \text{Tr}_{B^n} Z = v \mathbb{1}_{A^n}} (uq - v). \quad (3.8)$$

具体地，对原假设成功约束取乘子 $u \geq 0$ ，对 $T_1 + T_2 = \sigma \otimes \mathbb{1}$ 取 $Z = Z^\dagger$ ，对 $\text{Tr } \sigma = 1$ 取 v 。对 $T_1, T_2 \geq 0$ 作最小化，给出 $M_n + Z - u N_n \geq 0$ 与 $Z \geq 0$ ；对 Hermite 的 σ 作最小化，给出偏迹等式。当 $q < \xi < 1$ 时，点 $\sigma = \mathbb{1}/d_A^n$ 、 $T_1 = \xi \mathbb{1}/d_A^n$ 、 $T_2 = (1 - \xi) \mathbb{1}/d_A^n$ 严格可行，故强对偶成立。正性迫使 $v \geq 0$ ：若 $v > 0$ ，则 $Z = vQ$ 且 $Q \in \mathcal{K}_{\text{all},n}$ ；若 $v = 0$ ，则 $Z = 0$ 。无须为次归一化的松弛量作任何补全。

对一般检验器，令 Δ 为完全去极化信道，记 $P_0 = (J^\Delta)^{\otimes n}$ ，并设

$$\mathcal{V}_n = \text{span}_{\mathbb{R}} \{ P - P_0 : P \in \mathcal{P}_n \}.$$

取 $\mathcal{V}_n$ 的一组 Hermite 实基 $F_1, \dots, F_m$ 。记 $W = T_1 + T_2$ ，一般归一化等价于 $\text{Tr}(WP_0) = 1$ 且对一切 j 有 $\text{Tr}(WF_j) = 0$ 。这些等式的 Lagrange 乘子给出 $Z = vP_0 + \sum_j z_j F_j$ 。于是对正的 T_1, T_2 作最小化，给出

$$\beta_n^{\text{gen}}(q) = \sup_{u \geq 0, Z \geq 0, v \in \mathbb{R}, u N_n \leq M_n + Z, Z \in vP_0 + \mathcal{V}_n} (uq - v). \quad (3.9)$$

同样这组严格正的 T_1, T_2 满足全部一般归一化等式，故强对偶再次成立。每个 F_j 在 B^n 上的偏迹为零，于是 $\text{Tr}_{B^n} Z = v \mathbb{1}$ ，从而 $v \geq 0$ 。若 $v > 0$ ，则

$$Z/v \in (P_0 + \mathcal{V}_n) \cap \{Q : Q \geq 0\} = \mathcal{K}_{\text{aff},n}.$$

若 $v = 0$ ，则 $Z = 0$ ，该集合中任一元素都表示零项。这样无须假设凸乘积分解，就认出了仿射对偶集合。两种情形最终都化为

$$\beta_n^S(q) = \sup_{u, v \geq 0, Q \in \mathcal{K}_{\bullet,n}, u N_n \leq M_n + vQ} (uq - v),$$

其中 $(S, \bullet) = (\text{par}, \text{all})$ 或 $(S, \bullet) = (\text{gen}, \text{aff})$ 。Choi 控制给出

$$\beta_n^S(q) \geq q e^{-n D_{\text{max}}(\mathcal{N} \parallel \mathcal{M})} > 0.$$

于是目标值非正的候选皆可丢弃。剩下的每个候选都有 $u > 0$ ，而可逆变换

$$\lambda = 1/u, \quad \delta = v/u$$

给出 $\lambda > 0$, $0 \leq \delta < q$ 与 $N_n \leq \lambda M_n + \delta Q$, 目标值为 $(q - \delta)/\lambda$. 反过来, 每个这样的可行平滑候选经逆替换都给出一个对偶候选. 对每个 δ 关于 λ 作优化并取负对数, 两个等式即得证. 端点 $\delta = 0$ 始终包含在内; 全程没有对零取倒数或取对数.

□

4 从检验得分到正的 Choi 界

平行可达性. 定理 2.4 的下界部分只需要并行实验. 固定区块长度 k 以及 $\mathcal{N}^{\otimes k}$ 与 $\mathcal{M}^{\otimes k}$ 的一个纯参考辅助探针, 把它重复 $\lfloor n/k \rfloor$ 次并忽略剩余的槽位, 所得输出对彼此独立. 态的 Stein 引理 [2] 在任意固定的 $\varepsilon \in (0, 1)$ 下都能达到每个区块的相对熵. 由于 $\lfloor n/k \rfloor/n \rightarrow 1/k$, 先对探针优化、再对 k 优化, 并用 $\text{par} \subseteq \text{ada} \subseteq \text{gen}$, 即得

$$\liminf_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{n} D_H^{\varepsilon, S}(\mathcal{N}^{\otimes n} \parallel \mathcal{M}^{\otimes n}) \geq D^\infty(\mathcal{N} \parallel \mathcal{M}), \quad S \in \{\text{par}, \text{ada}, \text{gen}\}, \quad \varepsilon \in (0, 1). \quad (4.1)$$

若 Choi 支撑包含不成立, 取 $\rho = J^\mathcal{N}/d_A$, $\sigma = J^\mathcal{M}/d_A$, 并让 P_0 为到 $\ker \sigma$ 上的投影, 则 $q_0 = \text{Tr}(P_0 \rho) > 0$. 使用相互独立的最大纠缠探针, 只要至少一个输出产生 P_0 就接受原假设, 此时 $b = 0$ 且 $a = 1 - (1 - q_0)^n \rightarrow 1$. 于是对每个固定的 $\varepsilon > 0$, 可达速率都是 $+\infty$. 单拷贝 Choi 探针同时给出 $D(\mathcal{N} \parallel \mathcal{M}) = +\infty$, 速率无穷的情形就此了结.

面向逆命题的加权得分. 要证上界, 必须控制这样的权衡: 当备择假设下的接受概率 b 指数地小, 原假设下的接受概率 a 也不太大. 给定惩罚 $\lambda > 0$, 得分 $a - \lambda b$ 正刻画了这一权衡. 我们先从并行检验入手, 它的归一化有简洁的 SDP 描述; 把并行检验的最优得分记作

$$\Delta_n(\lambda) := \max_{\text{并行检验器}} (a - \lambda b).$$

目标是把这个并行量迁移到一般检验器. 我们将证明每个一般检验器都满足

$$a \leq \lambda b + g_n \Delta_n(\lambda), \quad \log g_n = O(\log n),$$

其中显式因子 g_n 稍后给出. 其用处在于: 当 $b \leq e^{-nr}$ 且 $t < r$ 时取 $\lambda = e^{nt}$, 右端第一项至多为 $e^{-n(r-t)}$; 此后再证明对一切 $t > D^\infty(\mathcal{N} \parallel \mathcal{M})$, $\Delta_n(e^{nt})$ 也指数衰减, 逆命题便随之成立.

记 $N_n = (J^\mathcal{N})^{\otimes n}$, $M_n = (J^\mathcal{M})^{\otimes n}$. 写成 Choi 形式, 最优并行得分为

$$\Delta_n(\lambda) = \max_{\sigma = \sigma^\dagger, \text{Tr } \sigma = 1, 0 \leq T \leq \sigma \otimes \mathbb{1}_{B^n}} \text{Tr}[T(N_n - \lambda M_n)], \quad \lambda > 0. \quad (4.2)$$

约束 $\sigma \geq 0$ 是自动的: 由 $\sigma \otimes \mathbb{1} \geq T \geq 0$ 即得. 因此这里跑的恰好就是全部并行检验. 改用式 (2.4) 中的规范探针, 上式等价于

$$\Delta_n(\lambda) = \sup_\psi \text{Tr} \left[((\text{id} \otimes \mathcal{N}^{\otimes n})(\psi) - \lambda(\text{id} \otimes \mathcal{M}^{\otimes n})(\psi))_+ \right]. \quad (4.3)$$

特别地, $0 \leq \Delta_n(\lambda) \leq 1$. 它只是一个辅助的松弛量预算, 并非新增的信道熵. 下面的引理把它与第 3 节的修正平滑 $D_{\max}$ 直接联系起来.

这一得分的好处在于, 它的对偶具有直接的算符解释: $\Delta_n(\lambda)$ 恰是使 λM_n 得以控制 N_n 所需的最小归一化修正.

引理 4.1. 归一化检验松弛量. 对一切 $n \geq 1$ 与 $\lambda > 0$,

$$\Delta_n(\lambda) = \min \{h : Z \geq 0, N_n \leq \lambda M_n + Z, \text{Tr}_{B^n} Z = h \mathbb{1}_{A^n}\}. \quad (4.4)$$

等价地说, $\Delta_n(\lambda)$ 就是使 $N_n \leq \lambda M_n + hQ$ 成立的最小 $h \geq 0$, 其中 Q 是某个信道的 Choi 算符. 最优松弛量可以取成置换不变的.

证明. 对乘子 $Z \geq 0$ 与 $h \in \mathbb{R}$, 式 (4.2) 的 Lagrangian 为

$$h + \text{Tr}[T(N_n - \lambda M_n - Z)] + \text{Tr}[\sigma(\text{Tr}_{B^n} Z - h \mathbb{1})].$$

它对 $T \geq 0$ 与 Hermite 的 σ 的上确界有限, 当且仅当式 (4.4) 中的约束成立. Slater 条件在 $\sigma = \mathbb{1}/d_A^n$ 与 $T = \mathbb{1}/(2d_A^n)$ 处成立. 此外 $Z = N_n$, $h = 1$ 是对偶可行的; 把 h 限制在 $0 \leq h \leq 1$ 内, 可行集是紧的, 因为 $\text{Tr } Z = d_A^n h$. 这就证明了等式成立且最小值可取到. 正性迫使 $h \geq 0$; 若 $h = 0$, 则 $Z = 0$, 否则可写 $Z = hQ$. 最后, 对联合置换取平均保持所有约束不变, 也不改变 h 的值.

□

对 $0 \leq \delta < 1$ 与 $\lambda > 0$, 由引理与紧性可得

$$\Delta_n(\lambda) \leq \delta \iff \tilde{D}_{\max, \text{all}}^\delta(\mathcal{N}^{\otimes n} \parallel \mathcal{M}^{\otimes n}) \leq \log \lambda. \quad (4.5)$$

事实上, 既然 $Q \geq 0$, 更小的松弛量 hQ 可以放大为 δQ ; 反之, 一个可行的修正平滑项本身就是预算为 δ 的松弛量。即便没有支撑包含, 只要平滑下确界有限, 它也能取到: 把 λ 限制在任一有限的可行下水平集内, 再用 $\mathcal{K}_{\text{all},n}$ 的紧性即可。因此 Δ_n 就是同一个修正平滑最大相对熵的逆预算曲线。

把得分迁移到一般检验器。 归一化后的松弛量 Q 可以是跨全部 n 次使用的一个联合信道的 Choi 算符, 而一般检验是在局域信道的乘积上归一化的, 所以我们需要一个乘积信道意义下对 Q 的控制。引理 4.1 给出的置换对称性, 允许我们用固定边际的 de Finetti 定理以多项式损失提供这种控制。令

$$g_n = \binom{n + d_A^2 d_B^2 - 1}{n}. \quad (4.6)$$

在 d_A, d_B 固定时, 这满足 $\log g_n = O(\log n)$ 。设 $Q \geq 0$ 满足 $\text{Tr}_{B^n} Q = \mathbb{1}_{A^n}$, 且在输入-输出对的同步置换下不变。态

$$\rho_{A^n B^n} = Q/d_A^n, \quad \text{Tr}_{B^n} \rho = (\mathbb{1}_A/d_A)^{\otimes n}$$

满足固定边际 de Finetti 定理的全部假设 (见 [12] 推论 1.1)。该定理给出一个定义在满足 $\text{Tr}_B \omega = \mathbb{1}_A/d_A$ 的态 ω_{AB} 上的概率测度, 使得

$$Q/d_A^n \leq g_n \int \omega_{AB}^{\otimes n} d\mu(\omega).$$

每个 $d_A \omega$ 都是一个 CPTP 映射的非归一化 Choi 算符。两边乘以 d_A^n , 并把测度推前到这些映射上, 得到

$$Q \leq g_n \int (d_A \omega_{AB})^{\otimes n} d\mu(\omega) = g_n \int (J^C)^{\otimes n} d\mu(C). \quad (4.7)$$

于是没有多出任何维数因子: 真正需要的假设是置换不变性, 至于支撑落在对称子空间内则无须要求。把它用于引理 4.1 中最优的归一化松弛量, 给出

$$N_n \leq \lambda M_n + g_n \Delta_n(\lambda) Q_{n,\lambda}, \quad Q_{n,\lambda} = \int (J^C)^{\otimes n} d\mu_{n,\lambda}(C). \quad (4.8)$$

这一混合依赖于信道对、 n 与 λ , 但与检验器无关。若 $\Delta_n(\lambda) = 0$, 任一这样的混合都可以使用。对一般接受效应 $0 \leq T_1 \leq W$, 归一化条件给出 $\text{Tr}(T_1 Q_{n,\lambda}) \leq 1$ 。于是每个具有接受对 (a, b) 的一般检验器都满足

$$a \leq \lambda b + g_n \Delta_n(\lambda) \quad (\lambda > 0). \quad (4.9)$$

算符不等式 (4.8) 经式 (4.9) 给出逆命题, 之后还将为渐近等分性论证提供平滑项。带接受对 $(a/g_n, b/g_n)$ 的显式并行检验同样可得; 更强的有限次构造将在附录 A 中单独证明。

4.1 二元 Rényi 界

定阶的二元界能在 Rényi 阈值之上控制 Δ_n 。对夹逼 Rényi 散度 [18], [19], 我们采用如下约定。对 $p > 1$ 与支撑相容的态对, 定义

$$\begin{aligned} \tilde{D}_p(\rho \parallel \sigma) &= \frac{1}{p-1} \log \tilde{Q}_p(\rho \parallel \sigma), \\ \tilde{Q}_p(\gamma \parallel \sigma) &= \text{Tr} \left(\sigma^{\frac{1-p}{2p}} \gamma \sigma^{\frac{1-p}{2p}} \right)^p \quad (p > 1). \end{aligned} \quad (4.10)$$

对迹任意的正算符 γ 沿用同一个 Rényi 迹表达式 $\tilde{Q}_p$, 并规定 $\tilde{Q}_p(0 \parallel \sigma) = 0$ 。逆幂只在 $\text{supp } \sigma$ 上作用; 支撑包含不成立时, 散度取 $+\infty$ 。

把式 (2.10) 与式 (2.11) 照搬用于 $\mathbb{D} = \tilde{D}_p$: 在每一个固定的 $p > 1$ 下, 同样的纯化与超可加性论证都成立。在 Choi 支撑包含条件下, 夹逼散度的数据处理不等式 [20], [21] 与对阶的单调性 [19] 共同给出

$$\begin{aligned} 0 \leq D^\infty(\mathcal{N} \parallel \mathcal{M}) &= \inf_{\alpha > 1} \tilde{D}_\alpha^\infty(\mathcal{N} \parallel \mathcal{M}) \leq \tilde{D}_p^\infty(\mathcal{N} \parallel \mathcal{M}), \\ &\leq D_{\max}(\mathcal{N} \parallel \mathcal{M}) < \infty \quad (p > 1). \end{aligned} \quad (4.11)$$

由对阶的单调性, 上式中的下确界可写成 $\lim_{p \downarrow 1} \tilde{D}_p^\infty(\mathcal{N} \parallel \mathcal{M})$, 只是其数值尚未确定。

除另有说明外, 从现在起到第 6 节末尾, 一律假设 Choi 支撑包含成立。此时并行接受对若满足 $a > 0$, 则必有 $b > 0$; $a = b = 0$ 的情形对二元矩的贡献为零。对 $p > 1$, 二元数据处理把每个并行检验的矩控制在

$$a^p b^{1-p} \leq \exp \left[(p-1) \tilde{D}_p(\mathcal{N}^{\otimes n} \parallel \mathcal{M}^{\otimes n}) \right]. \quad (4.12)$$

当 $a > \lambda b$ 时得分为正, 且满足 $(a - \lambda b) \lambda^{p-1} \leq a^p b^{1-p}$ 。对检验取最大, 给出

$$\Delta_n(\lambda) \leq \lambda^{1-p} \exp \left[(p-1) \tilde{D}_p(\mathcal{N}^{\otimes n} \parallel \mathcal{M}^{\otimes n}) \right]. \quad (4.13)$$

因此, 只要 $t > \inf_{p>1} \tilde{D}_p^\infty(\mathcal{N} \parallel \mathcal{M})$, $\Delta_n(e^{nt})$ 就指数衰减。剩下的分析工作, 是证明这一阈值恰好就是可达速率 $D^\infty(\mathcal{N} \parallel \mathcal{M})$ 。

5 正则化端点与 Stein 逆命题

上述归约只留下一个问题: Rényi 阈值是否恰好等于并行可达速率? 下面的恒等式回答这一问题, 它正是逆命题所需的分析步骤。

定理 5.1. 正则化 Rényi 端点。对满足 $\text{supp } J^\mathcal{N} \subseteq \text{supp } J^\mathcal{M}$ 的有限维 CPTP 映射 $\mathcal{N}, \mathcal{M} : A \rightarrow B$, 有

$$\lim_{p \downarrow 1} \tilde{D}_p^\infty(\mathcal{N} \parallel \mathcal{M}) = D^\infty(\mathcal{N} \parallel \mathcal{M}). \quad (5.1)$$

下界来自式 (4.11); 实质内容在于输入优化与正则化之后的连续性。若 Choi 支撑包含不成立, 由 Choi 探针可知两端皆为 $+\infty$ 。下面的证明从检验松弛量与二元散度界出发: 先构造公共的幅值逼近, 再将其张量化, 最后比较两种逼近速率。

设 $C := D_{\max}(\mathcal{N} \parallel \mathcal{M}) < \infty$, 并记

$$D_* := D^\infty(\mathcal{N} \parallel \mathcal{M}), \quad R_* := \inf_{p>1} \tilde{D}_p^\infty(\mathcal{N} \parallel \mathcal{M}).$$

于是 $D_* \leq R_* \leq C$ 。我们要说明严格的间隙不可能出现。公共逼近将直接由定义 Δ_k 的最优解构造。

5.1 正的松弛量给出统一的幅值逼近

要在重复的区块中使用松弛量, 需要一个能同时控制所有输入探针的逼近。对 Choi 算符取幅值即可提供这种一致控制, 并使张量积化为乘积。对 $A^k B^k$ 上的矩阵 X , 定义幅值范数

$$\nu_k(X) := \left\| \text{Tr}_{B^k} X X^\dagger \right\|_\infty^{1/2} = \sup_{\sigma \in \mathcal{D}(A^k)} \left\| (\sqrt{\sigma} \otimes \mathbb{1}) X \right\|_2. \quad (5.2)$$

第二个表达式是一族 Hilbert-Schmidt 半范数的上确界, 故 ν_k 满足三角不等式。由偏迹可得

$$\nu_k(\sqrt{N_k}) = 1, \quad \nu_{k+\ell}(X \otimes Y) = \nu_k(X) \nu_\ell(Y).$$

若把 X 的各列取为向量化后的 Kraus 算符, $\nu_k(X)$ 恰是相应公共环境延拓的算子范数。因此, 这一范数在探针选定之前就控制了所有输入与参考系统。

引理 5.2. 正序提升到幅值。设 $N, B, Z \geq 0$ 且 $N \leq B + Z$, 则存在矩阵 X, F 使得

$$\sqrt{N} = X + F, \quad X X^\dagger \leq B, \quad F F^\dagger \leq Z. \quad (5.3)$$

证明。 令 $S = B + Z$, 并使用其在支撑上的逆:

$$X = B S^+ \sqrt{N}, \quad F = Z S^+ \sqrt{N}. \quad (5.4)$$

由于 $\text{supp } N \subseteq \text{supp } S$, 两者之和恰为 $\sqrt{N}$ 。这里 S^+ 是 Moore-Penrose 逆, 并记 $S^{+1/2} := (S^+)^{1/2}$ 。在 $\text{supp } S$ 上, 只要 $0 \leq Y \leq S$, $S^{+1/2} N S^{+1/2}$ 与 $S^{+1/2} Y S^{+1/2}$ 都是正的压缩算符。对后者取平方得 $Y S^+ Y \leq Y$, 对前者得 $S^+ N S^+ \leq S^+$ 。于是 $X X^\dagger \leq B S^+ B \leq B$, 且 $F F^\dagger \leq Z S^+ Z \leq Z$ 。全程未使用任何交换性或可逆性假设。 $\square$

将引理 4.1 与引理 5.2 一起使用, 取 $B = e^{kt} M_k$, 并取最优的归一化松弛量满足 $\text{Tr}_{B^k} Z = \Delta_k(e^{kt}) \mathbb{1}$ 。对每个速率 t , 二者共同给出一个矩阵 $X_k(t)$, 满足

$$X_k(t) X_k(t)^\dagger \leq e^{kt} M_k, \quad \nu_k(\sqrt{N_k} - X_k(t)) \leq e_k(t), \quad e_k(t) := \sqrt{\Delta_k(e^{kt})}. \quad (5.5)$$

同一个矩阵对一切探针都适用; $e_k(t)$ 只是一个检验界, 并非另行优化的逼近轮廓。

两个标尺估计。 二元相对熵的数据处理对每个并行检验给出 $a \log(1/b) - \log 2 \leq k D_*$ 。得分 $a - e^{kr} b$ 为正蕴含 $b < e^{-kr}$, 于是当 $r > D_*$ 时

$$\Delta_k(e^{kr}) \leq \frac{k D_* + \log 2}{kr}, \quad \limsup_k e_k(r) \leq \sqrt{D_*/r} < 1. \quad (5.6)$$

当 $v > R_*$ 时, 取固定的 $q > 1$ 使得 $\tilde{D}_q^\infty(\mathcal{N} \parallel \mathcal{M}) < v$ 。由式 (4.13) 与超可加性得

$$\Delta_k(e^{kv}) \leq \exp \left[-k(q-1)(v - \tilde{D}_q^\infty(\mathcal{N} \parallel \mathcal{M})) \right], \quad e_k(v) \rightarrow 0. \quad (5.7)$$

这两个估计都不依赖端点恒等式, 也不依赖信道强逆命题。

5.2 对任意纠缠探针的一次张量估计

现在把幅值分解转化为 Rényi 界。每一项通过两个量发挥作用：它对 M_k 的控制代价，以及它的幅值范数。即使探针在所有重复区块之间纠缠，这一估计依然成立。

记 Schatten q -范数 $\|X\|_q := (\text{Tr } |X|^q)^{\frac{1}{q}}$ ，其中 $|X| := (X^\dagger X)^{\frac{1}{2}}$ 。对态 β 与 $0 \leq \gamma \leq \lambda\beta$ ，

$$\tilde{Q}_p(\gamma \parallel \beta) \leq \lambda^{p-1} \text{Tr } \gamma \quad (p > 1). \quad (5.8)$$

对非零的 γ ，把不等式 $\tilde{D}_p \leq D_{\max}$ 用于 $\gamma / \text{Tr } \gamma$ ，并用齐次性 $\tilde{Q}_p(c\gamma \parallel \beta) = c^p \tilde{Q}_p(\gamma \parallel \beta)$ 。 $\gamma = 0$ 的情形显然成立；控制关系保证了 $\text{supp } \gamma \subseteq \text{supp } \beta$ 。

引理 5.3. 张量幅值矩界。设 $\sqrt{N_k} = \sum_i X_i$ 是一个有限分解，且对每个 i 有 $\lambda_i > 0$ 使得 $X_i X_i^\dagger \leq \lambda_i M_k$ 。则

$$\exp \left[\frac{k(p-1)}{2p} \tilde{D}_p^\infty(\mathcal{N} \parallel \mathcal{M}) \right] \leq \sum_i \lambda_i^{\frac{p-1}{2p}} \nu_k(X_i)^{\frac{1}{p}}, \quad p > 1. \quad (5.9)$$

证明。 固定 k, p ，把上述分解重复 m 次。作用在全部 km 次使用上的任意探针，在相差一个参考等距的意义下由密度算符 σ 表示；记 $L_\sigma := \sqrt{\sigma} \otimes \mathbb{1}$ ， $\beta := L_\sigma M_{km} L_\sigma$ 。由 $\text{Tr}_{B^{km}} M_{km} = \mathbb{1}$ 与 $\text{Tr } \sigma = 1$ ， β 是一个态。对满足 $XX^\dagger \leq \lambda M_{km}$ 的幅值 X ，令 $\gamma := L_\sigma X X^\dagger L_\sigma$ ，则

$$\gamma \leq \lambda\beta, \quad \text{ran}(L_\sigma X) = \text{supp } \gamma \subseteq \text{supp } \beta. \quad (5.10)$$

于是下文的负幂在 $\text{supp } \beta$ 上良定义，即使 σ 与 J^M 奇异也成立。由式 (5.8) 得

$$\begin{aligned} \left\| \beta^{-\frac{p-1}{2p}} L_\sigma X \right\|_{2p} &\leq \lambda^{\frac{p-1}{2p}} (\text{Tr } L_\sigma X X^\dagger L_\sigma)^{\frac{1}{2p}} \\ &\leq \lambda^{\frac{p-1}{2p}} \nu_{km}(X)^{\frac{1}{p}}. \end{aligned} \quad (5.11)$$

对张量词 $X_i := X_{i_1} \otimes \dots \otimes X_{i_m}$ ，其阶常数与幅值范数都因子化，故 Schatten 范数的三角不等式给出

$$\begin{aligned} \left\| \beta^{-\frac{p-1}{2p}} L_\sigma \sqrt{N_{km}} \right\|_{2p} &\leq \sum_{i_1, \dots, i_m} \prod_{j=1}^m \lambda_{i_j}^{\frac{p-1}{2p}} \nu_k(X_{i_j})^{\frac{1}{p}} \\ &= \left(\sum_i \lambda_i^{\frac{p-1}{2p}} \nu_k(X_i)^{\frac{1}{p}} \right)^m. \end{aligned} \quad (5.12)$$

左端的 $2p$ 次方正是零输出的夹逼矩。该界与 σ 无关：全程未作乘积探针假设。对 σ 优化、取对数、除以 km ，再在固定 k, p 下令 $m \rightarrow \infty$ ；沿 k 的整数倍正则化即得式 (5.9)。

□

5.3 用两种逼近速率闭合端点

证明 (定理 5.1)。 设 $D_* < R_*$ 。固定 $D_* < r < R_* < v$ ，并令 $\delta = \sqrt{D_*/r} < 1$ 。由式 (5.6)–(5.7)， $\limsup_k e_k(r) \leq \delta$ 且 $e_k(v) \rightarrow 0$ 。公共逼近给出恒等式

$$\sqrt{N_k} = X_k(r) + (X_k(v) - X_k(r)) + (\sqrt{N_k} - X_k(v)). \quad (5.13)$$

对这三个幅值，可容许的阶常数与范数界为

幅值	满足 $X_i X_i^\dagger \leq \lambda_i M_k$ 的 λ_i	$\nu_k(X_i)$ 的上界
$X_k(r)$	e^{kr}	$1 + e_k(r)$
$X_k(v) - X_k(r)$	$4e^{kv}$	$e_k(r) + e_k(v)$
$\sqrt{N_k} - X_k(v)$	$4e^{k \max\{C, v\}}$	$e_k(v)$

(5.14)

范数界来自三角不等式；阶常数界则来自 $(X - Y)(X - Y)^\dagger \leq 2XX^\dagger + 2YY^\dagger$ 与 $N_k \leq e^{kC} M_k$ 。

固定 $s > 0$ 。当 $k > 2s$ 时，取

$$p_k = \frac{k}{k-2s}, \quad \frac{k(p_k-1)}{2p_k} = s, \quad \frac{1}{p_k} = 1 - \frac{2s}{k}.$$

应用引理 5.3 与 $R_* \leq \tilde{D}_{p_k}^\infty$ ，恰好得到

$$\begin{aligned} e^{sR_*} &\leq e^{sr} (1 + e_k(r))^{1-2s/k} + 4^{s/k} e^{sv} (e_k(r) + e_k(v))^{1-2s/k} \\ &\quad + 4^{s/k} e^{s \max\{C, v\}} e_k(v)^{1-2s/k}. \end{aligned} \quad (5.15)$$

引理 5.3 中的重复极限已在每个固定的 k, p_k 处取过。现在固定 r, v, s , 令 $k \rightarrow \infty$ 。由于 $0 \leq e_k(v) \leq 1$ 且最终有 $1 - 2s/k \geq 1/2$, 最后一项消失。对前两项, 利用最终成立的 $e_k(r) \leq \delta + \zeta$ 与 $e_k(v) \leq \zeta$, 先取上极限, 再令 $\zeta \downarrow 0$ 。这一步无须对 $e_k(r)$ 取极限, 并且涵盖 $D_* = 0$ 的情形。结果为

$$e^{sR_*} \leq (1 + \delta)e^{sr} + \delta e^{sv}. \quad (5.16)$$

这对每个固定的 $v > R_*$ 与 $s > 0$ 都成立。令 $v \downarrow R_*$:

$$1 - \delta \leq (1 + \delta)e^{-s(R_* - r)}.$$

左端严格为正, 而右端在 $s \rightarrow \infty$ 时趋于零。这一矛盾证明了 $R_* = D_*$ 。对 p 的单调性把 R_* 等同于阶一的极限。全程取极限的次序是 $m \rightarrow \infty, k \rightarrow \infty, v \downarrow R_*, s \rightarrow \infty$; 既未使用对 v 一致的估计, 也没有交换输入优化。

□

两种逼近速率各司其职。速率 r 给出小于 1 的误差; 速率 v 把该项不消失的修正推到任意接近 R_* 的代价上。只有趋于零的余项按可能更大的代价 C 计费。因此, 指数精度的低成本逼近并非端点证明的前提。

5.4 完成信道 Stein 定理

证明 (定理 2.4 的收尾)。 下界与无限速率的情形已在第 4 节开头解决。在支撑情形下, 固定 $r > D^\infty(\mathcal{N} \parallel \mathcal{M})$, 并取 $D^\infty < t < r$ 。由定理 5.1, 存在固定的 $q > 1$ 使得 $\tilde{D}_q^\infty(\mathcal{N} \parallel \mathcal{M}) < t$ 。令 $\eta_t = (q - 1)(t - \tilde{D}_q^\infty(\mathcal{N} \parallel \mathcal{M})) > 0$ 。于是由式 (4.9) 与 (5.7), 对一切满足 $b \leq e^{-nr}$ 的一般检验器,

$$a \leq e^{-n(r-t)} + g_n e^{-n\eta_t}. \quad (5.17)$$

由于 $\log g_n = o(n)$, 存在仅依赖于两个信道与 r 的常数 $c > 0$ 和 n_0 , 使得当 $n \geq n_0$ 时右端不超过 e^{-cn} 。这就直接证明了指数强逆命题。于是对固定的 $\varepsilon \in (0, 1)$, 条件 $a \geq 1 - \varepsilon$ 在一切充分大的 n 上都排除了 $b \leq e^{-nr}$ 。因此 Stein 上速率不超过 r 。令 $r \downarrow D^\infty$, 再结合式 (4.1) 与检验器的包含关系即可。

□

单时对偶与 Stein 定理给出 AEP 的下界。至于上界, 还需要额外的成分——式 (4.8) 的 IID 控制: 端点定理使其松弛量指数地小, 于是多项式前置因子能吸收进任何固定预算。

推论 5.4. 修正平滑最大相对熵的渐近等分性。对任意有限维 CPTP 对 $\mathcal{N}, \mathcal{M}: A \rightarrow B$ 、任意固定的 $\delta \in (0, 1)$ 与 $\bullet \in \{\text{all}, \text{aff}, \text{prod}, \text{iid}\}$,

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{n} \tilde{D}_{\max, \bullet}^\delta(\mathcal{N}^{\otimes n} \parallel \mathcal{M}^{\otimes n}) = D^\infty(\mathcal{N} \parallel \mathcal{M}). \quad (5.18)$$

等式在取扩展值 $+\infty$ 时同样成立。

证明。 先设 Choi 支撑包含成立。固定 $q \in (\delta, 1)$ 。在式 (3.6) 中取候选预算 δ , 得

$$\tilde{D}_{\max, \text{all}}^\delta(\mathcal{N}^{\otimes n} \parallel \mathcal{M}^{\otimes n}) \geq D_H^{1-q, \text{par}}(\mathcal{N}^{\otimes n} \parallel \mathcal{M}^{\otimes n}) + \log(q - \delta).$$

两边除以 n 并用定理 2.4。再由包含链式 (3.5), 四个平滑集合的下极限界全部得证。

上界方面, 固定 $t > D^\infty(\mathcal{N} \parallel \mathcal{M})$ 。由定理 5.1, 取 $p > 1$ 使得 $\tilde{D}_p^\infty(\mathcal{N} \parallel \mathcal{M}) < t$, 并令 $\eta = (p - 1)(t - \tilde{D}_p^\infty(\mathcal{N} \parallel \mathcal{M})) > 0$ 。式 (4.13) 与 (4.8) 给出

$$N_n \leq e^{nt} M_n + g_n e^{-n\eta} Q_{n, e^{nt}}, \quad Q_{n, e^{nt}} \in \mathcal{K}_{\text{iid}, n}.$$

由于 $\log g_n = o(n)$, 最终有 $g_n e^{-n\eta} \leq \delta$ 。把该系数增大到 δ 保持序不等式成立, 故对一切充分大的 n 有 $\tilde{D}_{\max, \text{iid}}^\delta \leq nt$ 。其余三个熵不会更大。令 $t \downarrow D^\infty$ 即得上极限界。

若 Choi 支撑包含不成立, 改用第 4 节构造的并行检验, 取 $b_n = 0$ 、 $a_n = 1 - (1 - q_0)^n \rightarrow 1$ 。任何满足 $Q \in \mathcal{K}_{\text{all}, n}$ 的可行不等式 $N_n \leq \lambda M_n + \delta Q$ 都将蕴含

$$a_n \leq \delta \text{Tr}(T_{1, n} Q) \leq \delta,$$

因为并行归一化对任意联合信道的 Choi 算符的压缩等于一。当 n 充分大时 $a_n > \delta$, 于是没有任何有限的 λ 可行。这说明四个平滑熵最终都取 $+\infty$, 与 $D^\infty = +\infty$ 相符。

□

注 5.5. 预算与边界核验。同一证明允许预算成一系列 $\delta_n \in (0, 1)$, 只要 $\limsup_n \delta_n < 1$ 且 $\log(1/\delta_n) = o(n)$: 下界取固定的 $q > \limsup_n \delta_n$; 上界则把指数地小的 IID 松弛量吸收进 δ_n 。然而零预算时, 四个熵都等于 $nD_{\max}(\mathcal{N} \parallel \mathcal{M})$, 因此“正预算”这一限定不可或缺。

对相同的信道, 直接比较迹并取 $Q = N_n$, 每个类都给出 $\tilde{D}_{\max, \bullet}^\delta = \log(1 - \delta)$ 。类似地, $D_H^{1-q, S} = -\log q$ 。这些公式核验了对偶中的归一化与对数修正项的符号。

6 有限次界与精确强逆指数

上一节的证明已经给出速率高于 Stein 速率时的指数衰减。本节保留检验界中最优的标量常数, 把这一衰减定量刻画。由此得到的有限次不等式与已知的并行可达性相合, 就确定了三类检验器共同的精确指数。

6.1 完整的定阶逆命题

式 (4.13) 的右端可以乘上更锐的常数 $c_p = (p-1)^{p-1}/p^p$ 。事实上, 在 $x = \lambda b/a \in (0, 1)$ 处最大化 $(1-x)x^{p-1}$ 给出

$$a - \lambda b \leq c_p \lambda^{1-p} a^p b^{1-p}.$$

把这条加强后的 Δ_n 界代入式 (4.9), 再对 $\lambda > 0$ 取下确界。初等恒等式

$$\inf_{\lambda > 0} \{\lambda b + c_p K \lambda^{1-p}\} = K^{1/p} b^{(p-1)/p}$$

给出

$$\frac{a^p b^{1-p}}{g_n} \leq \exp[(p-1)\tilde{D}_p(\mathcal{N}^{\otimes n} \parallel \mathcal{M}^{\otimes n})] \leq e^{n(p-1)\tilde{D}_p^\infty(\mathcal{N} \parallel \mathcal{M})}. \quad (6.1)$$

在 $(a, b) = (0, 0)$ 处规定二元矩为零。此处 $b = 0$ 由有限的 Choi 控制蕴含 $a = 0$; 其余情形上述下确界可直接计算。特别地, $a \geq 1 - \varepsilon$ 给出

$$D_H^{\varepsilon, \text{gen}}(\mathcal{N}^{\otimes n} \parallel \mathcal{M}^{\otimes n}) \leq n\tilde{D}_p^\infty(\mathcal{N} \parallel \mathcal{M}) + \frac{\log g_n + p \log \frac{1}{1-\varepsilon}}{p-1}. \quad (6.2)$$

当 $b \leq e^{-nr}$ 时, 式 (6.1) 还给出

$$a \leq g_n^{\frac{1}{p}} \exp \left[-n \frac{p-1}{p} [r - \tilde{D}_p^\infty(\mathcal{N} \parallel \mathcal{M})] \right]. \quad (6.3)$$

这些界比式 (5.17) 更锐, 并将据此确定精确指数。它们的证明只用到标量不等式 (4.9), 不需要显式构造的并行检验器。

6.2 精确的强逆指数

前面的证明没有引用任何外部的精确指数公式就建立了 Stein 定理。要确定整条衰减指数, 现在使用 [5] 定理 5.5 中的并行可达性部分。对检验器类 S 与 $r > 0$, 定义

$$E_{\text{sc}}^S(r) = \inf_{(T_{1,n}, T_{2,n}) \in S \forall n, \liminf_{n \rightarrow \infty} -\frac{1}{n} \log b_n \geq r} \limsup_{n \rightarrow \infty} -\frac{1}{n} \log a_n. \quad (6.4)$$

这里约定 $-\log 0 = +\infty$ 。[5] 第 5.2.1 节的错误量是 $\alpha_n = 1 - a_n$ 与 $\beta_n = b_n$, 该文条件 $\limsup_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{n} \log \beta_n \leq -r$ 与上式所列的条件完全相同。该文用以 2 为底的约定, 化为自然对数只需把 r 替换成 $r/\log 2$, 并把一切散度与指数都乘以 $\log 2$ 。所引定理的陈述对象是有限维 CPTP 映射, 并且明确指出用非自适应、从而也是并行的策略即可达到该指数。下面的推论只假设 Choi 支撑包含, 两个信道都不要求 Choi 算符满秩。

推论 6.1. 精确指数及其阈值。对满足 $\text{supp } J^{\mathcal{N}} \subseteq \text{supp } J^{\mathcal{M}}$ 的有限维 CPTP 映射 $\mathcal{N}, \mathcal{M} : A \rightarrow B$, 任意 $r > 0$ 与任意 $S \in \{\text{par}, \text{ada}, \text{gen}\}$,

$$E_{\text{sc}}^S(r) = \sup_{p > 1} \frac{p-1}{p} [r - \tilde{D}_p^\infty(\mathcal{N} \parallel \mathcal{M})]. \quad (6.5)$$

这一公共指数严格为正, 当且仅当 $r > D^\infty(\mathcal{N} \parallel \mathcal{M})$ 。

证明。 对定义中的每个序列与每个固定的 $p > 1$, 式 (6.1) 给出

$$\limsup_{n \rightarrow \infty} -\frac{1}{n} \log a_n \geq \frac{p-1}{p} [r - \tilde{D}_p^\infty(\mathcal{N} \parallel \mathcal{M})].$$

事实上, 先在 b_n 的最终界里把 r 换成 $r - \eta$, 再令 $\eta \downarrow 0$; 其间 $\frac{1}{n} \log g_n \rightarrow 0$ 。对 p 取上确界, 就得到一般策略的指数 $E_{\text{sc}}^{\text{gen}}$ 的下界。[5] 定理 5.5 的并行可达性用同一个表达式从上方界住并行指数。检验器的包含关系给出 $E_{\text{sc}}^{\text{gen}} \leq E_{\text{sc}}^{\text{ada}} \leq E_{\text{sc}}^{\text{par}}$, 于是三个数值彼此相同。这一相等没有用到端点; 端点用来判定它何

时为正。由定理 5.1, 当 $r > D^\infty$ 时该上确界为正。当 $r \leq D^\infty$ 时, 其中的各项都非正, 并在 $p \downarrow 1$ 时趋于零, 因为 $\tilde{D}_p^\infty \leq D_{\max} < \infty$ 。

□

7 讨论

对有限维无记忆信道, 反馈与不定因果序都不改变定误差的 Stein 速率。对每一个高于 $D^\infty(\mathcal{N} \parallel \mathcal{M})$ 的有限第二类指数, 正确接受原假设的概率都指数衰减。当 $\text{supp } J^\mathcal{N} \subseteq \text{supp } J^\mathcal{M}$ 时, 对每个 $r > 0$ 成立的精确并行强逆指数同样适用于自适应与一般检验器。这些结论确定了渐近的检验阈值, 尽管各检验器类在有限码长下的表现未必相同。

一个归一化的正松弛量贯穿整个证明。省去检验器边缘算符上多余的 positivity 约束后, 其 SDP 对偶便满足精确的偏迹归一化。固定边缘的 de Finetti 归约由此给出式 (4.8): 它把并行检验的界传递到一切一般检验器, 又为渐近等分性提供了独立同分布的平滑器。与此独立地, 把这一松弛量提升为幅值, 就能在张量化之前控制一切输入。三个幅值的比较据此确定了正则化的 Rényi 端点, 无需交换优化与渐近极限的次序。

单时对偶还进一步指明, 每一种检验器归一化各自对应哪一条平滑约束。除精确对偶中的全体信道集与正仿射集, 凸乘积集与独立同分布集也有相同的渐近极限: 对 $(0, 1)$ 内每一个固定的预算, 这四个修改后的平滑熵都收敛到 $D^\infty(\mathcal{N} \parallel \mathcal{M})$ 。证明先用端点把 Choi 松弛量压到指数小, 再吸收其独立同分布控制所付出的多项式代价。

附录 A 的显式转化把两个接受概率都乘以 $1/g_n$, 并不意味着有限次检验相互等价。二阶分析则需要速率趋于 D^∞ 、Rényi 阶趋于 1 时, 定量控制统一幅值的误差。这样的界还得追踪式 (6.2) 这条有限拷贝逆命题里的 $O(\log n)$ 后选择项。现有的端点证明只确立了连续性, 并未给出这样的收敛速率。

附注。本文初版完成于 2026 年 9 月 7 日 [22], 其后我们获悉 Gao、Ji、Liu 的独立工作 [23], 该文于 2026 年 9 月 23 日发布, 讨论并行与自适应策略下的定误差信道 Stein 定理与指数强逆命题。本文的论证与 Gao、Ji、Liu [23] 共用从检验到幅值的构造, 但直接用这里的三幅值界闭合端点; 他们的证明则先通过反复降低速率与固定区块的张量展开, 把逼近做到指数精确。

致谢

作者感谢 Ludovico Lami、Bartosz Regula、Yinan Li、Li Gao 富有启发的讨论。Bartosz Regula 在访问香港科技大学 (广州) 期间, 提出不定因果序能否改善信道判别这一问题, 我们尤其感谢他给出的这一建议。

本工作部分得到国家重点研发计划 (批准号 2024YFE0102500) 与国家自然科学基金 (批准号 92576114、12447107) 资助, 并得到广东省量子科学战略专项 (批准号 GDZX2403008、GDZX2503001) 与广东省泛在物联网通信感知算一体化重点实验室 (批准号 2023B1212010007) 的支持。

AI 使用声明。作者提出原始问题, 并在未借助 AI 的情况下得到定理 5.1 之前的全部结果, 其中包括单时对偶、一般检验器的多项式归约与定阶 Rényi 逆命题。随后 GPT-5.6 sol 生成了定理 5.1 的初版; 据我们所知, 作者核验并完善了这一生成的证明, 并对证明与结论负全部责任。

A 精确的多项式并行化

主证明只用到式 (4.9) 这一个标量推论。为完整起见, 这里保留更强的精确接受对转化。

命题 A.1. 多项式并行化。对每个具有接受对 (a, b) 的 n 槽一般检验器, 都存在一个 n 槽并行检验器, 其接受对为 $(a/g_n, b/g_n)$ 。于是

$$\beta_\varepsilon^{\text{gen}}(\mathcal{N}^{\otimes n}, \mathcal{M}^{\otimes n}) \geq g_n \beta_{1-(1-\varepsilon)/g_n}^{\text{par}}(\mathcal{N}^{\otimes n}, \mathcal{M}^{\otimes n}). \quad (\text{A.1})$$

证明。对检验器作联合置换平均, 接受对 (a, b) 保持不变, 并记 $W = T_1 + T_2$ 。由于 $X \otimes \mathbb{1} \geq W \geq 0$ 本身就蕴含 $X \geq 0$, SDP 对偶给出

$$\gamma(W) = \min_{X=X^\dagger, X \otimes \mathbb{1} \geq W} \text{Tr } X = \max_{Q \geq 0, \text{Tr}_{B^n} Q = \mathbb{1}_{A^n}} \text{Tr}[WQ]. \quad (\text{A.2})$$

取充分大的标量 X 就有严格的原始可行; 由迹的紧性, 最小值可以取到, 而信道 Choi 集合是紧的, 对偶最大值同样可以取到。对偶最优解 Q 经联合置换平均后即可套用式 (4.7), 一般归一化随即给出

$$\gamma(W) \leq g_n \int \text{Tr}[W(J^{\mathcal{C}})^{\otimes n}] d\mu(\mathcal{C}) = g_n.$$

此外 $\gamma(W) \geq \text{Tr}(WP_0) = 1$, 其中 P_0 是完全去极化信道的乘积 Choi 算符, 因此下面的归一化不会除以零。对最优的 X , 令 $\sigma = X / \text{Tr } X$, 则 $W \leq g_n \sigma \otimes \mathbb{1}$, 于是 T_1/g_n 与 $\sigma \otimes \mathbb{1} - T_1/g_n$ 就构成所求的并行检验器, 其接受对恰为 $(a/g_n, b/g_n)$ 。

□

参考文献

- [1] F. Hiai and D. Petz, “The proper formula for relative entropy and its asymptotics in quantum probability,” *Commun. Math. Phys.*, vol. 143, pp. 99–114, 1991.
- [2] T. Ogawa and H. Nagaoka, “Strong converse and Stein's lemma in quantum hypothesis testing,” *IEEE Trans. Inf. Theory*, vol. 46, pp. 2428–2433, 2000.
- [3] X. Wang and M. M. Wilde, “Resource theory of asymmetric distinguishability for quantum channels,” *Phys. Rev. Research*, vol. 1, no. 033169, Dec. 2019.
- [4] K. Fang, O. Fawzi, R. Renner, and D. Sutter, “Chain rule for the quantum relative entropy,” *Phys. Rev. Lett.*, vol. 124, p. 100501, Mar. 2020.
- [5] H. Fawzi and O. Fawzi, “Defining quantum divergences via convex optimization,” *Quantum*, vol. 5, p. 387, 2021.
- [6] K. Fang, G. Gour, and X. Wang, “Towards the ultimate limits of quantum channel discrimination and quantum communication,” *Sci. China Inf. Sci.*, vol. 68, p. 180509, 2025.
- [7] B. Bergh, N. Datta, R. Salzmänn, and M. M. Wilde, “Parallelization of adaptive quantum channel discrimination in the non-asymptotic regime,” *IEEE Trans. Inf. Theory*, vol. 70, pp. 2617–2636, 2024.
- [8] B. Regula, L. Lami, and M. M. Wilde, “Postselected quantum hypothesis testing,” *IEEE Trans. Inf. Theory*, vol. 70, pp. 3453–3469, 2024.
- [9] M. M. Wilde, M. Berta, C. Hirche, and E. Kaur, “Amortized channel divergence for asymptotic quantum channel discrimination,” *Lett. Math. Phys.*, vol. 110, no. 8, pp. 2277–2336, 2020.
- [10] O. Oreshkov, F. Costa, and Č. Brukner, “Quantum correlations with no causal order,” *Nat. Commun.*, vol. 3, p. 1092, 2012.
- [11] J. Bavaresco, M. Murao, and M. T. Quintino, “Strict hierarchy between parallel, sequential, and indefinite-causal-order strategies for channel discrimination,” *Phys. Rev. Lett.*, vol. 127, p. 200504, Nov. 2021.
- [12] S. Nahar, D. Tupkary, Y. Zhao, N. Lütkenhaus, and E. Y.-Z. Tan, “Postselection technique for optical quantum key distribution with improved de Finetti reductions,” *PRX Quantum*, vol. 5, no. 040315, 2024.
- [13] M. Tomamichel and M. Hayashi, “A hierarchy of information quantities for finite block length analysis of quantum tasks,” *IEEE Transactions on Information Theory*, vol. 59, pp. 7693–7710, Nov. 2013.
- [14] N. Datta, M. Mosonyi, M.-H. Hsieh, and F. G. S. L. Brandão, “A smooth entropy approach to quantum hypothesis testing and the classical capacity of quantum channels,” *IEEE Trans. Inf. Theory*, vol. 59, no. 12, pp. 8014–8026, 2013.
- [15] B. Regula, L. Lami, and N. Datta, “Tight relations and equivalences between smooth relative entropies,” *IEEE Trans. Inf. Theory*, vol. 72, no. 5, pp. 3051–3073, 2026.
- [16] G. Chiribella and D. Ebler, “Optimal quantum networks and one-shot entropies,” *New J. Phys.*, vol. 18, no. 093053, Sep. 2016.
- [17] G. Chiribella, G. M. D'Ariano, and P. Perinotti, “Theoretical framework for quantum networks,” *Phys. Rev. A*, vol. 80, no. 022339, 2009.
- [18] M. M. Wilde, A. Winter, and D. Yang, “Strong converse for the classical capacity of entanglement-breaking and Hadamard channels via a sandwiched Rényi relative entropy,” *Commun. Math. Phys.*, vol. 331, no. 2, pp. 593–622, 2014.
- [19] M. Müller-Lennert, F. Dupuis, O. Szechr, S. Fehr, and M. Tomamichel, “On quantum Rényi entropies: A new generalization and some properties,” *J. Math. Phys.*, vol. 54, p. 122203, 2013.
- [20] S. Beigi, “Sandwiched Rényi divergence satisfies data processing inequality,” *J. Math. Phys.*, vol. 54, p. 122202, 2013.
- [21] R. L. Frank and E. H. Lieb, “Monotonicity of a relative Rényi entropy,” *J. Math. Phys.*, vol. 54, p. 122201, 2013.
- [22] L. Lami and B. Regula, “Private communication.” 2026.

- [23] M. Gao, Z. Ji, and C. Liu, “Quantum channel Stein's lemma with an exponential strong converse.” 2026.