

格点 Anderson-Bernoulli 模型在任意维下 谱边缘附近的定域化

Localization near the edge for the lattice Anderson-Bernoulli model on general dimension

Linjun Li¹ Shihe Liu² Lingfu Zhang³

¹ 美国宾夕法尼亚大学数学系 (费城)

² 北京大学数学科学学院 (中国北京)

³ 美国加州理工学院物理、数学与天文学部 (帕萨迪纳)

谨以此文纪念 Jean Bourgain 教授

摘要

安德森紧束缚模型是描述无序介质中量子输运与定域化的基本模型。Bourgain 与 Kenig 曾把伯努利势情形留作公开问题, 本文把它补上: 对任意维数 $d \geq 2$, 带伯努利势的格点安德森模型在谱的下边缘附近满足安德森定域化。证明沿用 Fröhlich-Spencer 与 Bourgain-Kenig 的多尺度框架, 其中的主要新成分是一个针对离散薛定谔方程的**概率型离散唯一延拓原理**(PDUC)。这一 PDUC 由自举 (bootstrap) 论证建立, 关键的一步是一条概率引理, 其证法是把随机势自适应地逐格揭示出来。

1 引言

1.1 主要结果与背景

安德森紧束缚模型 (Anderson tight-binding model) 是描述波在无序介质中传播与电子传导的基本量子力学框架, 其典型例子是掺有杂质的金属 [1]。本文考虑势为伯努利型的情形, 即安德森-伯努利模型 (Anderson-Bernoulli model, ABM): 它是 $\ell^2(\mathbb{Z}^d)$ 上的随机薛定谔算子

$$H = -\Delta + \lambda V, \quad \lambda > 0 \quad (1.1)$$

其中 Δ 是离散拉普拉斯算子,

$$(\Delta u)(x) = \sum_{y: |y-x|=1} (u(y) - u(x)), \quad x \in \mathbb{Z}^d \quad (1.2)$$

而 V 是乘法算子 $(Vu)(x) = V_x u(x)$ 。¹ 随机变量 V_x ($x \in \mathbb{Z}^d$) 独立同分布, 且

$$\mathbb{P}(V_x = 0) = \mathbb{P}(V_x = 1) = 1/2, \quad \forall x \in \mathbb{Z}^d \quad (1.3)$$

参数 λ 通常称为无序强度 (disorder strength)。

安德森模型的核心现象是所谓的安德森定域化 (Anderson localization): 波被无序困住。要用数学语言表述它, 先回顾: 几乎必然地, H 的谱是确定的集合 [2, 定理 3.9]

$$\text{Spec}(H) = [0, 4d] \cup [\lambda, \lambda + 4d] \quad (1.4)$$

对安德森定域化, 既可以从谱的性质来刻画, 也可以从波包的长时间行为来刻画。给定能量区间 $I \subset \text{Spec}(H)$, 谱定域化 (spectral localization, SL) 是指 H 在 I 内具有纯点谱, 且本征函数指数衰减。动力学定域化 (dynamical localization, DL) 则是指: 把波包限制在 I 内时, 其空间矩关于时间一致有界, 从而在空间上不会扩散。由 RAGE 定理, 这样的动力学界蕴含纯点谱, 见 [2, 定理 7.14]。本征函数的指数衰减则由下文的多尺度估计推出。

本文的主定理在谱的下边缘附近建立谱定域化以及一种强动力学定域化 (strong dynamical localization, SDL), 其矩界取期望的形式, 与 [3], [4] 相同。陈述之前先约定记号: 设 $P_{H(I)} = \mathbb{1}_{I(H)}$ 为到 I 上的谱投影, δ_0 为原点处的标准基向量, 并对任意 $q > 0$ 以 $\langle X \rangle^q$ 表示乘以 $(1 + |x|^2)^{q/2}$ 的乘法算子。

定理 1.1. 对每个 $d \geq 4$, 存在 $p_0 = p_0(d) > 0$, 使得对每个 $\lambda > 0$, 都存在 $E_{\text{star}} = E_{\text{star}(d, \lambda)} \in (0, 4d)$, 满足下述性质。对形如 (1.1) 的算子 H 、每个 $b > 0$ 以及每个 $0 < s < p_0/(b + 1/2)$,

$$\mathbb{E} \left[\sup_{t \in \mathbb{R}} \left\| \langle X \rangle^{bd} e^{-itH} P_{H([0, E_{\text{star}}])} \delta_0 \right\|_{\ell^2(\mathbb{Z}^d)}^s \right] < \infty$$

此外, 几乎必然地, H 在 $[0, E_{\text{star}}]$ 上具有纯点谱, 且任一特征值落在 $[0, E_{\text{star}}]$ 中的本征函数在空间上指数衰减。

¹ 本文之中, $|\cdot|$ 一律表示欧氏距离。

有几点需要说明。其一，在本文之前，ABM 的安德森定域化已在 $d = 1$ [5]、 $d = 2$ [6] 与 $d = 3$ [7] 中被建立。而本文的证明适用于一切维数 $d \geq 2$ 。

其二，动力学界中的参数 p_0 由多尺度分析中的概率指数决定。Rangamani 与 Zhu [4, 定义 1 与定理 1] 用失败概率 $L^{-p_0 d}$ 来规范化这个指数；据此，定理 4.4 中的界 $R^{-\kappa_{\text{star}}}$ 对应于规范化后的指数 κ_{star}/d 。这里只断言存在正的 $p_0(d)$ 。

其三，本文的结果还可推广到 V 为独立同分布的 Bernoulli(p) 随机变量， $p \in (0, 1)$ 任意。再结合 [3], [8] 中的伯努利分解，就得到：对任何非退化、紧支撑的单格点分布所生成的独立同分布势，谱下边缘附近都有定域化。此外，借助本文建立的离散唯一延拓，[9, 定理 1.3] 中分层 ABM 定域化问题所需的条件 $\alpha > N$ 也可以去掉。

下面回顾安德森模型的相关工作，尤其是朝 ABM 定域化推进的进展。

相图、早期工作与正则性假设。 先来看势为一般独立同分布情形的安德森模型。预期的相图是： $d = 1, 2$ 时整个谱都处于定域化相； $d \geq 3$ 时，弱无序应在谱的内部产生游离化 (delocalization)、在谱的边缘附近产生定域化，二者之间的过渡能量称为迁移率边 (mobility edge)，而足够强 (且势的分布足够正则) 的无序预期仍使整个谱定域化。围绕定域化、游离化与相变这一类问题，人们还研究了许多相关模型，例如图上的安德森模型 (树、稀疏随机图、条带)、随机带状矩阵，以及 Manhattan pinball 与 Lorentz 镜这类经典轨道模型 [10], [11], [12], [13], [14], [15], [16], [17], [18], [19], [20], [21], [22], [23], [24], [25], [26], [27], [28], [29], [30], [31], [32]。然而就格点上的安德森模型而言，严格的结果大体只确立了这一图像中定域化的那一部分。

一维情形的定域化图像已基本完整。在 [33], [34] 早年的连续与格点结果之后，Carmona、Klein 与 Martinelli [5] 对非退化的独立同分布势 V (只需某正阶矩有限，伯努利分布包含在内) 建立了整个谱上的谱定域化。这里利用的一维模型的关键特征，是可以把它化为转移矩阵的乘积。近来的其他证法可见 [35], [36]。此外，一些相关的一维模型也已知定域化：例如 [37] 处理带伯努利分布的连续空间算子 (模拟合金)，[38] 处理带有有理跳跃符号的长程模型。

$d \geq 2$ 时的结果就少得多了。一个核心思路是 Fröhlich 与 Spencer [39] 引入的多尺度分析 (multi-scale analysis, MSA)。随后他们与 Martinelli、Scoppola 一起证明：对具有有界概率密度的独立同分布随机势，大无序以及谱边缘附近都有定域化 [40]。Carmona、Klein 与 Martinelli [5] 把这些结果推广到分布函数 Hölder 连续的情形。另一条路是 Aizenman 与 Molchanov [41] 的分数矩方法，它同样要求单格点分布具有正则性。

去掉这些正则性假设，既有物理上的动机，也源于安德森定域化预期的普适性。在置换合金模型中，势自然只取有限多个值，对应于各组分原子的种类；二元合金给出的正是伯努利势。更广泛地说，物理学家把安德森定域化视为普适现象：定域化相的存在应当与单格点分布的具体形式无关。因此 ABM 正是检验这一普适性的天然对象。

ABM 在 $d \geq 2$ 的框架。 在 ABM 的定域化方面，Bourgain [42] 发展出一套多尺度框架，把 1980 年代的方法大幅推进。其中的关键创新包括：在整个迭代过程中保留自由格点，并用 Sperner 定理控制特征值的聚集。在开创性的工作中，Bourgain 与 Kenig [43] 进一步发展这一方法，证明了 $\mathbb{R}^d$ ($d \geq 2$) 上连续 ABM 在谱下边缘附近的定域化。其论证充分利用了连续统的设定：量化唯一延拓原理给出本征函数质量的正下界，从而给出自由格点处特征值变化的下界；连续统情形的更多结果见 [44]。Germinet 与 Klein [3] 随后把这一框架推广开，对单格点分布为任意非退化、紧支撑的连续安德森模型建立了谱下边缘附近的强形式定域化。

离散唯一延拓。 [43] 首先揭示出定域化问题与唯一延拓原理之间存在深刻联系： $\mathbb{R}^d$ 上连续 ABM 在谱边缘附近的定域化，正是借助 $\mathbb{R}^d$ 上的量化唯一延拓原理建立的 ([43, 引理 3.10])。要把 Bourgain–Kenig 框架用于标准格点上的 ABM，所需的关键构件是一个合适的离散唯一延拓原理 (discrete unique continuation, DUC)。然而连续统情形的类比在格点上直接失效：Jitomirskaya 的反例见 [45, 定理 2]；解具有低维支撑的构造另见 [46]。Ding 与 Smart [6] 取得突破，他们证明：只要一个较弱的估计——控制本征函数定量非零的格点个数——再配上推广的 Sperner 定理，就足以推出定域化。他们还说明如何把这一估计的概率版本用于多尺度分析，并在 $\mathbb{Z}^2$ 上把它建立起来，其灵感来自 Buhovsky、Logunov、Malinnikova 与 Sodin 处理离散调和函数的多项式方法 [47]。由此得到二维 ABM 在谱边缘附近的定域化。Li [48] 接着证明：对 $\mathbb{Z}^2$ 上的对称伯努利模型，在大无序下，除有限多个例外能量的邻域之外都有定域化。

不过，要把这些想法推广到二维以上一直很困难。[47] 所用的多项式结构是平面格点特有的，而 Ding 与 Smart 的随机传播论证利用的是二维中细而倾斜的矩形的几何。Bou-Rabee、Cooperman 与 Ganguly [49] 后来给出的几何证明把调和函数的唯一延拓结果推广到平面周期图，同样依赖平面性，并不能直接给

出高维的替代物。下一次进展来自 Li 与 Zhang [7], 他们用适用于任意有界势的确定性 DUC 证明了 $\mathbb{Z}^3$ 上谱边缘的定域化。其证明利用金字塔与四面体的几何, 把关键估计化归到二维三角格点上, 那里近似的多项式结构与 Remez 不等式都可以用上。Hurtado [50], [51] 进一步把二维与三维谱下边缘附近的定域化推广到相互独立、但不必同分布的一致有界势。除了上述工作, 还有 Imbrie [52]: 他证明了 $\mathbb{Z}^d$ 上单格点分布取 N 个值 (N 充分大) 的安德森模型在大无序下定域化。

近来高维 DUC 又有若干进展。Krymskii [53] 对离散薛定谔方程非平凡解的支撑维数给出了下界, 该下界随环境维数对数增长。Liu、Shi 与 Zhang [9] 走概率路线, 证明对每个给定的初始数据, 解定量非零的格点个数有满维数量级的下界。其估计中的例外事件依赖于该初始数据, [9, 问题 2.7] 则要求一个对所有初始数据同时成立的事件。在确定性一侧, Li [46] 对有限格点方块上的支撑基数证明了降维原理, 在四维给出几乎 sharp 的界。Li [54] 继而利用 Pascal 不确定性原理, 对满足有向单纯形关系的函数建立了 sharp 的支撑基数界, 并构造出达到该增长指数的例子。Liu、Shi 与 Zhang [55] 把 Li 的方法作定量推广, 在单纯形上得到相应的大值估计, 且在定义关系带有小误差时仍然成立。

1.2 证明策略

证明沿用 [6], [7], [39], [40], [42], [43] 发展的多尺度框架。如前所述, 所需要的新输入主要是 DUC 的一个版本。更确切地说, 记 $Q_R = [-R, R]^d \cap \mathbb{Z}^d$ 。由 [6] 的推广 Sperner 论证所要求的 DUC, 是形如

$$|\{x \in Q_R : |u(x)| \geq e^{-CR^\alpha} |u(0)|\}| \geq cR^\beta \quad (1.5)$$

的估计, 其中 $u: \mathbb{Z}^d \rightarrow \mathbb{C}$ 对某个 E 满足 $Hu = Eu$, 而势 V 是任意给定的有界确定性函数。这里的指数 α 与 β 必须满足

$$\alpha(\alpha - 1) < \beta/d - 1/2, \quad \alpha \geq 1$$

另见 [55]。特别地, 若取 $\beta = d$, 就需要 $\alpha < (1 + \sqrt{3})/2$, 这恰好是 [43, 第 5 节] 的注记中指出的阈值。

[45], [46] 的稀疏解迫使 $\beta \leq [d/2]$, 于是 (1.5) 在偶数维根本不可能成立; 在奇数维也只留下 α 靠近 1 的一个很窄的范围。事实上, 此前它只在三维被证明, 取 $\alpha = 1$ 、 $\beta > 3/2$ [7, 定理 1.3], 由此得到三维 ABM 的定域化。上文讨论的那些确定性 DUC 结果, 都还没有给出 (1.5) 所要求的估计。最近的 [55] 则对 $\alpha = 2$ 、 $\beta = [d/2]$ 证明了 (1.5); 这仍不满足上面的条件, 因此这些估计无法为高维定域化提供所需的定量界。

本文转而证明一个取 $\alpha = 1$ 、计数为 $R^{d-o(1)}$ 量级的概率型离散唯一延拓原理 (probabilistic discrete unique continuation, PDUC)。更确切地说, 在某个紧区间 I 中固定能量 E_0 , 再固定增长常数 $K \geq 0$, 并记 $\gamma = (d-1)/d$ 。略去关于自由格点的若干讨论, 下面的定理 3.2 本质上断言: 存在一个概率至少为

$$1 - e^{-c(R/\log R)^\gamma}$$

的事件, 在其上每个非零的局部解 $u: Q_R \rightarrow \mathbb{C}$ ——它在 Q_{R-1} 上满足 $Hu = Eu$, 并且

$$E \in I, \quad |E - E_0| \leq e^{-aR}, \quad \|u\|_{\infty, Q_R} \leq e^{KR} |u(0)|$$

——都有

$$|\{x \in Q_R : |u(x)| \geq e^{-CR} |u(0)|\}| \geq cR^d / (\log R)^d = R^{d-o(1)}$$

其中常数 $a, C, c > 0$ 依赖于事先固定的参数。对充分大的 R , 这就给出 (1.5) 中任取的 $\beta < d$ 。要点在于: 这个事件对所有这些解同时成立; 作为对照, 只在某个固定边界条件下成立的 PDUC 见 [9]。

自举论证。 这里的主要策略是对大值的个数作自举 (bootstrap)。锥性质 (见 [7, 第 2 节] 或下面的命题 3.4) 先给出 $R^{1-o(1)}$ 个大值作为初始集合。把 u 归一化为 $u(0) = 1$, 并假设在内层立方体 Q_r 中有一个集合

$$S = \{x \in Q_r : |u(x)| \geq e^{-CR}\}$$

取 r 为 R 的一个较小的固定倍数, 以便在 $Q_R \setminus Q_r$ 中为下面的构造留出空间。目标是产生许多超过更小阈值的大值, 使得

$$S' = \{x \in Q_R : |u(x)| \geq e^{-C'R}\}, \quad C' > C$$

的规模达到 $R|S|^\gamma$ 量级, 其中 $\gamma = (d-1)/d$ 。这两个因子来源很简单: 几何给出 $|S|^\gamma$ 量级的源线, 随机传播则在每条成功的线上给出 R 量级的大目标值。

对于第一个因子, 引理 3.10 (其基础是离散的 Loomis-Whitney 不等式) 给出方向集合

$$\mathcal{V} = \{e_1 + e_2, e_1 - e_2, e_1 + e_3, \dots, e_1 + e_d\}$$

中的一个方向, 使至少有 $(|S|/2)^\gamma$ 条平行格线与 S 相交。由对称性, 考虑 $\nu = e_1 + e_2$, 把这些线写成

$$L(\kappa, \zeta) = \{(\kappa + a, a, \zeta) : a \in \mathbb{Z}\}, \quad \zeta \in \mathbb{Z}^{d-2}$$

把所有与 Q_r 相交的这样的线排出来：先按 κ 递增，再按 ζ 的字典序。它们与 Q_r 的交集就是诸源块 $\mathcal{J}_f$ ；与 S 相交的块称为大块。对位于 $L(\kappa_f, \zeta_f)$ 上的那个块，把它的目标集 $\mathcal{K}_f$ 放在平移后的直线 $L(\kappa_f + 1, \zeta_f)$ 上、 Q_r 的前向出口之外。每个块可以选出 R 量级的目标点，使所有目标点互不相同且都含于 Q_R 。这正是下面构造 3.8 中的源-目标几何。

为了把源值与目标值看成同一组初始数据的函数，使用碗形边界

$$\mathfrak{B} = T_s = (\{-s-1, -s\} \times \Omega_\Sigma) \cup (\{-s, \dots, s-1\} \times \partial^+ \Omega_\Sigma)$$

其中 $\Omega_\Sigma = [-s, s]^{d-1} \cap \mathbb{Z}^{d-1}$ ，而

$$\partial^+ \Omega_\Sigma = \{z \in \mathbb{Z}^{d-1} \setminus \Omega_\Sigma : \exists z' \in \Omega_\Sigma \text{ 使得 } |z - z'|_1 = 1\}$$

这里 s 取为 R 的某个合适的固定倍数，满足 $r < s < R$ 。在给定 $u|_{\mathfrak{B}}$ 之后， Q_s 内部的薛定谔方程可以沿 e_1 方向传播边值数据来求解。因此，只要把所有源集与目标集都取在立方体 Q_s 之内，一旦势给定，一切源值与目标值都是边值数据 $u|_{\mathfrak{B}}$ 的线性函数，其系数关于 R 至多为指数增长。

现在暂且事先固定边值数据，并对 Q_r 之外的势取条件。对指标为 f 的块，用 $S_{f,j}$ 与 $Y_{f,k}$ 表示重构出的源值与目标值，见下面的定义 2.1。块的排序保证：第 f 块中的源只依赖于更早的块，而它的目标只依赖于更早的块以及第 f 块自身。把某个源上的伯努利位由 0 改成 1，就得到精确恒等式

$$Y_{f,k}^1 - Y_{f,k}^0 = \pm \lambda S_{f,j}$$

该块的每个目标都满足此式。于是，只要 $|S_{f,j}| \geq \delta$ ，总可以选取这个位，使至少一半目标的模不小于 $\lambda\delta/2$ 。再把块中其余的位揭示出来，这个选取成功的概率仍至少为 $1/2$ 。按顺序逐块处理，就得到一个条件成功估计；再用指数上鞅控制未成功的大块个数。对固定的边值数据而言，这便解释了放大 $|S| \mapsto R|S|^\gamma$ 。

对边值数据一致：碗的选取与传播引理。以上说明的是：在给定边值数据 $u|_{\mathfrak{B}}$ 之下，大值能以高概率从源块 $\mathcal{J}_f$ 传播到目标集 $\mathcal{K}_f$ 。像 [9] 那样只对抽样之前就固定的输入成立的估计，无法直接用于在势已知之后才选定的本征函数。因此主要困难在于让这一概率估计对边值数据一致成立。我们用两步归约来克服它。

第一步，让碗的半径在一整段长度与 R 可比的范围上变动。选取间隔适当的诸半径，就得到 R 量级条两两不交的碗形边界，而每一条都重构出同样的源格点与目标格点。由于 S' 统计的是 Q_R 中一切超过新阈值的大值，这些边界中必有一条满足

$$\mathcal{A} = \mathfrak{B} \cap S', \quad p = |\mathcal{A}| \lesssim |S'|/R$$

倘若每条边界上都有许多大值，所要的 $|S'|$ 下界便已经成立。否则就只保留数据 $v = u|_{\mathcal{A}} \in \mathbb{C}^p$ ，而把其余边值置为零。把阈值适当分离之后，重构误差就小于传播所产生的目标值。于是相关的输入维数归约为 p 。

第二步，借助关键的传播引理（即下面的引理 2.4）把这 p 个输入坐标上的传播做成一致的。要得到一个对所有输入 v 都成立的事件，本质上需要做一次并界估计，而标准的取足够细的网的论证在此代价太大。我们的办法是用截断程序产生的记录 (record) 对输入分类。具体说，固定一个势的实现与一个输入 v ，按既定顺序扫描各个源块与目标集。每当某个泛函在 v 上取值很小、但它在当前输入体上的宽度很大，就用该泛函取小值的条带把输入体截去一块。把这些截断所在标签按顺序排成的表，称为该势实现之下输入的“记录”。每次截断都保留输入与一个公共小球，同时使体积缩小。体积比较可把截断次数控制在一个预算 m 之内，而对本节所考虑的单尺度参数， m 为 p 的量级。设有 N 个源与目标标签，则可能的记录至多有 $(N+1)^m$ 个。

现在对每个给定的记录（即一系列截断标签），条件成功论证给出其传播损失具有 e^{-t} 形式的指数尾，尾参数 $t \geq 0$ ，且与产生该记录的输入 v 无关。于是关键的并界为

$$\mathbb{P}[\text{至少有一个记录违反其传播界}] \leq (N+1)^m e^{-t}$$

每个可能的输入 v 都被某个记录覆盖，所以由此得到的估计对一切输入同时成立。由于 N 关于 R 多项式增长，只要 t 至少为 $p \log R$ 的量级，上式右端便可任意小。把这一项与其余各项误差一起计入，就得到所求的一步增益

$$|S'| \geq R^{1-o(1)} |S|^\gamma$$

最后重复这一放大过程。若 $|S| = R^\beta$ ，一步便把指数提升到 $1 + \gamma\beta - o(1)$ 。忽略那些趋于零的损失，指数依次变化

$$1 \mapsto 1 + \gamma \mapsto 1 + \gamma + \gamma^2 \mapsto \dots \longrightarrow 1/(1 - \gamma) = d$$

反复论证直到剩余的指数亏损趋于零，就得到 $R^{d-o(1)}$ 个大值。详细证明对各尺度与阈值作了协调，使振幅上的总损失保持为 e^{-CR} ，并得到前述更精细的计数 $cR^d/(\log R)^d$ 。由此得到的一致 PDUC 估计，为第 4 节中秩一扰动与推广的 Sperner 论证提供本征函数界，进而给出 Wegner 估计，封闭谱下边缘附近的多尺度归纳，最终得到定域化。

1.3 关于 AI 使用的说明

本证明是作者们与大语言模型 (Large Language Model, LLM) 之间持续、高度交互式讨论的产物。作者在 ABM 及相关问题上的经验使他们预期：格点上的组合结构——例如 [7] 中的金字塔——将在建立所需的 DUC 或 PDUC 中起核心作用。这正是他们请 LLM 帮助识别并探索此类结构的动机。作者把握研究的方向，LLM 则参与探索可能的进路、并发现若干中间结果的证明。在这一反复迭代的过程中，作者们检验并改进了所提出的论证，并随着研究的推进不断深化对整个证明的理解。论文中的证明由作者消化并撰写；LLM 用于改善文字表述、文献综述以及生成插图。数学内容与正确性由作者负全责。

我们研究的大致脉络如下。在 LLM 的协助下，我们试图建立形如 (1.5) 的合适 DUC。

- 最初，沿 [6], [7], [47] 的单纯形结构，我们想证明一个确定性 DUC。这导向支撑版本的结果 [54] 及其相应的定量版本 [55]。
- 在看出确定性结果已经 sharp、不足以支撑定域化论证之后，我们把注意力转向 DUC 的概率版本。仍然利用单纯形结构、并继续借助 LLM，这一进路所能得到的最强界是 $a = (1 + \sqrt{3})/2$ 、 $b \sim (3/4)d$ ，但对定域化论证仍不够。
- 关键突破来自我们独立引入的极大值条件

$$|u(0)| \geq e^{-KR^2} \|u\|_{\infty, Q_R}$$

并在该条件下改用 [9] 中的相关结构（而非单纯形结构），从而得到 $a = 2$ 、 $b = d -$ 的概率型 DUC。

- 最后，在理解并综合相关事实与进展之后，我们独立地意识到概率型 DUC 可以改进到 $a = 1$ 、 $b = d -$ ，最终得到本文所给出的 DUC 结果。

余文安排。第 2 节引入一个概率系统，称为线性鞅系统 (linear-martingale system)，它对薛定谔方程解的传播给出抽象描述，并在这一系统的语言下证明传播引理。第 3 节按上述自举策略建立关键的 PDUC。第 4 节把 PDUC 输入已有的框架，得到 Wegner 估计并实施多尺度分析，从而推出定域化。最后是附录 A：以 [7], [55] 的确定性 DUC 作为自举的输入，把 PDUC 强化为关于无序强度 λ 与能量 E 一致的版本。我们把这个更强的 PDUC 作为具有独立意义的结果记录下来，它并不用于定域化结果（定理 1.1）的证明。

致谢。LZ 得到 NSF 项目 DMS-2505625 与 Sloan 研究奖学金的资助。SL 现为北京大学博士生，在 Zhifei Zhang 指导下研究本问题，受 NSFC (12288101) 资助。LL 早在宾夕法尼亚大学攻读博士期间开始研究本问题；文中所署宾夕法尼亚大学，是本工作启动、并有相当一部分得以完成的机构。作者们感谢 Yunfeng Shi 对本项目持续的关注与支持，以及许多有益的建议。LL 与 LZ 感谢 Jian Ding 将他们引入这一课题并给予持续支持，也感谢 Charles Smart 的有益讨论。SL 感谢 Zhifei Zhang 在整个工作中的指导与一贯的鼓励。LZ 多年来与 Ahmed Bou-Rabee、Carlos Kenig、Eugenia Malinnikova、Hong Wang 与 Ruixiang Zhang 就本问题有过多次有价值的讨论，谨此致谢。

2 线性鞅系统

本节引入一个抽象的线性结构，用来刻画解逐层传播的过程，为第 3 节研究离散唯一延拓 (discrete unique continuation) 作准备。这一结构的由来，可参看下文构造 3.8。我们注意到，从某种意义上讲，它与 [9, 附录 A] 中的位点混合鞅 (site-mixed martingale) 颇为相像。

定义 2.1。取定整数 $n_{\text{blk}} \geq 1$ ，并对指标 $1 \leq f \leq n_{\text{blk}}$ 各取定整数 $r_f, b_f \geq 1$ 。对每个 $1 \leq f \leq n_{\text{blk}}$ ，令

$$\mathcal{J}_f = \{(f, j) : 1 \leq j \leq r_f\},$$

称它为第 f 个**源块** (source block)。给每个源块 $\mathcal{J}_f$ 配上一个**目标集** (target set)

$$\mathcal{K}_f = \{(f, k)_{\text{tag}} : 1 \leq k \leq b_f\},$$

其中的每个元素 $(f, k)_{\text{tag}}$ 都称为一个**目标** (target)。把成对的这两类对象打包在一起，记作

$$\mathcal{M} = \{(\mathcal{J}_f, \mathcal{K}_f) : 1 \leq f \leq n_{\text{blk}}\}.$$

设 $p \geq 1$ 是整数， $c_0 > 0$ 与 $C_0 > 0$ 是给定的常数， $K \subset \mathbb{C}^p$ ，而 $(\Omega, \mathbb{P})$ 是一个概率空间。若 $\mathcal{M}$ 具有下面各条性质，就称它是概率空间 $(\Omega, \mathbb{P})$ 上以 K 为**输入体** (input body) 的 (c_0, C_0) -**线性鞅系统** (linear-martingale system)。

(1) **位与字。**对每个 $1 \leq f \leq n_{\text{blk}}$ 和每个 $(f, j) \in \mathcal{J}_f$ ，各配有 $(\Omega, \mathbb{P})$ 上一列独立同分布 (i.i.d.) 随机变量 $\omega_{f,j}$ ，其共同分布为

$$\mathbb{P}(\omega_{f,j} = 0) = \mathbb{P}(\omega_{f,j} = 1) = \frac{1}{2}, \quad 1 \leq f \leq n_{\text{blk}}, (f, j) \in \mathcal{J}_f.$$

等价地，若记

$$\mathcal{J} = \bigcup_{f=1}^{n_{\text{blk}}} \mathcal{J}_f,$$

便可把 Ω 看成

$$\{0, 1\}^{\mathcal{J}}$$

，把 $\mathbb{P}$ 看成布尔立方体 Ω 上的均匀分布。

称随机变量 $\omega_{f,j}$ 为**位** (bit)，称 $\omega_f = (\omega_{f,1}, \dots, \omega_{f,r_f})$ 为源块 $\mathcal{J}_f$ 的**位串** (bit sequence)。一个完整配置 $\omega \in \Omega$ 称为一个**字** (word)。记

$$\omega_{<f} = (\omega_1, \omega_2, \dots, \omega_{f-1}),$$

$$\omega_{\leq f} = (\omega_1, \omega_2, \dots, \omega_f),$$

为字 ω 限制在相应指标集上所得到的部分，并由

$$F_0 = \{\emptyset, \Omega\}, \quad F_f = \sigma(\omega_{\leq f}), \quad 1 \leq f \leq n_{\text{blk}},$$

得到一列 σ -代数，它们构成滤子 (filtration)。

(2) **输入、源、汇与扇**。一个**输入** (input) 是向量 $v = (v_1, \dots, v_p) \in K$ ，它用来决定与系统 $\mathcal{M}$ 相联系的若干复线性泛函的取值。给 $\mathcal{J}$ 的每个元素 (f, j) (以及每个目标 $(f, k)_{\text{tag}}$) 各配上一个关于 v 的复线性泛函：元素 (f, j) 配**源** (source) $S_{f,j}$ ，目标 (f, k) 配**汇** (sink) $Y_{f,k}$ 。它们可以写成

$$S_{f,j}(\omega_{<f}; v) = \sum_{\nu=1}^p s_{f,j,\nu}(\omega_{<f}) v_{\nu}, \quad 1 \leq j \leq r_f, \quad (2.1)$$

$$Y_{f,k}(\omega_{\leq f}; v) = \sum_{\nu=1}^p y_{f,k,\nu}(\omega_{\leq f}) v_{\nu}, \quad 1 \leq k \leq b_f. \quad (2.2)$$

上面两式说明，源 $S_{f,j}$ (连同它的系数 $s_{f,j,\nu}$) 只依赖于 $\omega_{<f}$ ，即是 F_{f-1} -可测的。特别地，当 $f=1$ 时，源 $S_{1,j}(v)$ 只依赖于空字，也就是说它们与 ω 无关，是完全确定的。类似地，汇 $Y_{f,k}$ 连同它的系数 $y_{f,k,\nu}$ 只依赖于 $\omega_{\leq f}$ ，是 F_f -可测的。把汇按次序排成

$$(Y_{f,1}(\omega_{\leq f}; \cdot), \dots, Y_{f,b_f}(\omega_{\leq f}; \cdot)),$$

称它为源块 f 的**扇** (fan)。图 1 是其示意。

(3) **带 c_0 的传播条件**。固定 $(f, j) \in \mathcal{J}$ 和一个配置

$$\hat{\omega}_{f,j} = (\omega_{<f}, (\omega_{f,h})_{h \neq j}).$$

对 $e \in \{0, 1\}$ ，由于 $Y_{f,k}$ 只依赖于 $\omega_{\leq f} = (\hat{\omega}_{f,j}, \omega_{f,j})$ ，可记 $Y_{f,k}^{(e)}(\hat{\omega}_{f,j}; \cdot)$ 为如下所得的目标形式：令 $\omega_{f,j} = e$ ，而保持 $\omega_{\leq f}$ 中其余各位不动。对每个这样的配置 $\hat{\omega}_{f,j}$ 和每个目标 $(f, k)_{\text{tag}}$ ，都存在一个与 v 无关的标量 $c_{f,j,k}(\hat{\omega}_{f,j})$ ，使得

$$Y_{f,k}^{(1)}(\hat{\omega}_{f,j}; v) - Y_{f,k}^{(0)}(\hat{\omega}_{f,j}; v) = c_{f,j,k}(\hat{\omega}_{f,j}) S_{f,j}(\omega_{<f}; v), \quad |c_{f,j,k}(\hat{\omega}_{f,j})| \geq c_0. \quad (2.3)$$




图 1 二维实输入体 K 的示意，图中还标出一个输入 v 以及同一扇中的三个目标形式。彩色直线表示非零实线性汇的核。至于复的情形，只需取实部或虚部，就能由实情形的示意图得到近似的理解。




图2 引理 2.3 中估计的示意。

其中的等式是复线性泛函之间的恒等式：它对每个 $v \in K$ 都成立。

(4) **带 C_0 的一致系数界。** 把 (2.1) 与 (2.2) 中相应的系数行分别记作 $s_{f,j}$ 与 $y_{f,k}$ （它们确实是 $\mathbb{C}^p$ 中的向量），并要求它们的 ℓ^2 范数由 C_0 确定地界住，即

$$\sup_{\omega \in \Omega} \max_{f,j} \|s_{f,j}(\omega_{\leq f})\|_2 \leq C_0, \quad \sup_{\omega \in \Omega} \max_{(f,k)_{\text{tag}}} \|y_{f,k}(\omega_{\leq f})\|_2 \leq C_0. \quad (2.4)$$

注记 2.2。 所有源块、源块的先后次序、各个目标以及系数映射，都是在字（也就是随机性）被揭示之前就已固定好的。在第 3 节中，我们将在目标与 $\mathbb{Z}^d$ 的一些格点之间建立一一对应，这些对应同样在字被揭示之前就固定下来。

2.1 被条带截去的凸集体积估计

若集合 $K \subset \mathbb{C}^p$ 满足 $e^{i\theta}K = K$ 对每个 $\theta \in \mathbb{R}$ 都成立，就称它是**平衡的**（circled）。用 vol_{2p} 表示 $\mathbb{C}^p \simeq \mathbb{R}^{2p}$ 上的 Lebesgue 体积，并用

$$B_\rho = \{w \in \mathbb{C}^p : \|w\|_2 \leq \rho\}$$

记 $\mathbb{C}^p$ 中的闭欧氏球。若 K 紧且 $L : \mathbb{C}^p \rightarrow \mathbb{C}$ 复线性，则定义 K 在 L 下的**宽度**为

$$w_{K(L)} = \max_{v \in K} |L(v)|. \quad (2.5)$$

下面这条引理估计线性映射系统的输入体 K 被一条条带截去一部分时体积的变化。这样的截割会出现在下述情形： K 在某个源之下具有较大的宽度，而实际的输入却让该源取值很小，于是我们既能从 K 中切去相当大的一块，又能把真正的输入保留在余下的部分里。引理所要估计的，正是这一过程中的体积损失；图 2 是其示意。

引理 2.3。 设 $p \geq 1$ ， $K \subset \mathbb{C}^p$ 是有非空内部的紧凸平衡集， L 是非零复线性泛函。则对每个 $\tau > 0$ ，

$$\frac{\text{vol}_{2p}(K \cap \{|L| \leq \tau\})}{\text{vol}_{2p}(K)} \leq p(2p-1) \left(\frac{\tau}{w_{K(L)}} \right)^2. \quad (2.6)$$

证明。 记 $r = w_{K(L)} > 0$ 。当 $p = 1$ 时， K 是以原点为圆心的圆盘，可写成

$$K = \{|z| \leq r_K\},$$

其中 r_K 是某个正数；而 L 可写成

$$L(v) = z_0 v, \quad \forall v \in \mathbb{C},$$

其中的 z_0 是某个非零复数。于是 $r = |z_0| r_K$ ，且 (2.6) 的左端等于

$$\frac{\min\left(r_K^2, \frac{\tau^2}{|z_0|^2}\right)}{r_K^2} = \min\left(1, \frac{\tau^2}{r^2}\right).$$

故 $p = 1$ 时 (2.6) 成立。下设 $p \geq 2$ ，并令 $m = 2p - 2$ 。取复线性坐标 $(z, y) \in \mathbb{C} \times \mathbb{C}^{p-1}$ ，使 $z = L(v)$ ，再定义

$$K_z = \{y : (z, y) \in K\}, \quad f(z) = \text{vol}_m(K_z).$$

在这一坐标变换下，恒定的 Jacobi 行列式在体积比——也就是 (2.6) 的左端——中相互抵消。 K 的凸性与平衡性经此变换仍然保持，并给出 $L(K) = \{|z| \leq r\}$ 。此外，平衡性给出

$$f(e^{i\theta}z) = \text{vol}_m(K_{e^{i\theta}z}) = \text{vol}_m(e^{i\theta}K_z) = f(z), \quad (2.7)$$

凸性则给出

$$\frac{1}{2}(K_z + K_{-z}) \subseteq K_0. \quad (2.8)$$

在 $\mathbb{R}^m$ 中对 (2.8) 使用 Brunn-Minkowski 不等式, 便得到

$$\begin{aligned} f(0) &= \text{vol}_m(K_0) \geq \text{vol}_m\left(\frac{1}{2}(K_z + K_{-z})\right) \\ &\geq \left[\frac{\text{vol}_m(K_z)^{\frac{1}{m}} + \text{vol}_m(K_{-z})^{\frac{1}{m}}}{2}\right]^m = f(z). \end{aligned} \quad (2.9)$$

上式最后一个等号用的是 (2.7) 取 $\theta = \pi$, 由此 $f(-z) = f(z)$ 。

对每个 $\theta \in \mathbb{T}$, 取 $(re^{i\theta}, y_\theta) \in K$ 。由 K 的凸性以及 $(1-s/r) \cdot 0 + (s/r) \cdot re^{i\theta} = se^{i\theta}$ 可知, 对 $0 \leq s \leq r$ 有

$$\left(1 - \frac{s}{r}\right)K_0 + \left(\frac{s}{r}\right)y_\theta \subseteq K_{se^{i\theta}}.$$

由于把集合平移 $(s/r)y_\theta$ 不改变它的体积, 于是对 $0 \leq s \leq r$,

$$f(se^{i\theta}) \geq \left(1 - \frac{s}{r}\right)^m f(0).$$

结合这一估计与 (2.9), 先对 $y \in \mathbb{C}^{p-1}$ 积分, 再改用极坐标对 $z \in \mathbb{C}$ 积分, 可得

$$\text{vol}_{2p}(K) \geq 2\pi f(0) \int_0^r s \left(1 - \frac{s}{r}\right)^m ds = \frac{2\pi f(0)r^2}{(m+1)(m+2)},$$

$$\text{vol}_{2p}(K \cap \{|L| \leq \tau\}) \leq \pi\tau^2 f(0).$$

上面两个不等式相除恰好就是 (2.6), 因为 $(m+1)(m+2)/2 = p(2p-1)$ 。

□

2.2 传播引理

本节证明 (c_0, C_0) -线性鞅系统的传播引理。

传播条件式 (2.3) 表明: 若某个源满足 $|S_{f,j}(\omega_{<f}; v)| > \delta > 0$, 则把其余各位固定之后, 总可选取 $\omega_{f,j}$, 使第 f 块中至少一半的汇满足 $|Y_{f,k}(\omega_{\leq f}; v)| > c_0\delta/2$ 。这一传播机制也见于 [9, 第 72 页]: 那里可把格点 X_1 看作某个源块中的元素, 把 $|u(X_1)|$ 看作相应源的大小, 把 $\mathbf{e}_1$ 看作相应的目标集。我们将证明, 以高概率, 只要含有大模长源的源块足够多, 就必有足够多的目标取到大模长的汇 (见式 (2.14) 与式 (2.16))。

现在设 $\mathcal{M}$ 是一个 (c_0, C_0) -线性鞅系统, 并记

$$N = \sum_{f=1}^{n_{\text{blk}}} (r_f + b_f), \quad B = \max_{1 \leq f \leq n_{\text{blk}}} b_f \quad (2.10)$$

它们分别表示系统的总规模与目标集大小的最大值。本文其余部分为记号简洁, 偶尔省去源 $S_{f,j}(\omega_{<f}; v)$ 与汇 $Y_{f,k}(\omega_{\leq f}; v)$ 对随机字 ω 的依赖。对完整的字与输入 v 定义

$$W_\delta(v) = \sum_{f=1}^{n_{\text{blk}}} b_f \mathbf{1} \left\{ \max_{1 \leq j \leq r_f} |S_{f,j}(v)| \geq \delta \right\} \quad (2.11)$$

$$M_\tau(v) = \sum_{f=1}^{n_{\text{blk}}} \sum_{k=1}^{b_f} \mathbf{1} \{ |Y_{f,k}(v)| > \tau \} \quad (2.12)$$

于是 $W_\delta(v)$ 统计含有模长不小于 δ 的源的源块, 每块按其目标数 b_f 加权; $M_\tau(v)$ 则统计汇的模长大于 τ 的目标。这里 $\mathbf{1}\{E\}$ 是事件 E 的示性函数: E 发生时取 1, 否则取 0。事实上, 若考虑随机量

$$W_\delta(v) - \sum_{1 \leq f \leq n_{\text{blk}}} b_f \mathbb{E} \left(\mathbf{1} \left\{ \max_{1 \leq j \leq r_f} |S_{f,j}(v)| \geq \delta \right\} \mid \mathcal{F}_{f-2} \right)$$

$$M_\tau(v) - \sum_{f=1}^{n_{\text{blk}}} \sum_{k=1}^{b_f} \mathbb{E} (\mathbf{1} \{ |Y_{f,k}(v)| > \tau \} \mid \mathcal{F}_{f-1})$$

则由式 (2.1) 与式 (2.2) 关于源、汇依赖哪些位的描述可知, 上面两式给出两个补偿鞅。这也正是我们把它称为线性鞅系统的原因。

下面的传播引理表明, 以高概率, 式 (2.12) 可由式 (2.11) 从下方控制。

引理 2.4. 设 $\mathcal{M}$ 是按定义 2.1 给出的 (c_0, C_0) -线性鞅系统, 其输入体为

$$K = B_{R_{\text{in}}} = \{w \in \mathbb{C}^p : \|w\|_2 \leq R_{\text{in}}\} \subset \mathbb{C}^p, \quad R_{\text{in}} > 0$$

记 N, B 如式 (2.10)。设 $\delta > 0, \tau > 0$, 并令

$$\begin{aligned} h &= \delta \min(1, c_0/2), \quad D_p = \sqrt{p(2p-1)}, \\ m &= \min \left\{ N, \left\lfloor \frac{p \log(C_0 R_{\text{in}}/\tau)}{\log(h/(D_p \tau))} \right\rfloor \right\} \end{aligned} \quad (2.13)$$

并设参数 c_0, C_0, δ, τ 满足

$$\tau/C_0 \leq R_{\text{in}} \quad \text{且} \quad h > D_p \tau$$

则对每个 $L > 0$, 除一个概率不超过 e^{-L} 的事件外, 对一切输入 $v \in K$ 一致地有

$$2M_\tau(v) \geq \frac{1-e^{-1}}{2} W_\delta(v) - B(m(1+\log(N+1)) + L) \quad (2.14)$$

特别地, 若每个目标集 $\mathcal{K}_f$ 的大小都是 ℓ , 且

$$P_\delta(v) = \sum_{f=1}^{n_{\text{blk}}} \mathbf{1} \left\{ \max_{1 \leq j \leq r_f} |S_{f,j}(v)| \geq \delta \right\} \quad (2.15)$$

是含有模长至少为 δ 的源的源块个数, 则

$$2M_\tau(v) \geq \frac{1-e^{-1}}{2} \ell P_\delta(v) - \ell(m(1+\log(N+1)) + L) \quad (2.16)$$

输入 v 、它的大源图样与它的少目标图样, 都可以在完整字已知之后再选取。

注记 2.5. 在引理 2.4 中, 我们再次强调这些对象取定的先后次序。所有源块、目标以及输入体 K 都在引入随机性之前取定。我们先把论证所用的高概率事件上的字 (即随机性) ω 取定, 这就确定了所有源与汇的系数; 再任取 K 中的一个输入 v 。此时所有源与汇的取值都已确定, $W_\delta(v)$ 与 $M_\tau(v)$ 的取值也随之确定。

下面解释传播引理证明的思路。先在随机字抽样之前固定一个输入 $v \in K$ 。在一个含有模长至少为 δ 的源的块中, 取第一个这样的源 $S_{f,j}(v)$; 这一选取只依赖于前面的块。把当前块中其余各位都揭示出来, 只留下 $\omega_{f,j}$ 不揭示。由式 (2.3), 对每个目标 k , 两个可能的汇值 $Y_{f,k}^0(\hat{\omega}_{f,j}; v)$ 与 $Y_{f,k}^1(\hat{\omega}_{f,j}; v)$ 中至少有一个的模长不小于 $c_0 \delta/2 > \tau$ 。由鸽巢原理, 剩下这一位存在一个共同的取值, 使至少一半的汇超过阈值 τ 。而这一位仍是均匀的, 故该成功事件的条件概率至少为 $1/2$ 。再结合第三步中的条件指数估计, 对每个固定的 v 与一切 $t \geq 0$ 有

$$\mathbb{P} \left(2M_\tau(v) < \frac{1-e^{-1}}{2} W_\delta(v) - Bt \right) \leq e^{-t} \quad (2.17)$$

当每个目标集的大小都是 ℓ 时, 把 $W_\delta(v) = \ell P_\delta(v)$ 与 $B = \ell$ 代入, 即得关于大源块个数的相应估计。

困难在于要找到一个事件, 使上述估计对一切 $v \in K$ 同时成立, 其中包括在完整随机字已知之后才选取的输入。对不可数集 K 直接做联合界并不可行。若用通常的欧氏网, 并在阈值上留出适当余量, 则网格步长要取到 τ/C_0 的量级, 熵代价为 $p \log(1 + C_0 R_{\text{in}}/\tau)$ 的量级, 这很可能太大, 无法被固定输入的尾估计吸收。我们的做法是把每一对 (v, ω) 的相关信息编码为一条由输入体截断构成的短记录。每当某个源或汇在 v 处取值很小、而它在当前体上的宽度很大时, 就把该体与泛函模长不超过 τ 的条带相交, 并记下相应的标号。每次截断都保留 v 与公共内球 B_{τ/C_0} , 同时去掉体积的一个确定比例。由体积比较即得截断次数不超过 m 。标号取自一个大小为 N 的固定集合, 又按固定次序扫描, 因此可能的记录全体构成的确定族 $\mathcal{R}_m$ 的基数不超过 $(N+1)^m$ 。

对每条在抽样之前取定的记录 $\mathcal{I}$, 我们在不选取输入的情况下重放它所规定的截断。由此得到随机损失 $H_{\mathcal{I}}(\omega)$, 它度量活跃源块与成功目标块之间的失衡, 具体定义见式 (2.30)。关键在于: 重放是在原来的概率律下进行的, 我们并不以这条记录来自某个特定输入为条件。把所希望的传播估计中的损失定义为

$$D(v, \omega) := \frac{1-e^{-1}}{2} W_\delta(v) - 2M_\tau(v)$$

其中 W_δ 与 M_τ 对 ω 的依赖略去不写。与记录 $\mathcal{I}(v, \omega)$ 的确定性比较给出

$$\sup_{v \in K} D(v, \omega) \leq Bm + \max_{\mathcal{I} \in \mathcal{R}_m} H_{\mathcal{I}}(\omega) \quad (2.18)$$

与固定输入论证中相同的条件成功机制表明，对每条取定的记录都有

$$\mathbb{P}(H_{\mathcal{I}} > Bt) \leq e^{-t}, \quad t \geq 0.$$

于是关键的联合界只在这族有限的记录上施行：

$$\mathbb{P}\left(\sup_{v \in K} D(v, \omega) > Bm + Bt\right) \leq \sum_{\mathcal{I} \in \mathcal{R}_m} \mathbb{P}(H_{\mathcal{I}} > Bt) \leq (N+1)^m e^{-t}$$

取 $t = L + m \log(N+1)$ 即得引理。三个误差项 Bm 、 $Bm \log(N+1)$ 与 BL 分别来自截断、记录条数与所取的失败概率。

引理 2.4 的证明。

第一步：由截断定义记录。

记

$$\mathcal{L} = \cup_{f=1}^{n_{\text{blk}}} (\mathcal{J}_f \cup \mathcal{K}_f), \quad |\mathcal{L}| = N.$$

在揭示任何随机性之前固定一个扫描次序：按 f 增序访问各块，块内先按 j 增序扫描源，再按 k 增序扫描目标。

此刻先固定字 ω 与输入 $v \in K$ 。从当前体 $K' = K = B_{R_{\text{in}}}$ 出发，按上述次序施行如下贪心截断。本步中所有源、汇泛函都在取定的字 ω 处取值。

· 在源标号 (f, j) 处，若

$$|S_{f,j}(v)| \leq \tau \quad \text{且} \quad w_{K'}(S_{f,j}) \geq \delta \quad (2.19)$$

则施行一次截断：记下 (f, j) ，并把 K' 换成 $K' \cap \{|S_{f,j}| \leq \tau\}$ 。

· 在目标标号 $(f, k)_{\text{tag}}$ 处，若

$$|Y_{f,k}(v)| \leq \tau \quad \text{且} \quad w_{K'}(Y_{f,k}) \geq c_0 \delta / 2 \quad (2.20)$$

则施行一次截断：记下 $(f, k)_{\text{tag}}$ ，并把 K' 换成 $K' \cap \{|Y_{f,k}| \leq \tau\}$ 。

条件不成立时 K' 保持不变。宽度一律在当前体上计算，即在此前所有截断之后所得的体上计算。记 $\mathcal{I}(v, \omega) \subset \mathcal{L}$ 为被记下的标号集合；固定的扫描次序已经决定了这些截断的先后。

每次截断都保留 v ，并保持当前体的紧性、凸性与平衡性 (circled)。由式 (2.4)，每个源或汇泛函 L 都满足 $|L(w)| \leq C_0 \|w\|_2$ ，故所有中间体都包含同一个球：

$$B_{\tau/C_0} \subset K' \subset B_{R_{\text{in}}} \quad (2.21)$$

特别地，这些体的内部非空。在每次被记下的截断处，相应泛函的宽度至少为 $h = \delta \min(1, c_0/2)$ 。由引理 2.3，

$$\frac{\text{vol}_{2p}(K' \cap \{|L| \leq \tau\})}{\text{vol}_{2p}(K')} \leq D_p^2(\tau/h)^2 < 1. \quad (2.22)$$

若 $q = |\mathcal{I}(v, \omega)|$ ， K_{end} 为最后的体，则

$$(\tau/(C_0 R_{\text{in}}))^{2p} \leq \frac{\text{vol}_{2p}(K_{\text{end}})}{\text{vol}_{2p}(B_{R_{\text{in}}})} \leq (D_p^2(\tau/h)^2)^q \quad (2.23)$$

其示意图 3。

取对数并用 $q \leq N$ ，即得确定性估计

$$|\mathcal{I}(v, \omega)| \leq \min \left\{ N, \left\lceil \frac{p \log(C_0 R_{\text{in}}/\tau)}{\log(h/(D_p \tau))} \right\rceil \right\} = m \quad (2.24)$$

我们要在确定族

$$\mathcal{R}_m := \{\mathcal{I} \subset \mathcal{L} : |\mathcal{I}| \leq m\}$$

上做联合界，其基数满足

$$|\mathcal{R}_m| = \sum_{q=0}^m \binom{N}{q} \leq (N+1)^m \quad (2.25)$$




图3 式 (2.23) 所示估计的示意图。

事实上，把记录的标号按固定次序排好，再用空符号补足长度 m ，就给出记录的一种编码。

第二步：重放取定的记录以定义 $H_{\mathcal{I}}$ 。

现在定义 $H_{\mathcal{I}}$ ，它用来控制给定记录下的传播损失。

在抽样 ω 之前取定 $\mathcal{I} \in \mathcal{R}_m$ 。第二、三步中， K_f, A_f, G_f, I_f 对这条取定记录的依赖一律略去不写。从 $K' = B_{R_{in}}$ 出发，按第一步相同的扫描次序重放所规定的截断：

(1) 扫描第 f 块中的源。在每个属于 $\mathcal{I}$ 的标号 (f, j) 处，把 K' 换成 $K' \cap \{|S_{f,j}| \leq \tau\}$ ；其余源标号处保持不变。记 K_f 为这些源截断之后的体。

(2) 定义活跃示性函数

$$A_f := \mathbf{1} \left\{ \max_{1 \leq j \leq r_f} w_{K_f}(S_{f,j}) \geq \delta \right\} \quad (2.26)$$

若 $A_f = 1$ ，取第一个宽度至少为 δ 的源的下标 j_f 。

(3) 在活跃块中，揭示块 f 内其余各位，只留下 ω_{f,j_f} 不揭示。对 $e \in \{0, 1\}$ ，记 $Y_{f,k}^e$ 为把这一位取成 e 所得到的汇泛函，并定义

$$G_f := \left\{ e \in \{0, 1\} : \left| \left\{ 1 \leq k \leq b_f : w_{K_f}(Y_{f,k}^e) \geq c_0 \delta / 2 \right\} \right| \geq b_f / 2 \right\} \quad (2.27)$$

随后揭示 ω_{f,j_f} ，并令

$$I_f := \mathbf{1} \left\{ \omega_{f,j_f} \in G_f \right\} \quad (2.28)$$

在非活跃块中，揭示其全部位并令 $I_f = 0$ 。于是

$$0 \leq I_f \leq A_f \quad (2.29)$$

(4) 扫描第 f 块中的目标。在每个属于 $\mathcal{I}$ 的标号 $(f, k)_{\text{tag}}$ 处，把 K' 换成 $K' \cap \{|Y_{f,k}| \leq \tau\}$ ；否则保持不变，然后进入块 $f + 1$ 。

这一过程对每条记录、每个字都有定义，无需输入 v 。即使这条记录根本不会由贪心过程产生，所得的各个体仍都包含 B_{τ/C_0} 。由于块 f 中的源泛函只依赖 $\omega_{<f}$ ，体 K_f 、示性函数 A_f 以及活跃块中选定的下标 j_f 都是 $\mathcal{F}_{f-1}$ -可测的，而示性函数 I_f 是 $\mathcal{F}_f$ -可测的。

定义

$$H_{\mathcal{I}}(\omega) := a_0 \sum_{f=1}^{n_{\text{blk}}} b_f A_f - \sum_{f=1}^{n_{\text{blk}}} b_f I_f, \quad a_0 = \frac{1 - e^{-1}}{2} \quad (2.30)$$

这里 $\mathcal{I}$ 是在原概率测度下运行的过程的确定性数据。我们并不以 $\mathcal{I}(v, \omega) = \mathcal{I}$ 对某个输入成立为条件，因为那样会给论证中用到的各位带来偏倚。

第三步：控制 $H_{\mathcal{I}}$ 的上尾。

保持 $\mathcal{I}$ 固定。在活跃块上，条件于历史 $\mathcal{F}_{f-1}$ 以及当前块中除所选位 ω_{f,j_f} 之外的各位，此时所选位仍是独立均匀的。把传播条件式 (2.3) 用在取定的体 K_f 上，对每个目标有

$$w_{K_f}(Y_{f,k}^0) + w_{K_f}(Y_{f,k}^1) \geq |c_{f,j_f,k}| w_{K_f}(S_{f,j_f}) \geq c_0 \delta$$

对每个 k ，两个宽度中至少有一个不小于 $c_0 \delta / 2$ 。由鸽巢原理，存在共同的取值 e ，使至少一半的目标具有这一性质。故

$$G_f \neq \emptyset \quad \text{只要} \quad A_f = 1 \quad (2.31)$$

于是在活跃块上，条件成功概率至少为 $1/2$ 。对其余当前位取平均，并利用非活跃块上 $I_f = 0$ ，得

$$\mathbb{P}(I_f = 1 \mid \mathcal{F}_{f-1}) \geq 1/2 A_f \quad (2.32)$$

记 $x_f = b_f / B \in (0, 1]$ 。由于 A_f 是 $\mathcal{F}_{f-1}$ -可测的，

$$\begin{aligned} \mathbb{E}(e^{-x_f I_f} \mid \mathcal{F}_{f-1}) &= 1 - (1 - e^{-x_f}) \mathbb{P}(I_f = 1 \mid \mathcal{F}_{f-1}) \\ &\leq 1 - 1/2 A_f (1 - e^{-x_f}) \\ &\leq \exp(-a_0 x_f A_f) \end{aligned}$$

这里用到 $1 - e^{-x} \geq (1 - e^{-1})x$ ($0 \leq x \leq 1$) 与 $1 - e^{-x} \leq x$ ($x \in \mathbb{R}$)。于是

$$\mathbb{E} \left(\exp \left(\frac{a_0 b_f A_f - b_f I_f}{B} \right) \mid \mathcal{F}_{f-1} \right) \leq 1 \quad (2.33)$$

从而

$$Z_n := \exp \left(\frac{1}{B} \sum_{f=1}^n (a_0 b_f A_f - b_f I_f) \right), \quad 0 \leq n \leq n_{\text{blk}}$$

是一个非负上鞅且 $Z_0 = 1$ 。特别地

$$\mathbb{E} \exp(H_{\mathcal{I}}/B) \leq 1 \quad (2.34)$$

再由马尔可夫不等式即得所需的上尾估计

$$\mathbb{P}(H_{\mathcal{I}} > Bt) \leq e^{-t}, \quad t \geq 0 \quad (2.35)$$

第四步：控制传播损失并做联合界。

任取字 ω 与输入 $v \in K$ ，取第一步的贪心记录 $\mathcal{I} = \mathcal{I}(v, \omega)$ ，并用同一个字重放这条记录。贪心过程与重放在扫描的每一处所得的体都相同：两者从同一个球出发，且在每个标号处都恰在该标号属于 $\mathcal{I}$ 时作同样的截断。按固定的扫描次序归纳，即得这一匹配。

用 K_f, A_f, G_f, I_f 表示与所选记录相应的重放量。由于每次贪心截断都保留 v ，有 $v \in K_f$ 。因此满足 $|S_{f,j}(v)| \geq \delta$ 的源在该体上的宽度至少为 δ ，故

$$W_{\delta}(v) \leq \sum_{f=1}^{n_{\text{blk}}} b_f A_f \quad (2.36)$$

记

$$q_f = |\mathcal{I} \cap \mathcal{K}_f|, \quad M_f(v) = \sum_{k=1}^{b_f} \mathbf{1}\{|Y_{f,k}(v)| > \tau\}, \quad M_{\tau}(v) = \sum_{f=1}^{n_{\text{blk}}} M_f(v)$$

若 $q_f = 0$ ，则在目标扫描的整个过程中体保持为 K_f 。此时若再有 $I_f = 1$ ，则至少 $b_f/2$ 个目标在该体上的宽度不小于 $c_0 \delta / 2$ 。这些目标对应的汇在 v 处的模长必须大于 τ ，否则式 (2.20) 就会迫使一次目标截断。于是当 $q_f = 0$ 时有 $b_f I_f \leq 2M_f(v)$ ；当 $q_f \geq 1$ 时，估计 $b_f I_f \leq Bq_f$ 已然足够。把这两种情形相加，得

$$\sum_{f=1}^{n_{\text{blk}}} b_f I_f \leq 2M_\tau(v) + B \sum_{f=1}^{n_{\text{blk}}} q_f \leq 2M_\tau(v) + Bm \quad (2.37)$$

结合式 (2.36) 与 H_I 的定义, 即得

$$D(v, \omega) \leq Bm + H_{I(v, \omega)}(\omega) \quad (2.38)$$

其中 $D(v, \omega)$ 如式 (2.18) 之前所定义。由于对每一对 (v, ω) 都有 $|I(v, \omega)| \leq m$, 对 v 取上确界就证明了式 (2.18)。

现在可以在固定的有限族 $\mathcal{R}_m$ 上做联合界。对一切 $t \geq 0$,

$$\begin{aligned} \mathbb{P}\left(\sup_{v \in K} D(v, \omega) > Bm + Bt\right) &\leq \mathbb{P}\left(\max_{I \in \mathcal{R}_m} H_I > Bt\right) \\ &\leq \sum_{I \in \mathcal{R}_m} \mathbb{P}(H_I > Bt) \\ &\leq (N+1)^m e^{-t} \end{aligned} \quad (2.39)$$

取 $t = L + m \log(N+1)$, 便得到一个概率至少为 $1 - e^{-L}$ 的事件, 在其上对一切 $v \in K$ 同时有

$$2M_\tau(v) \geq a_0 W_\delta(v) - B(m(1 + \log(N+1)) + L)$$

这正是式 (2.14)。当所有目标集的大小都是 ℓ 时, 代入 $W_\delta(v) = \ell P_\delta(v)$ 与 $B = \ell$, 即得式 (2.16)。□

下面把引理 2.4 的证明与已有工作联系起来。关键之处是条件成功估计式 (2.32), 它给出第三步中的指数上鞅。类似的条件估计与指数论证也出现在 [9, 第 72 页]。

证明的另一要点, 是如何对初始输入体 K 作离散化, 从而得到对输入一致的概率估计。这与 [9, 问题 2.7] 所追求的目标密切相关。[9, 定理 2.6] 证明了一个版本的 PDUC, 但相应的概率依赖于方程的初值, 也就是我们框架中的输入。[9, 问题 2.7] 指出, 弄清这种对初值的依赖如何去掉十分重要, 因为那将给出对所有初值一致的 PDUC, 而这是解决高维 ABM 定域化问题的关键一步。事实上, 下面的定理 3.2 就肯定地解决了 [9, 问题 2.7]。

在前面传播引理的证明中, 我们要以高概率给出某些线性泛函模长的定量下界, 因此按式 (2.19) 与式 (2.20) 的方式, 把那些对应泛函宽度较大的下记录录下来。这样一来, 所有可能记录组成的集合便可看作参数空间的一个离散化。与扰动输入 v 、对 K 使用网论证相比, 这一离散化方案的熵代价更小, 因而能够被尾概率估计吸收。

3 概率型离散唯一延拓原理

本节建立 $\mathbb{Z}^d$ 上薛定谔方程的概率型离散唯一延拓 (probabilistic discrete unique continuation, PDUC) 的主要一步, 所依据的正是第 1.2 小节勾勒的自举策略。

3.1 分级集合与 PDUC 的陈述

要陈述 PDUC 的主定理, 先得引入分级集合 (graded set) 这一对象。它最早出现在 [7, 定义 3.3], 在那里它很好地描述了多尺度分析中所产生的概率逐尺度的演化。多尺度分析必须纳入所谓的自由格点论证 (free-sites argument); 这一论证由 [42] 首次提出, 用来克服 ABM 定域化问题中特征值不随势改变的困难。分级冻结集要刻画的, 是迭代全程中冻结格点——即那些非自由的格点——在几何上的稀疏性; 由此可保证迭代的每一步都还剩下足够多的自由格点可用。

本文其余部分总记

$$Q_{r(a)} = \{x \in \mathbb{Z}^d : |x - a|_\infty \leq r\}, \quad Q_r = Q_{r(0)},$$

为 $\mathbb{Z}^d$ 中的立方体 (即 ℓ^∞ -球)。

定义 3.1. 设 $N \in \mathbb{Z}_{\geq 1}$, $0 < \varepsilon < 1$, 并设 $\rho = (\rho_1, \dots, \rho_s)$ 为一项数有限 (当 $s = 0$ 时可以为空) 的实数列, 每一项都大于 1, 且满足

$$\rho_{i+1} \geq \rho_i^{1+2\varepsilon}.$$

若并集 $\mathcal{F} = \mathcal{F}_0 \cup \dots \cup \mathcal{F}_s \subset \mathbb{R}^d$ 具有下述性质, 就称之为 (N, ε, ρ) -分级集合。

(1) 集合 $\mathcal{F}_0$ 可表为 $\mathcal{F}_0 = \bigcup_{j \in \mathbb{Z}_+^+} Z^{(j)}$, 其中每个 $Z^{(j)}$ 都是 $\mathbb{R}^d$ 中圆心落在 $\mathbb{Z}^d$ 上的开单位球 (按 ℓ^2 -范数), 并且 $\text{dist}(Z^{(i)}, Z^{(j)}) \geq \varepsilon^{-1}$ ($i \neq j$)。

(2) 对每个 $i \geq 1$, 集合 $\mathcal{F}_i$ 可表为




图 4 一个 $(2, \varepsilon, \rho)$ -分级集合的示意图。

$$\mathcal{F}_i = \bigcup_{1 \leq t \leq N} \mathcal{F}_i^{(t)}, \quad \mathcal{F}_i^{(t)} = \bigcup_{j \in \mathbb{Z}_+} Z^{(t,j)}.$$

这里诸 $Z^{(t,j)}$ 是 $\mathbb{R}^d$ 中半径为 ρ_i 的开球；在每个 $\mathcal{F}_i^{(t)}$ 内部恒有 $\text{dist}(Z^{(t,s)}, Z^{(t,j)}) \geq \rho_i^{1+\varepsilon}$ ($s \neq j$)。

若 $F = \mathcal{F} \cap \mathbb{Z}^d$ ，而 $\mathcal{F}$ 是某个 (N, ε, ρ) -分级集合，则称 F 为离散 (N, ε, ρ) -分级集合。

对 (N, ε, ρ) -分级集合 $\mathcal{F}$ （以及与之对应的离散版本 $F = \mathcal{F} \cap \mathbb{Z}^d$ ），若每个 $i \geq 1$ 都满足：只要 $Q_{R(a)} \cap \mathcal{F}_i$ 非空就有 $\rho_i \leq \text{diam}(Q_{R(a)})^{1-\varepsilon/2} = (2\sqrt{d}R)^{1-\varepsilon/2}$ ，则称它在 $Q_{R(a)}$ 中是正规的。

为直观理解分级集合，图 4 画出了一个 $(2, \varepsilon, \rho)$ -分级集合。

要把 PDUC 用于多尺度分析，需要一个与自由格点相容的版本：它应当给出这样一个下界——在给定的分级冻结集之外，解的模足够大的格点至少有多少个。PDUC 的主定理如下。

设 $e_1, \dots, e_d$ 是 $\mathbb{Z}^d$ 的标准基。回忆算子 H 由式 (1.1) 给出，于是方程 $Hu = Eu$ 可写成

$$\sum_{i=1}^d (u(x + e_i) + u(x - e_i)) = (2d - E + \lambda V_x)u(x). \quad (3.1)$$

定理 3.2. 固定 $d \geq 2$ 、 $\lambda > 0$ 、一个紧区间 $I \subset \mathbb{R}$ 、 $K \geq 0$ 以及 $N \in \mathbb{Z}_{\geq 1}$ 。存在 $\varepsilon_0 > 0$ ，使得对一切 $0 < \varepsilon < \varepsilon_0$ ，都有尺度 $L_* = L_*(N, \varepsilon)$ 与常数 $a, C, c, R_0 > 0$ （它们只依赖 $d, \lambda, I, K, N, \varepsilon$ ），满足下述结论。设 $\rho_1 \geq L_*$ 且 $R \geq R_0$ 。取定一个在 Q_R 中正规的离散 (N, ε, ρ) -分级集合 F 。在 $F \cap Q_{R-1}$ 上任意规定一组取值 $v_F \in [0, 1]^{F \cap Q_{R-1}}$ ，并在 $F \cap Q_{R-1}$ （即冻结格点）上令 $V_x = v_{F(x)}$ ；对其余各点独立地取

$$\mathbb{P}(V_x = 0) = \mathbb{P}(V_x = 1) = \frac{1}{2} \quad \text{对一切 } x \in Q_{R-1} \setminus F.$$

则对每个固定的 $E_0 \in I$ ，都存在事件 $\mathcal{E}_{R(F, v_F, E_0)} \subset \{0, 1\}^{Q_{R-1} \setminus F}$ ，使得

$$\mathbb{P}[\mathcal{E}_{R(F, v_F, E_0)} \mid V_F = v_F] \geq 1 - \exp\left(-c \left(\frac{R}{\log R}\right)^{\frac{d-1}{d}}\right), \quad (3.2)$$

并且在此事件上，只要 $E \in I$ 、非零函数 $u: Q_R \rightarrow \mathbb{C}$ 在 $x \in Q_{R-1}$ 上满足式 (3.1)，且

$$|E - E_0| \leq e^{-aR}, \quad \|u\|_{\infty, Q_R} \leq e^{KR}|u(0)|,$$

就有

$$|\{x \in Q_R \setminus F : |u(x)| \geq e^{-CR}|u(0)|\}| \geq \frac{cR^d}{(\log R)^d}. \quad (3.3)$$

本节余下的内容用于证明定理 3.2，先从若干准备工作开始。定理 3.2 只针对固定的无序强度 λ 以及 E_0 附近的一个小能量区间，这对证明定域化已经够用。事实上，当维数 $d \geq 3$ 时，在不引入分级集合的前提下，该结论可加强为对一大片参数空间中的 (λ, E) 一致成立；我们将把它写在附录 A 中，供补充阅读。

3.2 分级集合的稀疏性

本小节讨论分级集合 (graded set) 的若干稀疏性事实。我们先回顾所谓的锥性质。

定义 3.3. 对任意 $x \in \mathbb{Z}^d$ 、 $1 \leq k \leq d$ 与 $\sigma \in \{1, -1\}$ ，称

$$\mathcal{C}(x, \sigma e_k) := \{y \in \mathbb{Z}^d : |y - (x + \sigma e_k)| \leq 1, \ y \neq x\}$$

为以 x 为根、以 σe_k 为方向的锥 (cone)。锥型链 (cone chain) 指 $\mathbb{Z}^d$ 中的路径 $P = (x_0, x_1, \dots, x_m)$ ，满足

$$x_j \in \mathcal{C}(x_{j-1}, \sigma e_k), \quad \forall 1 \leq j \leq m.$$

此外，称 m 为 P 的长度， x_0 为 P 的根， σe_k 为 P 的方向。

基于上述定义，我们有如下事实 (另见 [9, 第 2.1 节])：

命题 3.4. 固定 $d \geq 2$ 、 $\lambda > 0$ 与紧区间 $I \subset \mathbb{R}$ ，并设 $0 \leq V_x \leq 1$ 。则存在常数 $C_{\text{cone}} = C_{\text{cone}}(d, \lambda, I) > 0$ ，使得对每个 $E \in I$ 下列结论都成立。若式 (3.1) 在 $x + \sigma e_k$ 处成立，则

$$\max_{y \in \mathcal{C}(x, \sigma e_k)} |u(y)| \geq e^{-C_{\text{cone}}} |u(x)|. \quad (3.4)$$

设 $u : Q_{r(a)} \rightarrow \mathbb{C}$ 在 $Q_{r-1}(a)$ 上满足式 (3.1)。对每个 $x_0 \in Q_{r(a)}$ 、每个方向 σe_k 以及每个满足

$$2m \leq r - |x_0 - a|_\infty$$

的整数 $m \geq 0$ ，都存在该方向上的锥型链 $P = (x_0, \dots, x_m) \subset Q_{r(a)}$ ，使得

$$|u(x_j)| \geq e^{-C_{\text{cone}} j} |u(x_0)|, \quad 0 \leq j \leq m.$$

特别地，若 $r \geq 4$ 且 $x_0 \in Q_{r/2}(a)$ ，可取 $m = \lfloor r/4 \rfloor$ 。若 u 是 $Q_{r(a)}$ 上带零 Dirichlet 边值的本征函数且 $u(x_0) \neq 0$ ，则只要

$$2m \leq r - \sigma(x_0 - a)_k$$

同样的锥型链结论便成立。于是取 σ 使得 $\sigma(x_0 - a)_k \leq 0$ ，即使 x_0 落在边界上，也可取 $m = \lfloor r/2 \rfloor$ 。(本命题的陈述亦见 [7, 第 2 节]。)

下面的引理说明：由于分级集合是稀疏的，一条锥型链与它的交集至多只占很小的一部分。

引理 3.5. 设 $P = (x_0, \dots, x_m)$ 是锥型链， F 是离散 (N, ε, ρ) -分级集合，则

$$|\{j : x_j \in F\}| \lesssim \varepsilon m + 1 + N \sum_{i: \mathcal{F}_i \cap P \neq \emptyset} (m \rho_i^{-\varepsilon} + \rho_i). \quad (3.5)$$

此外，存在 $\varepsilon_0 > 0$ ，使得对每个 $0 < \varepsilon < \varepsilon_0$ 与每个 N ，都能找到尺度 $L_* = L_*(N, \varepsilon)$ ，满足如下性质：若 $\rho_1 \geq L_*$ ，则对每个固定的 $b > 0$ ，都存在充分大的尺度 $R_{\text{spa}} = R_{\text{spa}}(b, d, N, \varepsilon)$ ，使得对一切充分大的 $R \geq R_{\text{spa}}$ ，只要离散 (N, ε, ρ) -分级集合 F 在 Q_R 中是正规的，就有

$$|P \setminus F| \geq 3 \frac{m}{4} \quad (3.6)$$

对每条长度 $m \geq bR/\log(R)$ 的锥型链 $P \subset Q_R$ 成立。

证明. 交换坐标并作反射后，不妨设 P 的方向为 e_1 。按定义 3.1 将 F 表示为

$$F = \mathcal{F} \cap \mathbb{Z}^d, \quad \mathcal{F} = \mathcal{F}_0 \cup \dots \cup \mathcal{F}_s.$$

由 $x_j \in \mathcal{C}(x_{j-1}, e_1)$ 可知

$$1 \leq (x_j - x_{j-1}) \cdot e_1 \leq 2, \quad |x_j - x_{j-1}|_2 \leq 2, \quad 1 \leq j \leq m. \quad (3.7)$$

在每个 $\mathcal{F}_i^t = \cup_{s \geq 1} Z^{t,s}$ 中，设 P 依次碰到 (允许重复) g 个球

$$Z^{t,s_1}, Z^{t,s_2}, \dots, Z^{t,s_g}.$$

由于从一个球走到另一个球，路径 P 至少需要

$$\frac{\text{dist}_{\ell^2}(Z^{t,s}, Z^{t,s'})}{\sup_j |x_j - x_{j-1}|_2} \geq \frac{\rho_i^{1+\varepsilon}}{2}$$

步，于是 $g \leq 1 + 2m/\rho_i^{1+\varepsilon}$ 。又由式 (3.7)，第一坐标每步至少增加 1，故单个球至多包含 $2\rho_i + 2$ 个 P 的顶点。因此

$$|\mathcal{F}_i^t \cap P| \leq g(2 + 2\rho_i) \lesssim m\rho_i^{-\varepsilon} + \rho_i \quad (3.8)$$

对每个 $i \geq 1$ 与 $1 \leq t \leq N$ 成立。再考虑 $\mathcal{F}_0$ ：在 $\mathbb{R}^d$ 中，以格点为中心的开的单位球只含球心本身，对式 (3.8) 的论证照搬即得

$$|\mathcal{F}_0 \cap P| \lesssim \varepsilon m + 1. \quad (3.9)$$

合并式 (3.8) 与式 (3.9)，就得到式 (3.5)。现将式 (3.5) 改写为

$$|\{j : x_j \in F\}| \lesssim \left(\varepsilon + N \sum_{i: \mathcal{F}_i \cap P \neq \emptyset} \left(\rho_i^{-\varepsilon} + \frac{\rho_i}{m} \right) \right) m. \quad (3.10)$$

当 $\varepsilon < 1$ 且 ρ_1 （依赖于 ε ）充分大时，有

$$\sum_i \rho_i^{-\varepsilon} \leq \sum_{i \geq 0} \rho_1^{-\varepsilon(1+2\varepsilon)^i} \leq 2\rho_1^{-\varepsilon}, \quad \sum_{i \leq j} \rho_i \leq \rho_j \left(1 + \rho_{j-1}^{1-(1+2\varepsilon)} + \rho_{j-2}^{1-(1+2\varepsilon)^2} + \dots \right) \leq 2\rho_j. \quad (3.11)$$

于是可先取 ε 充分小，再取 ρ_1 （依赖于 ε 与 N ）充分大，使得

$$O\left(\varepsilon + N \sum_{i: \mathcal{F}_i \cap P \neq \emptyset} \rho_i^{-\varepsilon} \right) \leq \frac{1}{8}.$$

此外，因 F 在 Q_R 中正规，当 $m \geq bR/\log R$ 时可估计

$$O\left(Nm^{-1} \sum_{i: \mathcal{F}_i \cap P \neq \emptyset} \rho_i \right) \lesssim \frac{N \log R}{bR} \text{diam}_{\ell^2}(Q_{R(a)})^{1-\frac{\varepsilon}{2}},$$

其右端不超过 $\lesssim_{b,N,d} R^{-\varepsilon/2} \log R$ ；再取 R （依赖于 b, d, N, ε ）充分大，上式便又不超过 $1/8$ 。从而式 (3.10) 化为

$$|P \cap F| \leq \frac{m}{8} + \frac{m}{8} = \frac{m}{4}.$$

这就证明了式 (3.6)。 □

3.3 最小碗形边界

本部分处理式 (3.1) 在立方体 Q_s 上的边值问题。一个自然的问题是：在怎样的边值条件下，解 u 能在 Q_{s+1} 上被确定？答案并不唯一。例如，任何 Dirichlet 边值都可以（尽管这样的解 u 未必存在）。不过，考虑如下碗形边界会更方便。

把格点写成 $(t, z) \in \mathbb{Z} \times \mathbb{Z}^{d-1}$ 。对整数 $s \geq 1$ ，令 $\Omega_\Sigma := [-s, s]^{d-1} \cap \mathbb{Z}^{d-1}$ ，并设

$$\partial^+ \Omega_\Sigma := \{z \in \mathbb{Z}^{d-1} \setminus \Omega_\Sigma : \exists z' \in \Omega_\Sigma \text{ 使得 } |z - z'|_1 = 1\}.$$

考虑碗形边界

$$T_s := (\{-s-1, -s\} \times \Omega_\Sigma) \cup (\{-s, \dots, s-1\} \times \partial^+ \Omega_\Sigma). \quad (3.12)$$

容易验证：若给出 u 在边界 T_s 上的数据，则 u 在 Q_s 上的全部值由递推

$$u(t+1, z) = (2d - E + \lambda V_{t,z})u(t, z) - u(t-1, z) - \sum_{z' \sim z} u(t, z'), \quad -s \leq t \leq s-1 \quad (3.13)$$

即被确定。这里 $z \sim z' \in \mathbb{Z}^{d-1}$ 表示 $|z - z'|_1 = 1$ 。在这种碗形边界下，解 u 的传播容易追踪：式 (3.13) 表明， u 在 $(t+1, z)$ 处的值由 u 在锥 $\mathcal{C}((t+1, z), -e_1)$ 上的值决定，于是我们可以沿方向 e_1 逐层求解方程。

这种碗形区域为 Bourgain-Klein [[56]] 所用，在二维 PDUC 的证明中也起作用 ([6, 引理 5.3])。

然而，由于冻结集存在，我们无法直接使用正则的碗形边界 T_s ：边界必须加以调整，以避免分级的冻结集 F 。这是因为我们的最终目标是统计 F 之外使 $|u|$ 至少达到给定阈值的格点，并寻找一条包含此类格点尽可能少的边界。这一点在下方引理 3.7 的证明中会看得更清楚。

下面说明如何调整边界。构造从 T_s 出发。设 F 为冻结集。我们在 $T_s \cup Q_s$ 上归纳定义高度函数 (height function) $h(v)$ ：先令

$$h(v) = 0, \quad \text{对一切 } v \in T_s,$$

再给出递推关系

$$h(v) = \mathbf{1}_{v \notin F} + \min_{p \in \mathcal{C}(v, -e_1)} h(p). \quad (3.14)$$

事实上， $h(v)$ 就是从 T_s 出发、终止于 v 的锥型链中所含自由格点的最少数目，即




图 5 二维情形下高度函数与调整边界的示意图。

$$h(v) = \min_P |P \setminus (F \cup T_s)|, \quad (3.15)$$

其中极小取自所有把 T_s 连到 v 、方向为 e_1 的锥型链 P 。这是因为式 (3.15) 右端在 T_s 上为零，且由 $v \in \mathcal{C}(v', e_1) \Leftrightarrow v' \in \mathcal{C}(v, -e_1)$ 可知它也满足式 (3.14)。

我们把 h 的水平集

$$\mathcal{B}_k := \{v \in Q_s \setminus F : h(v) = k\}, \quad k \geq 1, \quad (3.16)$$

称为调整碗形边界 (adjusted boundary)，并记

$$\mathcal{D}_k := \{v \in Q_s : h(v) \geq k\}, \quad k \geq 1. \quad (3.17)$$

二维情形的示意图见图 5。

接下来证明： u 在边界 $\mathcal{B}_k$ 上的数据可以重建出 u 在 $\mathcal{D}_k$ 内的数据。

定理 3.6. 设式 (3.1) 在 Q_s 上成立，且 $x \in Q_s$ 的一切 V_x 的取值均已被揭示。则对每个 $k \geq 1$ ，若给出 u 在 $\mathcal{B}_k$ 上的值， u 在区域 $\mathcal{D}_k$ 内的全部值就由式 (3.1) 唯一确定。更确切地，对每个 $v \in \mathcal{D}_k$ ， $u(v)$ 是初始数据 $u|_{\mathcal{B}_k}$ 的线性泛函，即

$$u(v) = \sum_{w \in \mathcal{B}_k} \mathcal{W}(v, w; d, \lambda, E, V|_{Q_s}) u(w), \quad (3.18)$$

每个系数都是实数，并满足

$$\sup_{E \in I, k} \|\mathcal{W}(v, w)\|_{\ell^\infty(\mathcal{D}_k \times \mathcal{B}_k)} \leq e^{C_{\text{recon}} s}, \quad \sup_{E \in I, k} \|\partial_E \mathcal{W}(v, w)\|_{\ell^\infty(\mathcal{D}_k \times \mathcal{B}_k)} \leq e^{C_{\text{recon}} s}. \quad (3.19)$$

此外还有

$$\|u\|_{\ell^\infty(\mathcal{D}_k)} \leq e^{C_{\text{recon}} s} \|u\|_{\ell^\infty(\mathcal{B}_k)}. \quad (3.20)$$

这里 $C_{\text{recon}} = C_{\text{recon}}(d, I, \lambda)$ 是只依赖于 d 、 I 与 λ 的常数（取得充分大）。

证明。 固定 $k \geq 1$ 。若 $\mathcal{D}_k = \emptyset$ ，无需证明。对 $v \in \mathbb{Z}^d$ ，记 $v_1 := v \cdot e_1$ 。容易看出

$$p \in \mathcal{C}(v, -e_1) \implies p_1 \in \{v_1 - 1, v_1 - 2\}. \quad (3.21)$$

对 $v \in \mathcal{D}_k \setminus \mathcal{B}_k$ ，由高度的递推得

$$\min_{p \in \mathcal{C}(v, -e_1)} h(p) = h(v) - \mathbb{1}_{v \notin F}.$$

再者，

$$\begin{cases} h(v) \geq k & v \in \mathcal{D}_k \cap F \\ h(v) \geq k+1 & v \in \mathcal{D}_k \setminus (F \cup \mathcal{B}_k) \end{cases},$$

于是

$$\min_{p \in \mathcal{C}(v, -e_1)} h(p) \geq k, \quad \forall v \in \mathcal{D}_k \setminus \mathcal{B}_k, \quad (3.22)$$

从而

$$\mathcal{C}(v, -e_1) \subset \mathcal{D}_k, \quad \forall v \in \mathcal{D}_k \setminus \mathcal{B}_k. \quad (3.23)$$

关系式 (3.23) 使我们能够执行如下程序：对每个 $v \in \mathcal{D}_k \setminus \mathcal{B}_k$ ，利用式 (3.13) 把

$$u(v) = \sum_{w \in \mathcal{C}(v, -e_1)} \text{weight}(v, w) \cdot u(w) \quad (3.24)$$

展开为 u 在 $\mathcal{C}(v, -e_1) \subset \mathcal{D}_k$ 上取值的线性组合。上式右端的系数不依赖于 u 且是确定的，因为 V_x ($x \in Q_s$) 已被确定。接着考察右端求和中的每个 $w \in \mathcal{C}(v, -e_1)$ ：若 $w \in \mathcal{B}_k$ ，就停止展开；若 $w \in \mathcal{D}_k \setminus \mathcal{B}_k$ ，就继续把 $u(w)$ 展开为 u 在 $\mathcal{C}(w, -e_1)$ 上取值的线性组合。这一展开必在有限步内终止：否则我们就得到一条完全位于 $\mathcal{D}_k$ 内、方向为 $-e_1$ 的无穷锥型链 P ，而 P 中元素的第一坐标严格递减，终将走出 $Q_s \supset \mathcal{D}_k$ ，矛盾。因此最终可以把 $u(v)$ 表示为

$$u(v) = \sum_{x \in \mathcal{B}_k} \mathcal{W}(v, x) \cdot u(x),$$

即 u 在 $\mathcal{B}_k$ 上取值的、系数确定且不依赖于 u 的线性组合。更确切地，可以验证式 (3.24) 中的系数为

$$\text{weight}(v, w) := \begin{cases} 2d - E + \lambda V_w & \text{若 } w = v - e_1 \\ -1 & \text{若 } w \in \mathcal{C}(v, -e_1) \setminus \{v - e_1\} \end{cases} \quad (3.25)$$

于是容易算出

$$\mathcal{W}(v, w) = \sum_{P \in \mathcal{P}_{k(v, w)}} \text{weight}(P), \quad (3.26)$$

$$\text{weight}(P) = \prod_{1 \leq i \leq m} \text{weight}(x_{i-1}, x_i), \quad \text{若 } P = (x_0, x_1, \dots, x_m). \quad (3.27)$$

这里容许锥型链的集合定义为

$$\begin{aligned} \mathcal{P}_{k(v, w)} := \{ & P = (x_0, \dots, x_m) : x_0 = v, \quad x_m = w, \\ & x_{j+1} \in \mathcal{C}(x_j, -e_1), \quad x_j \in \mathcal{D}_k \setminus \mathcal{B}_k, \quad 0 \leq j < m \}. \end{aligned}$$

我们允许长度为零的路径，并规定空积的权为 1。于是当 $v, w \in \mathcal{B}_k$ 时，

$$\mathcal{W}(v, w) = \mathbb{1}_{v=w}.$$

由于 $0 \leq V_x \leq 1$ ，式 (3.25) 的系数可被 $2d + M_I + \lambda$ (其中 $M_I := \sup_{E \in I} |E|$) 关于能量 E 一致控制；又由前面的讨论，从 $v \in \mathcal{D}_k$ 到 $w \in \mathcal{B}_k$ 的链 P 的长度至多为 $2s$ (它不出 Q_s)，故对一切可行的 P 都有

$$\sup_{E \in I} |\text{weight}(P)| \leq (2d + M_I + \lambda)^{2s+1}, \quad \sup_{E \in I} |\partial_E \text{weight}(P)| \leq (2s+1)(2d + M_I + \lambda)^{2s}.$$

再者，每个锥含 $2d$ 个点，故从 v 到 w 、长度不超过 $2s+1$ 的锥型链 P 的总数小于 $(2d)^{2s}$ ，即

$$|\mathcal{P}_{k(v, w)}| \leq (2d)^{2s},$$

由式 (3.26) 得

$$\begin{aligned} \sup_{E \in I, k} \|\mathcal{W}(v, w)\|_{\ell^\infty(\mathcal{D}_k \times \mathcal{B}_k)} &= (2d)^{2s} (2d + M_I + \lambda)^{2s+1}, \\ \sup_{E \in I, k} \|\partial_E \mathcal{W}(v, w)\|_{\ell^\infty(\mathcal{D}_k \times \mathcal{B}_k)} &= (2d)^{2s} (2s+1)(2d + M_I + \lambda)^{2s}. \end{aligned}$$

取 $C_{\text{recon}}(d, I, \lambda)$ 充分大即保证式 (3.19)。最后估计 u 的 ℓ^∞ 范数：只要 $C_{\text{recon}}(d, I, \lambda)$ 充分大，便有

$$\begin{aligned} \|u\|_{\ell^\infty(\mathcal{D}_k)} &\leq |\mathcal{B}_k| \cdot \sup_{E \in I, k} \|\mathcal{W}(v, w)\|_{\ell^\infty(\mathcal{D}_k \times \mathcal{B}_k)} \cdot \|u\|_{\ell^\infty(\mathcal{B}_k)} \\ &\leq (2s+1)^d (2d)^{2s} (2d + M_I + \lambda)^{2s+1} \cdot \|u\|_{\ell^\infty(\mathcal{B}_k)} \leq e^{C_{\text{recon}} s} \|u\|_{\ell^\infty(\mathcal{B}_k)}. \end{aligned}$$

□

下一条引理说明: 在同一环带内的各条调整碗形边界中, 可以挑出一条使 $|u|$ 至少达到给定阈值的格点很少的边界。

引理 3.7. 固定 $b > 0$. 设 $\ell \geq bR/\log(R)$ 、 $r + 4\ell < R/2$, 并令 $s := r + 3\ell$. 我们从 T_s 出发构造调整碗形边界。设 $0 < \varepsilon < \varepsilon_0$ 、 $N \geq 1$ 、 $\rho_1 \geq L_*(N, \varepsilon)$ 、 $R \geq R_{\text{sba}}(b, d, N, \varepsilon)$, 与引理 3.5 中的取法相同。设 F 是离散 (N, ε, ρ) -分级集合且在 Q_R 中正规。则至少存在 $L := \lfloor \ell/8 \rfloor \geq \ell/10$ 条 (两两不交的) 调整碗形边界, 满足

$$\mathcal{B}_1, \dots, \mathcal{B}_L \subset Q_s \setminus (F \cup Q_{r+\ell+1}),$$

从而它们所影响的相应区域满足

$$Q_{r+\ell+1} \subset \mathcal{D}_1, \dots, \mathcal{D}_L.$$

最后, 对 $Q_{r+4\ell}$ 上的任意函数 u 与任意 $h > 0$, 总存在某个 $1 \leq k \leq L$ 使得

$$|\{x \in \mathcal{B}_k : |u(x)| \geq h\}| \leq \frac{10}{\ell} |\{x \in Q_{r+4\ell} \setminus F : |u(x)| \geq h\}|. \quad (3.28)$$

证明. 先考察 $Q_{r+\ell+1}$ 中元素的高度。回顾式 (3.15): 在方向 e_1 的锥型链 $P = (x_0, x_1, \dots, x_m)$ 的每一步移动中, 第一坐标至多变化 2, 其余坐标至多变化 1。由此可知, 任何从 T_s 出发、终止于 $Q_{r+\ell+1}$ 的锥型链长度至少为

$$\left\lceil \frac{2\ell - 1}{2} \right\rceil = \ell \geq b \frac{R}{\log R}.$$

因此由参数假设, 对这样的 P 可应用引理 3.5, 得到 $|P \setminus F| \geq 3\ell/4$, 再由式 (3.15) 即得

$$h(v) \geq 3\frac{\ell}{4} - 2 \geq \frac{\ell}{2}, \quad \forall v \in Q_{r+\ell+1}. \quad (3.29)$$

取 $L := \lfloor \ell/8 \rfloor$, 并按式 (3.16) 与式 (3.17) 对 $1 \leq k \leq L$ 构造 $\mathcal{B}_k$ 与 $\mathcal{D}_k$ 。这些集合由 F 唯一固定, 且诸 $\mathcal{B}_k$ 两两不交。由 L 的取法及式 (3.29), 有

$$Q_{r+\ell+1} \subset \mathcal{D}_L \subset \dots \subset \mathcal{D}_1 \subset Q_s, \quad \mathcal{B}_1, \dots, \mathcal{B}_L \subset Q_s \setminus (F \cup Q_{r+\ell+1}) \subset Q_{r+4\ell} \setminus (F \cup Q_{r+\ell+1}).$$

最后, 由于 $\mathcal{B}_k$ ($1 \leq k \leq L$) 两两不交,

$$\sum_{1 \leq k \leq L} |\{x \in \mathcal{B}_k : |u(x)| \geq h\}| \leq |\{x \in Q_{r+4\ell} \setminus F : |u(x)| \geq h\}|.$$

由鸽巢原理即得式 (3.28)。 □

3.4 线性鞅系统的构造

本节要说明的是: 式 (3.1) 在立方体上传播时, 线性鞅系统会自然出现。

下面令 $s = r + 3\ell$, 其中 $r + 4\ell < R/2$ 且 $\ell \geq bR/\log R$ 。设 F 是一个离散的 (N, ε, ρ) -分级集合, 各参数与引理 3.5 中的取法一致, 并且 R 充分大。回忆引理 3.7 构造的那族调整碗形边界

$$\mathfrak{B}_1, \dots, \mathfrak{B}_L \subset Q_s \setminus (F \cup Q_{r+\ell+1})$$

从中任取一条, 记作 $\mathfrak{B}$, 并把与它对应的区域记作 $\mathfrak{D}$ 。

现在固定方向 e_1 , 把

$$\mathcal{V} = \{e_1 + e_2, e_1 - e_2, e_1 + e_3, e_1 + e_4, \dots, e_1 + e_d\} \quad (3.30)$$

称为可行方向集 (feasible direction set)。这样的方向共有 d 个, 从中任取一个记作 ν 。整套结构在 $e_2, e_3, \dots, e_d$ 这些方向上的坐标变换与反射之下都不改变, 故不妨设 $\nu = e_1 + e_2$ 。

F 中的势 V_x 全部已经冻结 (也就是 F 里的随机性已经揭示), 因此我们只对 $\mathfrak{D} \setminus (Q_r \cup F)$ 中的随机性继续取条件: 把 Q_r 之外的每个 $V_x = \omega_x$ 固定住, 只在 $Q_r \setminus F$ 之内保留随机性。同时回忆定理 3.6: 若事先给出初值 $u|_{\mathfrak{B}}$, 那么当 $Q_r \setminus F$ 中所有的 V_x 都进一步揭示之后, u 在 $\mathfrak{D} \setminus \mathfrak{B}$ 上的全部取值 (从而在 $Q_{r+\ell+1} \setminus Q_r$ 上的取值) 也就随之确定。


构造就在尺度 r 与 ℓ 上进行, 图 6 给出它在二维与三维情形下的示意。

构造 3.8. 对每个取定的能量 E , 下述对象都按所写的方式定义。任取非空子集

$$\mathcal{A} = \{\xi_1, \dots, \xi_p\} \subset \mathfrak{B}, \quad p \geq 1,$$

其基数 p 事先给定。设输入体为 $K \subset \mathbb{C}^p$ 。令 $\mathcal{S} = Q_r \setminus F$, 方向 ν 按式 (3.30) 选取。设 $\mathcal{S} \neq \emptyset$; 回忆前面的设定, $\mathcal{S}$ 之外的随机性已经固定, $\mathcal{S}$ 之内的随机性尚未揭示。

依照方向 ν , 可把 $\mathcal{S}$ 划分为一系列有序且两两不交的源块 $\mathcal{J}_1, \mathcal{J}_2, \dots$ 。每个源块 $\mathcal{J}_f$ 都配备一个目标集 $\mathcal{K}_f \subset Q_{r+\ell+1} \setminus Q_r$, 其元素个数取为



(a) 二维情形下线性鞅系统构造的示意。

(b) 三维情形下源块及其传播的示意。

图 6 构造 3.8 所得线性鞅系统的示意图。(a) 二维情形下该构造的示意；(b) 三维情形下源块及其传播的示意。

$$b_f = \ell_{\text{tag}} := \lfloor \frac{\ell}{4} \rfloor \geq \frac{\ell}{8} \quad (3.31)$$

这些目标彼此不同，并且标记 $(f, k)_{\text{tag}}$ 单射地对应到 $Q_{r+\ell+1} \setminus Q_r$ 中的顶点。

取输入 $v \in K$ ，按

$$u(\xi_i) = v_i \quad (1 \leq i \leq p), \quad u \equiv 0 \quad \text{在 } \mathfrak{B} \setminus \mathcal{A}, \quad (3.32)$$

把它扩充成边界 $\mathfrak{B}$ 上的初值。把 $\mathcal{S} = \mathcal{J}_1 \cup \mathcal{J}_2 \cup \dots$ 上尚未揭示的势 $V_x = \omega_x$ 看作各个源块所含的比特。

定理 3.6 保证我们可以取

$$S_{f,j} = u((f, j)), \quad (f, j) \in \mathcal{S}; \quad Y_{f,k} = u((f, k)_{\text{tag}}), \quad (f, k)_{\text{tag}} \in Q_{r+\ell+1} \setminus Q_r$$

作为源与汇。于是上面便给出一个以 K 为输入体的 (c_0, C_0) -线性鞅系统 $\mathcal{M}_{r,\ell}^E(\nu, \mathfrak{B}, \mathcal{A})$ ，其中

$$c_0 = \lambda, \quad C_0 = e^{C_{\text{recon}}(d, I, \lambda)R}. \quad (3.33)$$

这里的常数 $C_{\text{recon}}(d, I, \lambda)$ 正是定理 3.6 中出现的那个。

构造 3.8 的证明。

第一步：构造源块。 如前所述，可取 $\nu = e_1 + e_2$ 。记

$$y = (t, x, \zeta) \in \mathbb{Z} \times \mathbb{Z} \times \mathbb{Z}^{d-2}. \quad (3.34)$$

当 $d = 2$ 时， $\mathbb{Z}^0$ 表示末项坐标 ζ 恒为零。注意这一论证仅对 $d \geq 2$ 成立，因此本文发展出的方法适用于所有维数 $d \geq 2$ ，但不适用于 $d = 1$ 。

对每一对 (κ, ζ') ，限制

$$\begin{aligned} L(\kappa, \zeta') &= \{(t, x, \zeta) \in \mathbb{Z}^d : t - x = \kappa, \zeta = \zeta'\} \\ &= \{(\kappa + a, a, \zeta') \in \mathbb{Z}^d : a \in \mathbb{Z}\} \end{aligned} \quad (3.35)$$

给出 ν 方向上的一条格点直线。将所有使 $L(\kappa_f, \zeta_f) \cap \mathcal{S} \neq \emptyset$ 成立的二元组 (κ_f, ζ_f) 枚举为 $f = 1, \dots, n_{\text{blk}}$ ，其中 $\mathcal{S} = Q_r \setminus F$ ；先按 κ_f 递增， κ_f 相同时再按 ζ_f 的字典序排列。于是 n_{blk} 就是这些非空格点直线的条数，且 $\zeta_f \in [-r, r]^{d-2} \cap \mathbb{Z}^{d-2}$ 。按下式定义源块

$$\mathcal{J}_f = L(\kappa_f, \zeta_f) \cap \mathcal{S}, \quad r_f = |\mathcal{J}_f|.$$

对每个 f ，将满足 $(\kappa_f + a, a, \zeta_f) \in \mathcal{J}_f$ 的整数 a 按递增序列列出：

$$a_{f,1} < \dots < a_{f,r_f}.$$

这里的下标 f 与 j 与定义 2.1 中的记号一致。

由上述对应，源块中的元素及其对应的比特可写为

$$(f, j) = X_{f,j} := (\kappa_f + a_{f,j}, a_{f,j}, \zeta_f), \quad \omega_{f,j} = V_{X_{f,j}}. \quad (3.36)$$

映射 $(f, j) \mapsto X_{f,j}$ 是到 $\mathcal{S}$ 的双射，从而

$$\mathcal{S} = \bigcup_{1 \leq f \leq n_{\text{blk}}} \mathcal{J}_f.$$

固定 $\mathcal{S}$ 之外的势，记 $\omega = (\omega_x)_{x \in \mathcal{S}}$ 。在此条件律下，各比特 $\omega_{f,j}$ 仍相互独立且取值公平，正如定义 2.1 所要求。

第二步：构造目标集。 现在对第一步得到的每个源块 $\mathcal{J}_f$ 构造其目标集 $\mathcal{K}_f$ 。对 $1 \leq m \leq \ell$ ，定义

$$a_+(\kappa) = \min(r, r - \kappa), a_{f(m)} = a_+(\kappa_f) + m, Z_{f(m)} = (\kappa_f + a_{f(m)} + 1, a_{f(m)}, \zeta_f). \quad (3.37)$$

事实上， $a_+(\kappa)$ 是使点 $(\kappa + a, a, \zeta)$ 落在 Q_r 中（从而落在内边界 $\partial_- Q_r$ 上）的最大 a 。因此

$$Z_{f(m)} \in Q_{r+\ell+1} \setminus Q_r. \quad (3.38)$$

又有

$$Z_{f(m+1)} - Z_{f(m)} = e_1 + e_2 = \nu.$$

可以验证路径 $(Z(1), Z(2), \dots)$ 是一条锥型链，含有 $\ell - 1$ 条边。若令 $Z(0) = (\kappa_f + a_+(\kappa_f) + 1, a_+(\kappa_f), \zeta_f)$ ，则路径 $(Z(0), Z(1), Z(2), \dots)$ 的长度为 $\ell \geq bR / \log R$ ，且仍是锥型链。对这条链应用引理 3.5，得

$$|\{1 \leq m \leq \ell : Z_{f(m)} \notin F\}| \geq |\{0 \leq m \leq \ell : Z_{f(m)} \notin F\}| - 1 \geq \frac{3}{4}\ell - 1 \geq \lfloor \ell/4 \rfloor := \ell_{\text{tag}}.$$

记 $m_{f,1} < \dots < m_{f,\ell_{\text{tag}}}$ 为集合 $\{m \geq 1 : Z_{f(m)} \notin F\}$ 中最小的 ℓ_{tag} 个指标，并令

$$(f, k)_{\text{tag}} = Z_{f(m_{f,k})}, \text{ 对 } 1 \leq k \leq \ell_{\text{tag}}, \mathcal{K}_f = \{(f, k)_{\text{tag}} : 1 \leq k \leq \ell_{\text{tag}}\}. \quad (3.39)$$

映射 $(f, k)_{\text{tag}} \mapsto Z_{f(m_{f,k})}$ 显然是单射。

第三步：源与汇的依赖关系。 现在证明源与汇的依赖结构。式 (3.36) 给出的源元素与式 (3.39) 给出的汇元素为

$$S_{f,j} = u(X_{f,j}), Y_{f,k} = u(Z_{f(m_{f,k})}).$$

我们先考察当某个比特（即某个 V_x 的值）改变时，解如何变化。回忆式 (3.13) 与式 (3.24) 允许我们沿 $-e_1$ 方向，用 u 的较早取值（即第一坐标较小的格点上的取值）展开 $u(v)$ ，并给出式 (3.18)，其系数由式 (3.26) 与式 (3.27) 给出。这说明：若 $u(v)$ 的取值牵涉到 V_w 的值，则必有一条自 v 出发、方向为 $-e_1$ 的锥型链

$$P = (x_0 = v, x_1, x_2, \dots, x_m, \dots),$$

使得某节点满足 $x_i = w + e_1$ 、 $x_{i+1} = w$ 。反过来看，这意味着必有一条自 $w + e_1$ 出发、方向为 e_1 的锥型链 P 经过 v 。在坐标 (3.34) 下， $v = (t, x, \zeta)$ 便落在锥区

$$\text{Cone}(w) = \text{Cone}(t', x', \zeta') := \{(t, x, \zeta) : t - (t' + 1) \geq |x - x'| + |\zeta - \zeta'|_1\} \quad (3.40)$$

之内，其顶点为 $w + e_1 = (t' + 1, x', \zeta')$ 。

现在固定元素 $(f, j) \in \mathcal{J}_f$ ，它对应格点 $X_{f,j} = (\kappa_f + a_{f,j}, a_{f,j}, \zeta_f)$ 。若另一格点 $X_{f',j'} = (\kappa_{f'} + a_{f',j'}, a_{f',j'}, \zeta_{f'})$ 处的比特影响到源 $S_{f,j}$ ，则必须有 $X_{f,j} \in \text{Cone}(X_{f',j'})$ ，即

$$\kappa_f - \kappa_{f'} \geq 1 + (a_{f',j'} - a_{f,j}) + |a_{f',j'} - a_{f,j}| + |\zeta_f - \zeta_{f'}|_1 \geq 1. \quad (3.41)$$

由 f 的排序规则， $\kappa_f > \kappa_{f'}$ 蕴含 $f > f'$ 。于是此处的源依赖满足比定义 2.1 的式 (2.1) 更强的条件：它只依赖于 $\omega_{\kappa < \kappa_f}$ ，而这是 $\omega_{< f}$ 的一个子串，并与那些 $\kappa = \kappa_f$ 但 $\zeta < \zeta_f$ 的其他源块上的比特无关。因此源 $S_{f,j}$ 只依赖于更早的源块，可表为

$$S_{f,j}(\omega_{< f}; v) := u(X_{f,j}; v, \omega_{\kappa < \kappa_f}) = u(X_{f,j}; v, \omega_{< f}). \quad (3.42)$$

对汇 $(f, k)_{\text{tag}} = Z_{f(m_{f,k})} = (\kappa_f + a_+(\kappa_f) + m_{f,k} + 1, a_+(\kappa_f) + m_{f,k}, \zeta_f)$ 作同样的讨论。若某 $X_{f',j'}$ 处的比特影响汇 $Y_{f,k}$ ，则必须有 $Z_{f(m_{f,k})} \in \text{Cone}(X_{f',j'})$ ，从而

$$\kappa_f - \kappa_{f'} \geq (a_{f',j'} - a_+(\kappa_f) - m_{f,k}) + |a_{f',j'} - a_+(\kappa_f) - m_{f,k}| + |\zeta_f - \zeta_{f'}|_1 \geq 0. \quad (3.43)$$

此处重要的是观察到

$$\kappa_{f'} = \kappa_f \Rightarrow \zeta_{f'} = \zeta_f. \quad (3.44)$$

这再次说明此处的汇依赖满足比定义 2.1 的式 (2.2) 更强的条件：它只依赖于 $(\omega_{\kappa < \kappa_f}, \omega_f)$ ，而这是 $\omega_{\leq f}$ 的一个子串，并与那些 $\kappa = \kappa_f$ 但 $\zeta \neq \zeta_f$ 的其他源块上的比特无关。于是汇也可表为

$$Y_{f,k}(\omega_{\leq f}; v) := u(Z_{f(m_{f,k})}; v, (\omega_{\kappa < \kappa_f}, \omega_f)) = u(Z_{f(m_{f,k})}; v, \omega_{\leq f}) \quad (3.45)$$

注记 3.9。 事实上，由于 $\mathcal{J}_f$ 与 $\mathcal{K}_f$ 都落在形如式 (3.35)、方向为 $\nu = e_1 + e_2$ 的直线上，同样的论证与结论对解在直线上的取值关于更早比特的依赖关系同样成立。更确切地说，用同样的方法可证： u 在 $L(\kappa, \zeta)$ 上的取值只依赖于子串 $\omega_{\kappa' < \kappa \circ}$

第四步：验证传播条件。现在考虑一个源块 $\mathcal{J}_f$ 及其目标集 $\mathcal{K}_f$ 。任取一个元素 $(f, j) \in \mathcal{J}_f$ 、子串 $\omega_{<f}$ 、 $\mathcal{J}_f$ 中其余的比特，以及输入 $v \in K$ 。为简便起见，下文记

$$X = X_{f,j}, X_n = X + n\nu (n \in \mathbb{Z}), a = a_{f,j}, A = A_{f,k} = a_+(\kappa_f) + m_{f,k}, A \geq a + 1, Z = Z_{f(m_{f,k})}.$$

可以直接验证 $Z = X + (A - a + 1)e_1 + (A - a)e_2 = X_{A-a} + e_1$ 。在所固定的构型（即先前固定的比特与输入 v ）下，记 U^1 为取 $\omega_{f,j} = 1$ 时式 (3.1) 的解， U^0 为取 $\omega_{f,j} = 0$ 时的解，并令 $D(y) = U^1(y) - U^0(y)$ 。由于 $\omega_{\kappa < \kappa_f}$ 已被固定，式 (3.42) 保证

$$U^1(\tilde{X}) = U^0(\tilde{X}), D(\tilde{X}) = 0, \forall \tilde{X} \in \mathcal{J}_{f'}, \text{ 其中 } \kappa_{f'} \leq \kappa_f.$$

进一步，注记 3.9 给出

$$U^1(\tilde{X}) = U^0(\tilde{X}), D(\tilde{X}) = 0, \forall \tilde{X} \in L(\kappa, \zeta) \text{ 其中 } \kappa \leq \kappa_f. \quad (3.46)$$

此外 $D|_{\mathfrak{B}} = 0$ 。在 X_n 处将 U^1 与 U^0 的逐点递推式 (3.1) 相减，得

$$\begin{aligned} D(X_n + e_1) + D(X_{n-1} + e_1) &= (2d - E + \lambda V_{X_n}^1) D(X_n) - D(X_n - e_1) - D(X_n + e_2) \\ &= - \sum_{\sigma=\pm 1, 3 \leq i \leq d} D(X_n + \sigma e_i) + \lambda 1_{n=0} S_{f,j}(\omega_{<f}; v). \end{aligned} \quad (3.47)$$

这里用到了 $X_n - e_2 = X_{n-1} + e_1$ 。容易验证式 (3.47) 右端的所有取值都落在某条满足 $\kappa \leq \kappa_f$ 的直线 $L(\kappa, \zeta)$ 上，故式 (3.46) 适用。于是式 (3.47) 化为

$$D(X_n + e_1) + D(X_{n-1} + e_1) = \lambda 1_{n=0} S_{f,j}(\omega_{<f}; v). \quad (3.48)$$

最后，格点 $X_n + e_1 \in L(\kappa_f + 1, \zeta_f)$ ；又因 Q_r 之外的随机性在最初已确定，式 (3.48) 对沿 $L(\kappa_f + 1, \zeta_f) \cap \mathfrak{D}$ 的所有 $X_n + e_1, X_{n-1} + e_1$ 均成立。因此可找到某个 $n_0 < 0$ ，使 $X_{n_0} + e_1 \in \mathfrak{B}$ 。（否则若无这样的 n_0 ，由于 $X_{n-1} + e_1 \in \mathfrak{C}(X_n + e_1, -e_1)$ ，由式 (3.23) 及 $X_0 + e_1 \in \mathfrak{D}$ 便得对所有 $n \leq 0$ 有 $X_n + e_1 \in \mathfrak{D} \subset Q_s$ ；但直线 $L(\kappa_f + 1, \zeta_f)$ 必然穿出 Q_s ，矛盾。）于是

$$D(X_{n_0} + e_1) = 0. \quad (3.49)$$

参见图 7。




图 7 式 (3.49) 的图示。

将式 (3.49) 代回式 (3.48), 得

$$D(X_n + e_1) = \begin{cases} 0 & \text{当 } n \leq -1 \\ (-1)^n \lambda S_{f,j}(\omega_{<f}; v) & \text{当 } n \geq 0 \end{cases} \quad (3.50)$$

于是取 $n = A - a$, 便证得

$$U^1(Z) - U^0(Z) = (-1)^{A-a} \lambda S_{f,j}(\omega_{<f}; v),$$

这正是

$$Y_{f,k}^1(\hat{\omega}_{f,j}; v) - Y_{f,k}^0(\hat{\omega}_{f,j}; v) = \lambda(-1)^{A_{f,k}-a_{f,j}} S_{f,j}(\omega_{<f}; v). \quad (3.51)$$

这就以 $c_{f,j,k} = \lambda(-1)^{A_{f,k}-a_{f,j}}$ 、 $c_0 = \lambda$ 验证了传播条件式 (2.3)。

第五步: 验证有界性条件。 由源与汇的选取方式以及式 (3.18), 我们可直接保证式 (2.1) 与式 (2.2), 其中

$$s_{f,j,i}(\omega_{<f}) = \mathcal{W}(X_{f,j}, \xi_i), y_{f,k,i}(\omega_{\leq f}) = \mathcal{W}(Z_{f(m_{f,k})}, \xi_i) \quad (3.52)$$

对每个 $\xi_i \in \mathcal{A}$ 成立。至于条件式 (2.4), 由定理 3.6 中的式 (3.19) 取 $C_0 = e^{C_{\text{recon}} R}$ 即立得 (因 $s < R/2$)。□

3.5 通过环状结构做多尺度自举, 以及 PDUC 的证明

证 PDUC 之前, 还差最后一项准备。下面的组合引理说明: 对任意有限集 $S \subset \mathbb{Z}^d$, 都能找到一个方向 $\nu \in \mathcal{V}$, 使许多条格点直线 $x + \mathbb{Z}\nu$ 与 S 相交。

引理 3.10。 设 $d \geq 2$, $S \subset \mathbb{Z}^d$ 为有限集, 记 $\gamma := (d-1)/d$ 。则存在 $\nu \in \mathcal{V}$, 使得

$$|\{(x + \mathbb{Z}\nu) : x \in \mathbb{Z}^d, (x + \mathbb{Z}\nu) \cap S \neq \emptyset\}| \geq \left(\frac{|S|}{2}\right)^\gamma \quad (3.53)$$

证明。 $S = \emptyset$ 时结论显然, 故以下设 $S \neq \emptyset$ 。记

$$v_1 := e_1 + e_2, \quad v_2 := e_1 - e_2, \quad v_i := e_1 + e_i \quad (3 \leq i \leq d),$$

并令

$$A := (v_1 \quad \cdots \quad v_d), \quad \mathcal{L} := A\mathbb{Z}^d.$$

对 $a = (a_1, \dots, a_d) \in \mathbb{R}^d$, 有

$$Aa = \left(a_1 + a_2 + \sum_{j=3}^d a_j, \quad a_1 - a_2, \quad a_3, \dots, a_d\right). \quad (3.54)$$

特别地 $\det A = -2$, 故 A 可逆。

我们断言

$$\mathcal{L} = \{x \in \mathbb{Z}^d : \sum_{j=1}^d x_j \in 2\mathbb{Z}\}. \quad (3.55)$$

事实上, 若 $x = Aa$ 而 $a \in \mathbb{Z}^d$, 则

$$\sum_{j=1}^d x_j = 2a_1 + 2 \sum_{j=3}^d a_j \in 2\mathbb{Z},$$

于是 (3.55) 中的包含关系 $\subset$ 成立。反过来, 设 $x \in \mathbb{Z}^d$ 且 $\sum_{j=1}^d x_j$ 为偶数。令

$$a_1 := \frac{x_1 + x_2 - \sum_{j=3}^d x_j}{2}, \quad a_2 := \frac{x_1 - x_2 - \sum_{j=3}^d x_j}{2}, \quad a_j := x_j \quad (3 \leq j \leq d). \quad (3.56)$$

(3.56) 右端两个分子都与 $\sum_{j=1}^d x_j$ 模 2 同余, 故 $a \in \mathbb{Z}^d$; 再直接代入 (3.54) 即得 $Aa = x$ 。于是 (3.55) 中的反向包含 $\supset$ 也成立, (3.55) 得证。

又因为

$$e_1 + \mathcal{L} = \{x \in \mathbb{Z}^d : \sum_{j=1}^d x_j \in 2\mathbb{Z} + 1\},$$

分解 $\mathbb{Z}^d = \mathcal{L} \cup (e_1 + \mathcal{L})$ 恰好给出 $\mathcal{L}$ 在 $\mathbb{Z}^d$ 中的两个陪集。由鸽巢原理, $\mathcal{L}$ 与 $\mathcal{L} + e_1$ 中至少有一个与 S 相交的格点数超过 $|S|/2$ 。不妨设 $|\mathcal{L} \cap S| \geq |S|/2$ 。

下面把 $\mathcal{L} \cap S$ 中的点改用基 ν 来表示, 这等价于把 $A^{-1}(\mathcal{L} \cap S)$ 嵌入 $\mathbb{Z}^d$ 。对每个 $1 \leq i \leq d$, 令

$$\pi_i : \mathbb{Z}^d \rightarrow \mathbb{Z}^{d-1}, \quad \pi_i(y_1, \dots, y_d) := (y_1, \dots, y_{i-1}, y_{i+1}, \dots, y_d).$$

离散的 Loomis-Whitney 不等式给出

$$|S \cap \mathcal{L}|^{d-1} \leq \prod_{i=1}^d |\pi_i(S \cap \mathcal{L})|.$$

因此存在某个 $i \in \{1, \dots, d\}$, 使得

$$|\pi_i(S)| \geq |\pi_i(S \cap \mathcal{L})| \geq |S \cap \mathcal{L}|^{\frac{d-1}{d}} \geq \left(\frac{|S|}{2}\right)^\gamma. \quad (3.57)$$

固定这样一个指标 i 。沿方向 v_i 看, 对一切 $(y_1, \dots, y_{i-1}, y_{i+1}, \dots, y_d) \in \pi_i(S)$, 都有

$$((y_1 v_1 + \cdots + y_{i-1} v_{i-1} + y_{i+1} v_{i+1} + \cdots) + \mathbb{Z}v_i) \cap S \neq \emptyset.$$

这就证明了 (3.53). □

现在来证定理 3.2. 构造 3.8 已经在尺度 r, ℓ 上造出了线性鞅系统 $\mathcal{M}_{r,\ell}^E(\nu, \mathfrak{B}, \mathcal{A})$, 证明的关键思路可以这样理解: 在大立方体里选取若干个不同的尺度, 每个尺度上各造一族线性鞅系统; 这些尺度把立方体切成一环套一环的环状结构 (annular structure). 对每个线性鞅系统套用传播引理 (引理 2.4), 就能以极高概率给出 $|u|$ 在下一尺度达到阈值的格点数目的下界. 把这个估计迭代下去, 这样的格点数目便随一环又一环向外推进而不断增加.

沿环逐圈自举这一手法, 在 ABM 的定域化研究中并不新鲜. 早在 Imbrie 的工作 [52, 命题 3.2] 中, 类似想法就被用来以高概率证明共振本征值个数的严格单调性. [9, 第 4 节] 则把环状结构讲得更明白: 那里作者沿用与 [52, 命题 3.2] 相近的想法, 为 $d \geq 4$ 时的相应模型建立了 Wegner 估计. 我们认为, 这一结构无论在定域化理论还是在多尺度分析中都是值得注意的现象.

定理 3.2 的证明.

先取 $0 < \varepsilon < \varepsilon_0$, 再取 $\rho_1 \geq L_*(N, \varepsilon)$, 这里的 ε_0 与 L_* 由引理 3.5 给出, 于是引理 3.5 便可用上.

下面设 F 是一个给定的离散 (N, ε, ρ) -分级集合, 且在 Q_R 中正规. 由线性性, 只需考虑满足 $u(0) = 1$ 的归一化解. 仿照引理 3.10 记 $\gamma = (d-1)/d$, 并令

$$J = \min\{j \geq 1 : \gamma^j \log R \leq 1\}, \quad w_j = \gamma^{J-1-j}, \quad 0 \leq j < J.$$

我们在立方体 Q_R 内构造如下尺度:

$$r_0 = \left\lfloor \frac{Rw_0}{64d} \right\rfloor, \quad \ell_j = \left\lfloor \frac{Rw_j}{64d} \right\rfloor, \quad r_{j+1} = r_j + 4\ell_j \quad (3.58)$$

当 $R \gg \frac{1}{d}$ 时, 直接计算即可保证

$$\frac{1}{\log R} < w_0 \leq \frac{1}{\gamma \log R}, \quad \sum_{j < J} w_j \leq d, \quad \frac{Rw_j}{128d} \leq \ell_j \leq \frac{Rw_j}{64d}, \quad r_J < \frac{R}{4}. \quad (3.59)$$

特别地 $J = O_{d(\log \log R)}$. 由 (3.59) 还可知, 上面所有的 r_i 、 ℓ_i 以及 $s_i = r_i + 3\ell_i$ 都满足引理 3.7 与构造 3.8 所要求的尺度条件, 相应的参数为

$$b = \frac{1}{4096d}.$$

为了描述解的取值, 对 $0 \leq j < J$ 引入下面几个量:

$$H_0 = e^{-R}, \quad H_{j+1} = H_j e^{-BRw_j}, \quad \delta_j = \frac{H_j}{2}, \quad \tau_j = H_j e^{-BR\frac{w_j}{2}}, \quad (3.60)$$

其中 B 是稍后确定的大常数. 这一取法配上 (3.59) 给出

$$H_j \geq \exp\left(-BR \sum_{0 \leq j < J} w_j\right) H_0 \geq e^{-(Bd+1)R} \quad (3.61)$$

它对一切 $0 \leq j \leq J$ 成立. 同理, 对每个 $0 \leq j < J$ 都有 $\tau_j \geq e^{-(Bd+1)R}$. 对每个归一化解 u , 把大值集及其基数定义为

$$S_j = \{x \in Q_{r_j} \setminus F : |u(x)| \geq H_j\}, \quad m_j = |S_j|, \quad 0 \leq j \leq J. \quad (3.62)$$

这些集合依赖于 u . 第一步对每一个这样的解都给出确定性估计; 第二步先构造一个与 u 的选取无关的事件, 第三步才能使用上述集合.

第一步: 自举的起点 因为 $u(0) = 1$, 命题 3.4 给出一条自原点出发、整条落在 Q_{r_0} 内的锥型链, 链长为 $\lfloor r_0/4 \rfloor$, 沿该链有

$$|u(x)| \geq e^{-C_{\text{cone}} \lfloor \frac{r_0}{4} \rfloor}.$$

当 R 充分大时, 链长满足

$$\left\lfloor \frac{r_0}{4} \right\rfloor \geq \frac{R}{1024d \log R} \geq \frac{bR}{\log R},$$

故由引理 3.5, 这条锥型链中至少有 $3\lfloor r_0/4 \rfloor/4 \geq 3R/(4096d \log R)$ 个顶点不在 F 中. 又因为

$$C_{\text{cone}} \left\lfloor \frac{r_0}{4} \right\rfloor \lesssim_{d, I, \lambda} \frac{R}{\log R} \leq R,$$

所以这些顶点处的函数值模长都不小于 $H_0 = e^{-R}$. 于是对每个解, 确定性地有

$$m_0 \geq |\{x \in Q_{r_0} \setminus F : |u(x)| \geq e^{-C_{\text{cone}} \lfloor \frac{r_0}{4} \rfloor}\}| \geq \frac{3R}{4096d \log R}. \quad (3.63)$$

这个估计就是自举的起点。

第二步：概率估计 接着构造所需的概率事件。此时分级集合 F 已经固定，故对每个指标 $0 \leq j < J$ ，由引理 3.7 可得一族（共 $L_j := \lfloor \ell_j/8 \rfloor \geq \ell_j/10$ 个）调整后的碗形边界

$$\mathfrak{B}_1^j, \dots, \mathfrak{B}_{L_j}^j \subset Q_{r_{j+1}} \setminus (F \cup Q_{r_j+\ell_j+1}).$$

再对每个边界 $\mathfrak{B}_k^j$ ($1 \leq k \leq L_j$) 以及可行方向集 $\mathcal{V}$ 中的每个方向 ν ，固定一个基数 $1 \leq p \leq |\mathfrak{B}_k^j|$ ，并取子集 $\mathcal{A} \subset \mathfrak{B}_k^j$ 使 $|\mathcal{A}| = p$ 。把这些数据全部固定之后，构造 3.8 给出一个 $(c_0, C_{0,j})$ -线性鞅系统 $\mathcal{M}_{r_j, \ell_j}^{E_0}(\nu, \mathfrak{B}_k^j, \mathcal{A})$ ，其中

$$c_0 = \lambda, \quad C_{0,j} = e^{DRw_j},$$

这里 $D = D(d, \lambda, I) > 0$ 是只依赖 d, λ, I 的常数。 c_0 与 $C_{0,j}$ 为何如此选取，下面的论证会说清楚。由于

$$\sum_{i=0}^{j-1} w_i \leq (d-1)w_j,$$

对一切 $0 \leq j < J$ 都有

$$s_j := r_j + 3\ell_j \leq \frac{Rw_j}{64d}(1 + 4(d-1) + 3) = \frac{Rw_j}{16}.$$

于是可以在半径 s_j 处使用定理 3.6，得到

$$\begin{aligned} \sup_{E \in I, k} \|\mathcal{W}(v, w) \big|_{\infty, \mathfrak{D}_k^j \times \mathfrak{B}_k^j}\| &\leq e^{C_{\text{recon}} s_j} \leq e^{DRw_j}, \\ \sup_{E \in I, k} \|\partial_E \mathcal{W}(v, w) \big|_{\infty, \mathfrak{D}_k^j \times \mathfrak{B}_k^j}\| &\leq e^{C_{\text{recon}} s_j} \leq e^{DRw_j}. \end{aligned}$$

其中 $D = D(d, \lambda, I) > 0$ 是充分大的常数。我们取 $B = 2D + 8$ 。据此定义指标集

$$\text{SysIndex} = \{\mathbf{i} : \mathbf{i} = (j, k, \nu, \mathcal{A}), \text{按上述方式确定}\} \quad (3.64)$$

对每个 $\mathbf{i} \in \text{SysIndex}$ ，记相应的线性鞅为 $\mathcal{M}^{E_0}(\mathbf{i})$ 。现在固定 $\mathbf{i} = (j, k, \nu, \mathcal{A})$ ，记 $p = |\mathcal{A}|$ ，并取输入体

$$K_p = B_{R_{\text{in}}} \subset \mathbb{C}^p, \quad R_{\text{in}} = e^{(K+1)R}.$$

记 $N_{\mathbf{i}}$ 为该系统源标记与汇标记的总数：

$$N_{\mathbf{i}} = \sum_{f=1}^{n_{\text{blk}}} (r_f + b_f).$$

由构造 3.8，源枚举的是 $Q_{r_j} \setminus F$ 中的格点，汇则是 $Q_{r_j+\ell_j+1} \setminus Q_{r_j}$ 中互不相同的格点，从而

$$N_{\mathbf{i}} \leq |Q_{r_j+\ell_j+1}| \leq |Q_R| \lesssim_d R^d.$$

下面要对这样的 $\mathcal{M}^{E_0}(\mathbf{i})$ 使用传播引理。与构造 3.8 的做法一致，我们先把 $Q_{r_j} \setminus F$ 之外的随机性条件化（即对 $(\omega_x)_{x \notin Q_{r_j} \cup F}$ 取条件），只保留 $Q_{r_j} \setminus F$ 内的随机性，也就是 $\mathcal{M}^{E_0}(\mathbf{i})$ 的那些比特。

回忆 (3.60) 对该系统给出 $\delta_j = H_j/2$ ， $\tau_j = H_j e^{-BRw_j/2}$ 。同时必有 $p \leq |\mathfrak{B}_k^j| \leq |Q_R| \lesssim_d R^d$ 。我们可以估计

$$\begin{aligned} \log \left(\frac{\delta_j \min(1, \frac{c_0}{2})}{D_p \tau_j} \right) &= \frac{B}{2} R w_j - \log \left(\frac{2D_p}{\min(1, \frac{\lambda}{2})} \right) \geq \frac{B}{3} R w_j \\ \log \left(C_{0,j} \frac{R_{\text{in}}}{\tau_j} \right) &\leq (D + K + 2 + Bd) R \end{aligned} \quad (3.65)$$

第二个不等式用到了 (3.61)。因此 (2.13) 中的记录预算 $m = m(\mathbf{i})$ 满足

$$m \lesssim_{d, \lambda, I, K} \frac{p}{w_j}. \quad (3.66)$$

此外，(3.65) 的第一个不等式保证了 $\delta_j \min(1, c_0/2) > D_p \tau_j$ ；而 $\tau_j/C_{0,j} < R_{\text{in}}$ 是显然的。于是传播引理（引理 2.4）可以使用。再由 $\mathcal{M}^{E_0}(\mathbf{i})$ 的构造（见 (3.31)）可知，每个目标集都含有 $\ell_{\text{tag}, j} = \lfloor \ell_j/4 \rfloor$ 个目标。因此引理 2.4 给出：把 T_p 记作待定的量，则除一个满足

$$\mathbb{P}\left[\mathcal{U}(\mathbf{i}) \mid (\omega_x)_{x \notin Q_{r_j} \cup F}, V_F = v_F\right] \leq e^{-T_p}$$

的概率事件 $\mathcal{U}(\mathbf{i})$ 之外, 对输入体 K_p 中的任意输入 v 都有

$$2M_{\tau_j}^{\mathbf{i}}(v) \geq \frac{1-e^{-1}}{2} \ell_{\text{tag},j} P_{\delta_j}^{\mathbf{i}}(v) - \ell_{\text{tag},j} [m(1 + \log(N_{\mathbf{i}} + 1)) + T_p], \quad (3.67)$$

其中 $M_{\tau_j}^{\mathbf{i}}(v)$ 与 $P_{\delta_j}^{\mathbf{i}}(v)$ 分别由 (2.12) 与 (2.15) 定义。再对 $(\omega_x)_{x \notin Q_{r_j} \cup F}$ 取期望, 便有

$$\mathbb{P}[\mathcal{U}(\mathbf{i}) \mid V_F = v_F] \leq e^{-T_p}. \quad (3.68)$$

现在对所有坏事件 $\mathcal{U}(\mathbf{i})$ 作联合界。因为 $\mathbf{i} = (j, k, \nu, \mathcal{A})$, 可按 $p = |\mathcal{A}|$ 把指标集分解为

$$\text{SysIndex} = \cup_{1 \leq p \leq R^d} \text{SysIndex}_p, \quad \text{SysIndex}_p = \{(j, k, \nu, \mathcal{A}) \in \text{SysIndex} : |\mathcal{A}| = p\}.$$

这里 $0 \leq j < J$ 的个数为 J ; $\mathfrak{B}_k^j$ 的个数不超过 $L_j \leq \ell_j/8$; $\nu \in \mathcal{V}$ 的个数为 d ; 最关键的是, $\mathfrak{B}_k^j$ 中满足 $|\mathcal{A}| = p$ 的 $\mathcal{A}$ 的个数至多为

$$(|\mathfrak{B}_k^j|)^p \leq (|Q_R|)^p \leq \exp((d+1)p \log R),$$

这里设 $R \gg_d 1$ 。因此

$$|\text{SysIndex}_p| \lesssim_d \sum_{0 \leq j < J} \ell_j \exp((d+1)p \log R) \leq R^2 \exp((d+1)p \log R) \quad (3.69)$$

这里仍然要求 $R \gg_d 1$ 。于是记

$$\mathcal{U}_R := \cup_{\mathbf{i} \in \text{SysIndex}} \mathcal{U}(\mathbf{i}),$$

由 (3.68) 与 (3.69) 得到

$$\begin{aligned} \mathbb{P}[\mathcal{U}_R \mid V_F = v_F] &\leq R^2 \sum_{1 \leq p \leq R^d} \exp((d+1)p \log R - T_p) \\ &\leq R^{d+3} \sup_{1 \leq p \leq R^d} \exp((d+1)p \log R - T_p). \end{aligned} \quad (3.70)$$

故取

$$T_p = (d+1)p \log R + (d+3) \log R + \eta \left(\frac{R}{\log R} R \right)^\gamma \quad (3.71)$$

从而

$$\mathbb{P}[\mathcal{U}_R \mid V_F = v_F] \leq \exp \left[-\eta \left(\frac{R}{\log R} R \right)^\gamma \right]. \quad (3.72)$$

这里 $\eta > 0$ 是稍后确定的固定小常数。于是对随机性任一构型 $\omega \notin \mathcal{U}_R$, (3.67) 化为

$$\begin{aligned} 2M_{\tau_j}^{\mathbf{i}}(v) &\geq \frac{1-e^{-1}}{2} \ell_{\text{tag},j} P_{\delta_j}^{\mathbf{i}}(v) - \ell_{\text{tag},j} [m(1 + \log(N_{\mathbf{i}} + 1)) + T_p] \\ &\geq \frac{1}{20} \ell_j P_{\delta_j}^{\mathbf{i}}(v) - \ell_j \cdot O_{d,\lambda,I,K} \left(\frac{p}{w_j} \log R + \log R \right) - \eta \ell_j \left(\frac{R}{\log R} R \right)^\gamma, \end{aligned} \quad (3.73)$$

它对所有 $\mathbf{i}$ 一致成立, 并且对输入 $v \in K_p$ 也一致成立。这里用到 (3.66)、 $N_{\mathbf{i}} \leq |Q_R| \lesssim_d R^d$ 以及 $\ell_j/5 \leq \ell_{\text{tag},j} \leq \ell_j$ 。我们最终取

$$\mathcal{E}_{R(F,v_F,E_0)} = \mathcal{U}_R^c$$

作为所需的事件。

第三步: 借环状结构自举 事件 $\mathcal{E}_{R(F,v_F,E_0)}$ 既已构造好, 就任取 $\omega \in \mathcal{E}_R$, 并令 $V_x = \omega_x$ ($x \in Q_R \setminus F$)。再任取方程 $Hu = Eu$ 在 Q_{R-1} 内满足

$$u(0) = 1, \quad |E - E_0| \leq e^{-aR}, \quad \|u\|_{\infty, Q_R} \leq e^{KR}$$

的一个解, 并使用 (3.62) 中该解对应的大值集 S_j 与基数 m_{j_0}

对每个 $0 \leq j < J$, 由引理 3.7 存在指标 $1 \leq \nu_j \leq L_j$ 使得

$$|\{x \in \mathfrak{B}_{\ell_j}^j : |u(x)| \geq H_{j+1}\}| \leq \frac{10}{\ell_j} |\{x \in Q_{r_{j+1}} \setminus F : |u(x)| \geq H_{j+1}\}| = \frac{10m_{j+1}}{\ell_j}. \quad (3.74)$$

令

$$\mathcal{A} = \{x \in \mathfrak{B}_{\ell_j}^j : |u(x)| \geq H_{j+1}\}, \quad p = |\mathcal{A}| \leq \frac{10m_{j+1}}{\ell_j}.$$

这里 $p \geq 1$: 否则由 (3.20) 就有 $|u(0)| \leq e^{DRw_j} H_{j+1} < 1$, 与 $u(0) = 1$ 矛盾。对每个 $x \in \mathcal{A}$ 取输入 $v_x = u(x)$, 这样得到的 v 落在输入体 $K_p = B_{R_{\text{in}}} \subset \mathbb{C}^p$ 之中, 因为

$$p \lesssim_d R^d \implies \|v\|_2 \leq \sqrt{p} \|u\|_{\infty, Q_R} \leq \sqrt{p} e^{KR} \leq R_{\text{in}} = e^{(K+1)R}. \quad (3.75)$$

此外, 把引理 3.10 用于 S_j , 可找到 $\nu \in \mathcal{V}$ 使得

$$|\{x + \mathbb{Z}\nu : x \in \mathbb{Z}^d, (x + \mathbb{Z}\nu) \cap S_j \neq \emptyset\}| \geq \left(\frac{m_j}{2}\right)^\gamma. \quad (3.76)$$

下面就把 (3.73) 用于这个指标 $\hat{\mathbf{i}} = (j, \ell_j, \nu, \mathcal{A})$ 以及上面构造出的输入 v 。

记 $\tilde{u}_1$ 为方程 $H\tilde{u}_1 = E_0\tilde{u}_1$ 的解, 它在边界 $\mathfrak{B}_{\ell_j}^j$ 上的边值数据换成

$$\tilde{u}_1(x) = 0, \quad x \in \mathfrak{B}_{\ell_j}^j \setminus \mathcal{A}; \quad \tilde{u}_1(x) = v_x = u(x), \quad x \in \mathcal{A}, \quad (3.77)$$

并记 $\tilde{u}_2$ 为方程 $H\tilde{u}_2 = E\tilde{u}_2$ 的解, 其边界条件与 $\tilde{u}_1$ 相同。由定理 3.6 中的 (3.19) 与 (3.20) 可得

$$\|u - \tilde{u}_2\|_{\infty, Q_{r_j+\ell_{j+1}}} \leq e^{C_{\text{recon}} s_j} \|u - \tilde{u}_2\|_{\infty, \mathfrak{B}} \leq e^{DRw_j} H_{j+1} \leq \frac{\tau_j}{8}, \quad (3.78)$$

再由 Cauchy-Schwarz 不等式,




图 8 沿多尺度立方体进行的环状自举示意图。

$$\begin{aligned} \|\tilde{u}_1 - \tilde{u}_2\|_{\infty, Q_{r_j+\ell_j+1}} &\leq |E - E_0| \cdot \sup_{E \in I} \|\partial_E \mathcal{W}(v, w)\|_2 \cdot \|v\|_{2, \mathfrak{B}} \\ &\lesssim_d e^{-aR} R^{\frac{d}{2}} e^{DRw_j} R_{\text{in}} \leq e^{-(a-D-K-2)R} = e^{-2(Bd+1)R} \leq \frac{\tau_j}{8} \end{aligned} \quad (3.79)$$

这里设 $a = D + K + 2 + 2(Bd + 1)$, 并用到 (3.61) 与 $R \gg_{d, I, \lambda} 1$ 。把这两个估计合起来使得

$$\|u - \tilde{u}_1\|_{\infty, Q_{r_j+\ell_j+1}} \leq \frac{\tau_j}{4}. \quad (3.80)$$

注意 $\tilde{u}_1$ 恰是线性鞅系统 $\mathcal{M}^{E_0}(\mathfrak{i})$ 重构出的源与汇, 因此 (3.73) 对这个解给出

$$2M_{\tau_j}^{\mathfrak{i}}(v) \geq \frac{1}{20} \ell_j P_{\delta_j}^{\mathfrak{i}}(v) - \ell_j \cdot O_{d, \lambda, I, K} \left(\frac{p}{w_j} \log R + \log R \right) - \eta \ell_j \left(\frac{R}{\log R} R \right)^\gamma$$

由 (2.15), 恰好有

$$P_{\delta_j}^{\mathfrak{i}}(v) = |\{(x + \mathbb{Z}\nu) : x \in \mathbb{Z}^d, (x + \mathbb{Z}\nu) \cap \{y \in Q_{r_j} \setminus F : |\tilde{u}_1(y)| \geq \delta_j\} \neq \emptyset\}|.$$

因为 $H_j - \tau_j/4 > \delta_j$, 由 (3.80) 可知 $S_j \subset \{y \in Q_{r_j} \setminus F : |\tilde{u}_1(y)| \geq \delta_j\}$, 于是由 (3.76) 得

$$P_{\delta_j}^{\mathfrak{i}}(v) \geq \left(\frac{m_j}{2} \right)^\gamma. \quad (3.81)$$

又由 (2.12),

$$M_{\tau_j}^{\mathfrak{i}}(v) \leq |\{y \in Q_{r_j+\ell_j+1} \setminus F : |\tilde{u}_1(y)| > \tau_j\}|.$$

因为 $\tau_j - \tau_j/4 > H_{j+1}$, $r_j + \ell_j + 1 < r_{j+1}$, 再由 (3.80), 上式右端集合含于 S_{j+1} , 从而

$$M_{\tau_j}^{\mathfrak{i}}(v) \leq m_{j+1}. \quad (3.82)$$

把 (3.81) 与 (3.82) 代回 (3.73), 就得到关键的递推关系

$$2m_{j+1} \geq c_* \ell_j m_j^\gamma - \ell_j \cdot C_* \left(\frac{p}{w_j} \log R + \log R \right) - \eta \ell_j \left(\frac{R}{\log R} R \right)^\gamma, \quad (3.83)$$

其中 $c_* = 2^{-\gamma}/20 > 0$, $C_* = C_*(d, \lambda, I, K)$, 二者都与 η 无关。把它改写为

$$\left(2 + C_* \frac{\log R}{w_j} \right) m_{j+1} \geq c_* \ell_j m_j^\gamma - C_* \ell_j \log R - \eta \ell_j \left(\frac{R}{\log R} R \right)^\gamma.$$

现在确定 (3.72) 中概率预算 η 的具体取法。回忆 (3.63) 给出 $m_j \geq m_0 \geq 3R/(4096d \log R)$ 。把 η 取得足够小, 再令 $R \gg_{d, \lambda, I, K} 1$, 就能保证

$$C_* \log R + \eta \left(\frac{R}{\log R} R \right)^\gamma \leq \frac{c_*}{2} m_j^\gamma. \quad (3.84)$$

于是

$$\left(2 + C_* \frac{\log R}{w_j} \right) m_{j+1} \geq c_* \ell_j \frac{m_j^\gamma}{2}.$$

由此存在常数 $c_{**} = c_{**}(d, \lambda, I, K)$ 使得

$$m_{j+1} \geq c_{**} \frac{R w_j^2}{\log R} m_j^\gamma, \quad 0 \leq j < J. \quad (3.85)$$

最后记 $x_j = m_j/R^d$ 。由于 $1 + d\gamma = d$,

$$x_{j+1} \geq \frac{c_{**} w_j^2}{\log R} x_j^\gamma, \quad x_0 \geq \frac{3R^{1-d}}{4096d \log R}.$$

反复使用 (3.85) 就得

$$x_J \geq \left(\frac{3}{4096d \log R} \right)^{\gamma^J} R^{-(d-1)\gamma^J} \left(\frac{c_{**}}{\log R} \right)^{\sum_{k=0}^{J-1} \gamma^k} \gamma^{2 \sum_{k=0}^{J-1} k \gamma^k}. \quad (3.86)$$

此处可以估计

$$\gamma^J \log R \leq 1, \quad \sum \gamma^k \leq d, \quad \sum k \gamma^k \leq \frac{\gamma}{(1-\gamma)^2}.$$

于是 $x_J \gtrsim 1/(\log R)^d$, 即

$$m_J \gtrsim \frac{R^d}{(\log R)^d}.$$

由 $Q_{r_J} \subset Q_R$ 以及 (3.61) 给出的 $H_J \geq e^{-(Bd+1)R}$, 至此 (3.3) 得证。最后提醒读者: 自举过程的具体样貌可参看图 8 的示意。 $\square$

4 Wegner 估计与多尺度分析

本节用上一节的 PDUC 推导定域化结果。相关框架如今已相当标准 [[6], [7], [38], [43]], 故此处从简, 略去若干常规步骤。

4.1 Wegner 估计

我们先建立 $d \geq 2$ 时 ABM 的 Wegner 估计。Wegner 估计是定域化研究的重要一环: 当势函数连续 (即具有有界密度或某种 Hölder 正则性) 时, 凭借特征值随势的连续变化, 可以直接在所有尺度上导出它。然而, 对 ABM 的定域化问题而言, 并不存在一般可用的 Wegner 估计: 本文的奇异伯努利势 V 使模型失去特征值变化的机制。因此只能仿照 [42]、[43], 以归纳的方式重建 Wegner 估计。

以下, 对任意子集 $\Lambda \subset \mathbb{Z}^d$ 与算子 $\text{Op}: \ell^2(\mathbb{Z}^d) \rightarrow \ell^2(\mathbb{Z}^d)$, 用 Op_Λ 表示该算子在 Λ 上的限制。特别地, 对薛定谔算子 H , H_Λ 恰是 Λ 上带零 Dirichlet 边界的算子。

在陈述 Wegner 估计之前, 先给出一个简单的几何引理。

引理 4.1. 设 $Q = Q_{L(z)} \subset \mathbb{Z}^d$, $\mathcal{D}$ 是至多 N 个半径 $n \geq 4$ 且含于 Q 的立方体之并。设 I 为 $\mathbb{R}$ 中的紧区间。存在常数 $C_{\text{geo}}, C_{\text{esc}} > 0$, 仅依赖于 d, λ, I, N , 使得当 $L \geq C_{\text{geo}}n$, $H_Q u = Eu$, $E \in I$ 且 $u \neq 0$ 时, 存在某个 $a \in Q$ 满足

$$Q_{n(a)} \subset Q \setminus \mathcal{D}, \quad |u(a)| \geq e^{-C_{\text{esc}}n} \|u\|_{\infty, Q}.$$

证明. 经平移, 可设 $Q = Q_L$ 。取 $a_0 \in Q$ 使 $|u(a_0)| = \|u\|_{\infty, Q}$, 并反射坐标轴, 使得对每个 j 都有 $(a_0)_j \leq 0$ 。命题 3.4 的 Dirichlet 形式给出一个自 a_0 出发、沿方向 e_1 、长度 $\lfloor L/2 \rfloor$ 的锥型链 P , 并给出 $|u|$ 的相应下界。回忆: 若 $(x_0, x_1, \dots, x_m)$ 是沿方向 σe_i 的锥型链, 则

$$1 \leq \sigma((x_s)_i - (x_{s-1})_i) \leq 2, \quad |(x_s)_j - (x_{s-1})_j| \leq 1 \quad \text{对一切 } j \neq i \quad (4.1)$$

对 $1 \leq s \leq m$ 成立。取如下大常数: 对 $2 \leq j \leq d$ 令 $D_j = 10^{d-j+1}$, 再取

$$B_d = 3 + 2 \sum_{j=2}^d (D_j + 1), \quad M = 2N(10B_d + 2).$$

取 $C_{\text{geo}} = 10M$ 。由于 $\mathcal{D}$ 中至多有 N 个立方体, 由鸽巢原理, 可找到整数 $y \in [(a_0)_1 + Mn, (a_0)_1 + 2Mn]$, 使高度为 Mn 的矩形满足

$$\{x \in Q : |x_1 - y| \leq 5B_d n\} \cap \mathcal{D} = \emptyset.$$

因 $L \geq 10Mn$, 链 P 至少有 $\lfloor 2Mn \rfloor$ 步, 其第一坐标可到达高度 y 。取 $x' \in P$ 为该水平首次穿过处。由 (4.1),

$$y \leq x'_1 \leq y + 1,$$

且这次穿过发生在 $2Mn$ 步之内。于是 $Q_{B_d n}(x') \cap \mathcal{D} = \emptyset$, 因为 $B_d n + 1 \leq 5B_d n$ 且 $\mathcal{D} \subset Q$ 。链上的估计还给出

$$|u(x')| \geq \exp(-2MC_{\text{cone}}n) |u(a_0)|.$$

现在只考虑区域 $Q \cap Q_{B_d n}(x')$ 。必要时反射坐标轴, 可设 $(x')_i \leq 0$ 对 $1 \leq i \leq d$ 。接下来让点发生“漂移”: 由命题 3.4, 可按如下程序构造路径

$$x' = y_0, y_1, y_2, \dots$$

并保证 $|u(y_s)| \geq e^{-C_{\text{cone}}s} |u(x')|$ 。先沿方向 e_2 走一条锥型链 $D_2 n$ 步; 再沿方向 e_3 走锥型链 $D_3 n$ 步……最后沿方向 e_d 走锥型链 $D_d n$ 步, 得到点 y' 满足

$$|u(y')| \geq \exp\left(-C_{\text{cone}}\left(2M + \sum_{2 \leq j \leq d} D_j\right)n\right) |u(a_0)| := e^{-C_{\text{esc}}n} |u(a_0)|.$$

设 Y_i ($2 \leq i \leq d$) 为沿方向 e_{i-1} 完成漂移后的终点。Dirichlet 边界保证 $Y_i \in Q_{B_d n}(y') \cap Q$ 。由 (4.1), 终点 y' 满足

$$(y' - Y_i)_i \geq D_i n - \sum_{j>i}^d D_j n \geq D_i \frac{n}{2} \geq n \quad \text{对一切 } 2 \leq i \leq d.$$

此外,

$$|(y' - x')_i| \leq 2n \sum_{j=2}^d D_j, \quad 1 \leq i \leq d.$$

首次穿过的取法给出 $L - |x'_1| \geq Mn$, 且经坐标反射后此性质保持不变。由上面的位移估计, y'_1 到 Q 第一坐标两个面的距离都至少为 n 。对 $i \geq 2$,

$$(y' - Y_i)_i \geq n$$

的下界给出到下边面的至少 n 的距离; 而 $x'_i \leq 0$ 与 $2n \sum_{j=2}^d D_j + n < L$ 则给出到上边面的相应距离。最后, $B_d > 2 \sum_{j=2}^d D_j + 1$ 保证 $Q_{n(y')} \subset Q_{B_d n}(x')$ 。于是 $Q_{n(y')} \subset Q \cap Q_{B_d n}(x')$, 它与 $\mathcal{D}$ 不相交。证毕。 $\square$

下面证明 Wegner 估计。关于该估计中相应条件与尺度的含义, 可参见 [6, 备注 5.7]。

定理 4.2. 设 $N_1, N_F \geq 1$ 为整数。存在只依赖于 d 的数值 $\varepsilon_* = \varepsilon_*(d) > 0$, 使得下述结论成立: 对 $0 < \varepsilon < \varepsilon_*$ 与 $0 < \delta \leq \varepsilon/4$, 存在足够大的常数

$$C_{\text{weg}} = C_{\text{weg}}(d, \lambda, I, N_1, N_F, \varepsilon, \delta) > 0$$

使得只要 (1) $E_0 \in [0, 4d + \lambda]$;

(2) $L_0 > \dots > L_5 \geq C_{\text{weg}}$ 且

$$L_j^{1-2\delta} \geq L_{j+1} \geq L_j^{1-\frac{\varepsilon}{2}}, \quad 0 \leq j \leq 4, \quad (4.2)$$

特别地, 取 L_0, L_3 为 2 的幂次整数;

(3) $Q \subset \mathbb{Z}^d$ 是边长为 L_0 的立方体;

(4) $Q'_1, \dots, Q'_J \subset Q$ 是 J 个边长为 L_3 的立方体, 其中 $1 \leq J \leq N_1$ 。记 $\mathcal{D} = \cup_{a=1}^J Q'_a$;

(5) $G \subset \mathcal{D}$ 且 $1 \leq |G| < L_0^\delta$;

(6) F 是固定的离散 (N_F, ε, ρ) -分级集合, 且 $\rho_1 \geq C_{\text{weg}}$; 此外, F 在每个立方体 $Q_{L_3}(a) \subset Q \setminus \mathcal{D}$ 中都是正规的。并固定 $v_F \in \{0, 1\}^{F \cap Q}$;

(7) 对每个满足 $V|_{F \cap Q} = v_F$ 的势 $V: Q \rightarrow [0, 1]$ 、每个满足 $|E - E_0| \leq e^{-L_5}$ 的 E 以及每个解 $H_Q u = Eu$, 都有

$$e^{L_4} \|u\|_{\ell^2(Q \setminus \mathcal{D})} \leq \|u\|_{\ell^2(Q)} \leq (1 + L_0^{-\delta}) \|u\|_{\ell^2(G)}. \quad (4.3)$$

则

$$\mathbb{P}\left\{\|(H_Q - E_0)^{-1}\| > e^{L_1} \mid V|_{F \cap Q} = v_F\right\} \leq L_0^{-\frac{d}{2} + 10d\varepsilon}. \quad (4.4)$$

证明. 取 ε_* 充分小、 C_{weg} 充分大, 使定理 3.2 可用。首先对 $\mathcal{D} \setminus F$ 上的随机性作条件化。令

$$F' = (F \cap Q) \cup \mathcal{D}, \quad \Sigma = Q \setminus F'.$$

整个证明中, $\mathbb{P}_\Sigma$ 表示势在 Σ 上的条件分布, F' 上的取值按上式固定。在此分布下, $(V_x)_{x \in \Sigma}$ 仍是参数为 $1/2$ 的独立伯努利变量。假设 (4.3) 对每个满足 $V|_\Sigma = t$ 的连续延拓 $t \in [0, 1]^\Sigma$ 依然成立。

记 $K = C_{\text{esc}}$ 为引理 4.1 中的常数。对上述 $K = C_{\text{esc}}$ 与 $I = [-1, 4d + \lambda + 1]$ 应用定理 3.2, 得到常数 $a_{\text{duc}}, C_{\text{duc}}, c_{\text{duc}} > 0$ 。记

$$\mathcal{C} = \{a \in \mathbb{Z}^d : Q_{L_3}(a) \subset Q \setminus \mathcal{D}\}.$$

由条件 (6), F 在每个 $Q_{L_3}(a)$ 中都是正规的; 此外, 每个 $a \in \mathcal{C}$ 对应的 $Q_{L_3}(a)$ 与 $\mathcal{D}$ 不相交, 因此除冻结集 (即 $V|_F = v_F$) 之外, 没有别的随机性被条件化。以 $\mathcal{E}'_{L_3}(F, v_F, E_0; a)$ 记立方体 $Q_{L_3}(a)$ 上能量 E_0 处相应的 QUC 事件, 取其交

$$\mathcal{E}' = \bigcup_{a \in \mathcal{C}} \mathcal{E}'_{L_3}(F, v_F, E_0; a). \quad (4.5)$$

则由 (3.2) 得

$$\mathbb{P}_\Sigma((\mathcal{E}')^c) \leq |\mathcal{C}| e^{-c_{\text{duc}} \left(\frac{L_3}{\log L_3}\right)^\gamma} \leq CL_0^d e^{-c_{\text{duc}} \left(\frac{L_3}{\log L_3}\right)^\gamma} \quad (4.6)$$

其中 $\gamma = (d-1)/d$ 如前。

现在任意固定 $\omega \in \mathcal{E}'$, 并令 $V|_{\Sigma} = \omega$ 。设 u 为该配置下 H_Q 属于特征值 E 的归一化特征向量, 即 $H_Q u = Eu$, 且 $|E - E_0| \leq e^{-L_2} \leq e^{-a_{\text{duc}} L_3}$ 。由引理 4.1, 可找到某个 $a \in \mathcal{C}$ 使得

$$\|u\|_{\infty, Q_{L_3}(a)} \leq \|u\|_{\infty, Q} \leq e^{C_{\text{esc}} L_3} |u(a)|.$$

因此 u 的限制在 $Q_{L_3-1}(a)$ 上仍满足方程, 于是 (3.3) 在 $Q_{L_3}(a)$ 内对 u 适用, 给出

$$|\{x \in Q_{L_3}(a) \setminus F : |u(x)| \geq e^{-C_{\text{duc}} L_3} |u(a)|\}| \geq \frac{c_{\text{duc}} L_3^d}{(\log L_3)^d}$$

又因

$$e^{-C_{\text{duc}} L_3} |u(a)| \geq e^{-(C_{\text{esc}} + C_{\text{duc}}) L_3} \|u\|_{\infty, Q},$$

且由假设 (4.3) 可得 $\|u\|_{\infty, Q} \geq \|u\|_{\infty, G} \geq \|u\|_{2, G} / \sqrt{|G|} \geq 1/(1 + L_0^\delta)$, 故 (注意 $Q_{L_3}(a) \setminus F \subset \Sigma$)

$$|\{x \in \Sigma : |u(x)| \geq e^{-\frac{L_2}{4}}\}| \geq \frac{c_{\text{duc}} L_3^d}{(\log L_3)^d} \quad (4.7)$$

对每个满足 $|E - E_0| \leq e^{-L_2}$ 的归一化特征向量同时成立。在估计 (4.7) 中用到了

$$(C_{\text{esc}} + C_{\text{duc}}) L_3 + \log(L_0^\delta + 1) \leq \frac{L_2}{4}$$

只要 C_{weg} 足够大即可。

现在对连续配置 $t \in [0, 1]^\Sigma$, 将 $H_{Q(t, v_F, \omega|_{\mathcal{D} \setminus F})}$ 的特征值按重数排列成

$$\mu_1(t) \geq \dots \geq \mu_{|Q|}(t),$$

相应的标准正交特征基记为 u_i , $1 \leq i \leq |Q|$ 。定义

$$\mathcal{K} = \left\{ j : \min_{t \in [0, 1]^\Sigma} |\mu_{j(t)} - E_0| \leq e^{-L_2} \right\}. \quad (4.8)$$

再结合 Bourgain 的自举论证 (细节可参见 [57, (3.57)–(3.61)] 或 [6, 断言 5.11]), 可得

$$\max_{t \in [0, 1]^\Sigma} |\mu_{j(t)} - E_0| \leq e^{-L_2} + \lambda e^{-2L_4} \leq e^{-L_4} < e^{-L_5}. \quad (4.9)$$

于是所有特征函数 u_j ($j \in \mathcal{K}$) 都满足 (4.3)。再由标准的 Hilbert-Schmidt 论证,

$$\frac{|\mathcal{K}|}{(1 + L_0^{-\delta})^2} \leq \sum_{j \in \mathcal{K}} \|\mathbf{1}_G u_j\|_2^2 = \sum_{x \in G} \sum_{j \in \mathcal{K}} |u_{j(x)}|^2 \leq |G|.$$

从而

$$|\mathcal{K}| \leq (1 + L_0^{-\delta})^2 |G| \leq 2L_0^\delta. \quad (4.10)$$

现在, 对 $1 \leq j_1, j_2 \leq |Q|$ 及整数 $0 \leq \ell \leq 10|\mathcal{K}| \lesssim L_0^\delta$, 以 $\mathcal{E}_{j_1, j_2, \ell}$ 表示关于 ω_Σ 的如下事件:

$$|\mu_{j_1} - E_0| \vee |\mu_{j_2} - E_0| < s_\ell \quad \text{且} \quad |\mu_{j_1-1} - E_0| \wedge |\mu_{j_2+1} - E_0| \geq s_{\ell+1},$$

其中 $s_\ell = \exp\{-L_1 + \ell(L_2 - L_4)\}$ 按 [6, 断言 5.11] 或 [38, 断言 4.5] 中的论证, 可以证明

$$\left\{ \omega_\Sigma : \|(H_Q - E_0)^{-1}\| > e^{L_1} \right\} = \left\{ \omega_\Sigma : \text{dist}(\text{spec}(H_Q), E_0) < e^{-L_1} \right\} \subset \bigcup_{(j_1, j_2 \in \mathcal{K}), 0 \leq \ell \leq 10|\mathcal{K}|} \mathcal{E}_{j_1, j_2, \ell}. \quad (4.11)$$

因此只需估计 $j_1, j_2 \in \mathcal{K}$, $0 \leq \ell \leq 10|\mathcal{K}|$ 时 $\mathcal{E}_{j_1, j_2, \ell}$ 的概率。

现在固定考察一个 $\mathcal{E}_{j_1, j_2, \ell}$ 。由于 $\delta < \varepsilon/4$ 且 $\ell \lesssim L_0^\delta$, 有 $s_\ell \leq e^{-L_1/2} < e^{-L_2}$ 。于是对每个满足 $\omega_\Sigma \in \mathcal{E}_{j_1, j_2, \ell}$ 的配置, 都有 $|E_0 - \mu_{j_1}|, |E_0 - \mu_{j_2}| < e^{-L_2}$; 从而在 (4.5) 给出的事件 $\mathcal{E}'$ 中, (4.7) 对 u_{j_1} 与 u_{j_2} 成立。据此定义特征函数模长不小于 $e^{-L_2/4}$ 的格点集合:

$$S_{\text{duc}(j_1, \omega_\Sigma)} := \left\{ x \in \Sigma : |u_{j_1}(x)| \geq e^{-\frac{L_2}{4}} \right\}, \quad |S_{\text{duc}(j_1, \omega_\Sigma)}| \geq \frac{c_{\text{duc}} L_3^d}{(\log L_3)^d};$$

$$S_{\text{duc}(j_2, \omega_\Sigma)} := \left\{ x \in \Sigma : |u_{j_2}(x)| \geq e^{-\frac{L_2}{4}} \right\}, \quad |S_{\text{duc}(j_2, \omega_\Sigma)}| \geq \frac{c_{\text{duc}} L_3^d}{(\log L_3)^d}.$$

由此 (再用一次鸽巢原理) 可作分解

$$\mathcal{E}_{j_1, j_2, \ell} \cap \mathcal{E}' = \mathcal{E}_{j_1, j_2, \ell, 0} \cup \mathcal{E}_{j_1, j_2, \ell, 1}, \quad (4.12)$$

其中 $\mathcal{E}_{j_1, j_2, \ell, i}$ 表示如下事件 ($i = 0, 1$):

$$\mathcal{E}_{j_1, j_2, \ell} \quad \text{且} \quad |S_{\text{duc}(j_1, \omega_\Sigma)} \cap \{n \in \Sigma : \omega_{\Sigma(n)} = i\}| \geq \frac{c_{\text{duc}} L_3^d}{2(\log L_3)^d}. \quad (4.13)$$

现在设 $\omega_\Sigma \in \mathcal{E}_{j_1, j_2, \ell, i}$, 且格点 $x \in S_{\text{duc}(j_1, \omega_\Sigma)} \cap \{n \in \Sigma : \omega_{\Sigma(n)} = i\} \subset \Sigma$ 满足

$$\omega_{\Sigma(x)} = i \quad \text{且} \quad |u_{j_1}(\omega_\Sigma; x)| \geq e^{-\frac{L_2}{4}},$$

我们改变 V 在 x 处的取值, 即令

$$\omega_\Sigma^x(y) = \begin{cases} (\omega_{\Sigma(y)}, \text{若 } y \in \Sigma \text{ 且 } y \neq x) \\ (1 - \omega_{\Sigma(x)}, \text{若 } y \in \Sigma \text{ 且 } y = x) \end{cases}$$

并有如下结论:

断言 4.1. $\omega_\Sigma^x \notin \mathcal{E}_{j_1, j_2, \ell, i^\circ}$

断言 4.1 的证明. 只需考虑 $i = 0$ 的情形, $i = 1$ 的证明完全类似。定义平移后的算子

$$\tilde{H}_{Q(\omega_\Sigma)} = \frac{H_{Q(\omega_\Sigma)} - E_0 + s_\ell}{\lambda},$$

其特征值全体为

$$\tilde{\mu}_j = (\mu_{j(\omega_\Sigma)} - E_0 + s_\ell) / \lambda$$

(对 $i = 1$, 相应的算子为

$$-(H_{Q(\omega_\Sigma)} - E_0 - s_\ell) / \lambda$$

)。这里之所以除以耦合常数 λ , 是因为秩一扰动引理 [6, 引理 5.1] 的陈述中不含耦合常数。再令

$$r_1 = \frac{2s_\ell}{\lambda}, \quad r_2 = \frac{s_{\ell+1}}{\lambda}, \quad r_3 = e^{-\frac{L_2}{2}}, \quad r_4 = e^{-L_4}, \quad r_5 = \frac{e^{-L_5}}{2\lambda}. \quad (4.14)$$

由于 $\omega_\Sigma \in \mathcal{E}_{j_1, j_2, \ell, i}$, 下述排序成立:

$$0 < \tilde{\mu}_{j_1} \leq \tilde{\mu}_{j_2} < r_1 < r_2 < \tilde{\mu}_{j_2+1}.$$

在格点 x 处还有

$$|u_{j_1}(\omega_\Sigma; x)|^2 \geq e^{-2 \cdot \frac{L_2}{4}} := r_3. \quad (4.15)$$

考虑满足 $r_2 < \tilde{\mu}_j < r_5$ 的 j , 则 $|\mu_{j(\omega_\Sigma)} - E_0| \leq \lambda r_5 - s_\ell < e^{-L_5}$ 。于是 (4.3) 对 $\mu_{j(\omega_\Sigma)}$ 适用, 从而 (注意 $x \in \Sigma \subset Q \setminus \mathcal{D}$)

$$\sum_{j: r_2 < \tilde{\mu}_j < r_5} |u_{j(x)}|^2 \leq |Q| \cdot \exp\{-2L_4\} \leq r_4. \quad (4.16)$$

于是可直接验证 r_1, r_2, r_3, r_4, r_5 满足 [6, 引理 5.1] 的参数条件, 结论随之成立。□

断言 4.1 表明 $\mathcal{E}_{j_1, j_2, \ell, i}$ 构成 Σ 上的一个 ρ -Sperner 族 (ρ -Sperner 的定义见 [6, 定义 4.1]), 其中由 (4.13) 得

$$\rho = \frac{c_{\text{duc}} L_3^d}{2(\log L_3)^d |\Sigma|}. \quad (4.17)$$

应用 [6, 定理 4.2] 即得

$$\mathbb{P}_\Sigma(\mathcal{E}_{j_1, j_2, \ell, i}) \leq (|\Sigma|)^{-\frac{1}{2}} \cdot \rho^{-1} \lesssim \frac{L_0^{\frac{d}{2}} (\log L_3)^d}{L_3^d}.$$

于是由 (4.12) 得

$$\mathbb{P}_\Sigma(\mathcal{E}_{j_1, j_2, \ell} \cap \mathcal{E}') \leq \mathbb{P}_\Sigma(\mathcal{E}_{j_1, j_2, \ell, 0}) + \mathbb{P}_\Sigma(\mathcal{E}_{j_1, j_2, \ell, 1}) \lesssim \frac{L_0^{\frac{d}{2}} (\log L_3)^d}{L_3^d}. \quad (4.18)$$

综合 (4.6)、(4.11) 与 (4.18) 可得

$$\begin{aligned}
\mathbb{P}_\Sigma \left(\left\{ \omega_\Sigma : \| (H_Q - E_0)^{-1} \| > e^{L_1} \right\} \right) &\leq \mathbb{P}_\Sigma \left(\bigcup_{(j_1, j_2 \in \mathcal{K}), 0 \leq \ell \leq 10 \mid \mathcal{K}} \mathcal{E}_{j_1, j_2, \ell} \right) \\
&\leq \sum_{(j_1, j_2 \in \mathcal{K}), 0 \leq \ell \leq 10 \mid \mathcal{K}} \mathbb{P}_\Sigma (\mathcal{E}_{j_1, j_2, \ell} \cap \mathcal{E}') + \mathbb{P}_\Sigma ((\mathcal{E}')^c) \\
&\lesssim (|\mathcal{K}|)^3 \frac{L_0^{\frac{d}{2}} (\log L_3)^d}{L_3^d} + L_0^d e^{-c_{\text{duc}} \left(\frac{L_3}{\log L_3} \right)^\gamma} \\
&\lesssim L_0^{3\delta} \frac{L_0^{\frac{d}{2}} (\log L_3)^d}{L_3^d} + L_0^d e^{-c_{\text{duc}} \left(\frac{L_3}{\log L_3} \right)^\gamma}.
\end{aligned}$$

最后一个不等式用到 (4.10)。只要取 $L_0 \geq C_{\text{weg}}$ 足够大, 便有

$$L_0^{3\delta} \frac{L_0^{\frac{d}{2}} (\log L_3)^d}{L_3^d} + L_0^d e^{-c_{\text{duc}} \left(\frac{L_3}{\log L_3} \right)^\gamma} \ll L_0^{-\frac{d}{2} + 10d\varepsilon},$$

由此 (4.4) 得证。上述估计对 $\mathcal{D} \setminus F$ 上已揭露的取值是一致成立的, 故对这些取值取平均即得 (4.4)。□

4.2 多尺度分析与定域化

下面给出由 Wegner 估计出发的最终多尺度分析陈述。这套流程如今已是标准内容, [7, 第 3 节] 中有详细描述, 故此处只写出 Green 函数估计的最终形式, 并简要讨论它与前述证明的差别。

初始尺度的 Green 函数估计通常作为多尺度分析归纳证明的第一步。ABM 的初始尺度分析最早由 [42] 给出, 其办法是挖掘若干大偏差事件 (另见 [38, 第 3.2 节])。[6, 第 7 节] 后来给出另一套证明初始尺度估计的论证, 它利用势函数的“网结构” (net structure); 该方法在 [7] 中被推广至任意维。下面直接陈述相应结果, 它取自 [7, 命题 B.4] 并作了调整。

定理 4.3. 对任意 $0 < \delta < 1/10$ 与 $\varepsilon > 0$, 存在 $C_{\delta, \varepsilon}$, 使得对任意 $n > C_{\delta, \varepsilon}$ 与

$$0 \leq E \lesssim \frac{n^{-\frac{\delta}{10}}}{2},$$

下述结论以至少 $1 - n^{-1}$ 的概率成立 (概率只涉及 $[\varepsilon^{-1}] \mathbb{Z}^d$ 上的随机性): 对该概率事件中的任意势配置 ω , 取任意 $V' : \mathbb{Z}^d \rightarrow [0, 1]$ 满足

$$V'_{Q_n \cap [\varepsilon^{-1}] \mathbb{Z}^d} = \omega_{Q_n \cap [\varepsilon^{-1}] \mathbb{Z}^d}.$$

设 H'_{Q_n} 为 $-\Delta + V'$ 在 Q_n 上带 Dirichlet 边界条件的限制, 则

$$\| (H'_{Q_n} - E)^{-1} \| \leq \exp(n^{2\delta}) \quad (4.19)$$

且

$$| (H'_{Q_n} - E)^{-1}(a, b) | \leq n^{2\delta} \exp(-n^{-\delta} |a - b|) \quad \text{对任意 } a, b \in Q_n. \quad (4.20)$$

从初始尺度的 Green 函数估计出发, 借助多尺度分析的归纳格式, 即可推出大尺度上的相应估计。

定理 4.4. 存在常数 $E_*, \kappa_*, \gamma_*, R_* > 0$, 使得对任意固定的 $E_0 \in [0, E_*]$ 、任意 2 的幂次 $R \geq R_*$ 与任意固定的 $a \in \mathbb{Z}^d$,

$$\mathbb{P} \left\{ | (H_{Q_{R(a)}} - E_0)^{-1}(x, y) | \leq \exp(R^{1-\gamma_*} - \gamma_* |x - y|) \quad \text{对一切 } x, y \in Q_{R(a)} \right\} \geq 1 - R^{-\kappa_*}. \quad (4.21)$$

有了定理 4.2 与定理 4.3, 定理 4.4 的证明便可照 [7, 定理 3.10] 逐字完成。证明中唯一的改动是: [7, 断言 3.14] 中的尾概率应换成 Wegner 估计 (定理 4.2) 中 (4.4) 给出的 $1 - L^{-d/2+10d\varepsilon}$ 。细节从略。最后, 由定理 4.4 并按 [4, 定理 1] 的论证, 即得定理 1.1。

附录 A 一致离散唯一延拓

本附录把定理 3.2 加强为对无序强度 λ 与方程 $Hu = Eu$ 中的能量 E 都一致的版本。先定义参数空间

$$\Theta(\lambda_-, \lambda_+, E_+) := \{(\lambda, E) : 0 < \lambda_- \leq \lambda \leq \lambda_+, |E| \leq E_+\} \quad (A.1)$$

结果如下。这里不再涉及分级集合 F (因为下文要用定理 A.3, 而它并非分级集合型的结论), 也就是说可以认为取了 $F = \emptyset$ 。

定理 A.1(不含分级集合的一致 PDUC)。 固定 $d \geq 3, \lambda_+ > \lambda_- > 0, E_+ > 0, K \geq 0$ 。存在常数 $C, c, R_0 > 0$, 只依赖于 $d, \lambda_+, \lambda_-, E_+, K$, 使下述结论成立: 设 $R \geq R_0$, 势 V_x ($x \in Q_{R-1}$) 是一族独立同分布的伯努利随机变量, 满足

$$\mathbb{P}(V_x = 0) = \mathbb{P}(V_x = 1) = \frac{1}{2}, \quad \forall x \in Q_{R-1}$$

则存在事件 $\mathcal{E}_R \subset \{0, 1\}^{Q_{R-1}}$, 它只关乎 Q_{R-1} 内的随机性, 且

$$\mathbb{P}(\mathcal{E}_R) \geq 1 - \exp\left(-c\left(\frac{R}{\log R}\right)^{\frac{d-1}{d}}\right) \quad (\text{A.2})$$

在此事件上, 对一切 $(\lambda, E) \in \Theta(\lambda_-, \lambda_+, E_+)$ 与一切在 Q_{R-1} 上满足 $Hu = Eu$ 的 (复值) 函数 $u: Q_R \rightarrow \mathbb{C}$, 只要

$$u(0) \neq 0, \quad \|u\|_{\infty, Q_R} \leq e^{KR} |u(0)|$$

就有

$$\#\{x \in Q_R : |u(x)| \geq e^{-CR} |u(0)|\} \geq \frac{cR^d}{(\log R)^d} \quad (\text{A.3})$$

定理 A.1 的证明与定理 3.2 的证明本质上相同, 只是个别地方有若干差别。最根本的差别在于: 启动自举所用的先验估计必须比原先更强。这是因为该估计要在更大的参数集上一致成立, 为此就得承受更大的概率损失, 以补偿参数网所带来的熵。于是初始先验估计必须足够强, 才能吸收更大的组合熵。(对比 (3.84) 与 (A.10) 便可看出这一点。) 下面只讨论这些差别。

A.1 定理 A.1 证明的梗概

这里只指出与定理 3.2 原证明不同之处。由于参数空间现在成了 $\Theta = \Theta(\lambda_-, \lambda_+, E_+)$, 必须用网 (net) 论证把这一区域离散化。对 $\lambda \in [\lambda_-, \lambda_+]$ 与 $E \in [-E_+, E_+]$ 一致地选取重构常数 C_{recon} 与 D , 系数估计中一律用 λ_+ ; 全程取 $c_0 = \lambda_-$, $B = 2D + 8$ 。作了这些一致选取之后, 仍沿用定理 3.2 证明中的指数 $a = D + K + 2 + 2(Bd + 1)$ 。回顾定理 3.6: 与证明 (3.19) 完全相同的论证还给出

$$\sup_{(\lambda, E) \in \Theta, k} \|\partial_\lambda \mathcal{W}(v, w)\|_{\ell^\infty(\mathfrak{D}_k \times \mathfrak{B}_k)} \leq e^{C_{\text{recon}} S} \quad (\text{A.4})$$

因此, 若把 Θ 分解为一个 ε_R -网 Θ_{net} , 即

$$\Theta \subset \cup_{(\lambda_0, E_0) \in \Theta_{\text{net}}} \{(\lambda, E) : |\lambda - \lambda_0| < \varepsilon_R, |E - E_0| < \varepsilon_R\}$$

就需要把 (3.64) 中的多重指标 $\mathbf{i}$ 扩充为

$$\mathbf{i} = ((\lambda_0, E_0), j, k, \nu, \mathcal{A}), \quad (\lambda_0, E_0) \in \Theta_{\text{net}}$$

相应地, (3.64) 变为

$$\text{SysIndex} = \{\mathbf{i} : \mathbf{i} = ((\lambda_0, E_0), j, k, \nu, \mathcal{A}) \text{ 按上文确定}\} \quad (\text{A.5})$$

于是对每个如此固定的 $\mathbf{i}$, (3.79) 中的 $\tilde{u}_1$ 应取为方程 $(-\Delta + \lambda_0 V)u = E_0 u$ 带边值数据 (3.77) 的解; $\tilde{u}_2$ 则应取为同一初值下方程 $(-\Delta + \lambda V)u = Eu$ 的解, 其中

$$|\lambda - \lambda_0| < \varepsilon_R, \quad |E - E_0| < \varepsilon_R$$

从而 (3.79) 变为

$$\|\tilde{u}_1 - \tilde{u}_2\|_{\infty, Q_{r_j + \ell_j + 1}} \lesssim_d \varepsilon_R R^{\frac{d}{2}} e^{DRw_j} R_{\text{in}} \leq e^{(D+K+2)R} \varepsilon_R = e^{-2(Bd+1)R} \leq \frac{\tau_j}{8}$$

据此取

$$\varepsilon_R = e^{-aR}$$

于是网的基数为

$$|\Theta_{\text{net}}| \lesssim_{\lambda_-, \lambda_+, E_+} \varepsilon_R^{-2} \leq e^{2(a+1)R} \quad (\text{A.6})$$

取 $c_0 = \lambda_-$ 使传播估计在网上一致成立。把网计入并集估计后, (3.70) 变为

$$\begin{aligned}
\mathbb{P}(\mathcal{U}_R \mid V_F = v_F) &\leq e^{2(a+1)R} R^2 \sum_{1 \leq p \leq R^d} \exp((d+1)p \log R - T_p) \\
&\leq e^{2(a+1)R} R^{d+3} \sup_{1 \leq p \leq R^d} \exp((d+1)p \log R - T_p)
\end{aligned} \tag{A.7}$$

为吸收上面概率估计中多出的熵，相应地要把 (3.71) 中的 T_p 换成

$$T_p = (d+1)p \log R + (d+3) \log R + 2(a+1)R + \eta \left(\frac{R}{\log R} \right)^\gamma \tag{A.8}$$

进而，最要紧的是递推式 (3.83) 变为

$$2m_{j+1} \geq c_* \ell_j m_j^\gamma - \ell_j \times C_* \left(\frac{p}{w_j} \log R + \log R + R \right) - \eta \ell_j \left(\frac{R}{\log R} \right)^\gamma \tag{A.9}$$

因此，正如 (3.84) 那样，必须保证

$$C_*(\log R + R) + \eta \left(\frac{R}{\log R} \right)^\gamma \leq \frac{c_*}{2} m_j^\gamma \tag{A.10}$$

一旦此式成立，(3.85) 便重新可用，自举即可完成定理 A.1 的证明。把 η 取得足够小，则为保证 (A.10)，只需把自举的起始步（即 (3.63)）强化为

$$m_0 = \# \{x \in Q_{r_0} : |u(x)| \geq e^{-R}\} \gg R^{\frac{1}{\gamma}} = R^{\frac{d}{d+1}}, \quad r_0 = \left\lfloor \frac{Rw_0}{64d} \right\rfloor \sim \frac{R}{\log R} \tag{A.11}$$

下一小节将说明 (A.11) 总能被满足。

□

A.2 自举起始步的强化

本小节说明自举的起始步，即 (A.11)，在维数 $d \geq 3$ 时确能满足。分情形讨论。

当 $d = 3$ 时， $d/(d-1) = 3/2$ 。回忆 [7, 定理 1.3] 给出的确定性离散唯一延拓。

定理 A.2。 存在常数 $p > 3/2$ ，使下述结论成立：对每个 $M > 0$ ，存在 $C_M > 0$ ，使得对任意充分大的 $n \in \mathbb{Z}_+$ 与满足

$$\Delta u = Vu \tag{A.12}$$

于 Q_n 内且 $\|V\|_\infty \leq M$ 的函数 $u, V : \mathbb{Z}^3 \rightarrow \mathbb{C}$ ，都有

$$\# \{a \in Q_n : |u(a)| \geq \exp(-C_M n) |u(0)|\} \geq n^p \tag{A.13}$$

取 $M := \sup_{(\lambda, E) \in \Theta} |2d + \lambda V - E| \leq 2d + \lambda_+ + E_+$ 。由定理 A.2，当 R 充分大时 $C_M r_0 \lesssim R / \log R \leq R$ ，又 $p > 3/2$ ，故

$$m_0 = \# \{x \in Q_{r_0} : |u(x)| \geq e^{-R}\} \geq \# \{x \in Q_{r_0} : |u(x)| \geq e^{-C_M r_0}\} \geq r_0^p \gg R^{\frac{3}{2}}$$

这就在 $d = 3$ 时保证了 (A.11)。

当 $d \geq 4$ 时，需要用到 [55, 定理 2.4] 中如下确定性离散唯一延拓。

定理 A.3。 设 $d \geq 4$ 、 $M \geq 0$ 。存在 $c_d, C_{d,M} > 0$ ，使得对任意充分大的 $n \in \mathbb{Z}_+$ 与满足

$$\Delta u = Vu \tag{A.14}$$

于 Q_n 内且 $\|V\|_\infty \leq M$ 的函数 $u, V : \mathbb{Z}^d \rightarrow \mathbb{C}$ ，都有

$$\# \{x \in Q_n : |u(x)| \geq \exp(-C_{d,M} n^2) |u(0)|\} \geq c_d \frac{n^{\lfloor \frac{d}{2} \rfloor}}{\log(2+n)} \tag{A.15}$$

定理 A.3 不能直接用来推出 (A.11)，因为 (A.15) 的下界是 $\exp(-C_{d,M} n^2)$ ，而非 $e^{-O(n)}$ 的量级。因此要对定理 A.3 作一次权衡 (trade-off)。权衡论证仍要用到锥性质 (命题 3.4)：构造一条足够长的锥型链，并对以该链上大量格点为中心的立方体套用原来的离散唯一延拓。这一想法最早见于 [7, 第 6 节]。

定理 A.4 ($d \geq 4$ 的确定性离散唯一延拓：权衡版本)。 设 $d \geq 4$ 、 $M \geq 0$ 。存在 $c_d, C_{d,M} > 0$ ，使得对任意充分大的 $n \in \mathbb{Z}_+$ 与满足

$$\Delta u = Vu \tag{A.16}$$

于 Q_n 内且 $\|V\|_\infty \leq M$ 的函数 $u, V : \mathbb{Z}^d \rightarrow \mathbb{C}$ ，都有

$$\# \{x \in Q_n : |u(x)| \geq \exp(-C_{d,M} n) |u(0)|\} \geq c_d \frac{n^{\lfloor \frac{d}{2} \rfloor + \frac{1}{2}}}{\log(2+n)} \tag{A.17}$$

证明。 先把 $u(0)$ 归一化为 1, 并记 $r = \lfloor \sqrt{n} \rfloor$ 。由命题 3.4, 在 $Q_{n/8}$ 内存在一条沿方向 e_1 、长度 $m = \lfloor n/32 \rfloor$ 的有向路径 $P = (x_0, \dots, x_m)$, 满足

$$|u(x_j)| \geq e^{-C_{\text{cone}} n} \quad \text{对每个 } 0 \leq j \leq m \quad (\text{A.18})$$

由于锥型链 P 的方向为 e_1 , 可在 P 中贪心地取出一列点, 使它们的第一坐标两两相距超过 $2r$ 。这样的点至少有 $m/(2r) > r/200$ 个, 把它们的并集记作 $P_{\text{separated}}$ 。要注意的是

$$Q_{r(x)} \cap Q_{r(x')} = \emptyset, \quad \forall x \neq x' \in P_{\text{separated}}$$

现在对每个以 $y \in P_{\text{separated}}$ 为中心的 $Q_{r(y)}$ 套用定理 A.3, 得

$$\# \{x \in Q_{r(y)} : |u(x)| \geq e^{-C' r^2} |u(y)|\} \geq \frac{c' r^{\lfloor \frac{d}{2} \rfloor}}{\log(r+2)}, \quad \forall y \in P_{\text{separated}} \quad (\text{A.19})$$

这里 C', c' 是定理 A.3 中相应的常数。又由 (A.18), 对每个 $y \in P_{\text{separated}}$ 都有 $|u(y)| > e^{-C_{\text{cone}} r^2}$, 于是

$$\# \{x \in Q_{r(y)} : |u(x)| \geq e^{-C' r^2} |u(y)| \geq e^{-(C' + C_{\text{cone}}) r^2}\} \geq \frac{c' r^{\lfloor \frac{d}{2} \rfloor}}{\log(r+2)} \quad (\text{A.20})$$

对每个 $y \in P_{\text{separated}}$ 成立。取 $C_{d,M} = C' + C_{\text{cone}}$ 最后由 (A.20)、

$$\# P_{\text{separated}} > r/200$$

以及诸立方体 $Q_{r(y)}$ ($y \in P_{\text{separated}}$) 两两不相交, 得

$$\begin{aligned} \# \{x \in Q_n : |u(x)| \geq e^{-C_{d,M} r^2} \geq e^{-C_{d,M} n}\} &\geq \sum_{y \in P_{\text{separated}}} \# \{x \in Q_{r(y)} : |u(x)| \geq e^{-C_n}\} \\ &\geq \frac{r}{200} \times \frac{c' r^{\lfloor \frac{d}{2} \rfloor}}{\log(r+2)} \gtrsim \frac{n^{\lfloor \frac{d}{2} \rfloor + \frac{1}{2}}}{\log(2+n)} \end{aligned}$$

这就证明了 (A.17)。 □

最后, 在定理 A.4 中取 $n = r_0$, 由 (A.17) 即可保证 (A.11), 因为当 $d \geq 4$ 时

$$\frac{1}{2} \lfloor d/2 \rfloor + \frac{1}{2} > \frac{d}{d-1}$$

参考文献

- [1] P. W. Anderson, “Absence of diffusion in certain random lattices,” *Phys. Rev. (2)*, vol. 109, no. 5, pp. 1492–1505, 1958.
- [2] W. Kirsch, “An invitation to random Schrödinger operators,” in *Random Schrödinger operators*, vol. 25, Société Mathématique de France, 2008, pp. 1–119.
- [3] F. Germinet and A. Klein, “A comprehensive proof of localization for continuous Anderson models with singular random potentials,” *J. Eur. Math. Soc. (JEMS)*, vol. 15, no. 1, pp. 53–143, 2012.
- [4] N. Rangamani and X. Zhu, “Dynamical localization for the singular Anderson model in $\mathbb{Z}^d$,” *J. Math. Phys.*, vol. 66, no. 2, 2025.
- [5] R. Carmona, A. Klein, and F. Martinelli, “Anderson localization for Bernoulli and other singular potentials,” *Comm. Math. Phys.*, vol. 108, no. 1, pp. 41–66, 1987.
- [6] J. Ding and C. K. Smart, “Localization near the edge for the Anderson Bernoulli model on the two dimensional lattice,” *Invent. Math.*, vol. 219, no. 2, pp. 467–506, 2020.
- [7] L. Li and L. Zhang, “Anderson-Bernoulli localization on the three-dimensional lattice and discrete unique continuation principle,” *Duke Math. J.*, vol. 171, no. 2, pp. 327–415, 2022.
- [8] M. Aizenman, F. Germinet, A. Klein, and S. Warzel, “On Bernoulli decompositions for random variables, concentration bounds, and spectral localization,” *Probab. Theory Related Fields*, vol. 143, pp. 219–238, 2009.
- [9] S. Liu, Y. Shi, and Z. Zhang, “Anderson localization for the hierarchical Anderson-Bernoulli model on $\mathbb{Z}^d$,” *arXiv preprint arXiv:2604.18989*, 2026.
- [10] A. Klein, “Extended states in the Anderson model on the Bethe lattice,” *Adv. Math.*, vol. 133, no. 1, pp. 163–184, 1998.
- [11] A. Aggarwal and P. Lopatto, “Mobility edge for the Anderson model on the Bethe lattice,” *arXiv preprint arXiv:2503.08949*, 2025.

- [12] J. Bourgain, “A lower bound for the Lyapounov exponents of the random Schrödinger operator on a strip,” *J. Stat. Phys.*, vol. 153, no. 1, pp. 1–9, 2013.
- [13] I. Binder, M. Goldstein, and M. Voda, “On fluctuations and localization length for the Anderson model on a strip,” *J. Spectr. Theory*, vol. 5, no. 1, pp. 193–225, 2015.
- [14] J. Huang, T. McKenzie, and H.-T. Yau, “Ramanujan property and edge universality of random regular graphs,” *arXiv preprint arXiv:2412.20263*, 2024.
- [15] S. Liu and P. Lopatto, “Mobility edge for the Anderson model on random regular graphs,” *arXiv preprint arXiv:2603.14230*, 2026.
- [16] J. Schenker, “Eigenvector localization for random band matrices with power law band width,” *Comm. Math. Phys.*, vol. 290, no. 3, pp. 1065–1097, 2009.
- [17] N. Chen and C. K. Smart, “Random band matrix localization by scalar fluctuations,” *arXiv preprint arXiv:2206.06439*, 2022.
- [18] M. Goldstein, “Fluctuations and localization length for random band GOE matrix,” *arXiv preprint arXiv:2210.04346*, 2022.
- [19] G. Cipolloni, R. Peled, J. Schenker, and J. Shapiro, “Dynamical localization for random band matrices up to $WN^{1/4}$,” *Comm. Math. Phys.*, vol. 405, no. 3, 2024.
- [20] R. Drogin, “Localization of one-dimensional random band matrices,” *arXiv preprint arXiv:2508.05802*, 2025.
- [21] M. Shcherbina and T. Shcherbina, “Characteristic polynomials for 1D random band matrices from the localization side,” *Comm. Math. Phys.*, vol. 351, no. 3, pp. 1009–1044, 2017.
- [22] T. Shcherbina, “Characteristic polynomials for random band matrices near the threshold,” *J. Stat. Phys.*, 2020.
- [23] M. Shcherbina and T. Shcherbina, “Universality for 1d random band matrices,” *Comm. Math. Phys.*, vol. 385, no. 2, pp. 667–716, 2021.
- [24] P. Bourgade, H.-T. Yau, and J. Yin, “Random Band Matrices in the Delocalized Phase I: Quantum Unique Ergodicity and Universality,” *Comm. Pure Appl. Math.*, vol. 73, no. 7, pp. 1526–1596, 2020.
- [25] H.-T. Yau and J. Yin, “Delocalization of one-dimensional random band matrices,” *arXiv preprint arXiv:2501.01718*, 2025.
- [26] L. Erdős and V. Riabov, “The zigzag strategy for random band matrices,” *arXiv preprint arXiv:2506.06441*, 2025.
- [27] C. Xu, F. Yang, H.-T. Yau, and J. Yin, “Bulk universality and quantum unique ergodicity for random band matrices in high dimensions,” *Ann. Probab.*, vol. 52, no. 3, pp. 765–837, 2024.
- [28] S. Dubova, K. Yang, H.-T. Yau, and J. Yin, “Delocalization of two-dimensional random band matrices,” *arXiv preprint arXiv:2503.07606*, 2025.
- [29] S. Dubova, F. Yang, H.-T. Yau, and J. Yin, “Delocalization of non-mean-field random matrices in dimensions $d \geq 3$,” *arXiv preprint arXiv:2507.20274*, 2025.
- [30] L. Li, “On the Manhattan pinball problem,” *Electron. Commun. Probab.*, 2021.
- [31] L. Li, “Polynomial bound for the localization length of the Lorentz mirror model on the 1D cylinder,” *Electron. Commun. Probab.*, 2026.
- [32] D. Elboim, A. Gloria, and F. Hernández, “Diffusivity of the Lorentz mirror walk in high dimensions,” *arXiv preprint arXiv:2505.01341*, 2025.
- [33] I. Y. Goldsheid, S. A. Molchanov, and L. A. Pastur, “A pure point spectrum of the stochastic one-dimensional Schrödinger operator,” *Funct. Anal. Appl.*, vol. 11, no. 1, pp. 1–8, 1977.
- [34] H. Kunz and B. Souillard, “Sur le spectre des opérateurs aux différences finies aléatoires,” *Comm. Math. Phys.*, vol. 78, no. 2, pp. 201–246, 1980.
- [35] V. Bucaj *et al.*, “Localization for the one-dimensional Anderson model via positivity and large deviations for the Lyapunov exponent,” *Trans. Amer. Math. Soc.*, 2019.
- [36] S. Jitomirskaya and X. Zhu, “Large deviations of the Lyapunov exponent and localization for the 1D Anderson model,” *Comm. Math. Phys.*, vol. 370, no. 1, pp. 311–324, 2019.
- [37] D. Damanik, R. Sims, and G. Stolz, “Localization for one-dimensional, continuum, Bernoulli-Anderson models,” *Duke Math. J.*, vol. 114, no. 1, pp. 59–100, 2002.
- [38] S. Liu, Y. Shi, and Z. Zhang, “Localization and unique continuation for the Anderson-Bernoulli model with long-range hopping on $\mathbb{Z}$,” *arXiv preprint arXiv:2607.03472*, 2026.
- [39] J. Fröhlich and T. Spencer, “Absence of diffusion in the Anderson tight binding model for large disorder or low energy,” *Comm. Math. Phys.*, vol. 88, no. 2, pp. 151–184, 1983.

- [40] J. Fröhlich, F. Martinelli, E. Scoppola, and T. Spencer, “Constructive proof of localization in the Anderson tight binding model,” *Comm. Math. Phys.*, vol. 101, no. 1, pp. 21–46, 1985.
- [41] M. Aizenman and S. Molchanov, “Localization at large disorder and at extreme energies: an elementary derivation,” *Comm. Math. Phys.*, vol. 157, no. 2, pp. 245–278, 1993.
- [42] J. Bourgain, “On localization for lattice Schrödinger operators involving Bernoulli variables,” in *Geometric aspects of functional analysis*, vol. 1850, Springer, 2004, pp. 77–99.
- [43] J. Bourgain and C. E. Kenig, “On localization in the continuous Anderson-Bernoulli model in higher dimension,” *Invent. Math.*, vol. 161, no. 2, pp. 389–426, 2005.
- [44] J. Bourgain, “Anderson-Bernoulli models,” *Mosc. Math. J.*, vol. 5, no. 3, pp. 523–536, 2005.
- [45] S. Jitomirskaya, “Ergodic Schrödinger operators (on one foot),” in *Spectral theory and mathematical physics: a Festschrift in honor of Barry Simon's 60th birthday*, vol. 76, Amer. Math. Soc., 2007, pp. 613–647.
- [46] L. Li, “On support cardinality for the discrete Schrödinger equation,” *Lett. Math. Phys.*, vol. 116, no. 4, 2026.
- [47] L. Buhovsky, A. Logunov, E. Malinnikova, and M. Sodin, “A discrete harmonic function bounded on a large portion of $\mathbb{Z}^2$ is constant,” *Duke Math. J.*, vol. 171, no. 6, pp. 1349–1378, 2022.
- [48] L. Li, “Anderson-Bernoulli localization at large disorder on the 2D lattice,” *Comm. Math. Phys.*, vol. 393, no. 1, pp. 151–214, 2022.
- [49] A. Bou-Rabee, W. Cooperman, and S. Ganguly, “Unique continuation on planar graphs,” *Discrete Anal.*, 2025.
- [50] O. Hurtado, “Localization and unique continuation for non-stationary Schrödinger operators on the 2d lattice,” *Comm. Math. Phys.*, vol. 407, no. 4, 2026.
- [51] O. Hurtado, “Localization for non-stationary Anderson models in three dimensions,” *arXiv preprint arXiv:2603.17810*, 2026.
- [52] J. Z. Imbrie, “Localization and eigenvalue statistics for the lattice Anderson model with discrete disorder,” *Rev. Math. Phys.*, vol. 33, no. 8, 2021.
- [53] S. Krymskii, “On the lowest possible dimension of supports of solutions to the discrete Schrödinger equation,” *arXiv preprint arXiv:2401.02800*, 2024.
- [54] L. Li, “Discrete unique continuation on simplex,” *arXiv preprint arXiv:2608.02707*, 2026.
- [55] S. Liu, Y. Shi, and Z. Zhang, “Quantitative unique continuation on simplex and $\mathbb{Z}^n$,” *arXiv preprint arXiv:2608.11602*, 2026.
- [56] J. Bourgain and A. Klein, “Bounds on the density of states for Schrödinger operators,” *Invent. Math.*, vol. 194, no. 1, pp. 41–72, 2013.
- [57] S. Liu, Y. Shi, and Z. Zhang, “On localization for the alloy-type Anderson-Bernoulli model with long-range hopping,” *arXiv preprint arXiv:2508.12714*, 2025.