

三维聚焦能量临界非线性薛定谔方程的 整体适定性与散射

Global well-posedness and scattering for the three-dimensional focusing energy-critical NLS

Qingtang Su¹ Zehua Zhao²

¹ 中国科学院数学与系统科学研究院 (中国北京); 晨兴数学中心 (中国北京)

² 北京理工大学数学与统计学院, 代数李理论与分析教育部重点实验室 (中国北京)

摘要

本文证明三维聚焦能量临界非线性薛定谔方程在基态的能量阈值与梯度阈值之下整体适定且散射, 从而确认了三维情形的阈值猜想。受我们此前关于 $H^s(\mathbb{R}^3)$ ($s > 1/2$) 上三维散焦三次方程工作的启发, 我们从一条相互作用 Morawetz 恒等式出发导出频率定域化的 $L^4_{t,x}$ 估计, 全程不假定有限质量。我们把相互作用权重改造得适应投影密度, 于是在聚焦情形下得到一个正的四次时空项, 再利用非线性相消把频率截断误差吸进这一项之中。

1 引言

1.1 主要结果

本文研究三维聚焦能量临界非线性薛定谔方程

$$(i\partial_t + \Delta)u = -|u|^4u, \quad u(0) = u_0 \in \dot{H}^1(\mathbb{R}^3). \quad (1.1)$$

方程之所以是能量临界的, 是因为缩放 $u_{\lambda(t,x)} = \lambda^{\frac{1}{2}}u(\lambda^2t, \lambda x)$ 同时保持方程本身与初值的 $\dot{H}^1(\mathbb{R}^3)$ 范数不变。Cazenave–Weissler 的临界局部理论[1] 给出了该空间中的局部适定性以及小数据的散射, 稳定性理论见 [2], [3]。强解属于 $C_t \dot{H}^1_x \cap L^{10}_{t,x,\text{loc}}$ 并满足 Duhamel 公式; 它在最大存在时间上的 $L^{10}_{t,x}$ 范数有限, 便蕴含整体存在与散射。因此, 大数据问题的关键在于获得长时间的时空控制。

对于散焦方程, 任意能量空间的数据都满足整体适定性与散射。Bourgain[4] 与 Tao[5] 建立了径向理论, Grillakis[6] 证明了光滑径向数据的整体存在性。Colliander、Keel、Staffilani、Takaoka 与 Tao[7] 解决了三维的一般情形, Ryckman–Visan[8] 解决了四维情形, Visan[9] 处理了高维情形。散焦能量临界波动方程也有类似的整体结果 [10], [11], [12]。

对于聚焦方程, 静止的基态使得任意数据不可能散射:

$$W(x) = \left(1 + \frac{|x|^2}{3}\right)^{-\frac{1}{2}}, \quad -\Delta W = W^5.$$

该流保持能量守恒, 即 $E(v) = \frac{1}{2}\|\nabla v\|_2^2 - \frac{1}{6}\|v\|_6^6$ 。基态使最优 Sobolev 不等式 [13], [14] 取到等号; 记 $G := \|\nabla W\|_2^2 = \|W\|_6^6$, 则

$$\|f\|_6^6 \leq G^{-2}\|\nabla f\|_2^6, \quad E(W) = \frac{G}{3}. \quad (1.2)$$

散射猜想断言: 能量与梯度均低于 W 相应阈值的解整体存在且散射, 相关讨论见 [2], [15]。受我们此前对三维散焦三次 NLS 在 $s > \frac{1}{2}$ 的 H^s 空间中双线性相互作用估计[16] 的启发, 我们在三维证明了这一猜想。我们构造一个频率定域化的相互作用量, 其主项在基态以下具有强制性; 随后把投影源项吸收进所产生的 $L^4_{t,x}$ 积分之中, 而无须假设有限质量。

定理 1.1. 设

$$u_0 \in \dot{H}^1(\mathbb{R}^3), \quad E(u_0) < E(W), \quad \|\nabla u_0\|_2 < \|\nabla W\|_2. \quad (1.3)$$

则式 (1.1) 的唯一最大强解整体存在, 属于

$$C(\mathbb{R}; \dot{H}^1) \cap L^{10}_{t,x}(\mathbb{R} \times \mathbb{R}^3),$$

且在两个时间方向上均散射: $u_{\pm} \in \dot{H}^1(\mathbb{R}^3)$, 使得

$$\lim_{t \rightarrow \pm\infty} \|u(t) - e^{it\Delta}u_{\pm}\|_{\dot{H}^1} = 0.$$

式 (1.3) 中的两个条件都是尖锐的。满足 $E(u_0) < E(W)$ 与 $\|\nabla u_0\|_2 > \|\nabla W\|_2$ 的有限方差数据会有有限时间爆破[2]。在能量 $E(W)$ 处, Duyckaerts–Merle[17] 构造了径向解 W^- : 它的梯度范数低于 W 的梯度范数, 却趋于 W 且沿正向时间不散射。

1.2 已有结果与低频问题

在式 (1.3) 之下, 能量守恒与最优 Sobolev 不等式 (1.2) 给出能量陷获: 梯度范数一致地保持在 $\|\nabla W\|_2$ 以下, 且

$$\|\nabla u(t)\|_2^2 - \|u(t)\|_6^6 \geq c(u_0) \|\nabla u(t)\|_2^2.$$

Kenig–Merle[2] 利用这一强制性证明了三、四、五维与五维径向数据的整体适定性与散射。他们的集中紧性论证借助 Keraani 的 profile 分解[18], 将散射的失败归结为存在一个非零临界元, 其在模对称意义下轨道预紧。径向对称性固定了该临界元的空间中心, 因而他们可以在不假设有限质量的情况下, 用定域化维里论证将其排除。

若要从这一维里论证中去掉径向对称假设, 就需要控制移动的中心。对 NLS 而言, 伽利略提升把初始时刻的 ∇u 替换为 $\nabla u + 2\pi i \xi u$, 而当 $u \in \dot{H}^1$ 时它未必属于 L^2 。因此, 借助提升将动量归一化需要额外的低频控制。对波动方程而言, 动量 $\int u_t \nabla u$ 在 $\dot{H}^1 \times L^2$ 中本就是有限的。Kenig–Merle[19] 利用 Lorentz 不变性与有限传播速度, 建立了非径向刚性所需的零动量性质, 从而证明了三、四、五维的相应结果。

对五维及更高维的 NLS, Killip–Visan[15] 通过额外的衰减与双 Duhamel 论证获得了所缺的低频控制, 由此为临界元得到负正则性, 进而得到有限质量。这些界排除了频率级联, 并允许进行伽利略提升。在孤子情形, 负正则性与几乎周期性给出 L^2 紧性, 而极小性给出零动量; 二者结合便得到中心的次线性运动, 从而允许使用截断维里论证。维数限制源自双 Duhamel 论证[15, 第 6 节]: $t+s$ 与 $t-\tau$ 处的正向与反向公式, 其传播子的时间间隔为 $s+\tau$ 。在单位频率下, 绝对值色散主项导出如下模型

$$\int_0^T \int_0^T (1+s+\tau)^{-\frac{d}{2}} ds d\tau \sim \begin{cases} 1 & d \geq 5 \\ \log T & d = 4 \\ T^{\frac{1}{2}} & d = 3 \end{cases} \quad (1.4)$$

这描述的是色散主项的可求和性, 而非临界元的质量。¹在临界维数四维, Dodson[20] 将长时间 Strichartz 估计与定域化双 Duhamel 估计同定域化相互作用 Morawetz 论证相结合, 证明了该定理。在三维, 式 (1.4) 中的幂次损失使得直接的绝对值估计无法提供所需的低频控制。早期的非径向结果包括: Han[21] 在定域化质量通量符号条件之下的 H^1 理论, 以及 Chung–Han[22] 关于频率尺度具有上下界、有限质量的几乎周期解的刚性定理。

1.3 证明概要

为了处理有限质量不成立这一剩余情形, 我们改用一个只依赖 $x-y$ 的相互作用。作用量中便不再出现空间中心; 于是我们必须控制住投影之后剩下的低频依赖。设定理 1.1 不成立, 我们按 [2], [15], [23] 作标准的集中紧性约化, 并把有限寿命的临界元排除掉; 命题 2.2 于是给出一个非零的前向整体几乎周期解 u , 带有频率尺度 $N(t) \geq 1$ 与空间中心 $x(t)$ 。记 $B := \sup_{t \geq 0} \|\nabla u(t)\|_2$ 。所谓几乎周期, 是指归一化轨道

$$\mathcal{K} = \left\{ N(t)^{-\frac{1}{2}} u \left(t, x(t) + \frac{\cdot}{N(t)} \right) : t \geq 0 \right\}$$

在 $\dot{H}^1(\mathbb{R}^3)$ 中预紧。由守恒能量为正可得

$$\inf_{f \in \mathcal{K}} \|\nabla f\|_2^2 \geq 2E(u) > 0.$$

预紧性与 Hölder 不等式于是给出

$$\int_{|x-x(t)| \leq R_0/N(t)} |u(t, x)|^2 dx \gtrsim_u N(t)^{-2}, \quad \|u(t)\|_4^4 \gtrsim_u N(t)^{-1}. \quad (1.5)$$

特别地, $N(t) \sim 1$ 会迫使 $\int_0^T \|u(t)\|_4^4 dt$ 线性增长。在散焦方程中, 相互作用 Morawetz 估计恰好控制住这个积分: 取 $k(x) = |x|$, 作用量 $M_k(u) := 2 \iint |u(y)|^2 \nabla k(x-y) \cdot \text{Im}(\bar{u} \nabla u)(x) dx dy$ 满足 $|M_k(u)| \lesssim \|u\|_2^3 \|\nabla u\|_2$, 而 $-\Delta^2 |x| = 8\pi \delta_0$ 在其导数中贡献出 $8\pi \|u\|_4^4$; 散焦情形因此有 $\int_I \|u(t)\|_4^4 dt \lesssim B \|u\|_{L_t^\infty L_x^2}^3$ 。聚焦情形还留下两个障碍: 低频质量之和 $\sum_{L \leq 1} L^{-2} \|\nabla P_L u\|_2^2$ 可能发散, 而聚焦一侧的导数中又含有负项

$$-\frac{8}{3} \iint \frac{|u(x)|^6 |u(y)|^2}{|x-y|} dx dy.$$

¹对 $\int_{|x| \leq \sqrt{T}} |W_d(x)|^2 dx$ 而言, 同样的增长率也会出现, 因为 d 维基态在无穷远处满足 $W_d(x) \sim |x|^{2-d}$ 。

我们沿 Colliander 等人 [7] 与 Killip-Visan [23] 的做法截断低频, 使相互作用 Morawetz 作用量成为有限。要把这条路在聚焦情形下走通, 我们把方向强制性与由投影密度决定的相互作用半径结合起来, 得到一个正的四次时空项; 再利用投影之后五次源项中的相消, 把投影误差吸进这一项。更确切地说, 记 $F(u) = |u|^4 u$, $h = P_{>\nu} u$, $l = P_{\leq \nu} u$, 并令 $M_\nu := \sup_t \|h(t)\|_2 \lesssim B/\nu$, $d_\nu := \nu M_\nu \rightarrow 0$, $a(t) := \|h(t)\|_4^4$, $K_a(I) := \int_I a(t) dt$; 其中 $d_\nu \rightarrow 0$ 由低频的预紧性得出。固定充分小的 ν 之后, 式 (1.5) 仍然给出 $K_a(I) \gtrsim_u \int_I N(t)^{-1} dt$, 而只要 ∇k 有界就有 $|M_k(h)| \lesssim_u \nu^{-3}$ 。命题 2.3 证明了频率定域化的相互作用 Morawetz 估计

$$\|P_{>\nu} u\|_{L_{t,x}^4(I_j \times \mathbb{R}^3)}^4 \leq C_u \nu^{-3} + \varepsilon_u(\nu) \|P_{>\nu} u\|_{L_{t,x}^4(I_j \times \mathbb{R}^3)}^4, \quad \varepsilon_u(\nu) \rightarrow 0. \quad (1.6)$$

这里 $I_j := [0, T_j]$ 。趋于无穷的递增列 T_j 与 ν 无关, 且常数对 j 与充分小的 ν 一致。取定 ν 使 $\varepsilon_u(\nu) \leq \frac{1}{2}$, 再令 $j \rightarrow \infty$, 使得 $\int_0^\infty \int |P_{>\nu} u|^4 \lesssim_u \nu^{-3}$ 。只要 $\int_0^\infty N(t)^{-1} dt = \infty$, 这就与预紧性相矛盾, 其中也包括 $N(t) \sim 1$ 的情形。

再配上一个强迫项比较, 这一估计还能把其余的频率尺度一并排除。为控制投影源项, 我们在命题 3.2 中证明

$$\int_{I_j} \|F(u(t))\|_1^2 dt \lesssim_u \int_{I_j} \int |P_{>\nu} u(t, x)|^4 dx dt = K_a(I_j). \quad (1.7)$$

在临界缩放下同时把 ν 换成 $\lambda\nu$, 上式两端都按 λ^{-3} 缩放。我们先在有限区间上使用这一比较, 证得式 (1.6); Morawetz 估计一旦建立, 同一比较又给出 $F(u) \in L_t^2 L_x^1([0, \infty) \times \mathbb{R}^3)$ 。此后, 无损耗 Duhamel 公式给出有限质量, 再由强迫项尾端的衰减得到零质量 (引理 2.4)。这样, 四次时空估计就把约化所提供的每一个非零临界元都排除掉了。

式 (1.6) 出自同一条相互作用恒等式。对核 $k_{R(t)}$, 记 $M(t) := M_{k_{R(t)}}(h(t))$ 。其导数分成三部分: 空间主项 $\mathcal{B}$ 、投影源项 Err 与半径贡献 D

$$M' = \mathcal{B} + \text{Err} + D, \quad |M| \lesssim_u \nu^{-3}, \quad (1.8)$$

$$\mathcal{B} \geq c_u a(t), \quad D \geq -\varepsilon_{\text{rad}}(\nu) a(t), \quad \left| \int_{I_j} \text{Err} \right| \leq \varepsilon_{\text{src}}(\nu) [\nu^{-3} + K_a(I_j)],$$

其中 $\varepsilon_{\text{rad}}(\nu) + \varepsilon_{\text{src}}(\nu) \rightarrow 0$ 。积分之后, 把与 $K_a(I_j)$ 成正比的误差吸收掉, 再把 ν^{-3} 的余项同端点估计合并。

这些估计必须对同一个核证明, 而且核的参数要在 ν 之前取定, 与 I_j 无关。我们在三次方程 [16] 中的论证把高频质量与一个辅助的低频能量密度配对使用。这便提示我们: 用相互作用自身所产生的那个时空积分去控制投影源项。对五次非线性来说, 临界标度抹掉了三次项可用的那个频率倒数增益; 这里的小系数来自低频因子, 以及源项的质量括号与动量括号中的相消。

为了得到这种低频控制, 我们先改善空间可积性。由于 $q > 3$ 时 $W \in L^q(\mathbb{R}^3)$, 我们寻求一个 L_x^4 界。Littlewood-Paley 递推与精化 Sobolev 不等式 [24] 给出

$$u \in L_t^\infty L_x^4, \quad f(t) := \|F(u(t))\|_1 \leq \|u(t)\|_4^2 \|u(t)\|_6^3 \lesssim_u 1.$$

定态解 W 同样满足这些界, 所以它们本身并不给出时间可积性。在每一个固定的输出频率上, 单个 Duhamel 积分的色散估计关于时间是可积的: 尽管有式 (1.4) 中的二重积分障碍, 仍有 $\int_0^\infty \min\{\nu^3, s^{-3/2}\} ds \sim \nu$ 。第 3 节将证明, 在选定的区间上

$$\|l\|_{L_t^2 L_x^\infty(I_j \times \mathbb{R}^3)} + \nu^{-1} \|\nabla l\|_{L_t^2 L_x^\infty(I_j \times \mathbb{R}^3)} \lesssim_u \nu K_a(I_j)^{1/2}.$$

把导数的界与 M_ν^2 配对使得 $M_\nu^2 \nu^2 = d_\nu^2 \rightarrow 0$, 而不必从紧性中要求定量的衰减速率。

严格的阈值间隙进入空间主项。 $\|l\|_{\dot{H}^1}$ 的一致小性为 h 保住了严格阈值。在归一化坐标下, 令 $v(y) := N(t)^{-\frac{1}{2}} |h(t, x(t) + y/N(t))|$ 。各向异性缩放与式 (1.2) 一起给出 (对方向 ω 一致成立)

$$\|\partial_\omega v\|_2^2 - \frac{1}{3} \|v\|_6^6 \geq c_u \|\partial_\omega v\|_2^2.$$

左端在 $v = W$ 处为零, 故严格不等式把基态排除在外。第 4 节中, 我们对一维 Green 核取平均来插入相互作用权重。权重在预紧核心上几乎为常数; 核心之外则用紧性、Hardy 不等式与 Green 方程来控制带权势项以及权重的导数。由此得到的强制性保留下正密度项 Q_R (式 (4.3)) 的一个固定比例, 且常数与投影质量无关。这一论证用的是 Planchon-Vega [25] 的方向性双线性维里框架; 其空间部分与 Dodson-Murphy [26] 关于 $\dot{H}^{1/2}$ 临界方程的聚焦相互作用 Morawetz 估计相关。

回到物理坐标, 我们选取的相互作用半径既跟着密度走, 又保持这一正性。设 k_R 是凸核, 可积轮廓 ψ 满足 $\partial_R \nabla k_R = \nabla[\psi(|\cdot|/R)]$, 用

$$C(R(t), \rho(t)) := \iint \rho(t, x) \rho(t, y) \psi(|x - y|/R(t)) dx dy = \kappa R(t)^4, \quad \rho = |h|^2. \quad (1.9)$$

定义 $R(t)$ 。把 $\kappa > 0$ 固定得足够小, 就有 $R(t) \underset{u}{\sim} a(t)$, 并且 $N(t)R(t)$ 充分大以支撑带权强制性。半径方程接着把保留下来的密度项与所需的四次密度连通:

$$\mathcal{B}_{k_R}(h) \gtrsim Q_R(h) \gtrsim_u R \gtrsim_u \|h\|_4^4. \quad (1.10)$$

同一选择也控制住了式 (1.8) 中的半径贡献。为看清符号, 先考虑不带质量源的连续性方程。记 $\psi_R(x) := \psi(|x|/R)$ 、 $M_\psi := M_{\psi_R}(h)$ 、 $T_R := 4\kappa R^3 - \partial_R C > 0$, 求得

$$T_R R' = 2M_\psi, \quad D = R' M_\psi = \frac{2M_\psi^2}{T_R} \geq 0.$$

对实际的投影方程, 我们在这一恒等式中保留质量源, 并在引理 4.3 中配方。低频界于是给出 $D \geq -\varepsilon_{\text{rad}}(\nu)a(t)$ 。

有了这个核与半径, 我们接着控制完整的投影源项 $\mathcal{E} := P_{>\nu} F(u) - F(h) = G_1 - g$, 其中 $G_1 := F(u) - F(h)$, $g := P_{\leq \nu} F(u)$ 。质量括号相消成 $\text{Im}(G_1 \bar{h}) = -\text{Im}(F(u) \bar{l})$; 动量括号里分部积分给出势项之差, 并把导数挪到 l 上。这些恒等式与低频估计合起来给出 $\left| \int_{I_j} \text{Err}_{G_1} \right| \lesssim_u (d_\nu + d_\nu^2) K_a(I_j)$ 。至于 g , 它可能含有频率相当的高频之间的相互作用, 我们写成 $h = \text{div}(\nabla \Delta^{-1} h)$ 再分部积分。Killip-Visan [23] 的长时间 Strichartz 估计以 Dodson 的方法 [27] 为基础, 并且对聚焦符号同样有效, 它控制了 $\nabla \Delta^{-1} h$ 。于是对同一个变动的核一致地有

$$\left| \int_{I_j} \text{Err}_{k_R, \nu}(t) dt \right| \lesssim_u (\nu^{1/4} + d_\nu + d_\nu^2) [\nu^{-3} + K_a(I_j)]. \quad (1.11)$$

把它同空间强制性、半径界以及 $|M_{k_R}(h)| \lesssim_u \nu^{-3}$ 结合起来, 就得到式 (1.6)。

1.4 组织、记号与约定

在第 2 节中, 我们给出临界元归约, 陈述相互作用 Morawetz 估计, 并导出相互作用恒等式; 接着在第 3 节证明低频界, 并在第 4 节利用这些界建立强制性、构造相互作用半径; 最后在第 5 节用它们估计投影源项、积分该恒等式并证明命题 2.3, 从而完成刚性论证。

除特别说明外, 全文的空间范数与积分都在 $\mathbb{R}^3$ 上进行, $\|\cdot\|_p$ 表示 L_x^p 范数。当 $X \leq CY$ 且常数 C 与所考虑的参数无关时, 我们记 $X \lesssim Y$; 下标标明 C 允许依赖的量。记号 $X \sim Y$ 表示 $X \lesssim Y$ 与 $Y \lesssim X$ 同时成立。我们的 Fourier 变换定义为

$$\hat{f}(\xi) = \int_{\mathbb{R}^3} e^{-2\pi i x \cdot \xi} f(x) dx$$

对维数较低的变量亦采用同一约定。于是 $\widehat{\partial_j f}(\xi) = 2\pi i \xi_j \hat{f}(\xi)$, 且与 K 的卷积的乘子为 $\hat{K}$ 。取定一个实值径向函数 $\varphi \in C_c^\infty(\mathbb{R}^3)$, 满足 $0 \leq \varphi \leq 1$ 、在 $B(0, 1)$ 上 $\varphi = 1$, 且 $\text{supp } \varphi \subset B(0, 2)$ 。相应的 Littlewood-Paley 投影为

$$\widehat{P_{\leq L} f}(\xi) = \varphi\left(\frac{\xi}{L}\right) \hat{f}(\xi), \quad P_{>L} = 1 - P_{\leq L}, \quad P_L = P_{\leq L} - P_{\leq \frac{L}{2}}$$

所有环域上的求和与上确界都遍历二进尺度; 允许对环域作固定的放大。重复出现的空间指标按约定求和, 并在上下文清楚时省略时空范数中的时间区间。

2 归约到相互作用 Morawetz 估计

我们把定理 1.1 归约为命题 2.3 中的四次时空估计。

2.1 临界元与无损耗公式

记 $A(f) = \|\nabla f\|_2^2$, $B_6(f) = \|f\|_6^6$ 。由能量陷获 [2, 定理 3.9 与推论 3.13], 存在常数 $\gamma > 0$, 使得

$$A(u(t)) \leq B^2 \leq (1 - \gamma)G < G, \quad (2.1)$$

$$A(u(t)) - B_6(u(t)) \geq (2\gamma - \gamma^2)A(u(t)), \quad E(u(t)) \geq \frac{A(u(t))}{3}.$$

[2, 第 2 节] 中的局部理论与稳定性估计适用于 $C_t \dot{H}_x^1 \cap L_{t,x,\text{loc}}^{10}$ 中的解。在每个紧子区间 $I \in I_{\max}$ 上, 这些解还满足: 对每一对满足 $\frac{2}{q} + \frac{3}{r} = \frac{3}{2}$ 且 $2 \leq q \leq \infty$ 的指标 (q, r) , 都有 $\nabla u \in L_t^q L_x^r(I)$ 。

定义 2.1. 非零解称为 (**模对称意义下**) **几乎周期的**, 若存在函数 $N : I_{\max} \rightarrow (0, \infty)$ 与 $x : I_{\max} \rightarrow \mathbb{R}^3$, 使得归一化轨道

$$\mathcal{K} = \left\{ N(t)^{-\frac{1}{2}} u \left(t, x(t) + \frac{\cdot}{N(t)} \right) : t \in I_{\max} \right\} \quad (2.2)$$

在 $\dot{H}^1$ 中预紧, 且 $\inf_{v \in \mathcal{K}} \|\nabla v\|_2 > 0$ 。

命题 2.2. 若定理 1.1 不成立, 则式 (1.1) 存在一个非零的几乎周期解, 其最大存在时间 $I_{\max} = \mathbb{R}$, 能量 $E(u) = E_c \in (0, E(W))$, 并且满足

$$\sup_t \|\nabla u(t)\|_2 < \|\nabla W\|_2, \quad \|u\|_{L_{t,x}^{10}([0,\infty) \times \mathbb{R}^3)} = \infty$$

此外, 前半直线可分解为特征区间之并 $[0, \infty) = \bigcup_k J_k$, 使得

$$N|_{J_k} = N_k \geq 1, \quad |J_k| \sim_u N_k^{-2}$$

证明. 在最小不散射能量 E_c 处的临界元构造 [2, 命题 4.1–4.2] 并不需要径向对称性。借助时间平移与紧性选取, 可得到这样一个临界元: 它在两个时间方向上的散射规模都是无穷的, 且其归一化轨道在最大存在时间上预紧; 参见 [23, 定理 1.4]。能量陷获保持了严格的阈值间隙。

利用 [23, 定理 1.8] 中关于时间平移与伸缩的归一化极限的选取论证, 必要时反转时间后, 我们可在 $[0, T_+)$ 上得到 $N(t) \geq 1$ 。所得的临界元可能与原来的那个不同。强收敛保持它的能量与阈值间隙, 稳定性则保持它在两个方向上均不散射这一事实。这一选取不依赖非线性项的任何符号条件。有限的端点由 [15, 定理 5.1] 排除, 而该结论在每一维 $d \geq 3$ 下都成立。于是最大存在时间为 $\mathbb{R}$ 。再由局部常值性 [23, 引理 1.5] 与一次固定的伸缩, 即得所述的满足 $N_k \geq 1$ 的特征区间。 $\square$

此后, 除特别说明外, 所有时间范数与上确界都在 $[0, \infty)$ 上取。我们固定命题 2.2 中的解 u ; 常数可以依赖于它的预紧轨道与阈值间隙。由预紧性与 $N(t) \geq 1$ 可知, 其低频梯度在时间上一致地趋于零。

在聚焦符号下, 无损耗 Duhamel 公式 [23, 命题 1.9] 具有形式

$$u(t) = -i \lim_{T \rightarrow \infty} \int_t^T e^{i(t-s)\Delta} F(u(s)) \, ds \quad (2.3)$$

其中极限在 $\dot{H}^1$ 中按弱收敛意义理解。该恒等式对满足 $N(t) \geq 1$ 的向前整体几乎周期解成立; 它不需要有限质量。

2.2 四次时空估计与刚性

对 $0 < \nu < 1$, 记

$$\begin{aligned} h &= P_{>\nu} u, \quad l = P_{\leq \nu} u, \quad a(t) = \|h(t)\|_4^4, \\ M_\nu &= \sup_t \|h(t)\|_2 \leq \frac{B}{\nu}, \quad d_\nu = \nu M_\nu, \quad \eta_\nu = \sup_t \|\nabla l(t)\|_2. \end{aligned} \quad (2.4)$$

投影使 $h \in C_t \dot{H}_x^1$, 故其四次积分在紧时间区间上有限。记

$$K_a(I) = \int_I a(t) \, dt = \|P_{>\nu} u\|_{L_{t,x}^4(I \times \mathbb{R}^3)}^4, \quad K_N(I) = \int_I N(t)^{-1} \, dt. \quad (2.5)$$

我们在第 3 至第 5 节证明下面这条估计。

命题 2.3 (频率定域化的相互作用 Morawetz 估计). 设 u 如命题 2.2 中所取。存在与 ν 无关的常数 $C_u, \nu_0 > 0$ 和一系列单调递增至无穷的时刻 $T_j \rightarrow \infty$, 使得

$$\|P_{>\nu} u\|_{L_{t,x}^4([0, T_j] \times \mathbb{R}^3)}^4 \leq C_u \nu^{-3} + \varepsilon_u(\nu) \|P_{>\nu} u\|_{L_{t,x}^4([0, T_j] \times \mathbb{R}^3)}^4, \quad 0 < \nu \leq \nu_0. \quad (2.6)$$

其中 $\varepsilon_u(\nu) \rightarrow 0$ ($\nu \rightarrow 0$)。特别地, 对每个充分小的固定 ν ,

$$\int_0^\infty \int_{\mathbb{R}^3} |P_{>\nu} u(t, x)|^4 \, dx \, dt \lesssim_u \nu^{-3}. \quad (2.7)$$

由轨道的预紧性 (见式 (3.7)), 当 ν 充分小时有 $K_a(I) \gtrsim_u K_N(I)$ 。于是式 (2.7) 已经排除了 $K_N([0, \infty)) = \infty$ 。为了把一切频率尺度都覆盖进来, 我们还将命题 3.2 中证明有限区间上的比较 $\|F(u)\|_{L_t^2 L_x^1([0, T_j])}^2 \lesssim_u K_a([0, T_j])$, 它与式 (2.7) 合起来恰好给出下面刚性引理的假设。

引理 2.4. 设 u 是式 (1.1) 的向前整体强解, 满足无损耗 Duhamel 公式 (2.3) 以及

$$\sup_{t \geq 0} \|\nabla u(t)\|_2 \leq B < \infty, \quad F(u) \in L_t^2 L_x^1([0, \infty) \times \mathbb{R}^3),$$

则 $u \equiv 0$ 。

记 $f(t) = \|F(u(t))\|_1$ 。关键估计对每个 $n > 0$ 都成立：

$$\|u(t)\|_2 \leq Cn^{\frac{1}{2}} \|f\|_{L^2(t, \infty)} + \frac{CB}{n}. \quad (2.8)$$

取 $n = 1$ 即回到有限质量；再由质量守恒以及强迫项尾部的衰减，这一质量只能为零。完整的证明放在第 5 节末尾给出。

2.3 相互作用恒等式

为了得到式 (2.6)，我们寻找一个时间导数，使它对 $a(t)$ 给出正的控制。取 $k(x) = |x|$ ，相应的密度项是 $8\pi a(t)$ ，但聚焦势是负的。因此我们需要一个核，让它的完整主项仍然控制得住 $a(t)$ 。

对 $h \in H^1$ 与实的偶核 k ，令

$$\rho = |h|^2, \quad p = \text{Im}(\bar{h} \nabla h), \quad Q_k(h) = - \iint \Delta^2 k(x-y) \rho(x) \rho(y) \, dx \, dy.$$

相互作用作用量及其主项为

$$M_k(h) = 2 \iint \rho(y) \nabla k(x-y) \cdot p(x) \, dx \, dy, \quad (2.9)$$

$$\begin{aligned} \mathcal{B}_k(h) &= Q_k(h) + 4 \iint k_{jk}(x-y) [\rho(y) \text{Re}(\partial_j \bar{h} \partial_k h)(x) - p_j(y) p_k(x)] \, dx \, dy \\ &\quad - \frac{4}{3} \iint \Delta k(x-y) |h(x)|^6 \rho(y) \, dx \, dy. \end{aligned} \quad (2.10)$$

源项估计需要如下关于 t 一致的界

$$|\nabla k(t, x)| + |x| |D^2 k(t, x)| + |x|^2 |D^3 k(t, x)| \leq C_k. \quad (2.11)$$

其中空间导数按弱意义理解，界几乎处处成立。再令

$$q(x) = \int \nabla k(x-y) \rho(y) \, dy, \quad q_m(y) = \int \nabla k(x-y) \cdot p(x) \, dx.$$

投影方程与两个强迫括号为

$$\begin{aligned} (i\partial_t + \Delta)h &= -F(h) - \mathcal{E}, \quad \mathcal{E} = G_1 - g, \quad G_1 = F(u) - F(h), \quad g = P_{\leq \nu} F(u), \\ \{z, h\}_m &= \text{Im}(z\bar{h}), \quad \{z, h\}_p = \text{Re}(z\nabla \bar{h} - h\nabla \bar{z}). \end{aligned}$$

求导便得

$$\begin{aligned} \partial_t \rho &= -2 \text{div } p - 2\{\mathcal{E}, h\}_m, \\ \partial_t p_j &= \frac{1}{2} \partial_j \Delta \rho - 2\partial_k \text{Re}(\partial_j \bar{h} \partial_k h) + \frac{2}{3} \partial_j |h|^6 - \{\mathcal{E}, h\}_{p,j}. \end{aligned}$$

把它们代入式 (2.9)，除了主项 (2.10) 之外还多出

$$\text{Err}_{k,\nu} = -2 \int q \cdot \{\mathcal{E}, h\}_p - 4 \int q_m \{\mathcal{E}, h\}_m. \quad (2.12)$$

对第 4 节中构造的可微核族 $k_{R,A}$ ，令 $M_\psi = 2 \int p \cdot (\partial_R \nabla k_{R,A} * \rho)$ 。完整恒等式为

$$\frac{d}{dt} M_{k_{R(t),A}}(h(t)) = \mathcal{B}_{k_{R(t),A}}(h(t)) + \text{Err}_{k_{R(t),A},\nu}(t) + R'(t) M_\psi(h(t)). \quad (2.13)$$

这些计算先对光滑函数进行，到命题 2.3 的证明中再在能量正则性下把积分后的恒等式补严格。把最后一项记作 $D(t) = R'(t) M_\psi(h(t))$ ，我们要建立

$$\mathcal{B}_{k_{R(t),A}}(h(t)) \geq c_u a(t), \quad D(t) \geq -\varepsilon_{\text{rad}}(\nu) a(t),$$

$$\left| \int_{I_j} \text{Err}_{k_{R(t),A},\nu}(t) \, dt \right| \leq \varepsilon_{\text{src}}(\nu) [\nu^{-3} + K_a(I_j)], \quad \varepsilon_{\text{rad}}(\nu) + \varepsilon_{\text{src}}(\nu) \rightarrow 0. \quad (2.14)$$

由于 $|M_k(h)| \leq 2\|\nabla k\|_\infty \|h\|_2^3 \|\nabla h\|_2 \lesssim_u \nu^{-3}$ ，对式 (2.13) 积分即得式 (2.6)。下面的低频估计将控制住源项；此外，所选的核还要同时给出式 (2.14) 中的前两个不等式。

3 低频界

式 (2.12) 中的源项既含有被移走的低频部分 l , 也含有低频输出 $P_{\leq \nu} F(u)$ 。为了把它们同四次积分作比较, 我们先证明 $u \in L_t^\infty L_x^4$, 这就使 $f(t) = \|F(u(t))\|_1$ 有界。随后, 无损耗 Duhamel 公式给出低频导数界, 其右端由 f 在未来的平均表示。通过选取合适的终止时刻, 我们便能在建立任何整体时间可积性之前, 把这些平均与 K_a 加以比较。

3.1 源项的空间可积性

为了估计式 (2.3) 的环状部分, 我们使用精化 Sobolev 不等式 [24, 定理 2], 取 $p = 2, q = 4, s = \alpha = 1$:

$$\|f\|_4^4 \lesssim (\sup_L L^{-1} \|P_L f\|_\infty)^2 \|\nabla f\|_2^2. \quad (3.1)$$

下面的递推式将在不假定有限质量的前提下, 证明右端 Besov 半范数的有限性。

引理 3.1. 设 u 是式 (1.1) 的前向整体几乎周期解, 且

$$N(t) \geq 1, \quad \sup_t \|\nabla u(t)\|_2 \leq B < \infty.$$

则

$$A_* := \sup_L L^{-1} \|P_L u\|_{L_{t,x}^\infty} < \infty, \quad U := \sup_t \|u(t)\|_4 < \infty, \quad \sup_t \|F(u(t))\|_1 < \infty. \quad (3.2)$$

证明. Bernstein 不等式给出下面 a_L 的初始界。给定充分小的 $\eta > 0$, 由低频紧性可取到 $L_0 > 0$, 使得

$$a_L := L^{-1} \|P_L u\|_{L_{t,x}^\infty} \lesssim B L^{-\frac{1}{2}}, \quad v = P_{\leq L_0} u, \quad \|\nabla v\|_{L^\infty L^2} \leq \eta.$$

由于 $\|u - v\|_{L^\infty L^2} \lesssim L_0^{-1} B$ 且 $\|u - v\|_{L^\infty L^6} \lesssim B$, 插值与 Hölder 不等式给出

$$\|u - v\|_{L^\infty L^3} \leq C_{L_0, B}, \quad \|F(u) - F(v)\|_{L^\infty L^1} \lesssim \|u - v\|_{L^\infty L^3} (\|u\|_{L^\infty L^6} + \|v\|_{L^\infty L^6})^4 \leq C_{L_0, B}. \quad (3.3)$$

在固定的输出频率上, 令 $r = P_{\leq \frac{L}{100}} v, z = v - r$ 。 r 与 $F(r)$ 的 Fourier 支撑分别落在 $B(0, \frac{L}{50})$ 与 $B(0, \frac{L}{10})$ 中, 故 $P_L F(r) = 0$ 。此外 $\hat{z}$ 在 $B(0, \frac{L}{100})$ 上为零, 而前面的界给出

$$\|z\|_2 \lesssim L^{-1} \eta, \quad \|z\|_6 + \|r\|_6 \lesssim \eta, \quad \sup_{M \geq cL} a_M \lesssim B L^{-\frac{1}{2}} < \infty.$$

由环状截断核在 L^1 中的一致有界性, z 的 Besov 半范数至多为 $C \sup_{M \geq cL} a_M$ 。于是式 (3.1) 给出

$$\|F(z)\|_1 \leq \|z\|_4^2 \|z\|_6^3 \lesssim \eta^4 \sup_{M \geq cL} a_M.$$

把 $F(v) = (r + z)^3 (\bar{r} + \bar{z})^2$ 展开后, 投影剩下的只有 $F(z)$ 与交叉项。对 $1 \leq k \leq 4$, Hölder 不等式给出

$$\| |z|^k |r|^{5-k} \|_1 \leq \|r\|_\infty \|z\|_2 \|z\|_6^{k-1} \|r\|_6^{4-k} \lesssim \eta^4 \sum_{M \leq CL} \frac{M}{L} a_M.$$

由初始的 Bernstein 界可知此和有限, 因为 $\sum_{M \leq CL} \frac{M}{L} a_M \lesssim B L^{-\frac{1}{2}}$ 。环状传播子满足

$$\int_0^\infty \|e^{-is\Delta} P_L\|_{L^1 \rightarrow L^\infty} ds \lesssim \int_0^\infty \min(L^3, s^{-\frac{3}{2}}) ds \lesssim L.$$

对每个固定的 L , 所有保留下来的源项都属于 $L_t^\infty L_x^1$ 。插入一个稍加放大的环状乘子后, 上面的核界便使它们的 Duhamel 积分在 L_x^∞ 中绝对收敛。它们的分布极限与式 (2.3) 中的弱 $\dot{H}^1$ 极限一致。于是得到

$$a_L \leq C_{L_0, B} + C \eta^4 \left[\sup_{M \geq cL} a_M + \sum_{M \leq CL} \frac{M}{L} a_M \right]. \quad (3.4)$$

我们尚未证明 $\sup_L a_L$ 有限。为闭合式 (3.4), 取定 $\frac{1}{2} < \alpha < 1$, 并引入

$$w_\varepsilon(L) = \min \left\{ 1, \left(\frac{L}{\varepsilon} \right)^\alpha \right\}, \quad A_\varepsilon = \sup_L w_\varepsilon(L) a_L \lesssim B \varepsilon^{-\frac{1}{2}} < \infty.$$

初始 Bernstein 界与权重之比给出

$$\sup_{M \geq cL} \frac{w_\varepsilon(L)}{w_\varepsilon(M)} \lesssim c^1, \quad \sum_{M \leq CL} \frac{M}{L} \frac{w_\varepsilon(L)}{w_\varepsilon(M)} \lesssim_C \sum_{j \geq 0} 2^{-j(1-\alpha)} < \infty,$$

从而

$$A_\varepsilon \leq C_{L_0, B} + C_\alpha \eta^4 A_\varepsilon.$$

选取 η 使 $C_\alpha \eta^4 \leq \frac{1}{2}$, 然后固定 L_0 , 便对一切 ε 一致地有 $A_\varepsilon \leq 2C_{L_0, B}$. 在每个固定的 L 处令 $\varepsilon \rightarrow 0$, 再取上确界, 即证得 $A_* < \infty$. 式 (3.1) 便给出

$$U^4 \lesssim A_*^2 B^2 < \infty, \quad \sup_t \|F(u(t))\|_1 \leq U^2 \sup_t \|u(t)\|_6^3 \leq CU^2 B^3 =: F_*. \quad (3.5)$$

□

3.2 投影与源项比较

现在验证式 (2.4) 中所取定投影的一致性质。对空间强制性估计, h 的归一化 profile 必须同时低于两个阈值; 对源项估计, 我们需要更强的质量界 $\nu M_\nu = o(1)$ 。两者都来自同一条一致的低频尾界。令

$$\omega(c) = 4\pi^2 \sup_t \int_{|\xi| \leq 2c} |\xi|^2 |\hat{u}(t, \xi)|^2 d\xi.$$

则当 $c \rightarrow 0$ 时 $\omega(c) \rightarrow 0$ 。对 $0 < \nu < c$, 乘子界推出

$$\eta_\nu^2 \leq \omega(\nu), \quad d_\nu^2 \leq \omega(c) + \nu^2 c^{-2} B^2.$$

先令 $\nu \rightarrow 0$, 再令 $c \rightarrow 0$, 得

$$\eta_\nu \rightarrow 0, \quad d_\nu \rightarrow 0. \quad (3.6)$$

其中波浪号表示式 (2.2) 中的归一化, 则有

$$\|\tilde{h}(t) - \tilde{u}(t)\|_{\dot{H}^1} = \|h(t) - u(t)\|_{\dot{H}^1} \leq \eta_\nu,$$

$$\|\nabla h\|_2^2 \leq (1 - \gamma)G, \quad |E(h) - E(u)| \lesssim (B + B^5)\eta_\nu \rightarrow 0.$$

因此对充分小的 ν , 两个阈值间隙都一致地保持。由预紧性以及定义 2.1 中的下界, 存在 $R_0, b_0 > 0$ 使得

$$\inf_{v \in \mathcal{K}} \|v\|_{L^4(B(0, R_0))} \geq b_0 > 0, \quad \|\tilde{h} - \tilde{u}\|_{L^4(B(0, R_0))} \lesssim R_0^{\frac{1}{4}} \eta_\nu \leq \frac{b_0}{2}.$$

重新标度与 L^4 乘子界给出

$$c_{\mathcal{K}} N(t)^{-1} \leq a(t) \leq CU^4 =: A_0, \quad K_a(I) \lesssim_u K_N(I). \quad (3.7)$$

为了把源项与 K_a 比较, 我们使用单边 Hardy–Littlewood 极大算子

$$(\mathcal{H}_+ f)(t) = \sup_{s>0} \frac{1}{s} \int_t^{t+s} f(\tau) d\tau, \quad E_f(T) = \int_0^T f(t)^2 dt.$$

它的平均区间可以越过终止时刻。我们在固定 ν 之前选取端点, 以此控制来自更晚时刻的贡献, 而不假定整体的时间可积性。

命题 3.2. 令 $f(t) = \|F(u(t))\|_1$, $F_+ = \mathcal{H}_+ f$ 。存在不依赖于 ν 的递增序列 $T_j \rightarrow \infty$, 使得

$$\|f\|_{L^2(0, T_j)}^2 + \|F_+\|_{L^2(0, T_j)}^2 \leq C_u K_a([0, T_j]), \quad 0 < \nu \leq \nu_0(u). \quad (3.8)$$

证明. 由式 (3.5), $0 < f \leq F_*$ 。我们依次选取 R_j 与 T_j , 使得

$$R_j \geq \max\{j, T_{j-1} + 1\}, \quad T_j \geq R_j, \quad \frac{E_f(T_j)}{T_j} \geq \frac{1}{2} \sup_{s \geq R_j} \frac{E_f(s)}{s} > 0.$$

该上确界是有限的。对 $T = T_j$, 极大算子定理给出

$$\begin{aligned} \int_0^T \sup_{0 < s \leq T} \left(\left(\frac{1}{s} \int_t^{t+s} f \right) \right)^2 dt &\leq \|\mathcal{H}_+(f 1_{[0, 2T]})\|_{L^2(\mathbb{R})}^2 \lesssim E_f(2T) \leq 4E_f(T), \\ \left(\frac{1}{s} \int_t^{t+s} f \right)^2 &\leq \frac{E_f(t+s)}{s} \leq \frac{2(t+s)}{s} \frac{E_f(T)}{T} \leq 4 \frac{E_f(T)}{T} \quad (0 \leq t \leq T < s). \end{aligned}$$

于是

$$\frac{E_f(s)}{s} \leq 2 \frac{E_f(T_j)}{T_j} \quad (s \geq T_j), \quad \|F_+\|_{L^2(0, T_j)}^2 \leq C_{\max} E_f(T_j). \quad (3.9)$$

令

$$k_L(s) = L^{-1} \min\{L^3, s^{-\frac{3}{2}}\}, \quad F_t(s) = \int_0^s f(t + \tau) d\tau.$$

则 $F_t(s) \leq sF_+(t)$, 且 k_L 单调不增、在 $[0, \infty)$ 上的积分为 3。绝对收敛的频率定域化 Duhamel 公式即式 (2.3) 给出

$$L^{-1} \|P_L u(t)\|_\infty \leq C \int_0^\infty k_L(s) f(t+s) ds = -C \int_0^\infty k'_L(s) F_t(s) ds \leq 3CF_+(t).$$

这里 $k_L(s)F_t(s)$ 在两个端点处都趋于 0。因此

$$\sup_L L^{-1} \|P_L u(t)\|_\infty \lesssim F_+(t), \quad (3.10)$$

二进求和便给出

$$\|l(t)\|_\infty \lesssim \nu F_+(t), \quad \|\nabla l(t)\|_\infty \lesssim \nu^2 F_+(t). \quad (3.11)$$

由插值、式 (3.1) 与式 (3.10) 得

$$\begin{aligned} \|h\|_5^5 &\leq \|h\|_4^2 \|h\|_6^3 \lesssim_B a^{\frac{1}{2}}, \quad \|l\|_4^2 \lesssim \eta_\nu F_+(t), \quad \|l\|_6^3 \lesssim \eta_\nu^3, \\ f(t) &\leq C_B a(t)^{\frac{1}{2}} + C\eta_\nu^4 F_+(t). \end{aligned} \quad (3.12)$$

在所选的时刻上,

$$E_f(T_j) \leq 2C_B^2 K_a([0, T_j]) + C\eta_\nu^8 C_{\max} E_f(T_j), \quad E_f(T_j) \leq T_j F_*^2 < \infty.$$

取 ν_0 使得 $\sup_{0 < \nu \leq \nu_0} C\eta_\nu^8 C_{\max} \leq \frac{1}{2}$, 便可吸收最后一项。再由式 (3.9) 即得式 (3.8)。 $\square$

特别地, 当我们把低频因子与作用量配对时, 式 (3.11) 提供了系数 $M_\nu \nu = d_\nu$ 与 $M_\nu^2 \nu^2 = d_\nu^2$ 。式 (5.3)–(5.4) 中的相消恰好把这些因子放进源项估计之中。随后命题 3.2 把剩下的乘积 fF_+ 化为 $K_a(I_j)$ 。

4 强制性相互作用半径

下面转入式 (2.14) 中的前两条不等式。空间估计要控制住 $a(t) = \|h(t)\|_4^4$, 而同一个核又须把半径贡献的负部压得足够小。我们从 $|x|$ 的一个光滑化版本入手, 对这个版本而言方向强制性足以吸收聚焦势; 随后, 它给出的正密度项将决定相互作用半径。

4.1 加权强制性

对于偶的凸核, 相位只贡献非负项。记 $f = |h|$, 并在 $\{f > 0\}$ 上令 $V = \frac{f}{f^2}$, 在其余地方令 $V = 0$, 则

$$\operatorname{Re}(\partial_j \bar{h} \partial_k h) = \partial_j f \partial_k f + f^2 V_j V_k, \quad \|fV\|_2 \leq \|\nabla h\|_2,$$

$$\mathcal{P}_k(h) := 2 \iint \rho(x) \rho(y) (V(x) - V(y))^T D^2 k(x - y) (V(x) - V(y)) dx dy \geq 0,$$

$$\mathcal{B}_k(h) = \mathcal{B}_k(f) + \mathcal{P}_k(h).$$

第一个恒等式几乎处处由 Sobolev 链式法则得到, 最后一个则来自对称化。对于下文用到的这些核, 由平移形式的 Hardy 不等式

$$\sup_x \int |x - y|^{-1} |h(y)|^2 dy \leq 2 \|h\|_2 \|\nabla h\|_2$$

可知一切项都是有限的。

我们把一维 Green 函数按方向取平均, 构造径向核

$$a_R(r) := r - 2R + \frac{2R^2(1 - e^{-\frac{r}{R}})}{r}, \quad a_R(0) = 0. \quad (4.1)$$

直接求导 (原点处按弱意义理解) 即得

$$\begin{aligned} |\nabla a_R| &\leq 1, \quad D^2 a_R \geq 0, \quad |D^2 a_R(x)| \lesssim |x|^{-1}, \quad |D^3 a_R(x)| \lesssim |x|^{-2}, \\ \Delta a_R &= \frac{2(1 - e^{-\frac{r}{R}})}{r}, \quad -\Delta^2 a_R = \frac{2e^{-\frac{r}{R}}}{R^2 r}. \end{aligned} \quad (4.2)$$

原点处并没有额外的 Dirac 质量。特别地,

$$Q_R(h) := Q_{a_R}(h) = \iint \frac{2e^{-\frac{|x-y|}{R}}}{R^2 |x-y|} |h(x)|^2 |h(y)|^2 dx dy = 8\pi \int \frac{|\widehat{h}|^2(\xi)}{1 + 4\pi^2 R^2 |\xi|^2} d\xi, \quad (4.3)$$

其中 Fourier 变换的约定见第 1.4 节。

式 (4.3) 中的乘子在高频率上衰减, 所以仅有 Q_R 的非负性并不能给出 $a = \int |\hat{\rho}|^2$ 的下界。我们要由 ρ 来选取 R , 并把 a_R 改造成一个凸核 $k_{R,A}$, 使得

$$\mathcal{B}_{k_{R,A}}(h) \geq \frac{7}{24} Q_R(h), \quad \kappa R \lesssim A^2 Q_R(h), \quad R \geq La. \quad (4.4)$$

下面的构造先固定 L , 再固定 κ , 最后固定 A . 有了这些选取, 上述不等式就给出 $\mathcal{B}_{\kappa_R, A}(h) \geq_u a_0$. 在引理 4.1 中, 我们先在保留足够多 Q_R 的前提下控制住聚焦势; 至于式 (4.4) 中关于所选半径的那些比较, 则留到命题 4.4 里证明。

引理 4.1 (一致强制性). 设 $\mathcal{K} \subset \dot{H}^1$ 是不含零元的紧集, 并且

$$\sup_{f \in \mathcal{K}} E(f) < E(W), \quad \sup_{f \in \mathcal{K}} \|\nabla f\|_2 < \|\nabla W\|_2.$$

则存在 $\varepsilon_0, R_*, c > 0$, 使得只要 $h \in H^1$ 满足

$$\inf_{v \in \mathcal{K}, y \in \mathbb{R}^3} \|h(\cdot + y) - v\|_{\dot{H}^1} < \varepsilon_0,$$

估计

$$\mathcal{B}_{a_R}(h) \geq \mathcal{B}_{a_R}(|h|) \geq \frac{c}{R} + \frac{7}{12} Q_R(h) \quad (4.5)$$

就对一切 $R \geq R_*$ 成立。这里并不要求 $\|h\|_2$ 有一致界。

保留下来的那部分 Q_R 足以吸收后面对核所作的改造, 并且在下文选定的半径处还能控制住 $a(t)$. 分数 $\frac{7}{12}$ 本身并无特殊意义。

证明. 方向不等式。由平移不变性, 可把 h 中心化到 $\mathcal{K}$ 附近。记 $f = |h|$, 并先固定一个邻域, 在其上

$$E(f) \leq E(h) \leq E(W) - e_0, \quad A(f) \leq A(h) \leq G - a_0, \quad e_0, a_0 > 0.$$

在足够小的邻域内, 方向梯度有一致于方向的正下界。为说明这一点, 假定这样的邻域不存在。于是可选取中心化后的 $h_n \in H^1$ 、 $v_n \in \mathcal{K}$ 与 $\omega_n \in S^2$, 使得

$$\|h_n - v_n\|_{\dot{H}^1} < \frac{1}{n}, \quad \|\partial_{\omega_n} |h_n|\|_2 < \frac{1}{n}.$$

由紧性, 取子列后可设 $h_n \rightarrow h_\infty \in \mathcal{K}$ 于 $\dot{H}^1$ 中, 且 $\omega_n \rightarrow \omega_0$. 于是 $|h_n| \rightarrow |h_\infty|$ 于 L^6 中, 而按构造又有 $\|\partial_{\omega_n} |h_n|\|_2 \rightarrow 0$. 这就推出在分布意义下 $\partial_{\omega_0} |h_\infty| = 0$. 而 $L^6(\mathbb{R}^3)$ 中沿一个方向保持不变的函数必恒为零, 这与 $0 \notin \mathcal{K}$ 矛盾。因此 f 与 ω 一致地有

$$A_\omega := \|\partial_\omega f\|_2^2 \geq a_1 > 0, \quad A_\perp := \|\nabla_\perp f\|_2^2, \quad A = A_\omega + A_\perp.$$

写 $x = s\omega + y$, 其中 $y \in \omega^\perp$. 沿 ω 方向的伸缩保持横向 Dirichlet 积分不变, 并把方向 Dirichlet 积分与势能同时乘以同一个因子。更确切地说, 对 $f_\lambda(s, y) := \lambda^{\frac{1}{2}} f(\lambda s, y)$, 有

$$\|\nabla f_\lambda\|_2^2 = A_\perp + \lambda^2 A_\omega, \quad \|f_\lambda\|_6^6 = \lambda^2 B_6.$$

取 $\lambda^2 = 1 + \frac{G-A}{A_\omega}$ 使得 $\|\nabla f_\lambda\|_2^2 = G$. 于是由最优 Sobolev 不等式得 $\|f_\lambda\|_6^6 \leq G$, 从而 $E(f_\lambda) \geq E(W)$. 再由

$$E(f_\lambda) - E(f) = \frac{1}{2}(\lambda^2 - 1)\left(A_\omega - \frac{B_6}{3}\right),$$

即得

$$A_\omega - \frac{1}{3}B_6 \geq \frac{2(E(W)-E(f))}{G-A} A_\omega \geq \frac{2e_0 a_1}{G} =: \sigma > 0. \quad (4.6)$$

平面边缘分布与 Green 方程。现在把式 (4.6) 转移到相互作用权重上。对每个方向 ω , 用

$$(m, \alpha, \beta)(s) := \int_{\omega^\perp} (f^2, |\partial_\omega f|^2, f^6)(s\omega + y) dy, \quad w_R(s) := \frac{e^{-\frac{|s|}{R}}}{2R}, \quad H := w_R * m,$$

$$J := \int m' H', \quad K := \int m \frac{(H')^2}{H}, \quad L_\omega(f) := \int H \alpha - \frac{1}{3} \int H \beta + \frac{1}{4} J$$

定义平面边缘分布。一维 Green 核给出表示式

$$A_R(s) = \frac{1}{2} \left(|s| - R + R e^{-\frac{|s|}{R}} \right), \quad A_{R''} = w_R, \quad (4.7)$$

$$a_R(x) = \pi^{-1} \int_{S^2} A_R(x \cdot \omega) d\omega, \quad \mathcal{B}_{a_R}(f) = \frac{4}{\pi} \int_{S^2} L_\omega(f) d\omega, \quad Q_R(f) = \pi^{-1} \int_{S^2} J_\omega d\omega.$$

这里 J_ω 的下标记录边缘分布所用的方向。由式 (4.7), 只需在 L_ω 中保留 $H(0)$ 与 J 的正倍数即可。Green 方程给出

$$H - R^2 H'' = m, \quad |H'| \leq \frac{H}{R}, \quad e^{-\frac{|s|}{R}} H(0) \leq H(s) \leq e^{\frac{|s|}{R}} H(0). \quad (4.8)$$

对取值于 $L^2(\omega^\perp)$ 的函数 $s \mapsto f(s\omega + \cdot)$ 的范数使用 Sobolev 链式法则, 再辅以一维 Sobolev 嵌入, 可得

$$\sqrt{m} \in H^1, \quad |m'|^2 \leq 4m\alpha, \quad m \in H^1 \cap L^1 \cap L^\infty.$$

此外 $H \in H^3$ 严格为正, 且在实轴的两端都趋于零。故分部积分给出

$$J = \int (H')^2 + R^2 \int (H'')^2 \geq 0, \quad (4.9)$$

$$K = \int (H')^2 - \frac{R^2}{3} \int \frac{(H')^4}{H^2} \leq J. \quad (4.10)$$

第二个恒等式的推导要用到

$$\int H'' \frac{(H')^2}{H} = \frac{1}{3} \int \frac{(H')^4}{H^2}, \quad \frac{(H')^4}{H^2} \leq R^{-4} H^2,$$

$$|H'' \frac{(H')^2}{H}| \leq R^{-2} |H''| H, \quad |\frac{(H')^3}{H}| \leq R^{-3} H^2 \rightarrow 0.$$

这些恒等式用到了每个 h 的质量有限, 但其中出现的常数并不依赖于该质量的大小。

加权尾部估计。由紧性, 尾部在 $\dot{H}^1$ 意义下、以及在加权 L^2 范数 $\|\frac{v}{|x|}\|_2$ 意义下都可以取得任意小。但这部分尾部的质量未必小, 于是我们使用一个只依赖于其梯度的加权 Sobolev 估计。记 $\mathcal{T}_C(v) := \int_{|x|>C} (|\nabla v|^2 + \frac{|v|^2}{|x|^2})$, 则由紧性、抗磁不等式与 Hardy 不等式得

$$\mathcal{T}_C(f) \lesssim \varepsilon_0^2 + \sup_{v \in \mathcal{K}} \mathcal{T}_C(v), \quad \sup_{v \in \mathcal{K}} \mathcal{T}_C(v) \rightarrow 0.$$

我们依 σ 选取 δ , 缩小 ε_0 , 再取 C_0 使得

$$\int_{|x|>C_0} (|\nabla f|^2 + \frac{f^2}{|x|^2}) dx \leq \delta. \quad (4.11)$$

取截断函数 χ 满足 $0 \leq \chi \leq 1$, 在 $B(0, C_0)$ 上为零、在 $|x| \geq 2C_0$ 上为 1, 且 $\|\nabla \chi\|_\infty \lesssim C_0^{-1}$ 。令 $g := \chi f$, 则 $\|\nabla g\|_2^2 \lesssim \delta$ 。把 m, α, β 的定义中的 f 换成 g , 相应记作 m_g, α_g, β_g , 于是

$$m_k := m - m_g \geq 0, \quad \text{supp } m_k \subset [-2C_0, 2C_0], \quad \int m_k \lesssim C_0^2 A.$$

为了估计加权的势能, 我们更换纵向坐标并对 g 重新缩放。这保持它的横向 Dirichlet 积分不变, 并把 $\int H\beta_g$ 化成不带权的 L^6 积分。具体地, 令

$$\tau(s) := \int_0^s H(\zeta)^{-\frac{1}{2}} d\zeta, \quad v(\tau, y) := H(s)^{\frac{1}{4}} g(s, y), \quad \partial_\tau v = H^{\frac{3}{4}} \partial_s g + \frac{1}{4} H^{-\frac{1}{4}} H' g.$$

由于 H 为正且有界, $s \rightarrow \pm\infty$ 时 $\tau(s) \rightarrow \pm\infty$ 。此外

$$\|v\|_2 = \|g\|_2, \quad X := \|\nabla_y v\|_2^2 = \|\nabla_\perp g\|_2^2 \lesssim \delta, \quad \|v\|_6^6 = \int H\beta_g, \quad (4.12)$$

$$Y := \|\partial_\tau v\|_2^2 = \int H\alpha_g + \frac{1}{4} \int H' m_{g'} + \frac{1}{16} \int m_g \frac{(H')^2}{H} < \infty.$$

这一变量替换是 $\mathbb{R}$ 上的微分同胚, 求导公式在局部的 Sobolev 意义下成立。因为 H 有界且 $|H'| \leq \frac{H}{R}$, 定义 Y 的右端有限。再结合式 (4.12) 的第一行, 便知 $v \in H^1(\mathbb{R}^3)$, 故沿 τ 方向伸缩一次之后即可使用最优 Sobolev 不等式。若 $g = 0$, 所得估计是显然的; 否则 $X, Y > 0$, 优化给出

$$\|v\|_6^6 \leq G^{-2} \inf_{\lambda>0} \lambda^{-2} (X + \lambda^2 Y)^3 = \frac{27}{4G^2} X^2 Y, \quad \lambda^2 = \frac{X}{2Y}.$$

从而

$$\int H\beta_g \leq \eta \left[\int H\alpha_g + \frac{1}{4} \int H' m_{g'} + \frac{1}{16} \int m_g \frac{(H')^2}{H} \right], \quad \eta \lesssim \delta^2. \quad (4.13)$$

由式 (4.8) - (4.10) 可得

$$\int m_g \frac{(H')^2}{H} \leq K \leq J, \quad \int H' m_{g'} = J - R^{-2} \int (m - H) m_k \leq J + R^{-2} \int H m_k. \quad (4.14)$$

记 $Z := \int_{|x|>C_0} H(x \cdot \omega) |\partial_\omega f(x)|^2 dx$ 。截断误差只在 $C_0 < |x| < 2C_0$ 上非零。当 $R \geq 2C_0$ 时

$$\int H\alpha_g \leq 2Z + C e^{\frac{2C_0}{R}} H(0) C_0^{-2} \int_{C_0 < |x| < 2C_0} f^2 \leq 2Z + C\delta H(0),$$

$$R^{-2} \int H m_k \leq C e^{\frac{2C_0}{R}} H(0) \frac{C_0^2 A}{R^2}.$$

代入式 (4.13) - (4.14), 即得

$$\int H\beta_g \leq \eta [2Z + \frac{5}{16} J + CH(0) \left(\delta + \frac{C_0^2 A}{R^2} \right)], \quad (4.15)$$

其中常数 C 与 C_0 无关。

强制性估计的收尾。在核心区域上, 权重与 $H(0)$ 相差一个在 R 增大时趋于 1 的因子。特别地

$$\int H\alpha \geq e^{-\frac{C_0}{R}} H(0) (A_\omega - \delta) + Z, \quad \int H\beta \leq e^{\frac{2C_0}{R}} H(0) B_6 + \int H\beta_g.$$

于是

$$L_\omega(f) \geq H(0) \left[e^{-\frac{C_0}{R}} (A_\omega - \delta) - \frac{1}{3} e^{\frac{2C_0}{R}} B_6 - C\eta \left(\delta + \frac{C_0^2 A}{R^2} \right) \right]$$

$$+ \left(1 - \frac{2\eta}{3} \right) Z + \left(\frac{1}{4} - \frac{5\eta}{48} \right) J.$$

如上取 δ 充分小, 并把 R_* 增大使得

$$\eta \leq 1, \quad C \left[\left(\frac{C_0}{R} \right) A + \delta + \eta \delta + \eta \frac{C_0^2 A}{R^2} \right] \leq \frac{\sigma}{2} \quad (R \geq R_*).$$

则

$$L_\omega(f) \geq \frac{\sigma}{2} H(0) + \frac{1}{3} Z + \frac{7}{48} J. \quad (4.16)$$

最后从下方估计 $H(0)$ 。因为 $\mathcal{K}$ 是紧集且不含零元，存在半径 R_c 使得

$$\inf_{v \in \mathcal{K}} \|v\|_{L^2(B(0, R_c))} > 0.$$

对中心化的 h 与靠近它的 $v \in \mathcal{K}$ ，Sobolev 不等式给出

$$\|f - |v|\|_{L^2(B(0, R_c))} \lesssim R_c \|h - v\|_{\dot{H}^1} \lesssim R_c \varepsilon_0.$$

再次缩小 ε_0 ，并把 R_* 增大到至少为 R_c ，使得

$$\inf_f \int_{|x| \leq R_c} f^2 \geq m_0 > 0, \quad H_\omega(0) \geq e^{-\frac{R_c}{R}} \frac{m_0}{2R} \gtrsim R^{-1}.$$

前面一切选取都只依赖于 $\mathcal{K}$ ：先定下阈值与方向性差距，再定尾部的大小与邻域，最后定 R 的下界。现在由相位恒等式、式 (4.7) 与式 (4.16) 即得

$$\mathcal{B}_{a_R}(h) \geq \mathcal{B}_{a_R}(f) \geq \frac{c}{R} + \frac{7}{12} Q_R(h). \quad (4.17)$$

□

4.2 相互作用半径

由缩放可得

$$\mathcal{B}_{a_R}(N^{\frac{1}{2}} f(N \cdot)) = N^{-1} \mathcal{B}_{a_{NR}}(f), \quad Q_R(N^{\frac{1}{2}} f(N \cdot)) = N^{-1} Q_{NR}(f).$$

因此，引理 4.1 的缩放形式要求 $R \geq R_*/N$ 。下文的修改造出了半径导数所用的可积核，并允许我们通过密度来强加这一比值下界。取定 $A \geq 2$ ，令 $\delta = A^{-1}$ ，并定义

$$\begin{aligned} k_{R,A}(r) &= \frac{a_R(r) - A^{-2} a_{AR}(r)}{1 - A^{-2}} = RK_A\left(\frac{r}{R}\right) \\ &= r - \frac{2R}{1 + A^{-1}} + \frac{2R^2}{(1 - A^{-2})r} (e^{-\frac{r}{AR}} - e^{-\frac{r}{R}}). \end{aligned}$$

其中含 R^2/r 的项相互抵消。于是

$$K_A''(s) = \frac{2}{1 - \delta^2} \int_\delta^1 t^2 e^{-ts} dt > 0, \quad K_A(0) = K_A'(0) = 0, \quad K_A'(\infty) = 1, \quad (4.18)$$

并且对 $A \geq 2$ 一致地有

$$|D^2 k_{R,A}| \geq 0, \quad |\nabla k_{R,A}| \leq 1, \quad |D^2 k_{R,A}(x)| \lesssim |x|^{-1}, \quad |D^3 k_{R,A}(x)| \lesssim |x|^{-2}.$$

原点处的导数按弱导数理解。由式 (4.3) 得

$$\begin{aligned} Q_{k_{R,A}}(h) &= 8\pi \int \frac{1 + 4\pi^2(A^2 + 1)R^2|\xi|^2}{(1 + 4\pi^2 R^2|\xi|^2)(1 + 4\pi^2 A^2 R^2|\xi|^2)} |\hat{\rho}(\xi)|^2 d\xi, \\ Q_R &\leq Q_{k_{R,A}} \leq (1 + A^{-2}) Q_R. \end{aligned} \quad (4.19)$$

对半径的导数，我们使用可积核

$$\psi_A(s) = K_A(s) - sK_A'(s) + \frac{2}{1 + \delta} = \frac{2}{1 - \delta^2} \int_\delta^1 (1 + ts) e^{-ts} dt > 0, \quad (4.20)$$

$$\psi_A(|\cdot|) \in L^1 \cap L^2(\mathbb{R}^3), \quad \partial_R \nabla k_{R,A}(z) = \nabla \left(\psi_A\left(\frac{|z|}{R}\right) \right). \quad (4.21)$$

其卷积乘子为

$$\Psi_A(\zeta) := \int_{\mathbb{R}^3} e^{-2\pi i x \cdot \zeta} \psi_A(|x|) dx = \frac{64\pi}{1 - \delta^2} \int_\delta^1 \frac{t^3}{(t^2 + 4\pi^2 |\zeta|^2)^3} dt, \quad \Psi_A(0) = 32\pi A^2, \quad (4.22)$$

其径向剖面满足

$$\Psi_A(s) > 0, \quad \Psi_A'(s) < 0 (s > 0), \quad |s\Psi_A'(s)| \leq 6\Psi_A(s).$$

对密度 $\rho = |h|^2$ ，定义

$$C(R, \rho) = \iint \rho(x) \rho(y) \psi_A\left(\frac{|x - y|}{R}\right) dx dy.$$

方程 $C(R, \rho) = \kappa R^4$ 与临界缩放相容。对 $h_\lambda(x) = \lambda^{\frac{1}{2}} h(\lambda x)$ ，有

$$C\left(\frac{R}{\lambda}, |h_\lambda|^2\right) = \lambda^{-4} C(R, |h|^2), \quad \|h_\lambda\|_4^4 = \lambda^{-1} \|h\|_4^4.$$

指数 4 还保证了根的非退化性, 从而可以沿连续性方程对半径求导。

引理 4.2. 设 $h \in H^1 \setminus \{0\}$, $a = \|h\|_4^4$, $\kappa > 0$. 则存在唯一的正半径满足

$$C(R, |h|^2) = \kappa R^4, \quad (4.23)$$

且它满足

$$T_R := 4\kappa R^3 - \partial_R C(R, |h|^2) \geq \kappa R^3 > 0. \quad (4.24)$$

在 $\|\nabla h\|_2 \leq B$ 之下, 半径满足

$$c_{A,\kappa,B} a \leq R \leq C_{A,\kappa} a.$$

此外, 任给 $L > 0$, 只要把 κ 取得充分小 (仅依赖 B, L), 就有对一切 $A \geq 2$ 一致地成立 $R \geq La$.

证明. 记 $\rho = |h|^2$, 由 Plancherel 定理得

$$C(R, \rho) = R^3 \int \Psi_A(R\xi) |\hat{\rho}(\xi)|^2 d\xi, \quad \frac{C}{R^4} = R^{-1} \int \Psi_A(R\xi) |\hat{\rho}(\xi)|^2 d\xi.$$

式 (4.22) 蕴含

$$\lim_{R \rightarrow 0} \int \Psi_A(R\xi) |\hat{\rho}(\xi)|^2 d\xi = \Psi_A(0)a > 0, \quad 0 < \frac{C}{R^4} \leq \frac{\Psi_A(0)a}{R}, \quad \partial_R \frac{C}{R^4} < 0,$$

$$\partial_R C \leq \frac{3C}{R}, \quad T_R \geq \kappa R^3, \quad R \leq \frac{\Psi_A(0)a}{\kappa}.$$

这就证明了存在性、唯一性与上界。分数阶积分与 Sobolev 不等式给出

$$2\pi \int |\xi| |\hat{\rho}(\xi)|^2 d\xi = \|\rho\|_{\dot{H}^{\frac{1}{2}}}^2 \lesssim \|\nabla \rho\|_{\frac{2}{3}}^2 \lesssim \|h\|_6^2 \|\nabla h\|_2^2 \leq CB^4, \quad \int_{|\xi| \leq \frac{2CB^4}{a}} |\hat{\rho}(\xi)|^2 d\xi \geq \frac{a}{2}.$$

记 $x := R/a$, 由根的方程得

$$\kappa x \geq \frac{1}{2} \Psi_A(2CB^4 x) > 0. \quad (4.25)$$

故 x 有正的下界。对 $A \geq 2$ 一致地有

$$\Psi_A(s) \geq 64\pi \int_{\frac{1}{2}}^1 \frac{t^3}{(t^2 + 4\pi^2 s^2)^3} dt > 0.$$

取 $\kappa L < \frac{1}{2} \inf_{A \geq 2} \Psi_A(2CB^4 L)$. 于是由式 (4.25) 与单调性即得 $x > L$. □

对 $h = P_{>\nu} u$, 连续性方程中含有质量源项。对半径的隐式方程求导, 便可用该源项给出半径贡献的下界。

引理 4.3. 设 I 为区间。假设 $h \in C(I; H^1)$, $h(t) \neq 0$ 对一切 $t \in I$ 成立, 且 $r \in L_{\text{loc}}^\infty(I; L^1)$. 再设密度 $\rho = |h|^2$ 与动量 $p = \text{Im}(\bar{h} \nabla h)$ 在 $\mathcal{D}'(I \times \mathbb{R}^3)$ 中满足连续性方程

$$\rho_t = -2 \operatorname{div} p + r, \quad (4.26)$$

并记 $R(t)$ 为式 (4.23) 中的根。令

$$\psi_R(x) = \psi_A\left(\frac{|x|}{R}\right), \quad M_\psi = 2 \int p \cdot (\nabla \psi_R * \rho), \quad S = \int r(\psi_R * \rho).$$

则 $R \in W_{\text{loc}}^{1,\infty}(I)$. 取 T_R 如式 (4.24), 则几乎处处有

$$D := R' M_\psi = \frac{2(M_\psi + \frac{S}{2})^2 - \frac{S^2}{2}}{T_R} \geq -\frac{S^2}{2T_R}. \quad (4.27)$$

特别地,

$$D \geq -C_{A,\kappa} \|h\|_4^4 \|r\|_1^2. \quad (4.28)$$

若 $r = 0$, 则 $D \geq 0$.

证明. 在紧子区间 $I_0 \Subset I$ 上, 由唯一性知根 R 连续, 且 $\rho \in C(I_0; L^1 \cap L^2)$. 由于在 I_0 上 $a(t) > 0$, 半径保持在某个紧区间 $[R_-, R_+] \subset (0, \infty)$ 内。为了在固定的 R 处求导, 先在稍大的紧区间上对 ρ, p, r 作时

空磨光。磨光后的场满足连续性方程；利用 ψ_R 的对称性，可对其二次型求导。再借助 ψ_R 与 $\nabla\psi_R$ 的有界性以及紧时间区间上的 L^1 收敛取极限，得到

$$\partial_t C(t, R) = 4 \int p \cdot (\nabla\psi_R * \rho) + 2 \int r(\psi_R * \rho) = 2M_\psi + 2S,$$

$$|\partial_t C(t, R)| \leq 4 \|\nabla\psi_R\|_\infty \|p\|_1 \|\rho\|_1 + 2 \|\psi_R\|_\infty \|r\|_1 \|\rho\|_1 \leq C_{I_0}.$$

上述界对 $(0, \infty)$ 的紧子区间内的 R 一致成立，从而 $C(\cdot, R) \in W^{1,\infty}(I_0)$ 。又因 $C(t, \cdot) \in C^1$ 且 $T_R(t) \geq \kappa R^3 > 0$ ，根的非退化性给出 $R \in W^{1,\infty}(I_0)$ 。隐函数的链式法则给出

$$T_R R' = 2M_\psi + 2S, \quad R' M_\psi = \frac{2M_\psi^2 + 2SM_\psi}{T_R}.$$

由式 (4.21)、式 (4.24) 与 Cauchy-Schwarz 不等式得

$$|S| \leq \|r\|_1 \|\psi_R * \rho\|_\infty \leq \|r\|_1 \|\psi_R\|_2 \|\rho\|_2 \leq C_A R^{\frac{3}{2}} a^{\frac{1}{2}} \|r\|_1, \quad \frac{S^2}{2T_R} \leq C_{A,\kappa} a \|r\|_1^2.$$

配方即证得上述两个结论。 $\square$

对固定的投影，质量源项有如下估计。令 $g = P_{\leq \nu} F(u)$ 。由 $u_t = i\Delta u + iF(u)$ 得

$$r = 2 \operatorname{Im}(F(u)\bar{l} + g\bar{h}). \quad (4.29)$$

由式 (3.2)、式 (3.5) 与 Bernstein 不等式得

$$\|l\|_\infty \lesssim A_* \nu, \quad \|g\|_2 \lesssim \nu^{\frac{3}{2}} F_*, \quad \|r\|_1 \lesssim F_*(A_* \nu + \nu^{\frac{3}{2}} M_\nu) = F_*(A_* \nu + d_\nu \nu^{\frac{1}{2}}).$$

于是

$$D \geq -C_{u,A,\kappa}(\nu^2 + d_\nu^2 \nu) a(t). \quad (4.30)$$

这样，半径项的负部相对于 $a(t)$ 便是小的。下面证明修正后的核仍给出 $a(t)$ 的正倍数。式 (4.5) 中保留的 Q_R 部分有两个作用：它既吸收核的改变，又在所选半径处控制 $a(t)$ 。

命题 4.4. 设 $\mathcal{K}$ 、 ε_0 、 R_* 如引理 4.1。固定 $B, c_{\mathcal{K}} > 0$ 。设 $h \in H^1 \setminus \{0\}$ 、 $N > 0$ 、 $x_0 \in \mathbb{R}^3$ 满足

$$\inf_{v \in \mathcal{K}} \|N^{-\frac{1}{2}} h(x_0 + \frac{\cdot}{N}) - v\|_{\dot{H}^1} < \varepsilon_0, \quad \|\nabla h\|_2 \leq B, \quad a := \|h\|_4^4 \geq \frac{c_{\mathcal{K}}}{N}.$$

则存在 $\kappa > 0$ 与 $A \geq 2$ ——按此先后顺序选取，且对这一族数据一致——使得式 (4.23) 中的半径满足

$$\mathcal{B}_{k_{R,A}}(h) \geq ca + \mathcal{P}_{k_{R,A}}(h), \quad c > 0. \quad (4.31)$$

证明. 取定 $L \geq \frac{R_*}{c_{\mathcal{K}}}$ 。由引理 4.2，可取 κ 与 $A \geq 2$ 无关，使得

$$R \geq La \geq \frac{R_*}{N}.$$

引理 4.1 的缩放形式便给出

$$\mathcal{B}_{a_R}(|h|) \geq \frac{7}{12} Q_R(h). \quad (4.32)$$

令 $b = k_{R,A} - a_R$ 。由于

$$a_R(r) = \frac{r^2}{3R} - \frac{r^3}{12R^2} + O(r^4), \quad D^3 a_R \in L_{\text{loc}}^\infty,$$

在原点处按弱导数理解即可。当 $R = 1$ 时， $b = \frac{A^{-2}(a_1 - a_A)}{1 - A^{-2}}$ ，公共的一次项相互抵消。分别在区域 $0 < r \leq 1$ 、 $1 < r < A$ 与 $r \geq A$ 内求导，得

$$|D^2 b| \lesssim \min\{A^{-2}, A^{-2}r^{-1}, r^{-3}\}, \quad |D^3 b| \lesssim \min\{A^{-2}, A^{-2}r^{-2}, r^{-4}\}.$$

在极坐标下积分并重新缩放，得

$$\|D^2 b\|_2 + \|\Delta b\|_2 \lesssim A^{-\frac{3}{2}} R^{\frac{1}{2}}, \quad \|D^3 b\|_2 + \|\nabla \Delta b\|_2 \lesssim A^{-2} R^{-\frac{1}{2}}. \quad (4.33)$$

对每个 Hessian 分量，在 Fourier 空间中用 Cauchy-Schwarz 不等式得

$$\begin{aligned}\|b_{jk} * \rho\|_\infty &\lesssim \left(\int (1 + 4\pi^2 R^2 |\xi|^2) |\widehat{b_{jk}}(\xi)|^2 d\xi \right)^{\frac{1}{2}} \left(\int \frac{|\hat{\rho}(\xi)|^2}{1 + 4\pi^2 R^2 |\xi|^2} d\xi \right)^{\frac{1}{2}} \\ &\lesssim (\|b_{jk}\|_2 + R \|\nabla b_{jk}\|_2) Q_R(h)^{\frac{1}{2}}.\end{aligned}$$

结合 Δb 的类似估计, 使得

$$\| |D^2 b * \rho| \|_\infty + \|\Delta b * \rho\|_\infty \lesssim A^{-\frac{3}{2}} R^{\frac{1}{2}} Q_R(h)^{\frac{1}{2}}. \quad (4.34)$$

这里矩阵范数在卷积之后取。对 $f = |h|$, 有 $p_f = 0$, 且 $Q_{k_{R,A}} \geq Q_R$, 故

$$\mathcal{B}_{k_{R,A}}(f) \geq \mathcal{B}_{a_R}(f) - C A^{-\frac{3}{2}} R^{\frac{1}{2}} Q_R(h)^{\frac{1}{2}} (B^2 + B^6). \quad (4.35)$$

在根处, 由式 (4.22) 得

$$\Psi_A(s) \lesssim \frac{A^2}{1 + 4\pi^2 s^2}, \quad \kappa R = \int \Psi_A(R\xi) |\hat{\rho}(\xi)|^2 d\xi \lesssim A^2 Q_R(h). \quad (4.36)$$

固定 κ 之后, 现可把 A 取得充分大, 使得

$$\begin{aligned}C A^{-\frac{1}{2}} \kappa^{-\frac{1}{2}} (B^2 + B^6) &\leq \frac{7}{24}, \\ \mathcal{B}_{k_{R,A}}(f) &\geq \frac{7}{24} Q_R(h), \quad Q_R(h) \gtrsim \kappa A^{-2} R \geq \kappa L A^{-2} a.\end{aligned}$$

由相位恒等式即证得式 (4.31)。

□

将引理 4.1 与命题 4.4 应用于式 (2.2) 中轨道的紧致闭包 $\bar{\mathcal{K}}$ 。固定 $\bar{\mathcal{K}}, \varepsilon_0, R_*, B, c_{\mathcal{K}}$ 之后, 依次选取 L 、 κ , 最后选取 A 。于是半径估计与强制性估计中的所有常数都在选取 ν 之前已经固定。由式 (3.6) 与式 (3.7), 对一切充分小的 ν , h 的归一化 profile 均落入所需的邻域。对同一核与同一半径, 成立

$$\mathcal{B}_{k_{R(t),A}}(h(t)) \geq c_u \|h(t)\|_4^4, \quad R'(t) M_\psi(h(t)) \geq -C_u (\nu^2 + d_\nu^2 \nu) \|h(t)\|_4^4.$$

源项估计将决定 ν 需要取多小; 随后在 $T_j \rightarrow \infty$ 时保持 ν 固定。

5 频率定域化的相互作用 Morawetz 估计

我们在此完成命题 2.3 的证明。上一节给出了正的主项与半径贡献的下界。本节利用第 3 节中的那些界来估计剩下的源项, 然后对恒等式积分, 并把带小系数的项吸进四次时空积分之中。

5.1 投影后的五次源项

我们沿用式 (2.12) 中的记号。由于源项估计只用到式 (2.11)、并且不涉及 k 的时间导数, 这些估计对第 4 节中构造出的核与半径同样适用, 其中的常数与二者的时间依赖无关。

命题 5.1。 对所选取的区间 $I_j = [0, T_j]$,

$$\left| \int_{I_j} \text{Err}_{k,\nu} dt \right| \leq C_{u,C_k} \beta_\nu [\nu^{-3} + K_a(I_j)], \quad \beta_\nu = \nu^{\frac{1}{4}} + d_\nu + d_\nu^2 \rightarrow 0. \quad (5.1)$$

这里的常数对一切满足式 (2.11) (常数 C_k 相同) 的可测时间依赖核都是一致的。

证明。 在本证明中, 隐式常数可以依赖于 u 与 C_k , 但与 ν, j 以及具有同一 C_k 的核 k 的选取无关。由 Hardy 不等式、Cauchy-Schwarz 不等式与 Hardy-Littlewood-Sobolev 不等式可得

$$\begin{aligned}\|q\|_\infty &\lesssim M_\nu^2, & \|\text{div } q\|_\infty + \|q_m\|_\infty &\lesssim M_\nu B, \\ \|\nabla q_m\|_{12} &\lesssim UB, \quad \|Dq\|_{12} + \|\text{div } q\|_{12} + \|\nabla \text{div } q\|_{\frac{12}{5}} &\lesssim M_\nu U.\end{aligned} \quad (5.2)$$

其中最后一行来自 Hardy-Littlewood-Sobolev 不等式以及

$$\|h\|_{\frac{4}{3}}^2 \lesssim M_\nu U, \quad \|h \nabla h\|_{\frac{4}{3}} \lesssim UB.$$

把式 (2.12) 中的 $\mathcal{E}$ 分别换成 G_1 与 g , 所得误差项记作 Err_{G_1} 与 Err_g , 于是 $\text{Err}_{k,\nu} = \text{Err}_{G_1} - \text{Err}_g$ 。对 G_1 这一贡献, 关键的相消是

$$\text{Im}(G_1 \bar{h}) = -\text{Im}(F(u) \bar{l}), \quad (5.3)$$

$$\begin{aligned} \int q \cdot \{G_1, h\}_p &= \int \operatorname{div} q \left[\frac{2}{3}(|u|^6 - |h|^6) - \operatorname{Re}(\overline{lF(u)}) \right] \\ &\quad - 2 \int q \cdot \operatorname{Re}(F(u) \nabla \bar{l}). \end{aligned} \quad (5.4)$$

第二个恒等式由分部积分以及下面两式推出：

$$\begin{aligned} \{F(v), v\}_p &= -\frac{2}{3} \nabla |v|^6, \quad \{G_1, h\}_p = \{F(u), u\}_p - \{F(h), h\}_p - \{F(u), l\}_p, \\ \{F(u), l\}_p &= 2 \operatorname{Re}(F(u) \nabla \bar{l}) - \nabla \operatorname{Re}(\overline{lF(u)}). \end{aligned}$$

L^5 乘子界与式 (3.11) 蕴含

$$\begin{aligned} \|F(h)\|_1 &\lesssim f(t), \quad \left\| \frac{2}{3}(|u|^6 - |h|^6) - \operatorname{Re}(\overline{lF(u)}) \right\|_1 \lesssim \|l\|_\infty f(t) \lesssim \nu F_+(t) f(t), \\ |\operatorname{Err}_{G_1}(t)| &\lesssim_{u, C_k} (M_\nu \nu + M_\nu^2 \nu^2) f(t) F_+(t) = (d_\nu + d_\nu^2) f(t) F_+(t). \end{aligned}$$

于是由式 (3.8) 得

$$\left| \int_{I_j} \operatorname{Err}_{G_1} \right| \lesssim_{u, C_k} (d_\nu + d_\nu^2) K_a(I_j).$$

为了估计 $g = P_{\leq \nu} F(u)$ ，我们把高频因子 h 写成一个散度，从而让导数得以落到 g 与相互作用权重上。令 $Z = \nabla \Delta^{-1} h$ ，则 $\operatorname{div} Z = h$ ；再记 $X = \nu^{-3} + K_a(I_j)$ 。所需的界来自文献 [23, 定理 4.1、式 (4.5) 与注记 4.3] 中的长时间估计。该估计的证明只使用 Strichartz 估计与紧性论证、不使用 Morawetz 恒等式，并且对聚焦符号同样成立：

$$\|\nabla P_{\leq L} u\|_{L_t^2 L_x^6(I)} \lesssim_u 1 + L^{\frac{3}{2}} K_N(I)^{\frac{1}{2}}, \quad I \in I_{\max}. \quad (5.5)$$

利用平方函数求和即得 $P_{\leq L} u$ 的这一估计。对任意紧区间 I ，至多两个不完整的特征区间要单独拿出来，按局部理论每个只贡献 $O_u(1)$ 。这样式 (5.5) 对 I_j 成立，再由式 (3.7) 得

$$\begin{aligned} \|Z\|_{L_t^2 L_x^6(I_j)} &\lesssim_u \sum_{L \gtrsim \nu} L^{-2} \left(1 + L^{\frac{3}{2}} K_N(I_j)^{\frac{1}{2}} \right) \\ &\lesssim_u \nu^{-2} + \nu^{-\frac{1}{2}} K_N(I_j)^{\frac{1}{2}} \lesssim_u \nu^{-\frac{1}{2}} X^{\frac{1}{2}}. \end{aligned} \quad (5.6)$$

Bernstein 不等式给出界

$$\|D^m g\|_{L_t^2 L_x^p(I_j)} \lesssim \nu^{m+3(1-\frac{1}{p})} \|f\|_{L^2(I_j)}, \quad m = 0, 1, 2, \quad 1 \leq p \leq \infty. \quad (5.7)$$

利用 $h = \operatorname{div} Z$ 作分部积分，得到

$$\begin{aligned} \int q_m \{g, h\}_m &= -\operatorname{Im} \int \overline{Z_k} [g \partial_k q_m + q_m \partial_k g], \\ \int q \cdot \{g, h\}_p &= -\operatorname{Re} \int \bar{h} [(\operatorname{div} q)g + 2q_j \partial_j g] \\ &= \operatorname{Re} \int \overline{Z_k} [(\partial_k \operatorname{div} q)g + (\operatorname{div} q) \partial_k g + 2(\partial_k q_j) \partial_j g + 2q_j \partial_k \partial_j g]. \end{aligned}$$

这些分部积分的合法性由密度论证保证。前面得到的界把 $q_m g$ 与 $(\operatorname{div} q)g + 2q \cdot \nabla g$ 放进 $L_t^2 W_{x(I_j)}^{1, \frac{6}{5}}$ ，因此可以把它们与 $h = \operatorname{div} Z$ 配对，其中 $Z \in L_t^2 L_x^6(I_j)$ 。例如，由式 (5.2)、(5.6) 与 (5.7) 可得

$$\begin{aligned} \int_{I_j} \int |Z g \nabla q_m| \, dx \, dt &\leq \|Z\|_{L_t^2 L_x^6(I_j)} \|g\|_{L_t^2 L_x^{\frac{4}{3}}(I_j)} \|\nabla q_m\|_{L_t^\infty L_x^{12}(I_j)} \\ &\lesssim_{u, C_k} \nu^{\frac{1}{4}} \|f\|_{L^2(I_j)} X^{\frac{1}{2}}. \end{aligned}$$

记 $Y = \|f\|_{L^2(I_j)} X^{\frac{1}{2}}$ ，其余各项可类似估计：

$$\begin{aligned}
\int_{I_j} \int |Z \nabla g q_m| &\lesssim_{u, C_k} \nu^{-\frac{1}{2}} \nu^{\frac{3}{2}} M_\nu Y = d_\nu Y, \\
\int_{I_j} \int |Z g \nabla \operatorname{div} q| &\lesssim_{u, C_k} \nu^{-\frac{1}{2}} \nu^{\frac{7}{4}} M_\nu Y = d_\nu \nu^{\frac{1}{4}} Y, \\
\int_{I_j} \int |Z \nabla g| (|\operatorname{div} q| + |Dq|) &\lesssim_{u, C_k} \nu^{-\frac{1}{2}} \nu^{\frac{7}{4}} M_\nu Y = d_\nu \nu^{\frac{1}{4}} Y, \\
\int_{I_j} \int |Z D^2 g q| &\lesssim_{u, C_k} \nu^{-\frac{1}{2}} \nu^{\frac{5}{2}} M_\nu^2 Y = d_\nu^2 Y.
\end{aligned}$$

由于 $\nu \leq 1$, 且式 (3.8) 给出

$$Y \lesssim_u K_a(I_j)^{\frac{1}{2}} X^{\frac{1}{2}} \leq C_u X,$$

这些界与 G_1 的估计就证明了式 (5.1)。

□

5.2 Morawetz 估计的证明

命题 2.3 的证明。 我们首先在 h 所具有的正则性下论证式 (2.13) 的合理性。取 $\nu > 0$ 充分小, 使得式 (3.7) 与命题 4.4 均可用, 并设 $I \subset [0, \infty)$ 是一个紧区间。特别地, 在 I 上有 $a(t) \geq \frac{c_\kappa}{N(t)} > 0$, 故半径在整个 I 上都有定义。在所有逼近中都使用由原始密度确定的半径, 并且在运用强制性估计与源项估计之前先取极限。由局部理论,

$$\begin{aligned}
h &\in C(I; H^1) \cap L^2(I; W^{1,6}), \quad \mathcal{F} := P_{>\nu} F(u) \in L^2(I; W^{1, \frac{6}{5}}), \\
\|\nabla F(u)\|_{L^2 L^{\frac{6}{5}}} &\leq 5 \|u\|_{L^\infty L^6}^4 \|\nabla u\|_{L^2 L^6}, \quad \|\mathcal{F}\|_{L^2 L^{\frac{6}{5}}} \lesssim \nu^{-1} \|\nabla F(u)\|_{L^2 L^{\frac{6}{5}}}.
\end{aligned}$$

对空间逼近恒等元 J_ε , 令

$$\begin{aligned}
h_\varepsilon &= J_\varepsilon h, \quad \mathcal{F}_\varepsilon = J_\varepsilon \mathcal{F}, \quad \mathcal{E}_\varepsilon = \mathcal{F}_\varepsilon - F(h_\varepsilon), \\
(i\partial_t + \Delta)h_\varepsilon &= -F(h_\varepsilon) - \mathcal{E}_\varepsilon.
\end{aligned}$$

五次型的乘积法则给出

$$\begin{aligned}
h_\varepsilon &\rightarrow h \quad \text{于 } C(I; H^1) \cap L^2(I; W^{1,6}), \\
\|F(h_\varepsilon) - F(h)\|_{L^2 W^{1, \frac{6}{5}}} &\leq C_I (\|h_\varepsilon - h\|_{L^2 W^{1,6}} + \|h_\varepsilon - h\|_{L^\infty H^1}) \rightarrow 0, \\
\mathcal{E}_\varepsilon &\rightarrow \mathcal{E} \quad \text{于 } L^2(I; W^{1, \frac{6}{5}}), \quad \rho_\varepsilon \rightarrow \rho \quad \text{于 } C(I; L^1 \cap L^2), \quad p_\varepsilon \rightarrow p \quad \text{于 } C(I; L^1).
\end{aligned}$$

这同一个半径满足 $R \in W^{1,\infty}(I)$ 且 $R(t) \in [R_-, R_+] \subset (0, \infty)$ 。此外

$$\|q_\varepsilon - q\|_{L_{t,x}^\infty} \lesssim \|\rho_\varepsilon - \rho\|_{L^\infty L^1} \rightarrow 0, \quad \|q_{m,\varepsilon} - q_m\|_{L_{t,x}^\infty} \lesssim \|p_\varepsilon - p\|_{L^\infty L^1} \rightarrow 0.$$

于是 Hölder 不等式给出

$$\operatorname{Err}_{k,\nu}^\varepsilon \rightarrow \operatorname{Err}_{k,\nu} \quad \text{于 } L^1(I).$$

在这一半径区间上有

$$\sup_t (\|D^2 k_{R(t),A}\|_\infty + \|\partial_R k_{R(t),A}\|_\infty) < \infty,$$

因而梯度项、流项、势项与半径项都收敛。对密度项, 由式 (4.19) 得

$$|Q_{k(t)}(h_\varepsilon) - Q_{k(t)}(h)| \lesssim_A (\|\rho_\varepsilon\|_2 + \|\rho\|_2) \|\rho_\varepsilon - \rho\|_2 \rightarrow 0$$

且对 $t \in I$ 一致成立。因此

$$\begin{aligned}
\mathcal{B}_{k(t)}(h_\varepsilon) &\rightarrow \mathcal{B}_{k(t)}(h), \quad R' M_{\psi(h_\varepsilon)} \rightarrow R' M_{\psi(h)} \quad \text{于 } L^1(I), \\
M_{k(t)}(h(t)) - M_{k(s)}(h(s)) &= \int_s^t [\mathcal{B}_{k(\tau)}(h) + \operatorname{Err}_{k(\tau),\nu} + R' M_{\psi(h)}] d\tau.
\end{aligned}$$

空间截断与核的光滑化保证了这些分部积分的合法性。利用上面列出的界把两种正则化同时去掉, 我们就对原始的 h 及其半径 $R(t)$ 在 $[0, \infty)$ 的每个紧区间上得到积分形式的恒等式。

现在我们在命题 3.2 所选的区间 $I_j = [0, T_j]$ 上积分。参数 L, κ, A 已在第 4 节中固定, 与 ν 和 j 无关。把命题 4.4、式 (4.30) 与端点界

$$|M_{k_{R(t),A}}(h(t))| \leq 2 \|h(t)\|_2^3 \|\nabla h(t)\|_2 \lesssim_u \nu^{-3} \quad (5.8)$$

同命题 5.1 合起来, 就得到

$$\begin{aligned} c_u K_a(I_j) &\leq \left[M_{k_{R(t),A}}(h(t)) \right]_{t=0}^{T_j} - \int_{I_j} \text{Err}_{k_{R(t),A},\nu} dt - \int_{I_j} D(t) dt \\ &\leq C_u \nu^{-3} + C_u \beta_\nu [\nu^{-3} + K_a(I_j)] + C_u (\nu^2 + d_\nu^2 \nu) K_a(I_j), \quad \beta_\nu = \nu^{\frac{1}{4}} + d_\nu + d_\nu^2. \end{aligned} \quad (5.9)$$

这样, 把 ν^{-3} 前的常数取得更大一些之后, 式 (2.6) 便以 $\varepsilon_u(\nu) = C'_u(\beta_\nu + \nu^2 + d_\nu^2 \nu) \rightarrow 0$ 成立。取 $\nu_0 > 0$ 使得当 $0 < \nu \leq \nu_0$ 时 $\varepsilon_u(\nu) \leq \frac{1}{2}$ 。对每个如此固定的 ν , 吸收与单调收敛就给出所需的时空估计

$$\int_0^\infty \int_{\mathbb{R}^3} |P_{>\nu} u(t, x)|^4 dx dt = \lim_{j \rightarrow \infty} K_a([0, T_j]) \leq 2C_u \nu^{-3}.$$

这就证明了式 (2.7)。

□

至此时空估计已经可用。最后我们证明刚性引理, 并应用有限区间上的强迫比较。

引理 2.4 的证明。 记 $f(t) = \|F(u(t))\|_1$ 。对固定的 $n > 0$, 由对偶端点 Strichartz 估计 [28] 与 Bernstein 不等式得

$$V_{t,T}^n := \int_t^T e^{i(t-s)\Delta} P_{\leq n} F(u(s)) ds, \quad \|V_{t,T}^n\|_2 \lesssim n^{\frac{1}{2}} \|f\|_{L^2(t,T)}. \quad (5.10)$$

由于 $f \in L^2(0, \infty)$, 当 $T \rightarrow \infty$ 时这些积分在 L_x^2 中构成 Cauchy 列:

$$\|V_{t,T'}^n - V_{t,T}^n\|_2 \lesssim n^{\frac{1}{2}} \|f\|_{L^2(T,T')} \rightarrow 0.$$

它们的 Fourier 支撑都落在 $B(0, 2n)$ 之中, 所以它们收敛到一个极限 V_t^n , 且在 L^2 与 $\dot{H}^1$ 中同时收敛。无损耗公式 (2.3) 把这个极限识别出来: $P_{\leq n} u(t) = -iV_t^n$ 。把它与 $\|P_{>n} u(t)\|_2 \lesssim n^{-1} \|\nabla u(t)\|_2 \leq \frac{B}{n}$ 以及 $u = P_{\leq n} u + P_{>n} u$ 合起来, 就证明了式 (2.8)。先取 $n = 1$ 即得有限质量:

$$\sup_{t \geq 0} \|u(t)\|_2 \leq C \|f\|_{L^2(0,\infty)} + CB < \infty.$$

现在由局部 H^1 理论与 $\dot{H}^1$ 中的唯一性可知, 这个解守恒质量。记 $m = \|u(t)\|_2$ 。对每个固定的 $n > 0$, 在式 (2.8) 中令 $t \rightarrow \infty$ 得 $m \leq \frac{CB}{n}$ 。由于 n 是任取的, 令 $n \rightarrow \infty$ 即得 $m = 0$ 。

□

定理 1.1 的证明。 假设定理不成立。我们取命题 2.2 中得到的非零临界元 u , 并按命题 2.3 固定 ν 。命题 3.2 中的有限区间比较与式 (2.7) 蕴含

$$\int_0^\infty \|F(u(t))\|_1^2 dt \lesssim_u \int_0^\infty \int_{\mathbb{R}^3} |P_{>\nu} u(t, x)|^4 dx dt \lesssim_u \nu^{-3} < \infty. \quad (5.11)$$

引理 2.4 给出 $u = 0$, 矛盾。于是, 归约论证与标准的散射判据 [2, 第 2 节] 一起即得: 对每个满足式 (1.3) 的初值, 解整体存在、唯一, 并在两个时间方向上散射。

□

致谢

Z. Zhao 得到国家重点研发计划 (资助号 2025YFA1018500)、国家自然科学基金 (资助号 12426205 与 12271032) 以及北京市自然科学基金 (资助号 1262019) 的资助; 此外还得到北京理工大学青年学者研究基金项目的支持。

数据可用性。 本文未生成或使用任何数据集。

竞争利益。 作者声明不存在竞争利益。

AI 使用说明。 在准备手稿的过程中, 作者使用 ChatGPT (OpenAI) 进行语言润色、LaTeX 排版、文献核查与一致性核查。作者对所有内容作了严格的审读与修改, 并对全文负责。

参考文献

- [1] T. Cazenave and F. B. Weissler, “The Cauchy problem for the critical nonlinear Schrödinger equation in H^s ,” *Nonlinear Anal.*, vol. 14, no. 10, pp. 807–836, 1990, doi: 10.1016/0362-546X(90)90023-A.
- [2] C. E. Kenig and F. Merle, “Global well-posedness, scattering and blow-up for the energy-critical, focusing, non-linear Schrödinger equation in the radial case,” *Invent. Math.*, vol. 166, no. 3, pp. 645–675, 2006, doi: 10.1007/s00222-006-0011-4.

- [3] T. Tao, *Nonlinear Dispersive Equations: Local and Global Analysis*. in CBMS Regional Conference Series in Mathematics, vol. 106. Providence, RI: American Mathematical Society, 2006.
- [4] J. Bourgain, “Global wellposedness of defocusing critical nonlinear Schrödinger equation in the radial case,” *J. Amer. Math. Soc.*, vol. 12, no. 1, pp. 145–171, 1999, doi: 10.1090/S0894-0347-99-00283-0.
- [5] T. Tao, “Global well-posedness and scattering for the higher-dimensional energy-critical nonlinear Schrödinger equation for radial data,” *New York J. Math.*, vol. 11, pp. 57–80, 2005, [Online]. Available: <https://nyjm.albany.edu/j/2005/11-4.html>
- [6] M. Grillakis, “On nonlinear Schrödinger equations,” *Comm. Partial Differential Equations*, vol. 25, no. 9–10, pp. 1827–1844, 2000, doi: 10.1080/03605300008821569.
- [7] J. Colliander, M. Keel, G. Staffilani, H. Takaoka, and T. Tao, “Global well-posedness and scattering for the energy-critical nonlinear Schrödinger equation in $\mathbb{R}^3$,” *Ann. of Math. (2)*, vol. 167, no. 3, pp. 767–865, 2008, doi: 10.4007/annals.2008.167.767.
- [8] E. Ryckman and M. Visan, “Global well-posedness and scattering for the defocusing energy-critical nonlinear Schrödinger equation in $\mathbb{R}^{1+4}$,” *Amer. J. Math.*, vol. 129, pp. 1–60, 2007, [Online]. Available: <https://arxiv.org/abs/math/0501462>
- [9] M. Visan, “The defocusing energy-critical nonlinear Schrödinger equation in higher dimensions,” *Duke Math. J.*, vol. 138, pp. 281–374, 2007, [Online]. Available: <https://arxiv.org/abs/math/0508298>
- [10] M. Grillakis, “Regularity and asymptotic behavior of the wave equation with a critical nonlinearity,” *Ann. of Math. (2)*, vol. 132, pp. 485–509, 1990.
- [11] J. Shatah and M. Struwe, “Well-posedness in the energy space for semilinear wave equations with critical growth,” *Int. Math. Res. Not.*, vol. 1994, pp. 303–309, 1994.
- [12] H. Bahouri and J. Shatah, “Decay estimates for the critical semilinear wave equation,” *Ann. Inst. H. Poincaré C Anal. Non Linéaire*, vol. 15, pp. 783–789, 1998.
- [13] T. Aubin, “Problèmes isopérimétriques et espaces de Sobolev,” *J. Differential Geom.*, vol. 11, no. 4, pp. 573–598, 1976.
- [14] G. Talenti, “Best constant in Sobolev inequality,” *Ann. Mat. Pura Appl. (4)*, vol. 110, pp. 353–372, 1976, doi: 10.1007/BF02418013.
- [15] R. Killip and M. Visan, “The focusing energy-critical nonlinear Schrödinger equation in dimensions five and higher,” *Amer. J. Math.*, vol. 132, no. 2, pp. 361–424, 2010, [Online]. Available: <https://arxiv.org/abs/0804.1018>
- [16] Q. Su and Z. Zhao, “Global well-posedness and scattering for the three-dimensional defocusing cubic Schrödinger equation in H^s , $s > 1/2$,” *arXiv:2609.24830*, 2026.
- [17] T. Duyckaerts and F. Merle, “Dynamic of threshold solutions for energy-critical NLS,” *Geom. Funct. Anal.*, vol. 18, no. 6, pp. 1787–1840, 2009, doi: 10.1007/s00039-009-0707-x.
- [18] S. Keraani, “On the defect of compactness for the Strichartz estimates of the Schrödinger equations,” *J. Differential Equations*, vol. 175, no. 2, pp. 353–392, 2001, doi: 10.1006/jdeq.2000.3951.
- [19] C. E. Kenig and F. Merle, “Global well-posedness, scattering and blow-up for the energy-critical focusing non-linear wave equation,” *Acta Math.*, vol. 201, pp. 147–212, 2008, [Online]. Available: <https://arxiv.org/abs/math/0610801>
- [20] B. Dodson, “Global well-posedness and scattering for the focusing, cubic Schrödinger equation in dimension $d = 4$,” *Ann. Sci. Éc. Norm. Supér. (4)*, vol. 52, no. 1, pp. 139–180, 2019, doi: 10.24033/asens.2385.
- [21] P. Han, “Global well-posedness and scattering for the focusing nonlinear Schrödinger equation in the nonradial case,” *Opuscula Math.*, vol. 32, no. 3, pp. 487–504, 2012, doi: 10.7494/OpMath.2012.32.3.487.
- [22] P.-H. Chung and D. Han, “Finite-mass soliton-type rigidity and four-channel reduction for the three-dimensional nonradial focusing energy-critical nonlinear Schrödinger equation,” *arXiv:2607.25735*, 2026.
- [23] R. Killip and M. Visan, “Global well-posedness and scattering for the defocusing quintic NLS in three dimensions,” *Anal. PDE*, vol. 5, no. 4, pp. 855–885, 2012, [Online]. Available: <https://arxiv.org/abs/1102.1192>
- [24] Y. Meyer, P. Gérard, and F. Oru, “Inégalités de Sobolev précisées,” in *Séminaire Équations aux dérivées partielles (1996–1997), Exp. IV*, 1997, pp. 1–8. [Online]. Available: https://www.numdam.org/item/SEDP_1996-1997____A4_0/
- [25] F. Planchon and L. Vega, “Bilinear virial identities and applications,” *Ann. Sci. Éc. Norm. Supér. (4)*, vol. 42, no. 2, pp. 261–290, 2009, doi: 10.24033/asens.2096.
- [26] B. Dodson and J. Murphy, “A new proof of scattering below the ground state for the non-radial focusing NLS,” *Math. Res. Lett.*, vol. 25, no. 6, pp. 1805–1825, 2018, [Online]. Available: <https://arxiv.org/abs/1712.09962>
- [27] B. Dodson, “Global well-posedness and scattering for the defocusing, L^2 -critical nonlinear Schrödinger equation when $d \geq 3$,” *J. Amer. Math. Soc.*, vol. 25, no. 2, pp. 429–463, 2012, doi: 10.1090/S0894-0347-2011-00727-3.
- [28] M. Keel and T. Tao, “Endpoint Strichartz estimates,” *Amer. J. Math.*, vol. 120, no. 5, pp. 955–980, 1998, doi: 10.1353/ajm.1998.0039.