

投影非晶拓扑绝缘体

Projected Amorphous Topological Insulators

Archisman Panigrahi Bitan Roy

麻省理工学院物理系, 美国马萨诸塞州剑桥 02139
利哈伊大学物理系, 美国宾夕法尼亚州伯利恒 18015
2026 年 9 月

摘要

我们提出投影非晶拓扑绝缘体 (PATI)。它只保留母晶体中随机选出、彼此断开的部分位点, 位点占比 x ; 只要用积分掉原晶格剩余位点的方式构造其有效哈密顿量, 系统便带有量子化的全局拓扑不变量, 即强 PATI。在母模型的拓扑区间内另有一个临界 x : 低于它时系统呈脆弱 PATI, 仅很少一部分位点支持量子化的局域拓扑标记。强与脆弱 PATI 都能在边界附近容纳能隙内模式。而在晶格模型的整个平凡参数区间内, 任意 x 下系统都是普通绝缘体 (NI): 不存在无隙边界模式, 全局拓扑不变量与局域拓扑标记皆为零。我们从破时间反演对称绝缘体的正方形母晶格模型出发, 展示了这些大概普适的结论; 强到脆弱 PATI 的量子相变可由 x 调控, 由平均关联长度指数 $\nu \in (1.00, 1.46)$ 来刻画。

引言。 绝缘体大致可分为两大类: 拓扑绝缘体与平凡的普通绝缘体 [1], [2], [3], [4], [5], [6], [7]。前一类中, 电子的 Bloch 能带在布里渊区的高对称点附近发生能带反转, 表现为量子化的拓扑不变量, 并带来稳健的无隙边界模式——此即常说的体-边对应。所需能带反转既可发生在布里渊区中心的 Γ 点, 也可发生在区内的有限动量点, 后者是否存在关键取决于晶体的离散平移与旋转对称性 [8], [9], [10], [11], [12], [13]。这两族拓扑绝缘体因而分别名为平移惰性与平移活跃。因此, 在毫无晶体有序时——例如位点随机分布的非晶晶格——能否实现拓扑绝缘体, 于基础于应用 (如低功耗逻辑器件) 都极为重要。

迄今为止, 非晶晶格上的研究找到的都只是平移惰性拓扑绝缘体的踪迹 [14], [15], [16], [17], [18], [19], [20], [21], [22], [23], [24], [25], 这略显单一, 却也在意料之中。本文以投影非晶拓扑绝缘体 (PATI) 绕开这一限制, 并在二维给出实例; 其构造原理本身普适, 对任意维度、任意对称性类与任意母晶体都应成立。




图 1 (a) 二维非晶晶格 (右) 的构造示意: 从母正方形晶格 (左) 随机选出占比很小的一部分位点 (红色)。(b) Qi-Wu-Zhang 模型的相图, 平移惰性的 Γ 相与平移活跃的 M 相皆为拓扑相, 各由取值不同的量子化陈数 (C) 或 Bott 指标 (B) 刻画; 普通绝缘体则 $C = B = 0$ 。

关键结果。 要构造投影非晶拓扑绝缘体 (PATI), 我们从母晶体中随机挑选出一小部分位点, 占比记为 x , 见图 1(a)。为展示投影方法的威力, 挑选位点时要求母晶格上紧束缚哈密顿量的有限程跃迁振幅不耦合这些位点。这样一来, 所得非晶晶格的每个位点在裸层次上只承载位点局域的原子轨道, 不带任何拓扑。接着, 按路径积分方法 [26], 我们把母晶体中其余位点积分掉 (即投影掉); 重整化后的哈密顿量通过长程跃迁把非晶晶格的所有位点耦合起来, 囊括母模型的全部拓扑相。非晶晶格就这样在母晶体的一个子系统内涌现——这样构造出的对象, 我们称为投影非晶膜 (PAB)。




图2 (a) Qi-Wu-Zhang 模型在 PAB 上的全局相图。除位形平均 BI $\langle \mathcal{B} \rangle = \pm 1$ 的强 PATI 外，在拓扑区间 ($|m_0/t_0| < 2$) 内、 x 较小时，系统还容纳脆弱 PATI：此时 $\langle \mathcal{B} \rangle = 0$ ，却有一小部分位点显示近乎量子化的 LCM $\approx \mathcal{B}$ (图 3)。白色区域为 PANI，其 $\langle \mathcal{B} \rangle$ 与 LCM 皆消失。数值计算一直做到 $x = 0.01$ ，圈出的点即参与计算的位形，粗黑曲线对这些点作外推。水平虚线 $x = 0$ 是奇异极限——此时 PAB 变为“空”。(b) 在晶格常数为 a 的正方形晶格上，非晶膜内的平均位点间距 ξ/a 对半谱隙 Δ/t_0 的依赖。红色实线 (黑色虚线) 画出 $\xi = \frac{a}{\sqrt{x}}$ ($\xi = \frac{a}{\sqrt{x-0.25}}$)；当 $-2 < \frac{m_0}{t_0} < -1$ ($-1 < \frac{m_0}{t_0} < 0$) 时， $\Delta = |2t_0 + m_0|$ ($\Delta = |m_0|$)。取 $t = t_0 = 1$ 。

从母正方形晶格上破时间反演对称绝缘体的紧束缚哈密顿量 [27] 出发，我们在其几何后裔——二维 PAB 上展示以下普遍结论。在母模型的整个拓扑参数区间 [图 1(b)] 内，总存在一个临界位点占比 $x = x_c$ ，高于它便找到平移活跃与平移惰性的强 PATI。该相的特征是量子化的全局拓扑不变量——Bott 指标 (BI)——以及局域拓扑标记——局域陈标记 (LCM)，后者出现在其中很大一部分位点上。仍在同一参数区间内，当 $x < x_c$ 时，我们在 PAB 上识别出一个奇特的绝缘相：其全局拓扑不变量为零，但仍有一小部分位点呈现近乎量子化的局域拓扑标记。我们称这一相为脆弱 PATI，见图 2(a)。在 $x = x_c$ 处，平均位点间距 ξ 与母模型的能带隙 Δ 之间呈现普适标度关系 [图 2(b)]。强 PATI 与脆弱 PATI 在开放边界条件 (OBC) 下都展现边界局域的能隙内模式。我们还在母模型的整个平庸参数区间内、对任意 x 找到投影非晶普通绝缘体 (PANI)：PANI 的全局与局域拓扑不变量均为零，也没有任何边界局域的能隙内模式，见图 3。在 $x = x_c$ 处的强-脆弱 PATI 量子相变 (QPT) 上，位形平均的全局拓扑不变量服从单参数标度。相应关联长度指数 ν 的平均值落在 $\nu \in (1.00, 1.46)$ 内；由于该 QPT 由 x 结构性地调节， ν 可能依赖维度，而不依赖对称性类。见图 4 与表 1。

投影膜方法。由于投影法是本文的核心，我们对其作详细讨论 [26]。把母晶体紧束缚哈密顿量 (含跃迁项与在位项) 中仅在构成非晶晶格的位点之间起作用的一块记为 H_{11} (图 1(a) 中的红色位点)，把仅在该膜之外的位点之间起作用的一块记为 H_{22} (图 1(a) 中的黑色位点)；连接这两组位点的跃迁哈密顿量矩阵元记为 H_{12} 与 H_{21} ($\equiv H_{12}^\dagger$)。为了把非晶膜之外的位点积分掉，我们用 Grassmann 变量写出虚时间 (τ) 配分函数 ($\mathcal{Z}$)： Ψ_1 与 $\bar{\Psi}_1$ 作用在非晶晶格的位点上， Ψ_2 与 $\bar{\Psi}_2$ 作用在母晶体的其余位点上，

$$\mathcal{Z} = \int \mathcal{D}\Psi_1 \mathcal{D}\Psi_2 \mathcal{D}\bar{\Psi}_1 \mathcal{D}\bar{\Psi}_2 \exp -S[\Psi_1, \Psi_2, \bar{\Psi}_1, \bar{\Psi}_2] \quad (1)$$

其中作用量 $S[\Psi_1, \Psi_2, \bar{\Psi}_1, \bar{\Psi}_2] \equiv S$ 为

$$S = \int_0^\beta d\tau (\bar{\Psi}_1^\tau \bar{\Psi}_2^\tau) \begin{pmatrix} \partial_\tau + H_{11} & H_{12} \\ H_{21} & \partial_\tau + H_{22} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} \Psi_1^\tau \\ \Psi_2^\tau \end{pmatrix}, \quad (2)$$

这里 β 为逆温度。改用频率空间中的 Grassmann 变量 $\Psi_{1,2}^\tau = \sum_{\omega_n} c_{1,2}^{(n)} \frac{e^{-i\omega_n \tau}}{\sqrt{\beta}}$ ，其中 $\omega_n = (2n+1)\frac{\pi}{\beta}$ ($n \in \mathbb{Z}$, $\mathbb{Z}$ 为整数集) 是费米子 Matsubara 频率，

$$S = \sum_{\omega_n} \bar{c}_1^{(n)} (-i\omega_n + H_{11}) c_1^{(n)} + \bar{c}_1^{(n)} H_{12} c_2^{(n)} + \bar{c}_2^{(n)} H_{21} c_1^{(n)} + \bar{c}_2^{(n)} (-i\omega_n + H_{22}) c_2^{(n)} \\ = \sum_{\omega_n} \bar{c}_1^{(n)} (-i\omega_n + H_{11}) c_1^{(n)} - \bar{c}_1^{(n)} (H_{12} (-i\omega_n + H_{22})^{-1} H_{21}) c_1^{(n)} + \bar{d}_2^{(n)} (-i\omega_n + H_{22}) d_2^{(n)} \quad (3)$$

把移位变量 $d_2^{(n)} = c_2^{(n)} + (-i\omega_n + H_{22})^{-1} H_{21} c_1^{(n)}$ 积分掉之后，我们得到非晶膜上位点的有效作用量

$$S_{\text{eff}}[\Psi_1, \bar{\Psi}_1] = \sum_{\omega_n} \bar{c}_1^{(n)} [-i\omega_n + H_{11} - H_{12} (-i\omega_n + H_{22})^{-1} H_{21}] c_1^{(n)} \quad (4)$$

由 $S_{\text{eff}}[\Psi_1, \bar{\Psi}_1]$ 出发，取极限 $\omega_n \rightarrow 0$ ，我们得到以锐利准粒子激发描述膜内重整化跃迁元的有效哈密顿量 (H_{eff})




图3 (a) $x = 0.05$ 、 $m_0 = -1.75$ 、 $\ell_{\max} = 0.05$ 的脆弱PATI在OBC下，能量最接近零的 $\pm E_0$ 模式的联合局域态密度(LDOS)，其中 $E_0 = 0.168$ 。(b)与(a)同位形、同参数下的LCM。面板(c) [(d)]与(a) [(b)]类似，仅边界条件换为PBC；(c)中 $E_0 = 1.957$ 、 $\ell_{\max} = 0.45$ 。(e) - (h)与(a)-(d)依次类似，但对应强PATI且 $x = 0.15$ ：(e)中 $\ell_{\max} = 0.015$ 、 $E_0 = 0.055$ ，(g)中 $\ell_{\max} = 0.14$ 、 $E_0 = 1.251$ 。(i) - (l)与(a)-(d)依次类似，但对应 $m_0 = -2.5$ 、 $x = 0.15$ 的PANI：(i)中 $\ell_{\max} = 0.15$ 、 $E_0 = 1.426$ ，(k)中 $\ell_{\max} = 0.145$ 、 $E_0 = 1.461$ 。取 $t = t_0 = 1$ 。

$$H_{\text{eff}} = H_{11} - H_{12}H_{22}^{-1}H_{21}. \quad (5)$$

我们所有的结论都由对角化 H_{eff} 得到。

微观模型。 H_{eff} 的推导与维度、对称性类以及所依托的母晶格结构都无关。不过，要具体展示平移活跃与平移惰性、强与脆弱的PATI以及PANI，我们仍在晶格常数为 a 的方晶格上，针对破时间反演对称绝缘体考虑Qi-Wu-Zhang模型[27]，其Bloch哈密顿量为 $H(\mathbf{k}) = \boldsymbol{\tau} \cdot \mathbf{d}(\mathbf{k})$ ： $\mathbf{k}$ 是晶格动量， $\boldsymbol{\tau}$ 是泡利矩阵矢量，三个分量分别为 $d_1(\mathbf{k}) = t \sin(k_x a)$ 、 $d_2(\mathbf{k}) = t \sin(k_y a)$ 、 $d_3(\mathbf{k}) = m_0 - t_0 [\cos(k_x a) + \cos(k_y a)]$ 。该模型在 $|m_0/t_0| < 2$ ($|m_0/t_0| > 2$)时支持拓扑(普通)绝缘体。拓扑区间进一步分裂为两个区：平移惰性(平移活跃)的 Γ (M)相，分别在 $0 < m_0/t_0 < 2$ ($-2 < m_0/t_0 < 0$)时实现。拓扑不变量取第一陈数[28]， Γ 相、M相与普通绝缘体中它依次取 $\mathcal{C} = -1$ 、 1 和 0 ，并有 $\mathcal{C} \equiv \mathcal{B}$ 。跃迁振幅取 $t = t_0 = 1$ 。拓扑绝缘体与普通绝缘体之间的QPT由M(Γ)点处的能带隙闭合驱动，发生在 $m_0 = -2$ ($m_0 = 2$)处；平移活跃相与平移惰性相之间的QPT则由X与Y点处的能带隙闭合实现，发生在 $m_0 = 0$ 处。因此，当 $-2 \leq m_0 \leq -1$ ($1 \leq m_0 \leq 2$)时，系统落在M(Γ)点的吸引域内；当 $-1 \leq m_0 \leq 1$ 时，系统落在X与Y点的吸引域内。




图4 位形平均 BI $\langle \mathcal{B} \rangle$ (对非晶晶格的 800 个独立位形取平均) 随位点占比 x 的变化, (a) 对应 $m_0 = -1$ 、(c) 对应 $m_0 = +1$, 两者均取 $t = t_0 = 1$ 。图中 x_c 标出临界位点占比, 该处 $\langle \mathcal{B} \rangle \approx \pm 0.5$, 对应强 PATI 与脆弱 PATI 之间的 QPT; 二者各以 $\langle \mathcal{B} \rangle = \pm 1.0$ 与 $\langle \mathcal{B} \rangle = 0.0$ 为特征。把 $\langle \mathcal{B} \rangle$ 与 $L^{1/\nu}(x - x_c)$ 作比较可实现数据坍缩, 由此得到这类转变的关联长度指数: (b) $m_0 = -1.0$ 时 $\nu = 1.39$, (d) $m_0 = 1.0$ 时 $\nu = 1.46$ 。另见表 1。

Bloch 哈密顿量很容易借助傅里叶变换在方晶格上实现, PAB 的 H_{eff} 就由式 (5) 给出。构成非晶晶格的位点从方晶格中随机选出, 选取时保证这些位点之间不被正比于 t 与 t_0 的跃迁项相连。于是, 非晶膜的裸哈密顿量 H_{11} 描述一个平庸绝缘体, 它由能量为 $\pm m_0$ 的位点局域原子轨道构成。相形之下, H_{eff} 中由投影得到的第二项引入了更长程的跃迁, 也正是它赋予 PAB 拓扑性质。在这一背景下, 我们的发现如下。

结果。为识别拓扑不同的相与相间的量子相变 (QPT), 我们主要计算 Bott 指标 (BI) $\mathcal{B}$ ——它尤其适合没有任何晶体有序的体系。占据单粒子态的投影算符为

$$P = \sum_{E_n < 0} |n\rangle \langle n| \quad (6)$$

其中 $|n\rangle$ 满足 $H_{\text{eff}} |n\rangle = E_n |n\rangle$; 向未占据态的互补投影为 $Q = I - P$, 这里 I 是单位矩阵。BI 的定义为 [29]

$$\mathcal{B} = \frac{1}{2\pi} \text{Im}[\text{tr}[\log[V_y U_x V_y^\dagger U_x^\dagger]]] \quad (7)$$

其中 $U_x = P U_0 P + Q$, 而 $U_0 = \exp(i2\pi X/L)$; $V_y = P V_0 P + Q$, 而 $V_0 = \exp(i2\pi Y/L)$ 。 X (Y) 是位置算符, 它在正方形晶格的坐标系下收录 PAB 每个位点的 x (y) 坐标, 边界取周期性边界条件 (PBC), 每个方向的线度为 L 。

我们用位形平均 BI $\langle \mathcal{B} \rangle$ 来判相: 当 $-2 < m_0 < 0$ ($0 < m_0 < 2$) 时, PAB 上 $\langle \mathcal{B} \rangle = 1$ ($\langle \mathcal{B} \rangle = -1$) 的相分别是平移活跃与平移惰性的强 PATI, 它们出现在临界位点占比 x_c 之上, 而 x_c 依赖于 m_0 。当 $|m_0| > 2$ 时, 我们得到 PANI, 任意 x 下都有 $\mathcal{B} = 0$ 。另一方面, 若 $|m_0| < 2$ (拓扑区间) 但 $x < x_c$, 则存在一个 $\langle \mathcal{B} \rangle = 0$ 的绝缘相, 见图 2(a)。为弄清这个绝缘相, 我们在 PAB 上每个位于 $\mathbf{r}$ 的位点计算局域陈标记 (LCM), 其定义为 [25], [30]

$$\mathcal{C}(\mathbf{r}) = \frac{4\pi}{A} \text{Im}(\langle \mathbf{r} | \text{tr}[P X Q Y P] | \mathbf{r} \rangle) \quad (8)$$

其中 tr 表示对位在轨道求和, $A = a^2/x$ 是每个位点的平均面积。值得注意的是, 尽管 $\langle \mathcal{B} \rangle = 0$, PAB 上仍有有限 (虽然很小) 比例的位点呈现出近乎量子化的 LCM, 其峰值落在母正方形晶格中找到的 $\mathcal{B}$ 附

近；施加 OBC 时尤为明显。改用 PBC 后，这类拓扑位点的数目会急剧减少，但需说明，局域拓扑标记严格来说只在 OBC 下才有定义。我们把这一相命名为脆弱 PATI。在 x_c 以下， x 增大时显示量子化 LCM 的位点数目也随之增加 [31]。在强 PATI 中，多数位点上的 LCM (近似) 量子化到 $\langle \mathcal{B} \rangle$ ；而在 PANI 中，不论边界条件如何，LCM 在体系各处都为零。见图 3。

表 1 PAB 上强 PATI 到脆弱 PATI 量子相变的临界位点占比 (x_c)，以及 $t = t_0 = 1$ 时不同 m_0 所对应的关联长度指数 (ν) [31]。

m_0/t_0	x_c	ν
-1.75	0.0898	1.27 ± 0.26
-1.50	0.1675	1.00 ± 0.13
-1.25	0.2337	1.15 ± 0.16
-1.00 (+1.00)	0.2892 (0.2886)	1.39 ± 0.25 (1.46 ± 0.26)

量子化的 BI 或 LCM 通过能隙内边缘模式印证了体-边对应：在带 OBC 的 PAB 上可以看到这类模式，其能量至少比 PBC 体系的体隙小一个量级。这种模式只出现在强 PATI 与脆弱 PATI 中，PANI 里没有，见图 3。我们还确认，强 PATI 与脆弱 PATI 的边缘模式对足够弱的随机点状电荷杂质稳健，杂质强度可达母正方形晶格上算出的能带宽度的 15% [31]。

强 PATI 到脆弱 PATI 的量子相变发生在 $x = x_c$ 处，此时平均位点间距 ξ/a 与 Δ/t_0 之间服从普适标度。具体而言，当体系落在 M 点的吸引域 ($-2 \leq m_0 \leq -1$) 内时， $\xi \sim \Delta^{-0.42}$ ，此时 $\xi \sim 1/\sqrt{x}$ ，且 $\Delta = |2t_0 + m_0|$ 。相反，当体系落在 X 与 Y 点的吸引域 ($-1 < m_0/t_0 < 0$) 内时， $\xi \sim \Delta^{-0.39}$ ，此时 $\xi \sim 1/\sqrt{x_* - x}$ ， $\Delta = |m_0|$ ，且 $x_* = 0.25$ ，见图 2(b)。 x_* 取有限值意味着：这些晶格位点虽然随机分布，但 PAB 上这样一组位点仍会在密度为 $a/\sqrt{x_*}$ 的有效均匀位点背景之上发展出随机性。注意两种情形下 ξ 对 Δ 的幂律依赖几乎相等，说明二者间是普适标度。

最后我们指出，跨越强 PATI 到脆弱 PATI 的量子相变时， $\langle \mathcal{B} \rangle$ 呈现单参数标度。这一 QPT 的临界位点占比 (x_c) 锁定在这样一个 x 处：对线度 L 不同的若干母正方形晶格算出的 PAB 上 $\langle \mathcal{B} \rangle$ 曲线大致交于该点，且此处 $\langle \mathcal{B} \rangle \approx \pm 0.5$ 。有了 x_c ，把 $\langle \mathcal{B} \rangle$ 与 $L^{\frac{1}{\nu}}(x - x_c)$ 加以比较，就能对某个关联长度指数 ν 观察到很好的数据坍缩； $m_0 = \pm 1$ 的结果见图 4。不同 m_0 下的 ν 值列于表 1。数值算出的结构型量子霍尔平台转变中 ν 的平均值介于 1.00 与 1.46 之间 [31]，这不同于由在位无序触发的同类 QPT，后者 $\nu \in (2.3, 2.6)$ [32], [33], [34], [35]。 ν 的误差棒用自助法 (bootstrap) 确定，给出标准误；随后假定抽样分布近似正态，把 95% 置信区间估计为标准误的 3.92 倍 [31]。

小结与讨论。本文构造了二维投影非晶膜 (PAB)：从母正方形晶格里随机选出占比为 x 的一部分位点，这些位点在裸哈密顿量层面不被任何跃迁振幅连通。把膜外的母晶体位点积分掉，就得到 PAB 的有效哈密顿量；它既捕获了平移活跃与平移惰性两类拓扑相的踪迹——全局与局域拓扑不变量在此皆量子化，此即强 PATI——也给出了两类不变量同时归零的 PANI。更引人注目的是，位点占比更低 ($x < x_c$) 时我们挖出了一类奇异的拓扑相：全局拓扑不变量为零，局域标记却近乎量子化，我们把它称为脆弱 PATI。强 PATI 与脆弱 PATI 都容纳能隙内的边缘局域模式，这正印证了体-边对应。以上结果共同揭示了投影拓扑膜的普适之处：各种基于晶格的拓扑相，都能经由投影拓扑膜在它的几何后裔上被捕获出来——低维准晶与涌现晶体 [26], [36], [37]、分形晶格 [38] 以及非晶晶格——哪怕这些后裔或缺、或全部失去了晶体对称性；膜上同样会涌现非厄米拓扑 [39] 与无序驱动的量子相变 [40]。把 PAB 的构造推广开去，用来处理各种维度、各种对称性类下的晶体、弱与高阶拓扑绝缘体和超导体，都是值得一做的方向，我们把它留给后续研究。局域拓扑标记在全部 Altland-Zirnbauer 对称性类里都能定义 [41]，因此我们有理由相信，脆弱非晶拓扑相在那样的体系中同样能够被识别出来。

投影过程必然生成一套长程跃迁：原本随机选出、彼此断开的位点正是靠它连成 PAB，母晶体的各类拓扑相也靠它一一存续；但也正因如此，强 PATI 与脆弱 PATI 眼下很难直接在量子材料中实现。尽管如此，定制量子材料的最新进展仍让我们对它们在实验室中的实现持乐观态度 [42], [43], [44], [45], [46]。而各类高度可调的经典超材料尤其令人期待：拓扑电路 (topoelectrical) [47], [48], [49]、光子晶格 [50] 与声子晶格 [51], [52]，理论上预言的种种 PATI 在不远的将来都有望在这些平台上做出来。

数据可用性。本工作产生的数值代码与数据见 [53]。

致谢。本工作的绝大部分计算使用了 MIT 物理系 subMIT 平台提供的资源 [54]。A.P. 感谢 Minho Luke Kim 与 Vladislav Poliakov 提供的技术支持；B.R. 得到 NSF CAREER 基金 (项目编号 DMR-2238679) 的资助。感谢 Vladimir Juricić 对文稿提出的意见。

参考文献

- [1] M. Z. Hasan and C. L. Kane, “Colloquium: Topological insulators,” *Rev. Mod. Phys.*, vol. 82, p. 3045, 2010, [Online]. Available: <https://doi.org/10.1103/RevModPhys.82.3045>
- [2] X.-L. Qi and S.-C. Zhang, “Topological insulators and superconductors,” *Rev. Mod. Phys.*, vol. 83, p. 1057, 2011, [Online]. Available: <https://doi.org/10.1103/RevModPhys.83.1057>
- [3] C.-K. Chiu, J. C. Y. Teo, A. P. Schnyder, and S. Ryu, “Classification of topological quantum matter with symmetries,” *Rev. Mod. Phys.*, vol. 88, no. 035005, 2016, [Online]. Available: <https://doi.org/10.1103/RevModPhys.88.035005>
- [4] L. Fu and C. L. Kane, “Topological insulators with inversion symmetry,” *Phys. Rev. B*, vol. 76, no. 045302, 2007, [Online]. Available: <https://journals.aps.org/prb/abstract/10.1103/PhysRevB.76.045302>
- [5] B. A. Bernevig, T. L. Hughes, and S.-C. Zhang, “Quantum Spin Hall Effect and Topological Phase Transition in HgTe Quantum Wells,” *Science*, vol. 314, p. 1757, 2006, [Online]. Available: <https://doi.org/10.1126/science.1133734>
- [6] R. Roy, “Topological phases and the quantum spin Hall effect in three dimensions,” *Phys. Rev. B*, vol. 79, no. 195322, 2009, [Online]. Available: <https://journals.aps.org/prb/abstract/10.1103/PhysRevB.79.195322>
- [7] S. Ryu, A. P. Schnyder, A. Furusaki, and A. W. W. Ludwig, “Topological insulators and superconductors: tenfold way and dimensional hierarchy,” *New J. Phys.*, vol. 12, no. 065010, 2010, [Online]. Available: <https://doi.org/10.1088/1367-2630/12/6/065010>
- [8] L. Fu, “Topological crystalline insulators,” *Phys. Rev. Lett.*, vol. 106, no. 106802, 2011, [Online]. Available: <https://doi.org/10.1103/PhysRevLett.106.106802>
- [9] R.-J. Slager, A. Mesaros, V. Juričić, and J. Zaanen, “The space group classification of topological band-insulators,” *Nat. Phys.*, vol. 9, p. 98, 2012, [Online]. Available: <https://doi.org/10.1038/nphys.2513>
- [10] K. Shiozaki and M. Sato, “Topology of crystalline insulators and superconductors,” *Phys. Rev. B*, vol. 90, no. 165114, 2014, [Online]. Available: <https://journals.aps.org/prb/abstract/10.1103/PhysRevB.90.165114>
- [11] B. Bradlyn *et al.*, “Topological quantum chemistry,” *Nature (London)*, vol. 547, p. 298, 2017, [Online]. Available: <https://www.nature.com/articles/nature23268>
- [12] H. C. Po, A. Vishwanath, and H. Watanabe, “Complete theory of symmetry-based indicators of band topology,” *Nat. Commun.*, vol. 8, p. 50, 2017, [Online]. Available: <https://www.nature.com/articles/s41467-017-00133-2>
- [13] T. Zhang *et al.*, “Catalogue of topological electronic materials,” *Nature (London)*, vol. 566, p. 475, 2019, [Online]. Available: <https://www.nature.com/articles/s41586-019-0944-6>
- [14] A. Agarwala and V. B. Shenoy, “Topological Insulators in Amorphous Systems,” *Phys. Rev. Lett.*, vol. 118, no. 236402, 2017, [Online]. Available: <https://doi.org/10.1103/PhysRevLett.118.236402>
- [15] N. P. Mitchell, L. M. Nash, D. Hexner, A. M. Turner, and W. T. M. Irvine, “Amorphous topological insulators constructed from random point sets,” *Nat. Phys.*, vol. 14, p. 380, 2018, [Online]. Available: <https://www.nature.com/articles/s41567-017-0024-5>
- [16] Y.-B. Yang, T. Qin, D.-L. Deng, L.-M. Duan, and Y. Xu, “Topological Amorphous Metals,” *Phys. Rev. Lett.*, vol. 123, no. 076401, 2019, [Online]. Available: <https://journals.aps.org/prl/abstract/10.1103/PhysRevLett.123.076401>
- [17] M. Costa, G. R. Schleder, M. B. Nardelli, C. Lewenkopf, and A. Fazzio, “Toward Realistic Amorphous Topological Insulators,” *Nano Lett.*, vol. 19, p. 8941, 2019, [Online]. Available: <https://pubs.acs.org/nalefd/article-abstract/19/12/8941/511832/Toward-Realistic-Amorphous-Topological-Insulators?redirectedFrom=fulltext>
- [18] P. Zhou *et al.*, “Photonic amorphous topological insulator,” *Light Sci Appl*, vol. 9, p. 133, 2020, [Online]. Available: <https://www.nature.com/articles/s41377-020-00368-7>
- [19] A. Agarwala, V. Juričić, and B. Roy, “Higher-order topological insulators in amorphous solids,” *Phys. Rev. Research*, vol. 2, no. 012067, 2020, [Online]. Available: <https://journals.aps.org/prresearch/abstract/10.1103/PhysRevResearch.2.012067>

- [20] Q. Marsal, D. Varjas, and A. G. Grushin, “Topological Weaire–Thorpe models of amorphous matter,” *Proc. Natl. Acad. Sci. USA*, vol. 117, p. 30260, 2020, [Online]. Available: <https://www.pnas.org/doi/10.1073/pnas.2007384117>
- [21] J.-H. Wang, Y.-B. Yang, N. Dai, and Y. Xu, “Structural-Disorder-Induced Second-Order Topological Insulators in Three Dimensions,” *Phys. Rev. Lett.*, vol. 126, no. 206404, 2021, [Online]. Available: <https://journals.aps.org/prl/abstract/10.1103/PhysRevLett.126.206404>
- [22] K. Li, J.-H. Wang, Y.-B. Yang, and Y. Xu, “Symmetry-Protected Topological Phases in a Rydberg Glass,” *Phys. Rev. Lett.*, vol. 127, no. 263004, 2021, [Online]. Available: <https://journals.aps.org/prl/abstract/10.1103/PhysRevLett.127.263004>
- [23] Y.-L. Tao, J.-H. Wang, and Y. Xu, “Average symmetry protected higher-order topological amorphous insulators,” *SciPost Phys.*, vol. 15, p. 193, 2023, [Online]. Available: <https://scipost.org/SciPostPhys.15.5.193>
- [24] P. Corbae *et al.*, “Observation of spin-momentum locked surface states in amorphous Bi_2Se_3 ,” *Nat. Mater.*, vol. 22, p. 200, 2023, [Online]. Available: <https://www.nature.com/articles/s41563-022-01458-0>
- [25] S. Manna, S. K. Das, and B. Roy, “Noncrystalline topological superconductors,” *Phys. Rev. B*, vol. 109, no. 174512, 2024, [Online]. Available: <https://doi.org/10.1103/PhysRevB.109.174512>
- [26] A. Panigrahi, V. Juričić, and B. Roy, “Projected topological branes,” *Commun. Phys.*, vol. 5, p. 230, 2022, [Online]. Available: <https://doi.org/10.1038/s42005-022-01006-x>
- [27] X.-L. Qi, Y. S. Wu, and S. C. Zhang, “Topological quantization of the spin Hall effect in two-dimensional paramagnetic semiconductors,” *Phys. Rev. B*, vol. 74, no. 085308, 2006, [Online]. Available: <https://doi.org/10.1103/PhysRevB.74.085308>
- [28] D. J. Thouless, M. Kohmoto, M. P. Nightingale, and M. den Nijs, “Quantized Hall Conductance in a Two-Dimensional Periodic Potential,” *Phys. Rev. Lett.*, vol. 49, p. 405, 1982, [Online]. Available: <https://doi.org/10.1103/PhysRevLett.49.405>
- [29] T. A. Loring and M. B. Hastings, “Disordered topological insulators via C^* -algebras,” *Europhys. Lett.*, vol. 92, p. 67004, 2010, [Online]. Available: <https://doi.org/10.1209/0295-5075/92/67004>
- [30] R. Bianco and R. Resta, “Mapping topological order in coordinate space,” *Phys. Rev. B*, vol. 84, no. 241106, 2011, [Online]. Available: <https://journals.aps.org/prb/abstract/10.1103/PhysRevB.84.241106>
- [31] “See Supplemental Material at XXX-XXXX for variation of LCM on the sites of fragile PATIs with increasing x , stability of edge modes against point-like charge impurities, details of error estimation in the computation of v , and additional results for strong-to-fragile PATI QPTs.”
- [32] J. T. Chalker and P. D. Coddington, “Percolation, quantum tunnelling and the integer Hall effect,” *J. Phys. C*, vol. 21, p. 2665, 1988, [Online]. Available: <https://iopscience.iop.org/article/10.1088/0022-3719/21/14/008>
- [33] K. Slevin and T. Ohtsuki, “Critical exponent for the quantum Hall transition,” *Phys. Rev. B*, vol. 80, p. 041304(R), 2009, [Online]. Available: <https://journals.aps.org/prb/abstract/10.1103/PhysRevB.80.041304>
- [34] B. Sbierski, E. J. Dresselhaus, J. E. Moore, and I. A. Gruzberg, “Criticality of Two-Dimensional Disordered Dirac Fermions in the Unitary Class and Universality of the Integer Quantum Hall Transition,” *Phys. Rev. Lett.*, vol. 126, no. 076801, 2021, [Online]. Available: <https://journals.aps.org/prl/abstract/10.1103/PhysRevLett.126.076801>
- [35] D. J. Salib and B. Roy, “Emergent fractals in dirty topological crystals,” *Phys. Rev. B*, vol. 112, p. L180201, 2025, [Online]. Available: <https://doi.org/10.1103/rm97-zx7v>
- [36] A. C. Tyner and V. Juričić, “Three-dimensional $\mathbb{Z}$ topological insulators without reflection symmetry,” *Sci. Rep.*, vol. 14, p. 4288, 2024, [Online]. Available: <https://doi.org/10.1038/s41598-024-54821-3>
- [37] A. Panigrahi and B. Roy, “Projected branes as platforms for crystalline, superconducting, and higher-order topological phases,” *Phys. Rev. B*, vol. 113, no. 035301, 2026, [Online]. Available: <https://doi.org/10.1103/vlk8-59x3>
- [38] D. J. Salib, A. J. Mains, and B. Roy, “Topological insulators on fractal lattices: A general principle of construction,” *Phys. Rev. B*, vol. 110, p. L241302, 2024, [Online]. Available: <https://journals.aps.org/prb/abstract/10.1103/PhysRevB.110.L241302>

- [39] S. Torđević and V. Juričić, “Non-Hermitian Crystalline Braid Topology from Hermitian Projection: A Zero-Mode Resonance Mechanism,” arXiv:2606.06626, 2026. [Online]. Available: <https://arxiv.org/abs/2606.06626>
- [40] A. C. Tyner, V. Juričić, and B. Roy, “Two-dimensional Disordered Projected Branes: Stability and Quantum Criticality via Dimensional Reduction,” arXiv:2507.23780, 2025. [Online]. Available: <https://arxiv.org/abs/2507.23780>
- [41] W. Chen, “Universal topological marker,” *Phys. Rev. B*, vol. 107, no. 045111, 2023, [Online]. Available: <https://journals.aps.org/prb/abstract/10.1103/PhysRevB.107.045111>
- [42] K. K. Gomes, W. Mar, W. Ko, F. Guinea, and H. C. Manoharan, “Designer dirac fermions and topological phases in molecular graphene,” *Nature*, vol. 483, p. 306, 2012, [Online]. Available: <https://www.nature.com/articles/nature10941>
- [43] L. C. Collins, T. G. Witte, R. Silverman, D. B. Green, and K. K. Gomes, “Imaging quasiperiodic electronic states in a synthetic Penrose tiling,” *Nat. Commun.*, vol. 8, p. 15961, 2017, [Online]. Available: <https://www.nature.com/articles/ncomms15961>
- [44] S. N. Kempkes *et al.*, “Design and characterization of electrons in a fractal geometry,” *Nat. Phys.*, vol. 15, p. 127, 2019, [Online]. Available: <https://www.nature.com/articles/s41567-018-0328-0>
- [45] L. Ma *et al.*, “Relativistic Mott transition in twisted WSe₂ tetralayers,” *Nat. Mater.*, vol. 24, p. 1935, 2025, [Online]. Available: <https://www.nature.com/articles/s41563-025-02359-8>
- [46] D. Yang *et al.*, “Correlated insulating states in slow dirac fermions on a honeycomb moiré superlattice,” arXiv:2504.17970, 2025. [Online]. Available: <https://arxiv.org/abs/2504.17970>
- [47] S. Imhof *et al.*, “Topoelectrical-circuit realization of topological corner modes,” *Nat. Phys.*, vol. 14, p. 925, 2018, [Online]. Available: <https://doi.org/10.1038/s41567-018-0246-1>
- [48] J. K. Dong, V. Juričić, and B. Roy, “Topoelectric circuits: Theory and construction,” *Phys. Rev. Res.*, vol. 3, no. 023056, 2021, [Online]. Available: <https://doi.org/10.1103/PhysRevResearch.3.023056>
- [49] N. A. Olekhno *et al.*, “Experimental realization of topological corner states in long-range-coupled electrical circuits,” *Phys. Rev. B*, vol. 105, p. L081107, 2022, [Online]. Available: <https://doi.org/10.1103/PhysRevB.105.L081107>
- [50] T. Ozawa *et al.*, “Topological photonics,” *Rev. Mod. Phys.*, vol. 91, no. 015006, 2019, [Online]. Available: <https://doi.org/10.1103/RevModPhys.91.015006>
- [51] R. Süssstrunk and S. D. Huber, “Observation of phononic helical edge states in a mechanical topological insulator,” *Science*, vol. 349, p. 47, 2015, [Online]. Available: <https://doi.org/10.1126/science.aab0239>
- [52] Z. Yang *et al.*, “Topological Acoustics,” *Phys. Rev. Lett.*, vol. 114, no. 114301, 2015, [Online]. Available: <https://doi.org/10.1103/PhysRevLett.114.114301>
- [53] A. Panigrahi, “Projected Amorphous Branes,” GitHub, 2026. [Online]. Available: https://github.com/archisman-panigrahi/projected_amorphous_branes
- [54] P. Acosta *et al.*, “SubMIT: A Physics Analysis Facility at MIT,” *EPJ Research Infrastructures*, vol. 10, p. 2, 2026, [Online]. Available: <https://doi.org/10.1007/s41781-025-00156-1>

补充材料

本补充材料包含: (a) 位点占比 x 增大时, 脆弱投影非晶拓扑绝缘体 (PATI) 中局域陈标记 (LCM) 的行为 [第 S1 节与图 S1]; (b) 弱在位随机电荷无序对脆弱与强 PATI 相中边缘模式的联合局域态密度 (LDOS) 以及局域陈标记的影响 [第 S2 节与图 S2]; (c) 关联长度指数 ν 误差分析的计算细节 [第 S3 节]; (d) 对一组 m_0 取值, 位形平均 Bott 指标 $\langle B \rangle$ 随 $(x - x_c)L^{\frac{1}{\nu}}$ 变化的标度分析 [第 S4 节与图 S3]。

S1. 脆弱 PATI 中局域陈标记随 x 的变化 ($x < x_c$)。 正文已经说明: 当非晶膜中的位点占比 x 小于临界位点占比 x_c , 而母晶格本身处于拓扑相时, 非晶膜中的位形平均 Bott 指标归零; 与此同时, 在开放边界条件下, 最靠近零能的态在系统边缘处形成很强的局域态密度峰, 令人想到陈绝缘体的无隙边缘模式。我们把这一相称为脆弱 PATI: 其中至少有一小部分位点显示出近乎量子化的局域陈标记, 其数值围绕 Bott 指标的取值成峰——同样的紧束缚模型参数若放在方晶格上, 得到的正是这个 Bott 指标值。因此, 在保持 $x < x_c$ 的前提下逐渐改变 x , 局域陈标记会如何变化, 就值得专门研究。

我们发现, 当 $x \ll x_c$ 时, 局域陈标记在整个系统中恒为零; 但当 x 从下方逼近 x_c 时, 系统体相中有限比例的位点会取得母态的取值。与此同时, 仍有一批占比更小但不可忽略的位点带有相反符号的局域陈标记。图 S1 针对 $m_0 = \pm 1$ (此时 $x_c \approx 0.29$) 展示了这一行为, 取 $x = 0.05, 0.10, 0.15, 0.20, 0.25$ 。如前所述, 当 $x = 0.20$ 或 0.25 时, 相当比例的位点取得 -1 或 $+1$ 的局域陈标记, 符号取决于 m_0 的正负 (同时也有若干位点符号相反); 而当 x 足够小时, 除少数位点外, 几乎所有位点上的局域陈标记都几乎恒为零。相形之下, 在母晶格中 (投影到膜之前), 所有体相位点都带有高度量子化的有限局域陈数。

S2. 强与脆弱 PATI 中边缘模式对无序的稳定性。 本节考察弱在位势无序对脆弱与强 PATI 相的影响。我们从跨度为 W 的一致分布中抽取 L^2 个数值, 也就是取自 $[-\frac{W}{2}, \frac{W}{2}]$ 的盒分布, 因此 W 表示无序强度。为了在存在无序时仍保持系统的粒子-空穴对称性, 我们从每个抽样值中减去样本均值, 使新样本的均值恒为零。随后, 把每个位点上的局域势取值同时加到两个子晶格轨道上。接着按正文给出的方案, 把包含跃迁项、质量项以及无序项的总哈密顿量投影到非晶膜上, 再对所得哈密顿量对角化, 从而得到以下结论。

我们发现, 脆弱 PATI 中的「边缘模式」在弱无序下依然存在 (我们测试到 W 达到干净母晶格上导带宽度的 15%), 并且尽管系统中存在少量无序, 局域陈标记的定性特征并未改变。具体而言, 当 $x < x_c$ 时, 除少数位点外整个膜上的局域陈标记几乎为零 (脆弱 PATI); 而当 $x > x_c$ 时 (强 PATI), 其在系统体相中的数值与系统量子化 Bott 指标相同。这些结论由图 S2 支持。因此, 脆弱与强 PATI 对足够弱的无序都是稳定的。

S3. 自助法 (bootstrap) 误差计算的细节。 本节说明正文表 1 中所列误差范围的估算过程。我们用自助法 (bootstrap) 来估计临界指数 ν 的误差。对每一组 (L, x) , 通过对平均 Bott 指标数据有放回地重采样, 得到一个自助样本 (也就是说, 在 800 组不同的数据点中, 同一个值原则上可能被多次选中)。再由该自助样本算出对应的平均 Bott 指标, 进而求出属于这个样本的临界指数 ν_i 。整个过程重复 1000 次, 得到自助估计值的一个分布 $\nu_1, \nu_2, \dots, \nu_{1000}$ 。

我们计算这 1000 个 ν 值的标准误,

$$SE(\nu) = \sqrt{\frac{1}{n-1} \sum_{i=1}^n (\nu_i - |\nu|)^2} \quad (S1)$$

其中 $n = 1000$, $|\nu| = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n \nu_i$ 。假设抽样分布近似正态, 则在平均值的每一侧, 95% 置信区间的长度取标准误的 1.96 倍。

最后, 正文表 1 中报告的是范围 $\nu_0 \pm 1.96 SE(\nu)$, 其中 ν_0 为临界指数的均值: 先对非晶晶格不同位形的 800 个 Bott 指标值取平均, 再由它们求出临界指数。

S4. 不同 m_0 取值下的标度分析。 为了得到强 PATI 到脆弱 PATI 量子相变 (QPT) 在不同 m_0 取值下的关联长度指数 ν , 我们先对某组 (L, x) 计算位形平均 Bott 指标 $\langle B \rangle$, 再对若干 L 值重复这一分析, 即 $L = 88, 100, 120$ 与 132 。这里 L 是投影前方形母晶格在每个方向上的线度, x 表示其中断开位点构成非晶晶格的位点占比。我们从这些曲线彼此相交的点提取 x_c , 交点出现在 $\langle B \rangle \approx 0.5$ 处。计算 $\langle B \rangle$ 时, 我们总是在投影之前对方形母晶格的每个方向施加周期性边界条件。

随后, 我们构造新变量 $(x - x_c)L^{\frac{1}{\nu}}$, 并把 $\langle B \rangle$ 对该新变量作图, 对应上述四个不同的 L 值。我们对间隔很近的一组 ν 取值重复这一操作, 并从如下条件确定 ν 的最优值: 它应使不同 L 对应曲线之间距离的平方和最小, 也就是实现数据坍缩。不同 m_0 取值下的标度分析见图 S3。




图 S1 脆弱 PATI 相中，局域陈标记 $\mathcal{C}(r)$ 在若干 x ($< x_c$) 取值下的行为。五列分别给出 $x = 0.05, 0.10, 0.15, 0.20$ 与 0.25 时局域陈标记的行为。这里取 $m_0 = -1$ ，相应的 $x_c \approx 0.29$ 。第一行〔面板 (a) 至 (e)〕在开放边界条件下给出上述 x 取值、 $m_0 = -1$ 时的局域陈标记。第二行〔面板 (f) 至 (j)〕在周期性边界条件下给出 $m_0 = -1$ 时局域陈数的对应图像。我们发现，周期性边界条件与开放边界条件下局域陈数的空间分布定性上相同。第三行〔面板 (k) 至 (o)〕与第四行〔面板 (p) 至 (t)〕给出类似图像，但取 $m_0 = +1$ 。 $m_0 = -1$ 与 $m_0 = +1$ 的定性图样一致，唯一的差别是：当 $x \lesssim x_c$ 时，占主导的局域陈标记的符号会随 m_0 变号而翻转。




图 S2 (a) 最靠近零能的两个粒子-空穴对称态的联合局域态密度 (LDOS)，这两个态的能量取 $\pm E_0$ ，其中 $E_0 = 0.21$ ；体系为脆弱 PATI 态（参数为 $m_0 = -1.75$ ，非晶膜中的位点占比 $x = 0.03$ ），并施加强度 $W = 0.5$ 的随机势无序。无序并不影响 LDOS 的边缘模式特征。(b) 该脆弱 PATI 态局域陈数 $\mathcal{C}(r)$ 的分布，参数与面板 (a) 完全相同。当 $x < x_c$ (≈ 0.09) 时，除少数位点外整个晶格上的局域陈数几乎为零，与不存在无序时的情形类似。面板 (c) 与 (d) 分别类似于面板 (a) 与 (b)，但取 $x = 0.15 > x_c$ 。面板 (c) 中 $E_0 = 0.0415$ 。这里面板 (c) 的 LDOS 定性上与面板 (a) 相同，但由于 $x > x_c$ ，局域陈数在系统体相中取量子化数值。面板 (b) 与 (d) 的 $\ell_{\max}$ 分别约为 0.09 与 0.0177。




图 S3 位形平均 Bott 指标 $\langle \mathcal{B} \rangle$ (每个 x 取值下由非晶晶格的 800 个独立位形平均得到) 随 x 的变化, 对应 (a) $m_0 = -1.25$ 、(c) $m_0 = -1.5$ 与 (e) $m_0 = -1.75$, 取 $t = t_0 = 1$ 。这里 x_c 标记每个 m_0 取值下的临界位点占比。在该临界处 $\langle \mathcal{B} \rangle \approx 0.5$, 它对应的正是强 PATI 与脆弱 PATI 之间的量子相变, 二者分别以 $\langle \mathcal{B} \rangle = \pm 1.0$ 与 $\langle \mathcal{B} \rangle = 0.0$ 刻画。面板 (b)、(d)、(f) 给出 $\langle \mathcal{B} \rangle$ 随 $L^{1/\nu}(x - x_c)$ 的变化, 分别对应 $m_0 = -1.25$ 、 -1.50 与 -1.75 , 展示了各图例所标关联长度指数 ν 下的数据坍缩。