

三维 Allen–Cahn 方程的稳定解是一维的

Stable solutions of the Allen–Cahn equation in dimension three are one-dimensional

Hardy Chan Xavier Fernández-Real Alessio Figalli Enric Florit-Simon Joaquim Serra

H. Chan: 巴塞尔大学数学与信息学系 (瑞士巴塞尔 4051, Spiegelgasse 1)。

X. Fernández-Real: 洛桑联邦理工学院 EPFL SB (瑞士洛桑 1015, Station 8)。

A. Figalli, E. Florit-Simon, J. Serra: 苏黎世联邦理工学院数学系 (瑞士苏黎世 8092, Rämistrasse 101)。

我们证明: $\mathbb{R}^3$ 中 Allen–Cahn 方程的每一个有界稳定解都是一维的。由此即得 De Giorgi 猜想在四维单调解情形下的正确性。

1 引言

Allen–Cahn 方程是描述相变的一个基本模型, 其定常形式为

$$-\Delta u + W'(u) = 0, \quad W(t) = \frac{1}{4}(1 - t^2)^2. \quad (1.1)$$

这一方程源于二元合金中界面的研究 [1], 如今它已成为联系非线性椭圆方程与极小曲面几何的核心环节 [2], [3], [4], [5], [6], [7], [8], [9]。

它的变分结构由下面这个能量来刻画

$$E(u; \Omega) := \int_{\Omega} \left(\frac{1}{2} |\nabla u|^2 + W(u) \right) dx,$$

其中 $\Omega \subset \mathbb{R}^n$ 是有界区域。 W 的两个极小值对应两个相 $u = \pm 1$, 而 u 的水平集则描述相与相之间的界面。

一个与 De Giorgi 原猜想密切相关的基本问题是: 这样的构型的**稳定性**究竟能在多大程度上决定其界面的几何。本文给出三维有界稳定解的分类; 作为一个广为人知的推论, 这就蕴含了 De Giorgi 猜想在四维的正确性。

1.1 De Giorgi 猜想及其稳定版本

De Giorgi 猜想于 1978 年提出 [10], 它是极小图 Bernstein 问题在相变模型中的对应物。

猜想 (De Giorgi)。

设 $u: \mathbb{R}^n \rightarrow (-1, 1)$ 是式 (1.1) 的经典解, 且满足 $\partial_{x_n} u > 0$ 。若 $n \leq 8$, 则 u 是一维的: 即存在 $e \in \mathbb{S}^{n-1}$ 与 $\varphi: \mathbb{R} \rightarrow (-1, 1)$, 使得

$$u(x) = \varphi(e \cdot x).$$

通俗地说, 人们预期单一方向的单调性会迫使所有水平集都成为彼此平行的超平面。Ghoussoub 与 Gui [11] 在二维证明了这一猜想, Ambrosio 与 Cabré [12] 在三维证明了它。高维的重大进展来自 Savin [13]: 在附加假设“解沿单调方向的两个端点处趋于 ± 1 ”下, 他把猜想证明到了八维, 其工作同时给出了七维及以下能量极小解的分类。这一维数门槛是尖锐的: del Pino、Kowalczyk 与 Wei [14] 在九维及更高维构造了反例。

为了把猜想放进更宽的变分框架, 先回顾: 若能量的二阶变分非负, 就称该解**稳定**, 亦即

$$Q_{u(\xi)} := \int_{\mathbb{R}^n} (|\nabla \xi|^2 + W''(u)\xi^2) dx \geq 0 \quad \text{对每个 } \xi \in C_c^1(\mathbb{R}^n). \quad (1.2)$$

由于严格单调的解必然稳定 [15], 自然会引出**稳定 De Giorgi 猜想**: 式 (1.1) 的每个有界稳定解在“低”维数下也应当是一维的。事实上这个猜想比此处所述更强: 借助 Jerison–Monneau [16] 与 Savin [13] 的变分论证, 它在 n 维成立即蕴含 De Giorgi 原猜想在 $n+1$ 维成立。于是便有下面这个猜想。

猜想 (稳定 De Giorgi)。

设 $u: \mathbb{R}^n \rightarrow (-1, 1)$ 是式 (1.1) 的经典解, 且满足稳定性不等式 (1.2)。若 $n \leq 7$, 则 u 是一维的。

如上所述, 完整解决稳定 De Giorgi 猜想 (即证明到七维) 就能证明 De Giorgi 原猜想到八维。在此之前, 稳定版本仅在二维为已知, 那归功于 Alberti、Ambrosio 与 Cabré 的工作 [12], [15]。在八维, Pacard 与 Wei [17] 构造了非平凡稳定解, Liu、Wang 与 Wei [18] 甚至构造出非平凡的极小解。

还应指出, 上述问题都属于一个更宏大的纲领: 稳定性何时迫使界面变平。近期的进展包括 $\mathbb{R}^7$ 及以下维数中完备双侧稳定极小超曲面的分类 [19], [20], [21], [22], 以及 Bernoulli 问题全局经典稳定解在三维 [23] 与四维 [24] 的分类。相变模型中相关的刚性结果还有: 半拉普拉斯算子情形见 [25], 自由边界 Allen–

Cahn 问题见 [23] 的第 10 节。最后，就经典 Allen–Cahn 方程本身而言，[26] 与 [27] 在额外的能量增长假设下建立了四维的刚性结果。

1.2 与极小曲面的联系

要理解这样的刚性结论为何自然，不妨回到与极小曲面的联系，这里的极小曲面即面积的临界点。Modica 与 Mortola [2] 第一次建立了这一联系，他们证明适当重标度后的 Allen–Cahn 能量 Γ -收敛到周长的一个倍数。这为与 Bernstein 问题的类比提供了变分基础，也提示稳定解应当有对应的稳定极小超曲面。而在三维，这一几何图像格外令人信服：由 do Carmo 与 Peng [28]、Fischer-Colbrie 与 Schoen [29] 以及 Pogorelov [30] 的经典工作，完备的双侧稳定极小曲面必为平面，且无需任何面积增长条件。

这一类比早已指导了 Allen–Cahn 方程的若干重要进展：能量极小界面的正则性理论在 Savin 的结果中居于核心地位，Wang 与 Wei [31], [32] 以及 Chodosh 与 Mantoulidis [33] 则发展了稳定转变层的二阶估计。

不过，从这一几何图像过渡到稳定解的分类，仍有实质性的困难。首先，缺少能量界，就无法从有界重数的极小曲面（吹缩）极限入手。更深一层，水平集未必是极小曲面，而稳定性不等式 (1.2) 作用在环境空间中；因此若想利用与极小曲面的类比，关键的一步就是把它转化为单个水平集上的可用不等式。这里一个显著的困难在于：相邻的转变层即便互不相交且几乎平坦，彼此仍会相互作用，而控制这些相互作用，对于下文将要给出的稳定性不等式的几何形式至关重要。

1.3 主要结果

第一个主要结果确立稳定 De Giorgi 猜想在三维成立。记

$$g(t) := \tanh\left(\frac{t}{\sqrt{2}}\right),$$

它是 Allen–Cahn 方程典范的单调一维解，也称异宿解。

定理 1.1。

设 $u : \mathbb{R}^3 \rightarrow (-1, 1)$ 是 Allen–Cahn 方程 (1.1) 的经典解，且满足稳定性不等式 (1.2)。则存在 $e \in \mathbb{S}^2$ 与 $t_0 \in \mathbb{R}$ ，使得¹

$$u(x) = g(e \cdot x - t_0).$$

证明建立在两项已有的关键输入之上：

- Wang 与 Wei 关于转变层足够平坦的 Allen–Cahn 方程稳定解的正则性理论 [32]；
- [23] 中对自由边界 Allen–Cahn 问题相应于定理 1.1 的结论的证明。

与 [23] 的工作相比，证明定理 1.1 所缺的主要一环，是把半线性稳定性不等式充分精确地归约到零水平集上的一个几何稳定性不等式；这一归约现由命题 4.7 给出。一个密切相关的归约后稳定性不等式曾出现在 [23] 中：在那里，转变区的不同局部分量之间不通过 PDE 发生相互作用，而 Bernoulli 问题的分类结果提供了所需的局部曲率估计。相反，在本文所处理的半线性 Allen–Cahn 方程中，互不相交的转变层会通过各自的指数尾部发生相互作用；在尖锐的对数分离尺度下，这些相互作用可能与归约后稳定性不等式中的曲率项同阶。因此，要控制分离各层时产生的误差，就需要 Wang–Wei 理论的全部强度，包括最优分离估计、曲率估计，以及用多层 ansatz 作出的精确逼近。

如前所述，定理 1.1 在高一维推出 De Giorgi 原猜想，于是有下面的推论。

推论 1.2 (四维 De Giorgi 猜想)。

设 $u : \mathbb{R}^4 \rightarrow (-1, 1)$ 是式 (1.1) 的经典解，且满足 $\partial_{x_4} u > 0$ 。则存在 $e \in \mathbb{S}^3$ (其中 $e_4 > 0$) 与 $t_0 \in \mathbb{R}$ ，使得

$$u(x) = g(e \cdot x - t_0).$$

证明。

由于极限剖面 $u^\pm(x') := \lim_{x_4 \rightarrow \pm\infty} u(x', x_4)$ (其中 $x' \in \mathbb{R}^3$) 是 $\mathbb{R}^3$ 中式 (1.1) 的稳定解，定理 1.1 表明二者或者是常数 ± 1 ，或者是一维剖面，从而都在紧支撑扰动下极小化能量。于是，Alberti、Ambrosio 与 Cabré 的局部极小性定理 [15] 中的定理 4.4 蕴含： u 在介于 u^- 与 u^+ 之间的竞争者中是极小的；又因为极限剖面 $u^\pm$ 自身就是极小元，把任意竞争者 v 替换为 $\max(u^-, \min(v, u^+))$ 不会增大其能量。因此 u 是局部极小元，再由 Savin 的分类 [13] 中的定理 2.3 即知它是一维的。 $\square$

¹每个有界解都取值于 $[-1, 1]$ ；而且，只要取到其中任一端点，该解就恒为常数。因此 $\mathbb{R}^3$ 中除上述一维解之外，其余的有界稳定解只有 $u \equiv \pm 1$ 。

1.4 相关工作

稳定性不等式的几何形式可追溯到 Sternberg 与 Zumbrun [34], 并构成 Farina、Sciunzi 与 Valdinoci 对称性结果 [35] 的基础——它们通过稳定性直接控制水平集的曲率。稳定性与界面几何之间的联系也出现在极小曲面极限中。对能量有界的序列, Hutchinson 与 Tonegawa [6] 建立了向稳恒变分流(即广义极小曲面)的收敛。Tonegawa [8] 对这类极限导出了几何稳定性不等式, Tonegawa 与 Wickramasekera [9] 则利用对面积问题更强的理解——尤其是 Wickramasekera 关于稳定变分流的正则性理论 [36]——发展了相应的正则性理论。

一个互补的问题是给出转变层自身的定量估计。早期结果包括 Caffarelli 与 Córdoba 在 Lipschitz 假设下对极小层得到的一致一阶正则性 [37]。对于含若干层的构型, 各层之间的相互作用带来额外的困难; 这一相互作用早在 del Pino、Kowalczyk 与 Wei 的构造 [38] 中就被识别, 并用 Toda 系统加以描述。该方向的一个重大进展是 Wang 与 Wei 的工作 [31], [32]: 他们在处理这些精细相互作用的同时, 得到了稳定转变层的二阶估计。

Wang-Wei 分析的重要性远超出上述工作原本针对的问题: 在 Wang-Wei [31] 的基础上, Chodosh 与 Mantoulidis [33] 在三维流形上建立了曲率与分层分离估计, 并将其应用于极小曲面极限中的重数与 Morse 指标问题以及著名的 Yau 猜想。此外, Wang-Wei 估计在能量增长假设下的整体分类结果中也居于核心地位: 在 $\mathbb{R}^4$ 中立方能量增长条件下, Florit-Simon 与 Serra [26] 证明了稳定解的一维性; Florit-Simon [27] 又把这一分类推广到有限指标解。

与这些刚性结果并行, 另一条线索关注有限指标解及其端的几何。在构造一方, del Pino、Kowalczyk 与 Wei [39] 在 $\mathbb{R}^3$ 中构造了逼近非退化、嵌入的有限全曲率极小曲面之放缩的解, 且 Morse 指标相同。在正则性一方, Wang 与 Wei [31] 证明: 在 $\mathbb{R}^2$ 中有限 Morse 指标蕴含有限多个端与线性能量增长。在 $\mathbb{R}^3$ 中, Florit-Simon [27] 刻画了具二次能量增长的有限指标解的端。在同样的假设下, Liu、Wang、Wei 与 Wu [40] 用指标控制了端的个数, 并证明指标一解具有轴对称性。

1.5 本工作的历史与人工智能的使用

本工作建立在多年关于稳定 Allen-Cahn 猜想的研究之上。几何策略最初在自由边界情形下发展起来 [23], 那里的不同转变层互不作用。借助这些思想与结果, 随后我们转向经典 Allen-Cahn 方程, 而剩下的主要困难正是控制相邻层之间的相互作用。

在研究坏集含于单个球的这一模型情形(见定义 3.1) 时, 我们向 ChatGPT 6 Pro 讲解了自己的思路, 其中包括我们的预期: 几何误差应像自由边界问题中那样, 随曲率减小而改善。在这些讨论之后, ChatGPT 于 2026 年 9 月 5 日给出了命题 4.7 在一般情形下的一个初步版本, 其中的相互作用误差可用粗糙的三次面积界求和。这一估计建立在 Wang-Wei [32] 对相互作用层的定量分析之上, 也是我们后来实际用到的唯一点来自 AI 的数学输入。

到那时, 我们已清楚如何把证明收尾。随后我们找到了该估计的一个更高效的证明, 并利用 [23] 的几何策略完成了分类。在撰写文稿的过程中, 我们还借助 AI 帮助起草与修改文字。

1.6 一篇独立的工作

在本文临近完稿时, 我们获悉 Liu、Luo、Wang、J. Wei、Y. Wei 与 Wu [41] 独立地给出了稳定 De Giorgi 猜想在 $\mathbb{R}^3$ 的一个证明。

1.7 文章结构

全文结构如下。第 2 节回顾几何稳定性与 Wang-Wei 估计。第 3 节构造坏集, 并证明存在任意宽的干净环境。第 4 节推出几何稳定性不等式, 进而在第 5 节给出稳定解的分类。最后, 附录 A 证明分类论证中用到的辅助性面积-曲率估计。

致谢

H.C. 得到瑞士国家科学基金会 (SNSF) 项目 PZ00P2_202012 的资助。X.F. 得到 SNSF 项目 PZ00P2_208930、瑞士教育研究与创新国务秘书处 (SERI) 合同 MB22.00034 以及西班牙 AEI 项目 PID2024-156429NB-I0 的资助。E.F. 与 J.S. 得到欧洲研究理事会 (ERC) 第 948029 号资助协议的资助。

2 预备知识

本节先给出一批预备结果及其推论, 它们在整个证明中都会反复用到。

2.1 记号

除另有说明外, 本文中的 u 恒指式 (1.1) 在 $\mathbb{R}^3$ 中的有界整体稳定解。记

$$\sigma_0 := \int_{\mathbb{R}} g'(t)^2 dt = \frac{2\sqrt{2}}{3}, \quad \Sigma_\lambda = \{u = \lambda\}.$$

再定义

$$\mathcal{A}(u)^2 = \frac{|D^2u|^2 - |\nabla|\nabla u||^2}{|\nabla u|^2} \quad \text{在 } \{\nabla u \neq 0\} \text{ 上, } \mathcal{A} = 0 \quad \text{在 } \{\nabla u = 0\} \text{ 上.}$$

在一个正则水平集上, 取法向 $\nu = \nabla u / |\nabla u|$, 并设第二基本形式为 $\Pi(X, Y) = -\langle D_X \nu, Y \rangle$, 则有

$$\mathcal{A}^2 = |\Pi_{\Sigma_\lambda}|^2 + |\nabla_{\Sigma_\lambda} \log |\nabla u||^2.$$

此外还有恒等式

$$\mathcal{A}^2 |\nabla u|^2 = |D^2u|^2 - |\nabla|\nabla u||^2 \quad \text{几乎处处.}$$

用 $H = \text{tr } \Pi$ 表示平均曲率。对尺寸相同的实矩阵 A 与 B , 记 $A : B := \sum_{i,j} A_{ij} B_{ij} = \text{tr}(A^T B)$ 为它们的 Frobenius 内积。

2.2 已知工具

稳定性不等式有一个用 $\mathcal{A}$ 表述的标准形式, 即 Sternberg-Zumbrun 不等式 [34]:

引理 2.1 (Sternberg-Zumbrun 不等式)。

设 $U \subset \mathbb{R}^3$ 为开集, u 是式 (1.1) 在 U 中的经典稳定解。则对每个 $\varphi \in C_c^{0,1}(U)$,

$$\int_U \mathcal{A}^2 |\nabla u|^2 \varphi^2 \leq \int_U |\nabla u|^2 |\nabla \varphi|^2.$$

下面回顾 Allen-Cahn 方程经典解的标准正则性估计:

引理 2.2 (一致正则性与衰减)。

式 (1.1) 的每个有界整体经典解都满足

$$|u| \leq 1, \quad |\nabla u| \leq \frac{1}{\sqrt{2}}, \quad |D^m u| \leq C_m \quad \text{对 } m \geq 2, \quad (2.1)$$

其中 C_m 只依赖于 m 。另有普适常数 $c, C > 0$, 使得对一切 $x \in \mathbb{R}^3$ 成立

$$1 - |u(x)| + |\nabla u(x)| + |D^2 u(x)| \leq C e^{-c \text{dist}(x, \Sigma_0)}.$$

特别地, 无零点的有界整体解必恒等于 1 或 -1 。

证明。

一致界来自 [26] 的引理 2.1 与内部椭圆估计。指数衰减来自 [42] 引理 4.2 的证明, 而该证明在 $\mathbb{R}^3$ 中同样适用。 □

2.3 Wang-Wei 的估计

这里给出 Wang-Wei 的结果 [32] 的一些推论 (由于我们在式 (1.1) 里对双阱势的选取与 [32] 相差一个常数因子, 相应的归一化也作了调整)。下文中 B'_r 表示 $\mathbb{R}^2$ 中半径为 $r > 0$ 的球。

定理 2.3 (Wang-Wei 分层与剖面估计)。

存在普适常数 $c, c_0, C, \bar{\delta} > 0$ 与 $R_* \geq 4$, 使得下述结论成立。

设 $R \geq R_*$, 且 $u : B_{2R} \rightarrow (-1, 1)$ 是式 (1.1) 的稳定解。假设对每个 $x \in B_{3R/2}$ 都存在 $e_x \in \mathbb{S}^2$ 与 $a_x \in \mathbb{R}$, 使得

$$\sup_{y \in B_2(x)} |u(y) - g(e_x \cdot y + a_x)| \leq \bar{\delta}. \quad (2.2)$$

则在 $\Sigma_0 \cap B_R$ 上有 $|\nabla u| \geq c_0$, 于是 Σ_0 在该处光滑。

对每个 $x_0 \in \Sigma_0 \cap B_R$, 存在以 x_0 为中心的标准正交坐标 (x', s) , 以及 B'_{8cR} 上一列依次排列的光滑有序零图 $f_1 < \dots < f_Q$, 它们整体包含在 $B_{R/2}(x_0)$ 中, 并具有下面这些性质: 记

$$\Gamma_j = \{(x', f_j(x')) : x' \in B'_{4cR}\}.$$

则:

(i) 图表示与几何估计。

$$\begin{aligned} \Sigma_0 \cap B_{2cR}(x_0) &= \bigcup_{j=1}^Q (\Gamma_j \cap B_{2cR}(x_0)), \\ \|Df_j\|_\infty + R \|\Pi_{\Gamma_j}\|_{C^{0,1}} + R^2 \|H_{\Gamma_j}\|_{C^{0,1/2}} &\leq C. \end{aligned} \quad (2.3)$$

(ii) 叶的分离。

$$\text{dist}(y, \Gamma_k) \geq \sqrt{2} \log R - C \quad \text{对 } y \in \Gamma_j \cap B_{2cR}(x_0), \quad k \neq j. \quad (2.4)$$

(iii) **剖面逼近**。记 d_j 为到延拓后的第 j 张图的带号距离，在其上方取正。每个 d_j 在 $B_{cR}(x_0)$ 内光滑，且存在 $\sigma \in \{-1, 1\}$ ，使得未平移的剖面满足

$$\begin{aligned} \|u - G_0\|_{C^2(B_{cR}(x_0))} &\leq CR^{-2}, \\ \sigma G_0(x) &= \sum_{j=1}^Q (-1)^{j-1} g(d_j(x)) - \frac{1+(-1)^Q}{2}. \end{aligned} \quad (2.5)$$

证明。

由 [32] 的推论 1.3 (第 4 页) 及其证明 (第 71 页)，并结合三维极小曲面的稳定 Bernstein 定理，

$$|\nabla u| \geq c_0, \quad \mathcal{A}(u) \leq CR^{-1} \quad \text{在 } B_{R/4}(x_0) \cap \{|u| \leq 9/10\} \text{ 内}. \quad (2.6)$$

这就是说 u 满足 Wang-Wei 估计所需的“分层假设”。于是 [32] 的引理 2.2、式 (3.3)、引理 3.1、式 (11.1) 及其下方显示式、命题 10.1 给出式 (2.3)，而 [32] 的命题 10.1 对应式 (2.4)。

至于式 (2.5)，记 G_h 为 [32] 第 (4.3) 式与命题 4.1 中构造的、经过平移与截断的剖面，并用我们原来的坐标来表达它 (本质上它就是式 (2.5) 中的剖面，只是在法方向上带有平移 $h_j(x)$ ，并且在远离各层之处被截断)。由 [32] 的式 (11.1) 及其后的显示式 (第 67 页) 与引理 4.6，

$$\|u - G_h\|_{C^2(B_{cR}(x_0))} + \sup_j \|h_j\|_{C^2(\Gamma_j)} \leq CR^{-2}. \quad (2.7)$$

接下来注意到：去掉截断与去掉平移所带来的误差可以求和，并且对叶的个数一致。事实上，式 (2.4) 一致地控制了与任一定点的距离不超过 $C \log R$ 的那些叶的个数，而其余各叶及其前两阶导数的贡献由指数衰减可求和。因此 [32] 第 4.1 节的截断构造与式 (2.7) 给出

$$\|G_h - G_0\|_{C^2(B_{cR}(x_0))} \leq CR^{-2},$$

其中的 C 与 Q 无关。把上述估计合起来即得式 (2.5)。 □

满足式 (2.2) 的球被视作“好球” (参见下文的干净球)，因为在其中 $\{u = 0\}$ 是光滑的并带有相应的估计。条件 (2.2) 与稳定性不等式很容易联系起来，下面是我们真正要用到的形式：

引理 2.4。

对每个 $\varepsilon > 0$ ，存在 $\delta > 0$ ，使得只要式 (1.1) 的有界整体稳定解 u 满足

$$\int_{B_2} \mathcal{A}^2 |\nabla u|^2 \leq \delta,$$

就存在 $e \in \mathbb{S}^2$ 与 $t_0 \in \mathbb{R}$ ，使得

$$\|u(x) - g(e \cdot x - t_0)\|_{C^2(B_2)} < \varepsilon.$$

证明。

固定 $\varepsilon > 0$ 。由紧性 (如 [26] 定理 3.4 证明中的做法)，存在 $\lambda > 0$ ，使得凡满足 $|u(0)| > 1 - \lambda$ 的解，在 $C^2(B_2)$ 中与某个常数 ± 1 的距离都不超过 $\varepsilon/2$ 。而这些常数是平移异宿解的极限，故此时结论成立。若在余下的情形中，当 $\delta \downarrow 0$ 时结论不成立，则紧性给出 $C_{\text{loc}}^2(\mathbb{R}^3)$ 中的一个稳定极限 u_∞ ，且 $|u_\infty(0)| \leq 1 - \lambda$ 。于是在 $B_2 \cap \{\nabla u_\infty \neq 0\}$ 上使用 Fatou 引理可得曲率消失，从而在 B_2 中 $\mathcal{A}(u_\infty) \equiv 0$ 。但这样一来 (见 [26] 的引理 2.6 与命题 2.8) u_∞ 就是一个平移异宿解，与在 $C^2(B_2)$ 中逼近不成立相矛盾。 □

3 坏集与有界簇

定理 2.3 与引理 2.4 十分自然地引出“坏球”这一概念；下面沿 [23] 的做法将它引入。核心想法是：

- 离坏球越远， $\{u = 0\}$ 就越接近一张极小曲面，参见式 (2.3)；
- 坏集则由稳定性来控制，这依靠引理 2.1。

一次性固定引理 2.4 在 $\varepsilon = \min \left\{ \frac{\delta}{2}, \frac{1}{100} \right\}$ 时给出的普适常数 $\delta > 0$ ，其中 δ 来自定理 2.3。这一取法与 u 无关。

定义 3.1 (坏集、干净球)。

设 u 是式 (1.1) 的有界整体稳定解，令

$$\mathcal{X} = \left\{ x : \int_{B_2(x)} \mathcal{A}^2 |\nabla u|^2 > \delta \right\}. \quad (3.1)$$

取一个极大的集合 $\mathcal{Z} \subset \mathcal{X}$ ，使得其中不同两点 z, z' 恒有 $|z - z'| \geq 1$ 。若 $B_{2R}(x) \cap \mathcal{X} = \emptyset$ ，则称球 $B_R(x)$ 是干净的。

由引理 2.4 以及 δ 的这一定法, 半径 $R \geq R_*$ 的每个干净球都满足式 (2.2)。至于 $\mathcal{X}$ 之外的零点, 同样的 C^2 逼近给出: 沿剖面方向的导数在该点的半单位球内有一致的正下界。于是, 必要时把 c_0 改小一些, 便有

$$|\nabla u| \geq c_0 \quad \text{在 } \Sigma_0 \setminus \mathcal{X}. \quad (3.2)$$

此外, 对每个 $y \in \Sigma_0 \setminus \mathcal{X}$, $\Sigma_0 \cap B_{\frac{1}{2}}(y)$ 是一张斜率一致有界的图。集合 $\mathcal{Z}$ 局部有限; 以它的各点为中心的单位球覆盖 $\mathcal{X}$, 而半径加倍之后这些球的重数不超过 5^3 。

注记 3.2.

对这个固定的 δ , $\mathcal{X} = \emptyset$ 蕴含 u 是一维的。事实上, 引理 2.4 在每个 $x \in \mathbb{R}^3$ 附近都可用, 故定理 2.3 的假设对任意大的 R 都成立; 令 $R \rightarrow \infty$ 即知 u 是一维的 (例如参见式 (2.6))。

与 [23] 的引理 10.8 类似, 一个对数截断的论证能找出任意宽的干净环境:

引理 3.3 (干净环域的存在)。

设 $\mathcal{X} \neq \emptyset$ 。对每个 $L \geq 1$ 与 $\Lambda > 0$, 存在 $z_\Lambda \in \mathcal{Z}$ 与 $R_\Lambda > 1$, 使得

$$\text{dist}(x, \mathcal{X}) \geq L \quad \text{对一切 } x \in B_{R_\Lambda + \Lambda}(z_\Lambda) \setminus B_{R_\Lambda}(z_\Lambda). \quad (3.3)$$

证明。

这一论证是 [23] 中引理 10.8 证明的一个变体。首先注意到, 由引理 2.1 与引理 2.2,

$$\int \mathcal{A}^2 |\nabla u|^2 \eta^2 \leq \int |\nabla u|^2 |\nabla \eta|^2 \leq \frac{1}{2} \int |\nabla \eta|^2 \quad \text{对一切 } \eta \in C_c^{0,1}(\mathbb{R}^3). \quad (3.4)$$

取 η 在 $B_t(a)$ 上恒等于 1、支撑在 $B_{2t}(a)$ 中且 $|\nabla \eta| \leq \frac{C}{t}$, 并利用上面提到的重数界, 得当 $t \geq 1$ 时

$$\int_{B_t(a)} \mathcal{A}^2 |\nabla u|^2 \leq Ct, \quad \delta \#(\mathcal{Z} \cap B_t(a)) \leq C \int_{B_{t+2}(a)} \mathcal{A}^2 |\nabla u|^2 \leq Ct. \quad (3.5)$$

现在, 若式 (3.3) 不成立, 则对每个 $z \in \mathcal{Z}$ 与每个 $r > 1$, 都存在 $q \in \mathcal{Z}$ 使得 $r - L - 1 < |q - z| < r + \Lambda + L + 1$ 。取这样一系列互不相交的区间并利用式 (3.5), 由此得到

$$ct \leq \#(\mathcal{Z} \cap B_t(z)) \leq Ct \quad \text{对一切 } z \in \mathcal{Z}, t \geq t_0,$$

其中 $t_0 \geq 2$ 与 $c, C > 0$ 只依赖于 L, Λ 。这些线性界允许我们构造一个对数截断函数, 它的 Dirichlet 能量小于它所保留的曲率质量:

固定 $z_0 \in \mathcal{Z}$, 取 R 充分大, 并令

$$d_R(x) = \text{dist} \left(x, \bigcup_{q \in \mathcal{Z} \cap B_R(z_0)} \overline{B}_2(q) \right).$$

对 $3t_0 \leq t \leq R$, 集合 $\mathcal{Z} \cap B_R(z_0)$ 的极大 t -分离子集至多有 $C \frac{R}{t}$ 个点, 因为其互不相交的 $\frac{t}{3}$ -球各含至少 ct 个中心, 而这些中心全都落在 $B_{2R}(z_0)$ 内。由极大性, 相应的 $3t$ -球覆盖 $\{d_R < t\}$ 。当 $t < 3t_0$ 时, 我们改为把原来的每个球 $B_2(q)$ 放大到 $B_{t+2}(q)$ 来覆盖该集合, 因为这样的球至多有 CR 个。这两个覆盖给出

$$|\{d_R < t\}| \leq CR(1+t)^2 \quad \text{当 } 0 < t \leq R.$$

由于截断函数 $\eta_R = \left(1 - \frac{\log(1+d_R)}{\log(1+R)}\right)_+$ 在定义 d_R 时所用的那些球 $B_2(q)$ 上等于 1, 于是

$$\int \mathcal{A}^2 |\nabla u|^2 \eta_R^2 \geq 5^{-3} \sum_{q \in \mathcal{Z} \cap B_R(z_0)} \int_{B_2(q)} \mathcal{A}^2 |\nabla u|^2 \geq cR,$$

而前面的体积界则给出

$$\begin{aligned} \int |\nabla \eta_R|^2 &\leq \frac{1}{(\log(1+R))^2} \int_{\{0 < d_R < R\}} \frac{dx}{(1+d_R)^2} \\ &\leq \frac{1}{(\log(1+R))^2} \left(\frac{|\{d_R < R\}|}{(1+R)^2} + 2 \int_0^R \frac{|\{d_R < t\}|}{(1+t)^3} dt \right) \\ &\leq \frac{CR}{\log(1+R)}, \end{aligned}$$

这与式 (3.4) 在 $R \rightarrow \infty$ 时矛盾。

□

定义 3.4 (有界簇及其邻域)。

设 $\mathcal{X} \neq \emptyset$, 固定 $L_0 \geq 2$ 与 $\Lambda \geq 32L_0$. 在引理 3.3 中取 $L = 8L_0$ 选出 z_Λ, R_Λ , 并令

$$\mathcal{X}_\Lambda = \mathcal{X} \cap B_{R_\Lambda}(z_\Lambda), \quad \mathcal{Z}_\Lambda = \mathcal{Z} \cap B_{R_\Lambda}(z_\Lambda), \quad N = \#\mathcal{Z}_\Lambda,$$

再定义到这一有界簇的距离及其邻域

$$\mathcal{D}(x) = \text{dist}(x, \mathcal{X}_\Lambda), \quad \mathcal{S}_\alpha = \{x : \mathcal{D}(x) < \alpha\} \quad (\alpha > 0),$$

并令 $\Sigma = \Sigma_0 \cap \{L_0 < \mathcal{D} < \frac{\Lambda}{3}\}$.

由于式 (3.3) 中的环域与每个以 $z \in \mathcal{X}$ 为中心、半径为 $8L_0$ 的球 $B_{8L_0}(z)$ 都不相交, 于是

$$\begin{aligned} |z - z_\Lambda| &\leq R_\Lambda - 8L_0 && \text{对一切 } z \in \mathcal{X}_\Lambda, \\ |z - z_\Lambda| &\geq R_\Lambda + \Lambda + 8L_0 && \text{对一切 } z \in \mathcal{X} \setminus \mathcal{X}_\Lambda. \end{aligned} \quad (3.6)$$

特别地, $\overline{\mathcal{X}_\Lambda}$ 非空且紧, 并且 $1 \leq N < \infty$. 又 $\mathcal{X}_\Lambda$ 的每一点到 $\mathcal{Z}_\Lambda$ 的距离都不超过 1, 由重数界,

$$\mathcal{S}_\alpha \subset \bigcup_{z \in \mathcal{Z}_\Lambda} B_{\alpha+1}(z), \quad \delta N \leq \sum_{z \in \mathcal{Z}_\Lambda} \int_{B_2(z)} \mathcal{A}^2 |\nabla u|^2 \leq 5^3 \int_{\mathcal{S}_2} \mathcal{A}^2 |\nabla u|^2. \quad (3.7)$$

再有, 若 $\mathcal{D}(x) < \frac{\Lambda}{3}$, 则簇外的每个坏点到 x 的距离至少为 $\Lambda + 16L_0 - \mathcal{D}(x)$, 而它大于 $\mathcal{D}(x)$. 由此

$$\text{dist}(x, \mathcal{X}) = \mathcal{D}(x) \quad \text{只要 } \mathcal{D}(x) < \frac{\Lambda}{3}. \quad (3.8)$$

特别地, 当 $L_0 < \mathcal{D}(x) < \frac{\Lambda}{3}$ 时有 $B_{\mathcal{D}_\frac{x}{2}}(x) \cap \mathcal{X} = \emptyset$, 从而 $B_{\mathcal{D}_\frac{x}{4}}(x)$ 是干净球. 于是由式 (3.2), Σ 是一张光滑嵌入曲面, 且

$$|\Pi_\Sigma(y)| \leq C\mathcal{D}(y)^{-1}, \quad |H_\Sigma(y)| \leq C\mathcal{D}(y)^{-2} \quad \text{对一切 } y \in \Sigma. \quad (3.9)$$

当 $\mathcal{D}(y) \geq 4R_*$ 时, 这些界来自定理 2.3; 在其余尺度上, 它们来自式 (3.2) 与引理 2.2.

4 稳定性的一种几何形式

本节在定义 3.4 的设定下工作, 并取 L_0 充分大. 本节的目标是: 在 u 的零水平集上、远离坏集之处, 导出一个几何形式的稳定性不等式, 同时在坏集附近保留正曲率的贡献.

定义 4.1 (法坐标与端点).

固定 $y \in \Sigma$, 并令截断距离为

$$T(y) = 3 \log \mathcal{D}(y).$$

将法向量取向 u 增大的一侧, 并记 F 为相应的 Fermi 坐标映射:

$$\nu(y) = \frac{\nabla u(y)}{|\nabla u(y)|}, \quad F(y, t) = y + t\nu(y).$$

沿每条法向射线移动, 一旦与另一个零点等距、或到达距离 $T(y)$ 时便停止 (以先发生者为准); 所得的带符号端点记为 $b_\pm(y)$. 形式化地,

$$b_\pm(y) = \pm \sup \left\{ s \in [0, T(y)] : \begin{array}{l} y \text{ 是 } \Sigma_0 \text{ 中到 } F(y, \pm t) \text{ 的唯一最近点} \\ \text{对每个 } 0 \leq t < s \end{array} \right\}. \quad (4.1)$$

于是, 若在截断之前未出现等距点, 则 $b_\pm(y) = \pm T(y)$. 所张成的法向区间为

$$\{F(y, t) : b_-(y) < t < b_+(y)\}. \quad (4.2)$$

为方便起见, 将该区间在两端各延伸一个单位, 记为

$$\mathcal{N} = \{(y, t) : y \in \Sigma, b_-(y) - 1 < t < b_+(y) + 1\}. \quad (4.3)$$

当 L_0 充分大时, F 在 $\mathcal{N}$ 上局部给出光滑的法坐标 (这一点在下方加以说明). 需要注意的是: 式 (4.2) 中诸法向区间的像两两不交, 但它们在 $\mathcal{N}$ 中的延伸相互重叠, 因此 F 未必在 $\mathcal{N}$ 上整体单射.

给定 $(y, t) \in \mathcal{N}$, 取 Σ 中 y 的一个开邻域 $\Gamma \subset \Sigma$, 使上述坐标在 Γ 上单射, 且满足 $\Gamma \times \{t\} \subset \mathcal{N}$, 并记

$$\Gamma^t = F(\Gamma, t), \quad \Gamma^0 = \Gamma.$$

下文 Γ^t 上的各量都在 $F(y, t)$ 处取值, 而 Γ 上的各量则在 y 处取值. 环境空间中的函数均与 F 复合; 特别地, 记 $u(y, t) = u(F(y, t))$, 则 $\partial_t u(y, t) = \partial_t(u \circ F)(y, t) = \nabla u(F(y, t)) \cdot \nu(y)$.

下面记录若干辅助估计, 供后文引用.

引理 4.2 (辅助估计).

在上述设定下, 当 L_0 充分大时下列结论成立, 且所用常数均为普适常数.

(i) **Fermi 坐标.** 对每个 $y \in \Sigma$, 存在 Σ 中 y 的一个开邻域 Γ , 使得 F 在

$$\Gamma \times [-4 \log \mathcal{D}(y) - 1, 4 \log \mathcal{D}(y) + 1] \quad (4.4)$$

上单射。此外，它在 (y, t) 处的 Jacobi 行列式为 $1 + O(|t|\mathcal{D}(y)^{-1})$ 。

(ii) **截断与端点界。** 截断距离满足

$$|\nabla_{\Sigma} T(y)| \leq 3\mathcal{D}(y)^{-1} \leq 1 \quad \text{几乎处处} \quad (4.5)$$

式 (4.1) 中的端点函数 $b_{\pm}$ 局部 Lipschitz，且满足

$$-T(y) \leq b_{-}(y) \leq -\frac{\log \mathcal{D}(y)}{2}, \quad \frac{\log \mathcal{D}(y)}{2} \leq b_{+}(y) \leq T(y), \quad |\nabla_{\Sigma} b_{-}| + |\nabla_{\Sigma} b_{+}| \leq C \quad \text{几乎处处} \quad (4.6)$$

(iii) **法向各量的估计。** 对 $y \in \Sigma$,

$$|\partial_t u(y, t) - g'(t)| \leq C\mathcal{D}(y)^{-2}e^{\sqrt{2}|t|} \quad \text{若} \quad |t| \leq \frac{\log \mathcal{D}(y)}{2}. \quad (4.7)$$

在由等距所得的端点 $F(y, b_{\pm}(y))$ 处，记 $\nu_{\pm}$ 为相邻那一叶的单位法向量、在其最近点处取值，并取其定向使 $\nu_{\pm} \cdot \nu(y) > 0$ ，即在该叶上与 ∇u 反向。于是

$$|\nu(y) - \nu_{\pm}| \leq C\mathcal{D}(y)^{-1}(2|b_{\pm}(y)| - \sqrt{2} \log \mathcal{D}(y) + C). \quad (4.8)$$

证明。

固定 $y \in \Sigma$ ，令 $R = \mathcal{D}_4^y$ 。由式 (3.8)， $B_R(y)$ 是干净的。在其上应用引理 2.4 与定理 2.3。较大的图坐标卡向内部限制之外延伸的距离与 $\mathcal{D}(y)$ 可比。取 L_0 足够大使得 $4 \log \mathcal{D}(y) + 2 < cR$ ，于是式 (4.4) 中的法向线段及其单位邻域都落在 $B_c R(y)$ 之内，且每一个竞争的最近零点也都在 $B_2 c R(y)$ 之内。这些是 Σ_0 的坐标卡，可能延伸到 Σ 之外。

第 (i) 部分。 法向映射 F 在 Σ 中 y 的某个邻域上、法向范围为式 (4.4) 时的单射性，以及 Jacobi 行列式的界，都是干净球上曲率界（即式 (2.3)）的直接推论。那里还有投影导数的有界性，参见 [32] 的引理 3.1、其式 (3.6) 与引理 3.5。

第 (ii) 部分。 式 (4.5) 的界仅由 $\mathcal{D}$ 的 1-Lipschitz 性质即得。至于式 (4.6)，注意由式 (2.4)，等距端点满足 $|b_{\pm}(y)| \geq \frac{\log \mathcal{D}(y)}{\sqrt{2}} - C \geq \frac{\log \mathcal{D}(y)}{2}$ ，这里 L_0 已充分大。若 $b_{\pm}(y)$ 是所谓的“截断”端点，即 $|b_{\pm}(y)| = T(y) = 3 \log \mathcal{D}(y)$ ，则式 (4.6) 中关于 $|b_{\pm}|$ 的界同样成立。

在法向范围式 (4.4) 内，起始叶有唯一的法向投影。在第一个等距端点之前，上半射线始终介于这一叶与其上方邻叶（若存在）之间。从此区域到任何其他叶的线段都会穿过更近的叶，故只有上方的邻叶能够竞争。最后，为证式 (4.6) 中的导数界：在上端点处记 r 为到下一叶的距离，并将其法向量 ν_{+} 定向为与 $\nu(y)$ 同向。由 [32] 引理 3.4 的近于平行性，得

$$\partial_t(t - r(F(y, t))) = 1 + \nu_{+} \cdot \nu(y) \geq 1 \quad \text{若} \quad t = b_{+}(y) < T(y).$$

由于 $|\nabla r| = 1$ 且 $|DF| \leq C$ ，隐函数定理即给出该端点的 Lipschitz 界。由式 (4.5)，与 T 取最小值后此界保持不变。对下半射线用下方邻叶作同样的论证，即得 b_{-} 的相应结论。沿一条法向射线，最近点区域是一个区间：对每个竞争的零点 q ，差 $|F(y, t) - q|^2 - t^2 = |y - q|^2 + 2t\nu(y) \cdot (y - q)$ 关于 t 是仿射的。这就证明了式 (4.2) 所述区域的结构。它们的像由式 (4.1) 中的唯一性条件保证两两不交。

第 (iii) 部分。 记 G_0 为式 (2.5) 中 u 的逼近，其在 C^2 意义下的误差为 $C\mathcal{D}(y)^{-2}$ 。减去各自的极限相位值后，由式 (2.4) 与 [32] 引理 3.6，其他各叶的剖面连同其一阶、二阶导数之和以 $C\mathcal{D}(y)^{-2}e^{\sqrt{2}|t|}$ 为界。这就证明了式 (4.7)。

最后证明式 (4.8)。考虑由等距所得的上端点。令 $P = F(y, b_{+}(y))$ ， $\ell = b_{+}(y) \leq 3 \log \mathcal{D}(y)$ ， $Q = y$ ， $\nu = \nu(y)$ 。记 Q_{+} 为上方邻叶上的最近点，其法向量 ν_{+} 按上文所取的定向。于是

$$P = Q + \ell\nu = Q_{+} - \ell\nu_{+}.$$

令 $e = \frac{\nu + \nu_{+}}{|\nu + \nu_{+}|}$ 。由 [32] 引理 3.4 的近于平行性，起始叶与上方叶在 $e^{\perp}$ 上、半径为 $\mathcal{D}(y)$ 的一个固定小倍数的圆盘上分别是函数 f 与 f_{+} 的图，且该圆盘含于前述较大的坐标卡内。由于 $Q_{+} - Q$ 平行于 e ，可取二者的公共水平坐标为零。在此圆盘上，由式 (2.4) 并利用普适常数 C_0 ，有

$$f_{+} - f - \sqrt{2} \log \mathcal{D}(y) + C_0 + 1 \geq 1. \quad (4.9)$$

将两图的平均曲率方程相减，并用式 (2.3)，得

$$\operatorname{div}(a\nabla(f_{+} - f)) = H_{+} - H, \quad |\nabla a| \leq C\mathcal{D}(y)^{-1}, \quad |H_{+} - H| \leq C\mathcal{D}(y)^{-2},$$

其中 a 一致椭圆， H, H_{+} 为各自的平均曲率，其法向量的 e -分量取为正。对式 (4.9) 中的正函数，仿照 [32] 引理 10.6 证明中的做法使用重标度的 Harnack 估计与内部梯度估计。其下界 1 吸收了非齐次项，从而给出

$$|\nabla(f_{+} - f)(0)| \leq C\mathcal{D}(y)^{-1}(f_{+}(0) - f(0) - \sqrt{2} \log \mathcal{D}(y) + C_0 + 1).$$

由于 $\nu \cdot e = \nu_+ \cdot e$, 由角平分线坐标得

$$\begin{aligned} f_+(0) - f(0) &= 2\ell(\nu \cdot e) \leq 2\ell, \\ |\nu - \nu_+| &= (\nu \cdot e)|\nabla(f_+ - f)(0)| \leq C\mathcal{D}(y)^{-1}(2\ell - \sqrt{2} \log \mathcal{D}(y) + C_0 + 1). \end{aligned}$$

这就在上端点处证明了式 (4.8)。下端点用下方邻叶的图 f_- 、正间隙 $f - f_-$ 与平均曲率差 $H - H_-$ 作同样论证即得。 $\square$

4.1 切向与法向估计

本节沿用定义 4.1 中的法坐标与端点。先记录法向导数所满足的方程。

引理 4.3 (沿 ∂_t 方向的求导方程)。

设 Γ 为带单位法向量 ν 的光滑定向曲面。在 $F(y, t) = y + t\nu(y)$ 确定光滑法坐标之处, 式 (1.1) 的解满足

$$(-\Delta + W''(u))\partial_t u = -|\Pi_{\Gamma^t}|^2 \partial_t u + 2\Pi_{\Gamma^t} : \nabla_{\Gamma^t}^2 u + \nabla_{\Gamma^t} H_{\Gamma^t} \cdot \nabla_{\Gamma^t} u. \quad (4.10)$$

其中 $\Gamma^t = F(\Gamma, t)$ 由法向量 $\nu(F(y, t)) = \nu(y)$ 定向, 并采用约定 $\Pi_{\Gamma^t} = -D\nu|_{T\Gamma^t}$ 与 $H_{\Gamma^t} = \text{tr } \Pi_{\Gamma^t}$ 。这里的 Hessian $\nabla_{\Gamma^t}^2 u$ 是内蕴的。

证明。

Fermi 坐标下的拉普拉斯算子为

$$\Delta = \partial_t^2 - H_{\Gamma^t} \partial_t + \Delta_{\Gamma^t}.$$

此外, [33] 附录 A 中的 (A.3) 与 (A.7) 两个变分公式 (在 $\mathbb{R}^3$ 中套用, 并取我们的符号约定) 给出

$$\begin{aligned} \partial_t H_{\Gamma^t} &= |\Pi_{\Gamma^t}|^2, \\ [\partial_t, \Delta_{\Gamma^t}]u &= 2\Pi_{\Gamma^t} : \nabla_{\Gamma^t}^2 u + \nabla_{\Gamma^t} H_{\Gamma^t} \cdot \nabla_{\Gamma^t} u \end{aligned}$$

再对 $\Delta u = W'(u)$ 关于 t 求导, 即得式 (4.10)。 $\square$

接下来在整个区域 $\mathcal{N}$ 上建立切向导数与衰减估计。

引理 4.4 (切向导数与衰减估计)。

在本节开头固定的设定下, 必要时增大 L_0 后, 对某个普适常数 C , 下列估计对一切 $(y, t) \in \mathcal{N}$ 成立:

$$|\nabla_{\Gamma^t} u| + |\nabla_{\Gamma^t}^2 u| \leq C\mathcal{D}(y)^{-2}, \quad (4.11)$$

$$|\nabla_{\Gamma^t} H_{\Gamma^t}| \leq C\mathcal{D}(y)^{-\frac{4}{3}}, \quad (4.12)$$

$$|\nabla u| + |D^2 u| \leq C(e^{-\sqrt{2}|t|} + \mathcal{D}(y)^{-2}). \quad (4.13)$$

证明。

固定 $y \in \Sigma$, 并在扩张后的坐标卡中, 取线段 $\{F(y, t) : 0 \leq t \leq b_+(y) + 1\}$ 的一个固定的单位邻域。记 r 为到上邻叶的距离 (当它出现在局部图中时)。定理 2.3 保证 r 在整个该邻域内光滑; 在其最近点处记该叶的法向量为 $\nu_+ = -\nabla r$ 。我们将用到的剖面近似 (它是式 (2.5) 的推论, 见下文) 为

$$\begin{aligned} \sum_{k=0}^2 |D^k(u - g(t) - g(r) + 1)| &\leq C\mathcal{D}(y)^{-2}, \\ \nabla r &= -\nu_+, \quad \partial_t r = -\nu(y) \cdot \nu_+, \quad \text{在 } F(y, t). \end{aligned} \quad (4.14)$$

这里求和中的导数是 $F(y, t)$ 处的环境欧氏导数, 而 t 表示到起始叶的局部带符号距离函数。若不存在上邻叶, 则省略项 $g(r) - 1$ 及其导数。任何进入或离开该坐标卡的叶, 到所考察的点 $F(y, t)$ 的距离至少为 $c\mathcal{D}(y)$, 因此它的剖面尾部及其前两阶导数指数小, 可吸收进 $C\mathcal{D}(y)^{-2}$ 的误差。

为得到式 (4.14), 取 $R = \mathcal{D}_4^{\frac{y}{4}}$ 套用式 (2.5)。这在 C^2 意义下把 $u - G_0$ 控制到 $C\mathcal{D}(y)^{-2}$, 故只需估计被省略剖面的贡献。对此注意到: 坐标卡内, 从保留叶之间的区域通往第 k 个更远叶的线段要穿过 k 个连续间隙, 于是由式 (2.4), 其长度至少为 $k(\sqrt{2} \log R - C)$ 。把区域扩大一个固定的单位邻域, 至多使该下界减少一个普适常数。因此, 剖面的指数衰减被省略尾部之和及其前两阶导数控制到

$$C \sum_{k \geq 1} e^{-\sqrt{2}k(\sqrt{2} \log R - C)} + CQe^{-cR} \leq CR^{-2}.$$

(这里用到带符号距离的导数有界以及 $Q \leq CR$; 最后一项对应距离至少为 cR 的叶。) 若无上邻叶, 则只剩下方一侧的求和。式 (4.14) 中的符号之所以成立, 是因为在这两张叶之间 $u > 0$, 而它们使 u 增大的法向指向相反方向。

若不存在上邻叶, 则由 $g(t)$ 在 Γ^t 上为常数, 式 (4.14) 立刻给出式 (4.11)。故可设有上邻叶。先设式 (4.1) 中的 $b_+(y)$ 为等距端点。定理 2.3 中的间距估计给出

$$e^{-\sqrt{2}b_+(y)}(2b_+(y) - \sqrt{2} \log \mathcal{D}(y) + C) \leq C\mathcal{D}(y)^{-1}. \quad (4.15)$$

在 $t = b_+(y) - s$ ($0 \leq s \leq b_+(y)$) 处, 邻叶的法向量 ν_+ 在到 $F(y, t)$ 的最近点处的取值, 与其在 $t = b_+(y)$ 处的取值之差至多为 $Cs\mathcal{D}(y)^{-1}$, 而 $r \geq b_+(y) + \frac{s}{2}$ 。把法向比较式 (4.8) 与式 (4.15) 结合, 得到

$$(g'(r) + |g''(r)|)|\nabla_{\Gamma^t} r| \leq C\mathcal{D}(y)^{-1}e^{-\sqrt{2}b_+(y) - \frac{s}{\sqrt{2}}}(2b_+(y) - \sqrt{2} \log \mathcal{D}(y) + C + s) \leq C\mathcal{D}(y)^{-2}. \quad (4.16)$$

式 (4.16) 对 $b_+(y) \leq t < b_+(y) + 1$ 同样成立: 距离 r 至多变化 1, 而由式 (2.3), 邻叶法向量 $\nu_+ = -\nabla r$ 至多变化 $C\mathcal{D}(y)^{-1}$; 此外, 对两张叶用式 (2.3) 得 $g'(r) \leq C\mathcal{D}(y)^{-1}$ 与 $|\nabla_{\Gamma^t}^2 r| \leq C\mathcal{D}(y)^{-1}$ 。由链式法则

$$\nabla_{\Gamma^t}^2 g(r) = g''(r)\nabla_{\Gamma^t} r \otimes \nabla_{\Gamma^t} r + g'(r)\nabla_{\Gamma^t}^2 r, \quad (4.17)$$

于是, 由于 $g(t)$ 在 Γ^t 上为常数, 由式 (4.14)、式 (4.16) 与式 (4.17) 可推出该半段区间上的式 (4.11)。反之, 若在达到等距之前端点就已截断, 即 $b_+(y) = T(y)$, 则 $r(y, T(y)) \geq T(y)$ 。若存在 $t_0 \in [0, T(y)]$ 使 $r(y, t_0) < T(y)$, 则由 1-Lipschitz 性质, 在 $[0, T(y)]$ 上恒有 $r(y, t) \leq r(y, t_0) + |t - t_0| < 2T(y) = 6 \log \mathcal{D}(y)$ 。于是由 [32] 的引理 3.4 与式 (4.14) 得 $\partial_t r \leq 0$, 从而 $r(y, T(y)) \leq r(y, t_0) < T(y)$, 矛盾。故在该线段上 $r(y, t) \geq T(y)$ 。在附加的单位窄带上利用 $|\partial_t r| \leq 1$, 邻叶尾部满足

$$\begin{aligned} r(y, t) &\geq T(y) - (t - T(y))_+ \geq T(y) - 1, \\ \sum_{k=0}^2 |D^k(g(r) - 1)| &\leq Ce^{-\sqrt{2}r(y, t)} \leq C\mathcal{D}(y)^{-3\sqrt{2}} \leq C\mathcal{D}(y)^{-2}, \quad 0 \leq t < T(y) + 1 \end{aligned}$$

(这里用到 $|\nabla r| = 1$ 、 $|D^2 r| \leq C\mathcal{D}(y)^{-1}$ 以及 $T(y) = 3 \log \mathcal{D}(y)$ 。) 这就在截断情形 (连同其外部单位窄带) 也建立了式 (4.11)。改用下邻叶, 同一论证证明 $t \leq 0$ 时的式 (4.11)。对 $(y, t) \in \mathcal{N}$, 其余每张叶的距离都至少为 $|t| - 2$, 把指数衰减的剖面前两阶导数求和, 即得式 (4.13)。

对式 (4.12), 式 (2.3) 中的估计给出

$$\|H_\Gamma\|_{C^{0, \frac{1}{2}}} \leq C\mathcal{D}(y)^{-2}, \quad \|\Pi_\Gamma\|_{C^{0, 1}} \leq C\mathcal{D}(y)^{-1}, \quad (4.18)$$

其中各范数都在固定大小的局部片上取值。为估计 DH_Γ , 我们把 H_Γ 的 Hölder 界与 $D^2 H_\Gamma$ 的一致界插值。为得到后者, 注意式 (4.7) 给出 $|\nabla u| \geq g'(0) - C\mathcal{D}(y)^{-2} \geq c > 0$ 在每个零点处成立; 把它与式 (1.1) 的内部正则性结合, 由隐函数定理便得一致的 C^4 图界, 从而在图坐标下 $|D^2 H_\Gamma| \leq C$ 。把这一界与式 (4.18) 结合, 并沿坐标线套用 Taylor 公式, 得到

$$|DH_\Gamma| \leq C\mathcal{D}(y)^{-2}h^{-\frac{1}{2}} + Ch \leq C\mathcal{D}(y)^{-\frac{4}{3}}, \quad h = \mathcal{D}(y)^{-\frac{4}{3}}. \quad (4.19)$$

平行曲面的第二基本形式为 $\Pi_{\Gamma^t} = \Pi_\Gamma(\text{Id} - t\Pi_\Gamma)^{-1}$, 对其迹求导并利用式 (4.18) 与式 (4.19), 得

$$|\nabla_{\Gamma^t} H_{\Gamma^t}| \leq C|\nabla_\Gamma H_\Gamma| + C|t|\|\Pi_\Gamma\|\|\nabla_\Gamma \Pi_\Gamma\| \leq C\mathcal{D}(y)^{-\frac{4}{3}} + C\mathcal{D}(y)^{-2} \log \mathcal{D}(y) \leq C\mathcal{D}(y)^{-\frac{4}{3}},$$

这就证明了式 (4.12)。 □

最后, 下面这条引理沿法向射线比较 $|\nabla u|$ 与 $\partial_t u$, 并证明过了端点之后 $(\partial_t u)_+$ 很小。在一个理想化的情形 (参见图 1) 中, 我们穿过 u 的极大点与极小点, 因而 $\partial_t u$ 变号。




图 1 周期性一维转变的示意。

引理 4.5 (与正法向导数的比较)。

在本节开头固定的设定下,

$$0 \leq |\nabla u| - (\partial_t u)_+ \leq C\mathcal{D}(y)^{-2} \quad \text{当 } b_-(y) \leq t \leq b_+(y). \quad (4.20)$$

此外, 在端点之外的单位窄带上还有如下估计:

$$(\partial_t u)_+ \leq C\mathcal{D}(y)^{-2} \quad \text{若 } b_+(y) \leq t < b_+(y) + 1 \quad \text{或 } b_-(y) - 1 < t \leq b_-(y). \quad (4.21)$$

证明。

使用引理 4.4 证明中的剖面表示式 (4.14)。若局部坐标卡中没有上邻叶，它给出 $\nabla u = g'(t)\nu(y) + O(\mathcal{D}(y)^{-2})$ 。截断之前任何前来竞争的零点距 y 不超过 $2T(y)$ ，故属于式 (2.3) 中的那些图。由于不存在上邻叶图， $b_+(y) = T(y)$ ，于是在外部单位窄带上 $g'(t) \leq C\mathcal{D}(y)^{-3\sqrt{2}}$ ，从而两个结论在上半段都成立。故可设有上邻叶。在 $0 \leq t \leq b_+(y)$ 上，有 $r \geq t$ ，且 g' 在 $[0, \infty)$ 上递减，于是

$$\partial_t u = g'(t) - g'(r)\nu(y) \cdot \nu_+ + O(\mathcal{D}(y)^{-2}) \geq -C\mathcal{D}(y)^{-2}. \quad (4.22)$$

把式 (4.22) 与式 (4.11) 以及 $|\nabla u| \leq |\partial_t u| + |\nabla_{\Gamma^t} u|$ 结合，即在上半段证明式 (4.20)。越过等距端点后，在 $b_+(y) \leq t < b_+(y) + 1$ 上改为有 $r \leq t$ ，从而

$$\partial_t u \leq g'(r)(1 - \nu(y) \cdot \nu_+) + C\mathcal{D}(y)^{-2} \leq C\mathcal{D}(y)^{-2},$$

这是由式 (4.16) 与近乎平行性得到的。在截断端点处，起始叶与邻叶剖面的导数被 $Ce^{-\sqrt{2}T(y)} \leq C\mathcal{D}(y)^{-2}$ 控制（在外部单位窄带上亦然）。改用下邻叶的同一论证给出 $t \leq 0$ 时的界，从而完成式 (4.20) 与式 (4.21)。 □

4.2 稳定性不等式

下面沿用定义 4.1 中的坐标以及上文得到的估计。我们先记录两个较为粗糙的面积界。

引理 4.6 (局部与三次面积界)。

在定义 3.4 的设定下，存在一个普适常数 $C > 0$ ，使得

$$\mathcal{H}^2(\Sigma_0 \cap B_1(x)) \leq C \quad \text{若 } \text{dist}(x, \mathcal{X}) \geq 2, \quad (4.23)$$

以及

$$\mathcal{H}^2(\Sigma \cap \{\mathcal{D} < t\}) \leq CNt^3 \quad \text{对所有 } t \geq L_0. \quad (4.24)$$

证明。

对每个 $y \in \Sigma_0 \setminus \mathcal{X}$ ， $\Sigma_0 \cap B_{\frac{1}{2}}(y)$ 都是一个斜率一致有界的图，于是它在 $B_{\frac{1}{2}}(y)$ 内的面积有一致界。若 $\text{dist}(x, \mathcal{X}) \geq 2$ ，取有限覆盖即得式 (4.23)。

固定 $t \geq L_0$ ，并在 $\Sigma \cap \{\mathcal{D} < t\}$ 中取一个极大的、两两距离不小于 1 的点族。各点处半径为 $\frac{1}{2}$ 的不交球都落在 $S_{t+\frac{1}{2}}$ 中，而由式 (3.7) 该集合可被 N 个半径为 $t + \frac{3}{2}$ 的球覆盖。体积比较说明点族至多有 CNt^3 个点。这些点处的单位球覆盖 $\Sigma \cap \{\mathcal{D} < t\}$ ，且由式 (4.23) 每个单位球内零水平集的面积不超过 C ：式 (3.8) 保证这些球心到整个坏集 $\mathcal{X}$ 的距离满足 $\mathcal{D} > L_0 \geq 2$ 。把上述估计相加，即得式 (4.24)。 □

我们把稳定性归结为 Σ 上的一个条件，同时保留坏集的曲率贡献（回顾式 (3.1) 中环集的定义）。

命题 4.7 (稳定性的一种几何形式)。

考虑定义 3.4 中的设定。必要时增大 R_* ，并设 $L_0 \geq 4R_*$ 、 $\Lambda \geq 32L_0$ 。设 $\varphi: \Sigma_0 \rightarrow [0, 1]$ 满足 $\varphi|_{\Sigma} \in C^{0,1}(\Sigma)$ 且

$$\varphi = 1 \quad \text{在 } \Sigma_0 \cap \mathcal{S}_{4L_0}, \quad \varphi = 0 \quad \text{在 } \Sigma_0 \cap \left\{ \mathcal{D} \geq \frac{\Lambda}{4} \right\}.$$

则存在普适常数 C ，使得

$$\frac{1}{\sigma_0} \int_{\mathcal{S}_2} \mathcal{A}^2 |\nabla u|^2 + \int_{\Sigma \setminus \mathcal{S}_{4L_0}} |\Pi_{\Sigma}|^2 \varphi^2 \leq \frac{3}{2} \int_{\Sigma} |\nabla_{\Sigma} \varphi|^2 + C \int_{\Sigma \setminus \mathcal{S}_{2L_0}} \mathcal{D}^{-\frac{13}{4}} \varphi^2 + CNL_0^{-\frac{1}{4}}. \quad (4.25)$$

证明。

我们先简要说明证明的思路。在远离坏集处，把 φ 沿法向射线延拓，并在每个法向区间的端点附近将其截断。通常的 Sternberg–Zumbrun 计算用形如 $\xi = \varphi |\nabla u|$ 的函数去测试稳定性。这里的思路是改用 $\tilde{\xi} = \tilde{\varphi}(\partial_t u)_+$ ：由式 (4.20)，正的法向导数在区间内部逼近 $|\nabla u|$ ，而式 (4.21) 又使它在法向截断起作用的外部单位窄带上很小。在这些窄带上， $\tilde{\varphi}$ 由截断 φ 得到，而这种小性让我们能控制住由此产生的截断误差。

需要强调的是， $\tilde{\xi}$ 未必真能定义一个单值的环境测试函数，因为（即便引入了截断）在外部单位窄带上仍可能出现重叠。因此我们转而工作在式 (4.3) 的“参数化流形” $\mathcal{N}$ 上，并赋予它拉回后的欧氏度量。稳定性给出线性化方程的一个正解，其拉回使我们能在 $\mathcal{N}$ 上使用一个带权的分部积分恒等式。我们在 $\mathcal{N}$ 上把这个恒等式用于 $\tilde{\xi}$ ，又在环境空间中用互补的截断权函数把它用于 $|\nabla u|$ 。在后一种用法中，逐点的 Sternberg–Zumbrun 恒等式在坏集附近给出曲率项。比较所得公式，使我们得以保留这一正贡献。

现在给出严格的论证。我们先确立并回顾一些约定与设定。把 z_Λ 平移到原点。回顾： $\mathcal{N}$ 上的导数与积分都是用 $F(y, t) = y + t\nu(y)$ 拉回的欧氏度量来计算的。类似地，环境函数在 (y, t) 坐标下与 F 复合。特别地 $\partial_t u(y, t) = \partial_t(u \circ F)(y, t) = \nabla u(F(y, t)) \cdot \nu(y)$ ，且

$$\int_{\mathcal{N}} f = \int_{\Sigma} \int_{b_-(y)-1}^{b_+(y)+1} f(y, t) \det(\text{Id} - t\Pi_{\Sigma}(y)) dt d\mathcal{H}^2(y).$$

每个起始零点都只被积分一次，不论延长后的区间是否有重叠的像。取 $\chi: \mathbb{R} \rightarrow [0, 1]$ 光滑，满足 $\chi \equiv 0$ 于 $(-\infty, 0]$ 、 $\chi \equiv 1$ 于 $[\frac{1}{2}, \infty)$ 。令

$$\begin{aligned} \tilde{\varphi}(y, t) &= \varphi(y) [\chi(\mathcal{D}(y) - L_0) \chi(b_+(y) + 1 - t) \chi(t - b_-(y) + 1)], \\ \tilde{\xi}(y, t) &= \tilde{\varphi}(y, t) (\partial_t u(y, t))_+, \end{aligned}$$

于是 $\tilde{\varphi}$ 在 $\mathcal{D}(y) = L_0$ 以及法向端点 $t = b_-(y) - 1$ 、 $t = b_+(y) + 1$ 处消失，并且它与 φ 只在这些边界单位距离以内（即 $\nabla \chi$ 起作用之处）有所不同。特别地，当 $\mathcal{D} \geq \frac{\Lambda}{4}$ 时 $\tilde{\varphi} = 0$ ， $\tilde{\xi} \in H_0^1(\mathcal{N})$ ，且 $F(\text{supp } \tilde{\xi}) \Subset B_{R_\Lambda + \frac{\Lambda}{3}}$ 。

现在注意到，我们希望得到式 (4.25) 中的那一项 $\int_{\mathcal{S}_2} \mathcal{A}^2 |\nabla u|^2$ ，它来自用 $\xi = \varphi |\nabla u|$ （而不是 $\tilde{\xi}$ ）的通常 Sternberg-Zumbrun 计算。尽管如此，我们仍能把两者联系起来。

第 1 步。 有如下估计

$$\int_{\mathcal{S}_2} \mathcal{A}^2 |\nabla u|^2 \leq \int_{\mathcal{N}} (1 - \chi_0) \tilde{\xi} (-\Delta + W''(u)) \tilde{\xi} + C N L_0^{-\frac{1}{4}}, \quad (4.26)$$

其中 χ_0 是一个光滑截断函数，满足 $\chi_0 \equiv 1$ 于 $\mathcal{S}_{\frac{5}{2}L_0}$ 、 $\chi_0 \equiv 0$ 于 $\mathcal{S}_{3L_0}$ 之外（故 $\text{supp } \chi_0 \subset B_{R_\Lambda + \frac{\Lambda}{3}}$ ），并满足

$$0 \leq \chi_0 \leq 1, \quad |\nabla \chi_0| \leq \frac{C}{L_0}, \quad |\Delta \chi_0| \leq \frac{C}{L_0^2}. \quad (4.27)$$

由于 $\chi_0 \equiv 1$ 于 $\mathcal{S}_2$ 上，只需把 $\int \chi_0 \mathcal{A}^2 |\nabla u|^2$ 用式 (4.26) 右端的那一项来控制即可。对 Allen-Cahn 方程求导，在 $\{\nabla u \neq 0\}$ 上逐点地有

$$\begin{aligned} |\nabla u| (-\Delta + W''(u)) |\nabla u| &= -\frac{1}{2} \Delta |\nabla u|^2 + |\nabla |\nabla u||^2 + W''(u) |\nabla u|^2 \\ &= -|D^2 u|^2 + |\nabla |\nabla u||^2 = -\mathcal{A}^2 |\nabla u|^2. \end{aligned} \quad (4.28)$$

这促使我们使用下面这个源自稳定性的加权基态恒等式：对试验函数 f 与 η ，其中 $\eta \geq 0$ 光滑，且 η 紧支撑或 f 迹为零，有

$$\int \eta f (-\Delta + W''(u)) f = \int \eta h^2 \left| \nabla \left(\frac{f}{h} \right) \right|^2 - \int f^2 \frac{1}{2} \Delta \eta + \nabla \eta \cdot \nabla \log h, \quad (4.29)$$

其中 h 求解线性化方程

$$\begin{cases} -\Delta h + W''(u)h = 0 & \text{在 } B_{R_\Lambda + \Lambda}, \\ h = 1 & \text{在 } \partial B_{R_\Lambda + \Lambda}. \end{cases} \quad (4.30)$$

稳定性以及第一 Dirichlet 特征值关于区域的严格单调性给出 $\lambda_1(-\Delta + W''(u), B_{R_\Lambda + \Lambda}) > 0$ 。因此该 Dirichlet 问题有唯一解；分部积分即得式 (4.29)。极值原理给出 $h > 0$ ，而单位尺度上的 Harnack 估计与内部梯度估计给出

$$|\nabla \log h| \leq C \quad \text{在 } B_{R_\Lambda + \frac{\Lambda}{2}}. \quad (4.31)$$

在式 (4.29) 中取 $f = |\nabla u|$ 、 $\eta = \chi_0$ ，并利用式 (4.28)，我们便得到

$$\int \chi_0 \mathcal{A}^2 |\nabla u|^2 - \int_{\mathbb{R}} |\nabla u|^2 \frac{1}{2} \Delta \chi_0 + \nabla \chi_0 \cdot \nabla \log h = - \int \chi_0 h^2 \left| \nabla \left(\frac{|\nabla u|}{h} \right) \right|^2 \leq 0. \quad (4.32)$$

现在我们在 $\mathcal{N}$ 上应用式 (4.29)，取 $f = \tilde{\xi}$ 、 $\eta = 1 - \chi_0$ 。准确地说： F 在 $\mathcal{N}$ 上是局部等距，故 $h \circ F$ 满足同一线性化方程。因此我们能在 $\mathcal{N}$ 上执行由式 (4.30) 推出式 (4.29) 的同分部积分。同理，由于 $\tilde{\xi}$ 在 $t = b_- - 1$ 与 $t = b_+ + 1$ 处消失，不产生边界项。于是得到

$$\begin{aligned} \int_{\mathcal{N}} (1 - \chi_0) \tilde{\xi} (-\Delta + W''(u)) \tilde{\xi} - \int_{\mathcal{N}} \tilde{\xi}^2 \frac{1}{2} \Delta \chi_0 + \nabla \chi_0 \cdot \nabla \log h &= \int_{\mathcal{N}} (1 - \chi_0) h^2 \left| \nabla \left(\frac{\tilde{\xi}}{h} \right) \right|^2 \\ &\geq 0. \end{aligned} \quad (4.33)$$

用式 (4.32) 减去式 (4.33)，并记 $\Psi_0 := \frac{1}{2} \Delta \chi_0 + \nabla \chi_0 \cdot \nabla \log h$ ，我们得到

$$\int \chi_0 \mathcal{A}^2 |\nabla u|^2 \leq \int_{\mathcal{N}} (1 - \chi_0) \tilde{\xi} (-\Delta + W''(u)) \tilde{\xi} + \int_{\mathbb{R}^3} |\nabla u|^2 \Psi_0 - \int_{\mathcal{N}} \tilde{\xi}^2 \Psi_0. \quad (4.34)$$

要达到式 (4.26), 只剩下把最后两项之差用 $CNL_0^{-\frac{1}{4}}$ 控制。我们把它按三个区域拆开计算:

$$\begin{aligned} \int_{\mathbb{R}^3} |\nabla u|^2 \Psi_0 - \int_{\mathcal{N}} \tilde{\xi}^2 \Psi_0 &= \int_{\mathcal{N} \cap \{b_- < t < b_+\}} |\nabla u|^2 - \tilde{\xi}^2 \Psi_0 \\ &\quad + \int_{\mathbb{R}^3 \setminus F(\mathcal{N} \cap \{b_- < t < b_+\})} |\nabla u|^2 \Psi_0 \\ &\quad - \int_{\mathcal{N} \cap (\{t \leq b_-\} \cup \{t \geq b_+\})} \tilde{\xi}^2 \Psi_0 \\ &\leq \frac{C}{L_0} \int_{\Sigma \cap \{2L_0 < \mathcal{D} < 4L_0\}} \int_{b_-}^{b_+} |\nabla u|^2 - \tilde{\xi}^2 dt \\ &\quad + \frac{C}{L_0} \int_{\mathcal{S}_{3L_0} \setminus (\mathcal{S}_{\frac{5}{2}L_0} \cup F(\mathcal{N} \cap \{b_- < t < b_+\}))} |\nabla u|^2 \\ &\quad + \frac{C}{L_0} \int_{\Sigma \cap \{2L_0 < \mathcal{D} < 4L_0\}} \int_{b_-}^{b_-} \tilde{\xi}^2 dt + \int_{b_+}^{b_++1} \tilde{\xi}^2 dt. \end{aligned} \quad (4.35)$$

这里我们用到了式 (4.27) 中 χ_0 的支撑与导数界、式 (4.31) 中 $\nabla \log h$ 的界, 以及 Jacobi 行列式有界。此外, 每个与 χ_0 的导数的支撑相交的区间都始于 $2L_0 < \mathcal{D}(y) < 4L_0$, 此处 $\varphi = 1$ 。在其未延拓的部分上 $\tilde{\varphi} = 1$ 且 $\tilde{\xi} = (\partial_t u)_+$, 故上式中各平方之差都是非负的。

最后, 我们断言如下估计:

$$\frac{1}{L_0} \int_{\Sigma \cap \{2L_0 < \mathcal{D} < 4L_0\}} \int_{b_-}^{b_+} (|\nabla u|^2 - \tilde{\xi}^2) dt \leq CNL_0^{-2} \log L_0, \quad (4.36)$$

$$\frac{1}{L_0} \int_{\mathcal{S}_{3L_0} \setminus (\mathcal{S}_{\frac{5}{2}L_0} \cup F(\mathcal{N} \cap \{b_- < t < b_+\}))} |\nabla u|^2 \leq CNL_0^{-4}, \quad (4.37)$$

$$\frac{1}{L_0} \int_{\Sigma \cap \{2L_0 < \mathcal{D} < 4L_0\}} \left(\int_{b_-}^{b_-} \tilde{\xi}^2 dt + \int_{b_+}^{b_++1} \tilde{\xi}^2 dt \right) \leq CNL_0^{-2}. \quad (4.38)$$

关于式 (4.36): 在未延长的区间上 $\varphi = \tilde{\varphi} = 1$, 于是由式 (4.11) 与式 (4.20) 有 $|\nabla u|^2 - \tilde{\xi}^2 = |\nabla_{\Gamma^t} u|^2 + (\partial_t u)_-^2 \leq C\mathcal{D}(y)^{-4}$; 这里用到, 若 $\partial_t u < 0$, 则式 (4.20) 本身给出 $|\nabla u|$ 的上界。在长度不超过 $6 \log \mathcal{D}(y)$ 的区间上积分, 并用引理 4.6, 即得第一个估计。

要证式 (4.38), 把同一面积估计与外部单位窄带上的 $\tilde{\xi}^2 \leq C\mathcal{D}(y)^{-4}$ 相结合即可 (回顾式 (4.21))。

最后看式 (4.37)。积分区域中几乎每个点都满足 $\text{dist}(x, \Sigma_0) \geq 3 \log L_0$ 。事实上, 几乎每个更靠近的点都有唯一最近的零点 y , 满足 $2L_0 < \mathcal{D}(y) < 4L_0$ 且 $|t| < 3 \log L_0 < T(y)$; 沿该线段, 这同一个零点始终保持唯一最近, 故 $b_-(y) < t < b_+(y)$, 这与这些像被排除在外相矛盾。仿照引理 2.2 的证明, 利用离 Σ_0 足够远处 $|u|(1 + |u|) \geq \frac{3}{2}$, 可得 $|\nabla u| \leq Ce^{-\text{dist}(x, \Sigma_0)}$ 。于是由式 (3.7), 最后一项不超过 $CL_0^{-7} |\mathcal{S}_{3L_0}| \leq CNL_0^{-4}$ 。

将式 (4.36)、(4.37)、(4.38) 代入式 (4.34)、(4.35), 即得式 (4.26)。

现在把式 (4.26) 右端的积分与式 (4.25) 中的几何项相比较, 得到:

第 2 步。 有如下不等式

$$\int_{\mathcal{N}} (1 - \chi_0) \tilde{\xi} (-\Delta + W''(u)) \tilde{\xi} \leq \frac{9\sigma_0}{8} \int_{\Sigma} |\nabla_{\Sigma} \varphi|^2 - \frac{3\sigma_0}{4} \int_{\Sigma \setminus \mathcal{S}_{4L_0}} |\Pi_{\Sigma}|^2 \varphi^2 + C \int_{\Sigma \setminus \mathcal{S}_{2L_0}} \mathcal{D}^{-\frac{13}{4}} \varphi^2. \quad (4.39)$$

事实上, 先在 $\mathcal{N}$ 上分部积分, 并用 $\tilde{\xi} = (\partial_t u)_+, \tilde{\varphi} \in H_0^1(\mathcal{N})$, 得

$$\begin{aligned} \int_{\mathcal{N}} (1 - \chi_0) \tilde{\xi} (-\Delta + W''(u)) \tilde{\xi} &= \int_{\mathcal{N}} (1 - \chi_0) (\partial_t u)_+ \tilde{\varphi}^2 (-\Delta + W''(u)) \partial_t u \\ &\quad + \int_{\mathcal{N}} (1 - \chi_0) (\partial_t u)_+^2 |\nabla \tilde{\varphi}|^2 - \int_{\mathcal{N}} (\partial_t u)_+^2 \tilde{\varphi} \cdot \nabla \chi_0 \cdot \nabla \tilde{\varphi}, \end{aligned} \quad (4.40)$$

再将式 (4.10) 代入式 (4.40), 得

$$\begin{aligned} \int_{\mathcal{N}} (1 - \chi_0) \tilde{\xi} (-\Delta + W''(u)) \tilde{\xi} &= \int_{\mathcal{N}} (1 - \chi_0) (\partial_t u)_+^2 (|\nabla \tilde{\varphi}|^2 - |\Pi_{\Gamma^t}|^2 \tilde{\varphi}^2) \\ &\quad + I_1 - I_2. \end{aligned} \quad (4.41)$$

其中

$$I_1 := \int_{\mathcal{N}} (1 - \chi_0) (\partial_t u)_+ \tilde{\varphi}^2 (2\Pi_{\Gamma^t} : \nabla_{\Gamma^t}^2 u + \nabla_{\Gamma^t} H_{\Gamma^t} \cdot \nabla_{\Gamma^t} u),$$

$$I_2 := \int_{\mathcal{N}} (\partial_t u)_+^2 \tilde{\varphi} \nabla \chi_0 \cdot \nabla \tilde{\varphi}.$$

利用 $ab \leq \frac{a^2}{8} + 2b^2$ 有

$$(|\Pi_{\Gamma^t}| (\partial_t u)_+)(2|\nabla_{\Gamma^t}^2 u|) \leq \frac{1}{8} |\Pi_{\Gamma^t}|^2 (\partial_t u)_+^2 + 8 |\nabla_{\Gamma^t}^2 u|^2,$$

于是由式 (4.11) 与式 (4.12) 可估计

$$\begin{aligned} I_1 &\leq \frac{1}{8} \int_{\mathcal{N}} (1 - \chi_0) |\Pi_{\Gamma^t}|^2 (\partial_t u)_+^2 \tilde{\varphi}^2 + C \int_{\Sigma \setminus \mathcal{S}_{2L_0}} (\mathcal{D}^{-4} \log \mathcal{D} + \mathcal{D}^{-\frac{10}{3}} \log \mathcal{D}) \varphi^2 \\ &\leq \frac{1}{8} \int_{\mathcal{N}} (1 - \chi_0) |\Pi_{\Gamma^t}|^2 (\partial_t u)_+^2 \tilde{\varphi}^2 + C \int_{\Sigma \setminus \mathcal{S}_{2L_0}} \mathcal{D}^{-\frac{13}{4}} \varphi^2. \end{aligned}$$

这里用到 $b_+ - b_- + 2 \leq 6 \log \mathcal{D}(y) + 2$ 与 $(\partial_t u)_+ \leq C$ 。

下面断言

$$|I_2| \leq C \int_{\Sigma \setminus \mathcal{S}_{2L_0}} \mathcal{D}^{-5} \varphi^2.$$

在 $\{\nabla \chi_0 \neq 0\}$ 上有 $2L_0 < \mathcal{D}(y) < 4L_0$ 且 $\varphi = \chi(\mathcal{D}(y) - L_0) = 1$ 。于是当 $b_- < t < b_+$ 时 $\nabla \tilde{\varphi} = 0$ ，故定义 I_2 的被积函数只可能在

$$b_- - 1 < t < b_- \quad \text{或} \quad b_+ < t < b_+ + 1$$

上非零。在那里，式 (4.6) 与式 (4.21) 给出

$$|(\partial_t u)_+^2 \tilde{\varphi} \nabla \chi_0 \cdot \nabla \tilde{\varphi}| \leq C \mathcal{D}(y)^{-4} \varphi^2 \mathcal{D}(y)^{-1}.$$

积分即得断言。

综合上述估计，式 (4.41) 化为

$$\int_{\mathcal{N}} (1 - \chi_0) \tilde{\xi} (-\Delta + W''(u)) \tilde{\xi} \leq \int_{\mathcal{N}} (1 - \chi_0) (\partial_t u)_+^2 \left(|\nabla \tilde{\varphi}|^2 - \frac{7}{8} |\Pi_{\Gamma^t}|^2 \tilde{\varphi}^2 \right) + C \int_{\Sigma \setminus \mathcal{S}_{2L_0}} \mathcal{D}^{-\frac{13}{4}} \varphi^2. \quad (4.42)$$

剩下的，是对右端第一个积分沿法向方向积分，从而把 $\mathcal{N}$ 换回 Σ 。我们断言：当 L_0 充分大时，

$$\begin{aligned} \int_{\mathcal{N}} (1 - \chi_0) (\partial_t u)_+^2 |\nabla \tilde{\varphi}|^2 &\leq \frac{9\sigma_0}{8} \int_{\Sigma} |\nabla_{\Sigma} \varphi|^2 + C \int_{\Sigma \setminus \mathcal{S}_{2L_0}} \mathcal{D}^{-4} \varphi^2, \\ \int_{\mathcal{N}} (1 - \chi_0) |\Pi_{\Gamma^t}|^2 (\partial_t u)_+^2 \tilde{\varphi}^2 &\geq \frac{7\sigma_0}{8} \int_{\Sigma \setminus \mathcal{S}_{4L_0}} |\Pi_{\Sigma}|^2 \varphi^2. \end{aligned}$$

对这两个不等式，都用式 (4.7) 与式 (4.13)，它们给出

$$\int_{-\frac{1}{2} \log \mathcal{D}(y)}^{\frac{1}{2} \log \mathcal{D}(y)} (\partial_t u)_+^2 dt = \sigma_0 + o(1), \quad \int_{b_- - 1}^{b_+ + 1} (\partial_t u)_+^2 dt = \sigma_0 + o(1), \quad (4.43)$$

其中 $o(1) \rightarrow 0$ 关于 $\mathcal{D}(y) \geq L_0$ 在 $L_0 \rightarrow \infty$ 时一致成立。在较小的区间上 $\partial_t u > 0$ 。

对第一个不等式，注意当 $\mathcal{D}(y) \leq 2L_0$ 时 $1 - \chi_0 = 0$ 。当 $\mathcal{D}(y) > 2L_0$ 时，在 $b_- < t < b_+$ 上有 $\tilde{\varphi} = \varphi$ ，而式 (4.6) 与式 (4.21) 给出

$$\left(\int_{b_- - 1}^{b_-} + \int_{b_+}^{b_+ + 1} \right) (\partial_t u)_+^2 |\nabla \tilde{\varphi}|^2 \det(\text{Id} - t\Pi_{\Sigma}) dt \leq C \mathcal{D}(y)^{-4} (\varphi(y)^2 + |\nabla_{\Sigma} \varphi(y)|^2).$$

在 F 之下，切向导数乘以 $(\text{Id} - t\Pi_{\Sigma})^{-1} = \text{Id} + O(|t|\mathcal{D}(y)^{-1})$ ，面积元乘以 $\det(\text{Id} - t\Pi_{\Sigma}) = 1 + O(|t|\mathcal{D}(y)^{-1})$ 。于是式 (4.43) 给出第一个不等式。

对第二个不等式，把积分限制在满足 $\mathcal{D}(y) \geq 4L_0$ 且 $|t| \leq \frac{1}{2} \log \mathcal{D}(y)$ 的 (y, t) 上——其余区域由正性直接舍去。在那里 $\chi_0 = 0$ ， $\tilde{\varphi} = \varphi$ ，且 $|\Pi_{\Gamma^t}|^2 \det(\text{Id} - t\Pi_{\Sigma}) \geq (1 - C|t|\mathcal{D}(y)^{-1}) |\Pi_{\Sigma}|^2$ 。因此式 (4.43) 的第一个等式给出第二个不等式。

把这两个不等式代入式 (4.42) 即得式 (4.39)。再结合式 (4.26)，便得到式 (4.25)。

□

式 (4.25) 中最后两个“误差”项可以立刻被吸收。这里的幂次 $-\frac{13}{4} < -3$ 至关重要。

命题 4.8 (几何稳定性, 去掉误差项)。

考虑定义 3.4 中的设定。必要时增大 R_* 后, 设 $L_0 \geq 4R_*$ 且 $\Lambda \geq 32L_0$ 。设 $\varphi: \Sigma_0 \rightarrow [0, 1]$ 满足 $\varphi|_{\Sigma} \in C^{0,1}(\Sigma)$ 且

$$\varphi = 1 \quad \text{在 } \Sigma_0 \cap \mathcal{S}_{4L_0}, \quad \varphi = 0 \quad \text{在 } \Sigma_0 \cap \left\{ \mathcal{D} \geq \frac{\Lambda}{4} \right\}.$$

则当 L_0 充分大时, 有

$$\frac{\delta N}{2 \cdot 5^3 \sigma_0} + \int_{\Sigma \setminus \mathcal{S}_{4L_0}} |\Pi_{\Sigma}|^2 \varphi^2 \leq \frac{3}{2} \int_{\Sigma} |\nabla_{\Sigma} \varphi|^2. \quad (4.44)$$

L_0 的下界阈值是普适的, 与 u 、 N 、 R_{Λ} 和 Λ 无关。

证明。

在集合 $2^k L_0 \leq \mathcal{D} < 2^{k+1} L_0$ ($k \geq 1$) 上应用引理 4.6 中的三次面积界, 并用 $0 \leq \varphi \leq 1$, 得

$$\int_{\Sigma \setminus \mathcal{S}_{2L_0}} \varphi^2 \mathcal{D}^{-\frac{13}{4}} d\mathcal{H}^2 \leq \int_{\Sigma \setminus \mathcal{S}_{2L_0}} \mathcal{D}^{-\frac{13}{4}} d\mathcal{H}^2 \leq CN \sum_{k=1}^{\infty} (2^k L_0)^{-\frac{1}{4}} \leq CN L_0^{-\frac{1}{4}}.$$

取 L_0 充分大, 使式 (4.25) 的最后两项不超过 $\frac{\delta N}{2 \cdot 5^3 \sigma_0}$ 。由于式 (3.7) 给出 $\sigma_0^{-1} \int_{\mathcal{S}_2} \mathcal{A}^2 |\nabla u|^2 \geq \frac{\delta N}{5^3 \sigma_0}$, 这两项可被左端吸收, 从而得到式 (4.44)。 $\square$

5 定理 1.1 的证明

现在借助命题 4.8 的几何稳定性不等式、内蕴面积估计与对数截断函数把证明收尾。我们先取 L_0 充分大, 并在尺度 L_0 上为坏簇构造一个光滑邻域, 使其边界与 Σ 横截相交。

引理 5.1 (坏集的大光滑邻域)。

在定义 3.4 的设定下, 存在一个具有光滑边界的有界开集 $\mathcal{B}$, 使得:

1. 下面这个包含关系成立

$$\mathcal{S}_{4L_0} \subset \mathcal{B}, \quad \overline{\mathcal{B}} \subset \mathcal{S}_{4L_0+2} \Subset B_{R_{\Lambda}}(z_{\Lambda}). \quad (5.1)$$

$\partial \mathcal{B} \subset \{3L_0 < \mathcal{D} < 5L_0\}$, 且 $\partial \mathcal{B}$ 与 Σ_0 横截。特别地, $\Sigma \cap \partial \mathcal{B}$ 是一条光滑的紧曲线, 可以为空, 也可以不连通。

证明。

把 $\mathcal{D}$ 磨光, 得到光滑函数 $\tilde{\mathcal{D}}$, 满足 $|\tilde{\mathcal{D}} - \mathcal{D}| < \frac{1}{4}$ 。由于 $\overline{\mathcal{R}_{\Lambda}}$ 有界, $\tilde{\mathcal{D}}$ 在无穷远处趋于无穷。由式 (3.8) 与式 (3.9), 零水平集在 $\{3L_0 < \mathcal{D} < 5L_0\} \subset \{L_0 < \mathcal{D} < \frac{\Lambda}{3}\}$ 上是光滑的。由 Sard 定理, 存在 $t_0 \in (4L_0 + \frac{1}{2}, 4L_0 + 1)$, 它既是 $\tilde{\mathcal{D}}$ 在 $\mathbb{R}^3$ 上的正则值, 也是它在这部分 Σ_0 上的正则值。于是 $\mathcal{B} = \{\tilde{\mathcal{D}} < t_0\}$ 是一个具有光滑边界的有界集, 并且由逼近估计与式 (3.6) 即得式 (5.1)。其边界含于 $\{3L_0 < \mathcal{D} < 5L_0\}$, 且由 t_0 的取法与 Σ_0 横截。 $\square$

固定这一选取的 $\mathcal{B}$, 它扮演的角色相当于文献 [23] 中 (10.13)–(10.17) 的有界坏区域; 较小的集合 $\mathcal{S}_2 \subset \mathcal{B}$ 则按照式 (3.7) 携带着正曲率质量。

我们先引入从 $\partial \mathcal{B}$ 出发的内蕴距离, 以及距离邻域的内蕴面积。

定义 5.2 (内蕴距离与内蕴面积)。

对 $y \in \Sigma \setminus \mathcal{B}$, 令

$$d_{\mathcal{B}}(y) = \text{dist}_{\Sigma \setminus \mathcal{B}}(y, \Sigma \cap \partial \mathcal{B}),$$

即 $\Sigma \setminus \mathcal{B}$ 内连接 y 与 $\Sigma \cap \partial \mathcal{B}$ 的路径长度之下确界; 在不与该边界相交的连通分支上它取值为 $+\infty$, 并在 $\Sigma \cap \mathcal{B}$ 上按零延拓。

把内蕴邻域的面积记作

$$\Theta(r) = \mathcal{H}^2\{y \in \Sigma : 0 < d_{\mathcal{B}}(y) < r\}.$$

下面的结果把内蕴面积与稳定性中的曲率项联系起来。在 $d_{\mathcal{B}} = +\infty$ 处, 我们约定 $(r - d_{\mathcal{B}})_+ = 0$ 。

引理 5.3 (面积与曲率的关系)。

对 $2 \leq r < \frac{\Lambda}{16}$, 有

$$\Theta(r) \leq \frac{1}{4} \int_{\Sigma \setminus \mathcal{B}} |\Pi_\Sigma|^2 (r - d_{\mathcal{B}})_+^2 d\mathcal{H}^2 + Cr^2 \Theta(2), \quad (5.2)$$

其中 C 为普适常数。

证明。

类似的面积-曲率估计出现在文献 [23] 的引理 10.16 及命题 10.17 的证明中。为完整起见，我们在附录 A 中用法向的 Jacobi 场给出一个自治的证明。

□

最后给出主定理（定理 1.1）的证明：

证明。

假设 u 不是一维的。则由注记 3.2, $\mathcal{X} \neq \emptyset$ 。先取充分大的普适常数 L_0 ，再取 Λ 充分大、仅依赖于 L_0 。从此刻起，我们在定义 3.4 的设定下工作。考虑引理 5.1 中构造的光滑集合 $\mathcal{B}$ ，以及定义 5.2 中的内蕴距离与内蕴面积。注意命题 4.8 对每个容许的 φ 都适用，并且 L_0 与 Λ 的下界阈值只依赖于普适常数，与坏中心的个数 N 以及簇的半径 R_Λ 无关。

第 1 步：面积的二次增长。 我们首先证明

$$\Theta(r) \leq Cr^2 \Theta(2) \quad \text{对} \quad 2 \leq r < \frac{\Lambda}{16}, \quad \text{且} \quad \Theta(2) \leq CNL_0^3. \quad (5.3)$$

事实上，固定满足 $2 \leq r < \frac{\Lambda}{16}$ 的 r ，在 $\Sigma_0 \cap \mathcal{B}$ 上令 $\varphi = 1$ ，在 $\Sigma \setminus \mathcal{B}$ 上令 $\varphi = \left(1 - \frac{d_{\mathcal{B}}}{r}\right)_+$ ，在其余的零水平集上置 $\varphi = 0$ 。它在 $\mathcal{B}$ 之外的支撑含于

$$\{4L_0 \leq \mathcal{D} \leq 4L_0 + 2 + r\} \in \left\{L_0 < \mathcal{D} < \frac{\Lambda}{4}\right\}. \quad (5.4)$$

于是 φ 对命题 4.8 是容许的；把它与引理 5.3 结合起来，得到

$$\begin{aligned} \frac{\Theta(r)}{r^2} &\leq \frac{1}{4} \int_{\Sigma \setminus \mathcal{B}} |\Pi_\Sigma|^2 \left(1 - \frac{d_{\mathcal{B}}}{r}\right)_+^2 + C\Theta(2) \\ &\leq \frac{3}{8} \int_{\Sigma} |\nabla_\Sigma \varphi|^2 + C\Theta(2) = \frac{3}{8} \frac{\Theta(r)}{r^2} + C\Theta(2). \end{aligned}$$

吸收即得式 (5.3) 中的第一个估计。最后， $\Theta(2)$ 的界来自式 (4.24)，因为 $\{0 < d_{\mathcal{B}} < 2\} \subset \Sigma \cap \{\mathcal{D} < 4L_0 + 4\}$ 。

第 2 步：对数截断与矛盾。 考虑第二个测试函数：在 $\Sigma_0 \cap \mathcal{B}$ 上仍有 $\varphi = 1$ ，而在 $\Sigma \setminus \mathcal{B}$ 上令

$$\varphi = 1 - \frac{\log \max \frac{\{2, d_{\mathcal{B}}\}}{2}}{\log \left(\frac{\Lambda}{64}\right)} \quad \text{在} \quad \Sigma \setminus \mathcal{B}. \quad (5.5)$$

在其余的零水平集上以及 $d_{\mathcal{B}} = +\infty$ 处，仍置 $\varphi = 0$ 。其外部支撑满足 $d_{\mathcal{B}} \leq \frac{\Lambda}{32}$ ，故由式 (5.4)（取 $r = \frac{\Lambda}{32}$ ）可知容许性成立。在 $2^j < d_{\mathcal{B}} < 2^{j+1}$ 上，式 (5.5) 给出 $|\nabla_\Sigma \varphi| \leq \frac{2^{-j}}{\log \left(\frac{\Lambda}{64}\right)}$ 。与梯度支撑相交的那些区间满足 $j \geq 1$ 且 $2^j < \frac{\Lambda}{32}$ ，从而 $2^{j+1} < \frac{\Lambda}{16}$ 。因此式 (5.3) 在每个区间上都可用，于是

$$\begin{aligned} \int_{\Sigma} |\nabla_\Sigma \varphi|^2 &\leq \frac{1}{\log^2 \left(\frac{\Lambda}{64}\right)} \sum_{\substack{\text{对 } j \geq 1 \\ \text{且 } 2^j < \Lambda/32}} 2^{-2j} \Theta(2^{j+1}) \leq \frac{C\Theta(2)}{\log \Lambda} \\ &\leq \frac{CNL_0^3}{\log \Lambda}. \end{aligned}$$

把它与式 (4.44) 结合，得 $c\delta N \leq \frac{CNL_0^3}{\log \Lambda}$ ；当 Λ 充分大（仅依赖于 L_0 ）时这是不可能的，矛盾。因此 u 是一维的。稳定的一维解只有常数 ± 1 和异宿剖面 g 的平移，再结合 $|u| < 1$ ，得 $u(x) = g(e \cdot x - t_0)$ 。□

附录 A 引理 5.3 的证明

证明。

以下沿用第 5 节的记号。

由构造， $\Sigma \cap \partial \mathcal{B}$ 是一条光滑的紧致曲线，它可以为空，也可以不连通。从 $\Sigma \cap \partial \mathcal{B}$ 出发、长度不超过 r 的每一条外部道路都落在

$$\Sigma_0 \cap \{4L_0 \leq \mathcal{D} \leq 4L_0 + 2 + r\} \in \Sigma, \quad r \leq \frac{\Lambda}{16} \quad (A.1)$$

之中。下界来自 $\mathcal{S}_{AL_0} \subset \mathcal{B}$, 上界则因为 $\mathcal{D}$ 是 1-Lipschitz 的。若 $\Sigma \cap \partial\mathcal{B} = \emptyset$, 则在 $\Sigma \setminus \mathcal{B}$ 上有 $d_{\mathcal{B}} = +\infty$, 于是结论式 (5.2) 立得。

记 K 为 Σ 的高斯曲率, 并注意

$$|\Pi_{\Sigma}| \leq \frac{|D^2u|}{|\nabla u|} \leq C, \quad K \geq -\frac{1}{2}|\Pi_{\Sigma}|^2 \geq -C^2 \quad (\text{A.2})$$

这里 $C \geq 1$ 是一个取定的普适常数。从 $\Sigma \cap \partial\mathcal{B}$ 出发的极小道路不可能再次碰到这条边界。对每个 $q \in \Sigma \cap \partial\mathcal{B}$, 取从 q 出发、在 Σ 内垂直于该曲线、并指向 $\Sigma \setminus \mathcal{B}$ 一侧的单位速度测地线。用 $\kappa(q)$ 记它的截点时间, 在此时间之前它极小化到内边界的距离; 用 $J(q, t)$ 记长度 Jacobi 因子, 并以内边界上的弧长作为初始坐标。除去截迹 (其面积测度为零) 之外, 距离有限且小于 $\frac{\Lambda}{16}$ 的每一点都落在唯一一条极小化法射线上。由 Jacobi 方程与面积公式得

$$\begin{aligned} J_{tt}(q, t) &= -K(q, t)J(q, t), \quad J(q, 0) = 1, \quad J(q, t) > 0 \quad \text{对} \quad 0 < t < \kappa(q), \\ \Theta(s) &= \int_{\Sigma \cap \partial\mathcal{B}} \int_0^{\min\{s, \kappa(q)\}} J(q, t) dt d\mathcal{H}^1(q) \quad \text{对} \quad 0 < s < \frac{\Lambda}{16}. \end{aligned} \quad (\text{A.3})$$

对 $0 < t < \kappa(q)$, 由式 (A.3) 与式 (A.2) 得

$$\left(\frac{J_t}{J}\right)' + \left(\frac{J_t}{J}\right)^2 = -K \leq C^2, \quad \frac{J_t}{J} \leq C \coth(Ct). \quad (\text{A.4})$$

式 (A.4) 中的第二个不等式由比较即得, 因为 $\frac{J_t}{J}$ 在零点处有限, 而 $C \coth(Ct)$ 在该处趋于 $+\infty$ 。特别地, 由此得到的界在 $[\frac{1}{2}, 1]$ 上一致, 且与内边界的曲率无关。

接着在这一区间中选取一条长度同样受控的水平集。由于 $d_{\mathcal{B}}$ 在其取值有限的分支上是局部 Lipschitz 的, 并且在正距离处几乎处处有 $|\nabla_{\Sigma} d_{\mathcal{B}}| = 1$, 由协面积公式可取到 $b \in [\frac{1}{2}, 1]$, 使得 $\mathcal{H}^1(\{d_{\mathcal{B}} = b\}) \leq 2\Theta(2)$ 。我们还可以要求这条水平集与截迹相交于一个长度为零的集合。把这一选取与式 (A.4) 的比较估计合起来, 就有

$$\begin{aligned} J_t(q, b)_+ &\leq C J(q, b) \quad \text{只要} \quad \kappa(q) > b, \\ \int_{\{q \in \Sigma \cap \partial\mathcal{B} : \kappa(q) > b\}} J(q, b) d\mathcal{H}^1(q) &= \mathcal{H}^1(\{d_{\mathcal{B}} = b\}) \leq 2\Theta(2). \end{aligned} \quad (\text{A.5})$$

固定 $2 \leq r < \frac{\Lambda}{16}$ 。对 $b < t < \kappa(q)$, 将 Jacobi 方程积分两次, 得

$$J(q, t) \leq J(q, b) + (t - b)J_t(q, b)_+ + \int_b^t (t - s)K(q, s)_- J(q, s) ds,$$

先在 $b < t < \min\{r, \kappa(q)\}$ 上积分, 再对满足 $\kappa(q) > b$ 的那些射线积分; 若积分至截点时间, 则从下方取极限。为了恢复 $\Theta(r)$, 还要把距离不超过 b 的点也计入, 这部分的面积由 $\Theta(2)$ 控制。加上这一贡献, 并利用 Fubini 定理以及式 (A.3)–(A.5), 我们得到

$$\begin{aligned} \Theta(r) &\leq Cr^2\Theta(2) + \frac{1}{2} \int_{\Sigma \setminus \mathcal{B}} K_-(r - d_{\mathcal{B}})_+^2 d\mathcal{H}^2 \\ &\leq Cr^2\Theta(2) + \frac{1}{4} \int_{\Sigma \setminus \mathcal{B}} |\Pi_{\Sigma}|^2 (r - d_{\mathcal{B}})_+^2 d\mathcal{H}^2, \end{aligned}$$

这里用到的事实是式 (A.2) 给出的 $K_- \leq \frac{|\Pi_{\Sigma}|^2}{2}$ 。

□

参考文献

- [1] S. M. Allen and J. W. Cahn, “A microscopic theory for antiphase boundary motion and its application to antiphase domain coarsening,” *Acta Metallurgica*, vol. 27, no. 6, pp. 1085–1095, 1979.
- [2] L. Modica and S. Mortola, “Un esempio di Γ -convergenza,” *Bollettino dell'Unione Matematica Italiana B*, vol. (5) 14, pp. 285–299, 1977.
- [3] L. Modica, “The gradient theory of phase transitions and the minimal interface criterion,” *Archive for Rational Mechanics and Analysis*, vol. 98, no. 2, pp. 123–142, 1987, doi: 10.1007/BF00251230.
- [4] P. Sternberg, “The effect of a singular perturbation on nonconvex variational problems,” *Archive for Rational Mechanics and Analysis*, vol. 101, no. 3, pp. 209–260, 1988, doi: 10.1007/BF00253122.

- [5] L. A. Caffarelli and A. Córdoba, “Uniform convergence of a singular perturbation problem,” *Communications on Pure and Applied Mathematics*, vol. 48, no. 1, pp. 1–12, 1995, doi: 10.1002/cpa.3160480101.
- [6] J. E. Hutchinson and Y. Tonegawa, “Convergence of phase interfaces in the van der Waals–Cahn–Hilliard theory,” *Calculus of Variations and Partial Differential Equations*, vol. 10, no. 1, pp. 49–84, 2000.
- [7] F. Pacard and M. Ritoré, “From constant mean curvature hypersurfaces to the gradient theory of phase transitions,” *Journal of Differential Geometry*, vol. 64, no. 3, pp. 359–423, 2003, doi: 10.4310/jdg/1090426999.
- [8] Y. Tonegawa, “On stable critical points for a singular perturbation problem,” *Communications in Analysis and Geometry*, vol. 13, no. 2, pp. 439–459, 2005, doi: 10.4310/CAG.2005.v13.n2.a7.
- [9] Y. Tonegawa and N. Wickramasekera, “Stable phase interfaces in the van der Waals–Cahn–Hilliard theory,” *Journal für die reine und angewandte Mathematik*, vol. 668, pp. 191–210, 2012.
- [10] E. De Giorgi, “Convergence problems for functionals and operators,” in *Proceedings of the International Meeting on Recent Methods in Nonlinear Analysis (Rome, 1978)*, Bologna: Pitagora, 1979, pp. 131–188.
- [11] N. Ghoussoub and C. Gui, “On a conjecture of De Giorgi and some related problems,” *Mathematische Annalen*, vol. 311, no. 3, pp. 481–491, 1998.
- [12] L. Ambrosio and X. Cabré, “Entire solutions of semilinear elliptic equations in $\mathbb{R}^3$ and a conjecture of De Giorgi,” *Journal of the American Mathematical Society*, vol. 13, no. 4, pp. 725–739, 2000.
- [13] O. Savin, “Regularity of flat level sets in phase transitions,” *Annals of Mathematics*, vol. 169, no. 1, pp. 41–78, 2009.
- [14] M. del Pino, M. Kowalczyk, and J. Wei, “On De Giorgi’s conjecture in dimension $N \geq 9$,” *Annals of Mathematics*, vol. 174, no. 3, pp. 1485–1569, 2011.
- [15] G. Alberti, L. Ambrosio, and X. Cabré, “On a long-standing conjecture of E. De Giorgi: symmetry in 3D for general nonlinearities and a local minimality property,” *Acta Applicandae Mathematicae*, vol. 65, no. 1–3, pp. 9–33, 2001.
- [16] D. Jerison and R. Monneau, “Towards a counter-example to a conjecture of De Giorgi in high dimensions,” *Annali di Matematica Pura ed Applicata*, vol. 183, no. 4, pp. 439–467, 2004.
- [17] F. Pacard and J. Wei, “Stable solutions of the Allen–Cahn equation in dimension 8 and minimal cones,” *Journal of Functional Analysis*, vol. 264, no. 5, pp. 1131–1167, 2013.
- [18] Y. Liu, K. Wang, and J. Wei, “Global minimizers of the Allen–Cahn equation in dimension $n \geq 8$,” *Journal de Mathématiques Pures et Appliquées*, vol. 108, no. 6, pp. 818–840, 2017.
- [19] O. Chodosh and C. Li, “Stable minimal hypersurfaces in $\mathbb{R}^4$,” *Acta Mathematica*, vol. 233, no. 1, pp. 1–31, 2024.
- [20] O. Chodosh, C. Li, P. Minter, and D. Stryker, “Stable minimal hypersurfaces in $\mathbb{R}^5$,” *Annals of Mathematics*, vol. 204, no. 1, pp. 423–453, 2026.
- [21] L. Mazet, “Stable minimal hypersurfaces in $\mathbb{R}^6$,” 2024.
- [22] H. Hong, H. Li, and G. Wang, “The stable Bernstein theorem in $\mathbb{R}^7$,” 2026.
- [23] H. Chan, X. Fernández-Real, A. Figalli, and J. Serra, “Global stable solutions to the free boundary Allen–Cahn and Bernoulli problems in 3D are one-dimensional,” *Journal of the American Mathematical Society*, vol. 39, no. 4, pp. 1027–1151, 2026.
- [24] X. Fernández-Real and J. Serra, “The stability conjecture for the Bernoulli problem in dimension four,” 2026.
- [25] A. Figalli and J. Serra, “On stable solutions for boundary reactions: a De Giorgi-type result in dimension $4+1$,” *Inventiones Mathematicae*, vol. 219, no. 1, pp. 153–177, 2020.
- [26] E. Florit-Simon and J. Serra, “On stable solutions to the Allen–Cahn equation with bounded energy density in $\mathbb{R}^4$,” 2025.
- [27] E. Florit-Simon, “Phase transitions with bounded index: Parallels to De Giorgi’s conjecture,” 2026.
- [28] M. do Carmo and C. Peng, “Stable complete minimal surfaces in $\mathbb{R}^3$ are planes,” *Bulletin of the American Mathematical Society*, vol. 1, no. 6, pp. 903–906, 1979.
- [29] D. Fischer-Colbrie and R. Schoen, “The structure of complete stable minimal surfaces in 3-manifolds of non-negative scalar curvature,” *Communications on Pure and Applied Mathematics*, vol. 33, no. 2, pp. 199–211, 1980.

- [30] A. V. Pogorelov, “On the stability of minimal surfaces,” *Soviet Mathematics Doklady*, vol. 24, pp. 274–276, 1981.
- [31] K. Wang and J. Wei, “Finite Morse index implies finite ends,” *Communications on Pure and Applied Mathematics*, vol. 72, no. 5, pp. 1044–1119, 2019.
- [32] K. Wang and J. Wei, “Second order estimate on transition layers,” *Advances in Mathematics*, vol. 358, p. 106856, 2019.
- [33] O. Chodosh and C. Mantoulidis, “Minimal surfaces and the Allen–Cahn equation on 3-manifolds: index, multiplicity, and curvature estimates,” *Annals of Mathematics*, vol. 191, no. 1, pp. 213–328, 2020.
- [34] P. Sternberg and K. Zumbrun, “Connectivity of phase boundaries in strictly convex domains,” *Archive for Rational Mechanics and Analysis*, vol. 141, no. 4, pp. 375–400, 1998.
- [35] A. Farina, B. Sciunzi, and E. Valdinoci, “Bernstein and De Giorgi type problems: new results via a geometric approach,” *Annali della Scuola Normale Superiore di Pisa, Classe di Scienze*, vol. 7, no. 4, pp. 741–791, 2008.
- [36] N. Wickramasekera, “A general regularity theory for stable codimension 1 integral varifolds,” *Annals of Mathematics*, vol. 179, no. 3, pp. 843–1007, 2014, doi: 10.4007/annals.2014.179.3.2.
- [37] L. A. Caffarelli and A. Córdoba, “Phase transitions: uniform regularity of the intermediate layers,” *Journal für die reine und angewandte Mathematik*, vol. 593, pp. 209–235, 2006, doi: 10.1515/CRELLE.2006.033.
- [38] M. del Pino, M. Kowalczyk, and J. Wei, “The Toda system and clustering interfaces in the Allen–Cahn equation,” *Archive for Rational Mechanics and Analysis*, vol. 190, pp. 141–187, 2008, doi: 10.1007/s00205-008-0143-3.
- [39] M. del Pino, M. Kowalczyk, and J. Wei, “Entire solutions of the Allen–Cahn equation and complete embedded minimal surfaces of finite total curvature in $\mathbb{R}^3$,” *Journal of Differential Geometry*, vol. 93, no. 1, pp. 67–131, 2013, doi: 10.4310/jdg/1357141507.
- [40] Y. Liu, K. Wang, J. Wei, and K. Wu, “Finite Morse index solutions of the Allen–Cahn equation with energy bound.” 2026.
- [41] Y. Liu, T. Luo, K. Wang, J. Wei, Y. Wei, and K. Wu, “Stable De Giorgi conjecture of the Allen–Cahn equation in $\mathbb{R}^3$.” 2026.
- [42] M. Kowalczyk, Y. Liu, and F. Pacard, “The space of 4-ended solutions to the Allen–Cahn equation in the plane,” *Annales de l’Institut Henri Poincaré. C, Analyse non linéaire*, vol. 29, no. 5, pp. 761–781, 2012.