

Программа по профилактике и лечению заболеваний молодняка КРС

1 этап	Безопасность первых 2-х дней жизни
Цель	<ol style="list-style-type: none"> 1. Технологичное выпаивание молозива. 2. Обеспечение защиты от инфекций ЖКТ за счет применения вяжущих и обволакивающих свойств Фарматана, дополнительного протеина и энергии для ворсинок кишечника.
1 день	<p>В 1-ю выпойку молозиво (в течение 1-го часа жизни) добавляем Фарматан СР в дозе 3 гр./гол. (1 ч. ложка).</p> <p>Обрабатываем пуповину Репидерма спрей в одно касание.</p>
2 день	<p>Во 2-ю выпойку (не позднее 12 ч после 1-й) задаем Фарматан Гель через дозатор 2 нажатия с максимальной дозой (8 мл/гол. – зеленый регулятор до упора).</p>
2 этап	Оптимизация процессов пищеварения и сохранения здоровья
Цель	<ol style="list-style-type: none"> 1. Обеспечение постоянной защиты от инфекций ЖКТ за счет применения Фарматан СР. 2. Получение привесов за счет содержания протеина в легкоусвояемой форме.
3 – 30 день (до 60 дня при поздних переводах)	<p>Добавляем Фарматан СР в каждую выпойку в дозе 3 гр./гол. (6 гр. в сутки).</p> <p>При появлении признаков угнетения, отказе от корма, применяем Фарматан Гель в дозе 8 мл/гол. 2 раза в день 2 дня (снимаем действие энтеротоксинов, не допускаем обезвоживания).</p>
3 этап	Профилактика респираторных заболеваний
Цель	<ol style="list-style-type: none"> 1. Снять отек слизистой оболочки носовых ходов при переводе (стресс, сквозняк, микроклимат). 2. Дать толчок для развития иммунного ответа на новые патогены и вакцины.
с 30, 45, 60 дня (у кого как переводят телят)	<p>При переводе обрабатываем каждого теленка Интра-Аэрозоль спрей в области носа 2 сек.</p> <p>Применяем Витровит в дозе 30-50 мл/гол. с выпойкой 1 раз/день в течение 2-3 недель.</p> <p>Один раз в неделю в выпойку добавляем Интра-Аэрозоль жидкость из расчета 2 мл/гол. утром и 2 мл/гол. вечером (исключаем за 2 дня до вакцинации и 2 дня после)</p> <p>При риске заболеваний ЖКТ (некачественный корм, молоко) применяем Фарматан СР до 60 дня.</p>
4 этап	Технология лечения телят при возникновении диареи
	<p>Применяем Фарматан гель незамедлительно после выявления заболевания 2р/день 2-3 дня подряд по 8мл/гол. (2 нажатия дозатора).</p> <p>При необходимости проводим мероприятия по восстановлению водно-щелочного баланса при помощи электролитов (раствор Рингера-Локка, гипертонический (изотонический) раствор натрия хлорида).</p> <p>С первого дня заболевания дополнительно увеличиваем дозу Фарматан СР с 6 гр. до 18 гр./гол. в сутки в течение 5 дней.</p>
5 этап	Технология лечения телят при респираторных заболеваниях
	<p>Вводим Интра-Аэрозоль в каждую выпойку (молоко или вода) из расчета 1мл на 4 л жидкости в течение 2-7 дней.</p> <p>Применяем Интра-Аэрозоль спрей местно в области носа 2 раза/день по 2-3 сек. 3-4 дня подряд.</p> <p>Проводим обработку газацией с добавлением Интра-Аэрозоль жидкости 200 мл на 10 л раствора 2 дня подряд (холодный или горячий туман).</p>