- 19:35:25 -- Человеку плохо, Вы в безопасности -> Выполнено
- 19:35:25 -- Громко оповестить, вывести лишних -> Выполнено
- 19:35:25 -- Вызвать СМП (телефон 103), назвать адрес, не класть трубку -> Выполнено
- 19:35:25 -- Доставить укладку, дефибриллятор -> Выполнено
- 19:35:30 -- Определение веса и возраста: Примерный возраст старше 10 лет Примерный вес 50-90 кг
- 19:35:32 -- В сознании. Ответил на вопрос "Что беспокоит" или отреагировал на мягкое "потрясывание" за плечи -> Да
- 19:35:32 -- Судороги -> Да
- 19:35:34 -- Уложите пациента на пол на спину -> Выполнено
- 19:35:34 -- Удалите от пациента опасные предметы (пациента от предметов). Насильно не удерживайте пациента!!! -> Выполнено
- 19:35:37 -- Генерализированные судороги -> Да
- 19:35:38 -- Характер дыхания -> Одышка
- 19:35:40 -- Пульс на сонной артерии -> Отчетливый
- 19:35:41 -- Подключите к пациенту пульсоксиметр -> Выполнено
- 19:35:41 -- Подсоедините тонометр, измерьте артериальное давление -> Выполнено
- 19:35:43 -- Артериальное давление -> Ниже 90/60 мм.рт.ст. у взрослого
- 19:35:45 -- Генерализированные судороги -> Да
- 19:35:46 -- Уложите пациента на пол на спину -> Выполнено
- 19:35:46 -- Удалите от пациента опасные предметы (пациента от предметов). Насильно не удерживайте пациента!!! -> Выполнено
- 19:35:48 -- Не помещайте пальцы в рот (за зубы) пациента -> Выполнено
- 19:35:48 -- Ничего не давайте через рот/под язык! -> Выполнено
- 19:35:49 -- Обеспечьте внутривенный/внутрикостный сосудистый доступ -> Выполнено
- 19:35:51 -- При наличии сосудистого доступа введите внутривенно вальпроевую кислоту мл (15 мг/кг), либо мидазолам мл (0,3 мг/к
- 19:35:51 -- При отсутствии сосудистого доступа внутримышечно ввести мидазолам мл (0,3 мг/кг), либо диазепам мл (0,3-0,5 мг/кг) ->
- 19:35:52 -- Сахар крови -> Выше 3 ммоль/л

- 19:35:53 -- Судороги купированы? -> Да
- 19:35:55 -- Пациент может выполнять команды? -> Да
- 19:35:57 -- Обеспечьте внутривенный/внутрикостный сосудистый доступ -> Выполнено
- 19:35:59 -- Внезапное начало. Покраснение кожи. Затруднения дыхания -> Нет
- 19:35:59 -- Введена потенциально токсическая доза местного анестетика (максимальная разовая доза). Реакция через некоторое вре
- 19:36:02 -- Боли в груди/ «жжение» за грудиной, нехватка воздуха есть? -> Нет
- 19:36:04 -- ЧСС более в мин -> Нет
- 19:36:04 -- ЧСС менее в мин -> Нет
- 19:36:07 -- Вводите внутривенно капельно или (при отсутствии сосудистого доступа внутримышечно) Эпинефрин (адреналин) 1,0 м
- 19:36:08 -- Оценивайте дыхание, пульс и SpO2 непрерывно, измеряйте АД не реже раза в 5 минут -> Выполнено
- 19:36:10 -- Артериальное давление -> Нормальное
- 19:36:13 -- Оценивайте дыхание, пульс и SpO2 непрерывно, измеряйте АД не реже раза в 5 минут. -> Выполнено
- 19:36:13 -- При нарушениях, развитии судорог нажмите «В начало» -> Выполнено
- 19:36:15 -- Пациент может выполнять команды? -> Да
- 19:36:20 -- Откройте пути для эвакуации пациента. Передайте пациента бригаде скорой медицинской помощи, опишите детали прои
- 19:36:20 -- Заполните медицинскую документацию -> Выполнено