

Logik

Aussagenlogik

Aussage Satz/Formel entweder wahr oder falsch; „-form“ bei zu wenig Infos.

Theoreme sind wahre Aussagen.

Junktoren

Negation $\neg A$ „Nicht“ (!, ~, \neg)

Konjunkt. $A \wedge B$ „und“ (&, \cap)

Disjunkt. $A \vee B$ „oder“ (||, \cup)

Implikat. $A \Rightarrow B$ „Wenn, dann“ / „B“ (\rightarrow , \supset)

$A \Rightarrow B$ „A hinreichend“

$B \Rightarrow A$ „A notwendig“

Äquiv. $A \Leftrightarrow B$ „Genau dann, wenn“ (\leftrightarrow , \equiv , $=$, \Leftrightarrow)

Wahrheitstabelle mit 2^n Zeilen für n Atome. Konstruktionssystematik: Frequenz pro Atom verdoppeln.

Äquivalente Formeln \Leftrightarrow		Bezeichnung
$A \wedge B$	$B \wedge A$	Kommutativ
$A \vee B$	$B \vee A$	
$A \wedge (B \wedge C)$	$(A \wedge B) \wedge C$	Assoziativ
$A \vee (B \vee C)$	$(A \vee B) \vee C$	
$A \wedge (B \vee C)$	$(A \wedge B) \vee (A \wedge C)$	Distributiv
$A \vee (B \wedge C)$	$(A \vee B) \wedge (A \vee C)$	
$A \wedge A$	A	Idempotenz
$A \vee A$	A	
$\neg \neg A$	A	Involution
$\neg(A \wedge B)$	$\neg A \vee \neg B$	
$\neg(A \vee B)$	$\neg A \wedge \neg B$	DE-MORGAN
$A \wedge (A \vee B)$	A	
$A \vee (A \wedge B)$	A	Absorption
$A \Rightarrow B$	$\neg A \vee B$	
$\neg(A \Rightarrow B)$	$A \wedge \neg B$	Elimination
$A \Leftrightarrow B$	$(A \Rightarrow B) \wedge (B \Rightarrow A)$	

Axiomatik

Axiome als wahr angenommene Aussagen; an Nützlichkeit gemessen. Anspruch, aber nach GÖDELS Unvollständigkeitssatz nicht möglich:

- Unabhängig
- Vollständig
- Widerspruchsfrei

Prädikatenlogik

Quantoren Innerhalb eines Universums:

Existenzq. \exists „Mind. eines“

Individuum $\exists!$ „Genau eines“

Allq. \forall „Für alle“

Quantitative Aussagen

Erfüllbar $\exists x F(x)$

Widerlegbar $\exists x \neg F(x)$

Tautologie $\top = \forall x F(x)$ (alle Schlussregeln)

Kontradiktion $\perp = \forall x \neg F(x)$



Klassische Tautologien	Bezeichnung
$A \vee \neg A$	Ausgeschlossenes Drittes
$A \wedge (A \Rightarrow B) \Rightarrow B$	Modus ponens
$(A \wedge B) \Rightarrow A$	Abschwächung
$A \Rightarrow (A \vee B)$	

Negation (DE-MORGAN)

$$\neg \exists x F(x) \Leftrightarrow \forall x \neg F(x)$$

$$\neg \forall x F(x) \Leftrightarrow \exists x \neg F(x)$$

Häufige Fehler

- $U = \emptyset^c$ nicht notwendig
- $\exists x(P(x) \Rightarrow Q(x)) \not\Leftrightarrow \exists x P(x)$
- $\neg \exists x \exists y P(x, y) \Leftrightarrow \forall x \neg \exists y P(x, y)$

Beweistechniken

Achtung: Aus falschen Aussagen können wahre *und* falsche Aussagen folgen.

Direkt $A \Rightarrow B$ Angenommen A , zeige B . Oder: Angenommen $\neg B$, zeige $\neg A$ (**Kontraposition**).

$$(A \Rightarrow B) \Leftrightarrow (\neg B \Rightarrow \neg A)$$

Fallunters. Aufteilen, lösen, zusammenführen. O.B.d.A = „Ohne Beschränkung der Allgemeinheit“

Widerspruch $(\neg A \Rightarrow \perp) \Rightarrow A$ Angenommen $A \wedge \neg B$, zeige Kontradiktion. (Reductio ad absurdum)

Ring (Transitivität der Implikation)

$$A \Leftrightarrow B \Leftrightarrow C \Leftrightarrow \dots$$
$$\equiv A \Rightarrow B \Rightarrow C \Rightarrow \dots \Rightarrow A$$

Induktion $F(n) \quad \forall n \geq n_0 \in \mathbb{N}$

1. **Anfang:** Zeige $F(n_0)$.

2. **Schritt:** Angenommen $F(n)$ (Hypothese), zeige $F(n+1)$ (Behauptung).

Starke Induktion: Angenommen $F(k) \quad \forall n_0 \leq k \leq n \in \mathbb{N}$.

Häufige Fehler

- Nicht voraussetzen, was zu beweisen ist
- Äquiv. von Implikat. unterscheiden (Zweifelsfall immer Implikat.)

Naive Mengenlehre

$$f(1) = 0, r_{11} r_{12} r_{13} r_{14} \dots$$
$$f(2) = 0, r_{21} r_{22} r_{23} r_{24} \dots$$
$$f(3) = 0, r_{31} r_{32} r_{33} r_{34} \dots$$
$$f(4) = 0, r_{41} r_{42} r_{43} r_{44} \dots$$

\vdots

(CANTORS Diagonalargumente)

Mengen Zusammenfassung versch. Objekte „Elemente“.

Element $x \in M$ „enthält“

Leere M. $\emptyset = \{\}$

Universum U

Einschränkung $\{x \mid F(x)\}$

Relationen

Teilmenge $N \subseteq M$
 $\Leftrightarrow \forall n \in N : n \in M$ \odot


Gleichheit $M = N$
 $\Leftrightarrow M \subseteq N \wedge N \subseteq M$ \odot

Mächtigkeit

$$|M| \begin{cases} = n & \text{endlich} \\ \geq \infty & \text{unendlich} \end{cases}$$
$$= |N| \Leftrightarrow \exists f_{\text{bijekt.}} : M \rightarrow N$$

Abzählbar $\exists f_{\text{surj.}} : \mathbb{N} \rightarrow M$

- Endliche Mengen, $\emptyset, \mathbb{N}, \mathbb{Z}, \mathbb{Q}$
- $M_{\text{abz.}} \wedge N_{\text{abz.}} \Rightarrow (M \cup N)_{\text{abz.}}$ ($= \{m_1, n_1, m_2, n_2, \dots\}$)
- $M_{\text{abz.}} \wedge N \subseteq M \Rightarrow N_{\text{abz.}}$



Operationen

Vereinig. $M \cup N$
 $\Leftrightarrow \{x \mid x \in M \vee x \in N\}$ \odot

Schnitt $M \cap N \Leftrightarrow \{x \mid x \in M \wedge x \in N\}$ ($= \emptyset$ „disjunkt“) \odot

Diff. $M \setminus N \Leftrightarrow \{x \mid x \in M \wedge x \notin N\}$ \odot

Komplement $M^c = \{x \mid x \notin M\}$ \odot

Alle logischen Äquivalenzen gelten auch für die Mengenoperationen.

Häufige Fehler

- $\forall M : \emptyset \subseteq M$, nicht $\forall M : \emptyset \in M$

Quantitative Relationen

Sei Indexmenge I und Mengen $M_i \quad \forall i \in I$.

$$\bigcup_{i \in I} M_i := \{x \mid \exists i \in I : x \in M_i\}$$

$$\bigcap_{i \in I} M_i := \{x \mid \forall i \in I : x \in M_i\}$$

Neutrale Elemente

- $\bigcup_{i \in \emptyset} M_i = \emptyset$ („hinzufügen“)
- $\bigcap_{i \in \emptyset} M_i = U$ („wegnehmen“)

Potenzmenge

$$\mathcal{P}(M) := \{N \mid N \subseteq M\}$$

$$|\mathcal{P}(M)| = 2^{|M|} \quad (\in / \notin \text{ binär})$$

Abbildungen

Abbildung f von X (Definitions- b.) nach Y (Werteb.) ordnet jedem $x \in X$ eindeutig ein $y \in Y$ zu.

$$f : X \rightarrow Y$$

Graph $\text{gr}(f) := \{(x, f(x)) \mid x \in X\}$

Identität

$$\text{id}_A : A \rightarrow A$$

$$\text{id}_A(a) := a \quad \forall a \in A$$

Umkehrfunktion $f^{-1} : Y \rightarrow X$ wenn f bijektiv und $(f \circ f^{-1})(y) = y$

Eigenschaften


Injektiv $\forall x_1, x_2 \in X :$
 $x_1 \neq x_2 \Leftrightarrow f(x_1) \neq f(x_2)$

Surjektiv $\forall y \in Y \exists x \in X : y = f(x)$

Bijektiv wenn injektiv und surjektiv

Verkettung $f \circ g : A \rightarrow C$

$$(f \circ g)(a) = f(g(a))$$
 (der Reihenfolge nach)



Relationen

Kartesisches Produkt

$$X_1 \times \cdots \times X_n := \{(x_1, \cdots, x_n) \mid x_1 \in X_1, \cdots, x_n \in X_n\}$$

Relation \sim von/auf M nach N ist Teilmenge $R \subseteq M \times N$. ($R' \subseteq N \times P$)

$$m \sim n \Leftrightarrow (m, n) \in R$$

\equiv **Reflexiv** $\forall x \in M : (x, x) \in R$
 $\Leftrightarrow \text{id}_M \subseteq R$

Irreflexiv $\forall x \in M : (x, x) \notin R$
 $\Leftrightarrow \text{id}_M \cap R = \emptyset$

\equiv **Sym.** $\forall (x, y) \in R : (y, x) \in R$
 $\Leftrightarrow R \subseteq R^{-1}$

Antis. $\forall x, y : ((x, y) \in R \wedge (y, x) \in R) \Rightarrow x = y$
 $\Leftrightarrow R \cap R' \subseteq \text{id}_M$

\equiv **Transitiv** $\forall x, y, z : ((x, y) \in R \wedge (y, z) \in R) \Rightarrow (x, z) \in R$
 $\Leftrightarrow R; R \subseteq R$

Vollst. $\forall x, y \in M : (x, y) \in R \vee (y, x) \in R$
 $\Leftrightarrow R \cup R^{-1} = M \times M$

Spezielle Relationen

Inverse Relation R^{-1} mit $R \in M \times N := \{(n, m) \in N \times M \mid (m, n) \in R\}$

Komposition $R; R$ mit $R' \in N \times P := \{(m, p) \in M \times P \mid \exists n \in N : (m, n) \in R \wedge (n, p) \in R'\}$

Leere Relation \emptyset

Identität $\text{id}_M := \{(m, m) \mid m \in M\}$
(=)

Allrelation $M \times M$

Äquivalenzrelation \equiv reflexiv, symmetrisch und transitiv. (Gleichheit***)

Äquivalenzklasse $[m]_{\equiv}$ auf M , Vertreter $m \in M$.

$$[m]_{\equiv} := \{x \in M \mid m \equiv x\}$$

$$\Leftrightarrow [m]_{\equiv} = [x]_{\equiv}$$

Zerlegung $\mathcal{N} \subseteq \mathcal{P}(M)$ von M .

- $\emptyset \notin \mathcal{N}$
- $M = \bigcup \mathcal{N}$
- $N \cap N' = \emptyset$
($N, N' \in \mathcal{N} : N \neq N'$)
- (Korrespondiert zur ÄR.)

Quotient (M / \equiv) Sei \equiv ÄR. auf M . (ist Zerlegung)

$$(M / \equiv) := \{[m]_{\equiv} \mid m \in M\}$$

Analysis

Reelle Zahlen \mathbb{R}

Angeordnete Körper

(Gilt auch für \mathbb{Z} und \mathbb{Q})

Körperaxiome $(\mathbb{R}, +, *)$ $a, b, c \in \mathbb{R}$

Addition $(\mathbb{R}, +)$

Assoziativität
 $a + (b + c) = (a + b) + c$

Kommutativität
 $a + b = b + a$

Neutrales Element Null

$$a + 0 = a \quad 0 \in \mathbb{R}$$

Inverses „Negativ“

$$a + (-a) = 0 \quad (-a) \in \mathbb{R}$$

Multiplikation $(\mathbb{R}, *)$

Assoziativität $a * (b * c) = (a * b) * c$

Kommutativität $a * b = b * a$

Neutrales Element Eins

$$a * 1 = a \quad 1 \in \mathbb{R} \setminus \{0\}$$

Inverses „Kehrwert“

$$a * (a^{-1}) = 1$$

$$a \neq 0, (a^{-1}) \in \mathbb{R}$$

Distributivität

$$a * (b + c) = a * b + a * c$$

Totale Ordnung

Transitivität

$$a < b \wedge b < c \Rightarrow a < c$$

Trichotomie Entweder

$$a < b \text{ oder } a = b \text{ oder } b < a$$

$$\Rightarrow \text{Irreflexivität } (a < b \Rightarrow a \neq b)$$

Addition

$$a < b \Rightarrow a + c < b + c$$

Multiplikation

$$a < b \Rightarrow a * c < b * c \quad 0 < c$$

Bei Additiver oder Multiplikativer Inversion dreht sich die Ungleichung.

ARCHIMEDES Axiom

$$\forall x \in \mathbb{R} \exists n \in \mathbb{N} : n > x$$

$$n > \frac{1}{x}$$

Teilbarkeit

$$a \mid b \Leftrightarrow \exists n \in \mathbb{Z} : b = a * n$$

($\Rightarrow \sqrt{2} \notin \mathbb{Q}$, da mit $\frac{a}{b} = \sqrt{2}$ nicht teilerfremd)

Häufige Fehler

- Nicht durch Null teilen/kürzen
- Nicht $-x < 0$ annehmen
- Multiplikation mit negativen Zahlen kehrt Ungleichungen

Operationen

Brüche

- $\frac{a}{b} * \frac{c}{d} = \frac{a*c}{b*d}$
- $\frac{a}{b} \stackrel{*d}{=} \frac{a*d}{b*d}$
- $\frac{a}{c} + \frac{b}{c} = \frac{a+b}{c}$
- $\frac{a}{b} + \frac{c}{d} = \frac{a*d+c*b}{b*d}$

Wurzeln $b^n = a \Leftrightarrow b = \sqrt[n]{a}$

- $\sqrt[n]{a * b} = \sqrt[n]{a} * \sqrt[n]{b}$
- $\sqrt[n]{\sqrt[m]{a}} = \sqrt[n*m]{a}$
- $\sqrt[n]{a} < \sqrt[n]{b} \quad 0 \leq a < b$
- $\sqrt[n+1]{a} < \sqrt[n]{a} \quad 1 < a$
- $\sqrt[n]{a} < \sqrt[n+1]{b} \quad 0 < a < 1$

$$\sqrt[n]{a^n} = |a| \quad a \in \mathbb{R}$$

Potenzen $a^{\frac{x}{y}} = \sqrt[y]{a^x}$

- $a^x * b^x = (a * b)^x$
- $a^x * a^y = a^{x+y}$
- $(a^x)^y = a^{x*y}$

Intervalle

Sei $A \subseteq \mathbb{R}, A \neq \emptyset, a_0 \in A$.

Geschlossen $[a; b] := \{x \in \mathbb{R} \mid a \leq x \leq b\}$
(„Ecken sind mit enthalten“)

Offen $(a; b) := \{x \in \mathbb{R} \mid a < x < b\}$
(Bei ∞ immer offen, da $\infty \notin \mathbb{R}$)

Kleinstes/Größtes Element

Minimum $\min(A) := a_0$
 $\Leftrightarrow \forall a \in A : a_0 \leq a$

Maximum $\max(A) := a_0$
 $\Leftrightarrow \forall a \in A : a \leq a_0$

$$(\sharp^{\min} / \max(a; b))$$

Beschränktheit A heißt

Ober beschränkt $\exists s \in \mathbb{R} \forall a \in A : \mathbf{a} \leq s$


Unten beschränkt $\exists s \in \mathbb{R} \forall a \in A : \mathbf{s} \leq a$

Vollständigkeit

Infimum (klein) $\inf(A)$
:= $\max\{s \in \mathbb{R} \mid \forall a \in A : \mathbf{s} \leq a\}$

Supremum (groß) $\sup(A)$
:= $\min\{s \in \mathbb{R} \mid \forall a \in A : \mathbf{a} \leq s\}$

Vollständigkeitsaxiom $\exists \sup(A).$



Folgen

Folge $(\mathbf{a_n})_{n \in \mathbb{N}}$ in A ist eine Abb. $f : \mathbb{N} \rightarrow A$ mit $a_n = f(n)$.

Arithmetische Folge $a_{n+1} = a_n + d$
 $a_n = a + (n - 1) * d \quad d, a \in \mathbb{R}$

Geometrische Folge $a_{n+1} = a_n * q$
 $a_n = q^n \quad q \in \mathbb{R}$

Rekursion a_n ist auf $\mathbf{a_{n-1}}$ definiert.

$$a_{n+1} = F(n, a_n) \quad \forall n \in \mathbb{N}$$
$$F : A \times \mathbb{N} \rightarrow A$$

Primfaktorzerlegung $n \in \mathbb{N}, n \geq 2$

$$\exists p_1, \dots, p_n \in \mathbb{P} : n = \mathbf{p_1 * \dots * p_n}$$

Summen und Produkte

Summe $\sum_{i=1}^n i = 1 + 2 + \dots + n$

Produkt $\prod_{i=1}^n i = 1 * 2 * 3 * \dots * n$

Fakultät $n! = \prod i \quad (\mathbf{0! = 1})$

GAUSSCHE SUMME $n \in \mathbb{N}$

$$\sum i = \frac{n * (n + 1)}{2}$$

Geom. Summe $q \in \mathbb{R} \setminus \{0\}, n \in \mathbb{N}_0$

$$\sum_{i=0}^n q^i = \frac{1 - q^{n+1}}{1 - q}$$

BERNOULLI Unglei. $n \in \mathbb{N}_0, x \geq -1$

$$(1 + x)^n \geq 1 + n * x$$

Binom. Koeff. $\binom{n}{k} = \frac{n!}{k! * (n - k)!}$

• Rechnen: $\frac{n > k}{0 < (n - k)}$

$$\binom{n}{0} = \binom{n}{n} = 1$$

$$\binom{n+1}{k+1} = \binom{n}{k} + \binom{n}{k+1}$$

Binomischer Satz $n \in \mathbb{N}$

$$(a + b)^n = \sum_{k=0}^n \binom{n}{k} * a^{n-k} * b^k$$

Grenzwerte

Betrag $|x| := \begin{cases} x & 0 \leq x \\ -x & x < 0 \end{cases}$

Lemma $|x * y| = |x| * |y|$


Dreiecksungleichung $|x + y| \leq |x| + |y|$

Umgekehrte Dreiecksungleichung
 $||x| - |y|| \leq |x - y|$

Konvergenz

Sei $(a_n)_{n \in \mathbb{N}} \subseteq \mathbb{R}, a \in \mathbb{R}.$

$$a_n \xrightarrow{n \rightarrow \infty} a \Leftrightarrow \forall \epsilon > 0 \exists n_0 \in \mathbb{N} \forall n \in \mathbb{N} n \geq n_0 : |\mathbf{a_n - a}| \leq \epsilon$$
$$(a - \epsilon \leq a_n \leq a + \epsilon)$$



$$\bullet \quad a_n \xrightarrow{n \rightarrow \infty} a \Leftrightarrow \mathbf{\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = a}$$

Beschränkt + monoton \Rightarrow konvergent:

$$\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = \begin{cases} \inf\{a_n \mid n \in \mathbb{N}\} & (a_n)_{\text{fall.}} \\ \sup\{a_n \mid n \in \mathbb{N}\} & (a_n)_{\text{steig.}} \end{cases}$$

Nullfolgen $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = \mathbf{0}$

- $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{n^k} = \mathbf{0} \quad k \in \mathbb{N}$
- $\lim_{n \rightarrow \infty} n * q^n = \mathbf{0}$

Folgen gegen 1

- $\lim_{n \rightarrow \infty} \sqrt[n]{a} = \mathbf{1} \quad a > 0$
- $\lim_{n \rightarrow \infty} \sqrt[n]{n} = \mathbf{1}$

Bestimmt Divergent

$$a_n \xrightarrow{n \rightarrow \infty} \infty \Leftrightarrow \forall R > 0 \exists n \geq n_0 \in \mathbb{N} : a_n \geq R$$
$$a_n \xrightarrow{n \rightarrow \infty} -\infty \Leftrightarrow \forall R < 0 \exists n \geq n_0 \in \mathbb{N} : a_n \leq R$$

$$\lim_{n \rightarrow \infty} q^n \begin{cases} = \mathbf{0} & (-1; 1) \\ = \mathbf{1} & = 1 \\ \geq \infty & > 1 \\ \text{div.} & \leq -1 \end{cases}$$

Monotonie

Monoton fallend

$$a_n \underset{(\text{streng})}{\geq} a_{n+1} \quad \forall n \in \mathbb{N}$$

Monoton steigend

$$a_n \underset{(\text{streng})}{\leq} a_{n+1} \quad \forall n \in \mathbb{N}$$

Beschränktheit

$$\exists k > 0 \forall n \in \mathbb{N} : |\mathbf{a_n}| \leq k$$

- Konvergent \Rightarrow beschränkt
- Unbeschränkt \Rightarrow divergent

Grenzwertsätze

$$\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = a, \lim_{n \rightarrow \infty} b_n = b$$

$$\bullet \quad a_n \xrightarrow{n \rightarrow \infty} a \wedge a_n \xrightarrow{n \rightarrow \infty} b \Rightarrow a = b \text{ (Max. einen Grenzw.)}$$

$$\bullet \quad a = \mathbf{0} \wedge (b_n)_{\text{beschr.}} \Leftrightarrow \lim_{n \rightarrow \infty} a_n * b_n = \mathbf{0}$$

$$\bullet \quad a_n \leq b_n \Leftrightarrow a \leq b \quad (\text{nicht } <)$$

$$\bullet \quad \lim_{n \rightarrow \infty} \begin{cases} a_n \pm b_n = a \pm b \\ a_n * b_n = a * b \\ a_n * c = a * c \\ \sqrt[k]{a_n} = \sqrt[k]{a} \\ |a_n| = |a| \end{cases}$$

Einschachtelungssatz

$$\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = \lim_{n \rightarrow \infty} b_n = a$$
$$\forall n \geq N \in \mathbb{N} : \mathbf{a_n \leq c_n \leq b_n}$$
$$(\exists) \lim_{n \rightarrow \infty} c_n = \mathbf{a}$$

Spezielle Folgen

Teilfolge *streng mnt.* Folge $(b_k)_{k \in \mathbb{N}}$ mit $(n_k)_{k \in \mathbb{N}}$, sodass $b_k = \mathbf{a_{n_k}} \quad \forall k \in \mathbb{N}.$

$$\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = a \Rightarrow \lim_{n \rightarrow \infty} a_{n_k} = a$$

(da n_k mnt. steigend)

$$\forall (a_n)_{n \in \mathbb{N}} \exists (a_{n_k})_{k \in \mathbb{N}} \text{ mnt.}$$

(nicht streng!)

Häufungspunkt h mit einer Teilfolge

$$\lim_{n \rightarrow \infty} a_{n_k} = h$$

$$\bullet \quad \lim_{n \rightarrow \infty} a_n = a \Leftrightarrow \exists ! : h = a$$

BOLZANO-WEIERSTRASS

$$(a_n)_{n \in \mathbb{N}} \text{ beschr.} \Rightarrow \exists h \text{ Häuf.}$$

(Teilfolge + (beschr.) $\Rightarrow \exists$ Häuf.)

CAUCHY-Folge

$$\forall \epsilon > 0 \exists n_0 \in \mathbb{N} \forall n, m \geq n_0 : |a_n - a_m| \leq \epsilon$$

(Konv. ohne bekannten Grenzwert)

Vollständigkeit von \mathbb{R}

$$(a_n)_{n \in \mathbb{N}} \text{ CAUCHY} \Leftrightarrow \exists \lim_{n \rightarrow \infty} a_n$$

$$(\exists \lim_{n \rightarrow \infty} a_n \Rightarrow (a_n)_{n \in \mathbb{N}} \text{ CAUCHY} \Rightarrow (a_n)_{n \in \mathbb{N}} \text{ beschr.} \Rightarrow \exists h \text{ (BW)} \Rightarrow \lim_{n \rightarrow \infty} a_n = h)$$

Reihen

Reihe $(s_n)_{n \in \mathbb{N}} = \sum_{k=1}^{\infty} a_k$ mit den Gliedern $(a_k)_{k \in \mathbb{N}}$.

n-te Partialsumme $s_n = \sum_{k=1}^n a_k$

Grenzwert ebenfalls $\sum_{k=1}^{\infty} a_k$, falls s_n konvergiert

Spezielle Reihen

Geom. $\sum_{k=0}^{\infty} q^k = \frac{1}{1-q} \quad q \in (-1; 1)$

Harmon. $\sum_{k=1}^{\infty} \frac{1}{k}$ divergent

Allg. Harmon. $\sum_{k=1}^{\infty} \frac{1}{k^\alpha}$ konvergiert $\forall \alpha > \mathbf{1}$

Lemma

- $\sum_{k=1}^{\infty} a_k, \sum_{k=1}^{\infty} b_k$ konvergent
 $-\sum_{k=1}^{\infty} \mathbf{a_k} + \sum_{k=1}^{\infty} \mathbf{b_k} = \sum_{k=1}^{\infty} (\mathbf{a_k} + \mathbf{b_k})$
 $-\mathbf{c} * \sum_{k=1}^{\infty} \mathbf{a_k} = \sum_{k=1}^{\infty} \mathbf{c * a_k}$
- $\exists N \in \mathbb{N} : (\sum_{k=N}^{\infty} a_k)_{\text{konv.}} \Rightarrow (\sum_{k=1}^{\infty} a_k)_{\text{konv.}}$ (Es reicht spätere Glieder zu betrachten)
- $(\sum_{k=1}^{\infty} a_k)_{\text{konv.}} \Rightarrow \forall N \in \mathbb{N} : (\sum_{k=N}^{\infty} a_k)_{\text{konv.}} \Rightarrow \lim_{N \rightarrow \infty} \sum_{k=N}^{\infty} a_k = 0$

Konvergenzkriterien

CAUCHY

$(\sum_{k=1}^\infty a_k)_{\text{konv.}}$
 $\Leftrightarrow (\sum_{k=1}^n a_k)_{n \in \mathbb{N}}$ CAUCHY
 $\Leftrightarrow \forall \epsilon > 0 \exists n_0 \in \mathbb{N} \forall n > m > n_0 :$
 $|\sum_{k=m+1}^n a_k| \leq \epsilon$

Notwendige

$(\sum_{k=1}^\infty a_k)_{\text{konv.}} \Rightarrow \lim_{n \rightarrow \infty} a_n = 0$
 $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n \neq 0 \Rightarrow (\sum_{k=1}^\infty a_k)_{\text{div.}}$

Hinreichende

Lemma $a_k \geq 0 \Rightarrow (mnt.) \forall k \in \mathbb{N}$

$(\sum_{k=1}^\infty a_k)_{\text{konv.}} \Leftrightarrow (\sum_{k=1}^\infty a_k)_{\text{beschr.}}$

Majorante $0 \leq \mathbf{a_k} \leq \mathbf{b_k} \quad \forall k \in \mathbb{N}$
(Min. \leq Major.)

$(\sum_{k=1}^\infty b_k)_{\text{konv.}} \Leftrightarrow (\sum_{k=1}^\infty a_k)_{\text{konv.}}$

Algorithmus Handlungsvorschrift aus endlich vielen Einzelschritten zur Problemlösung.

- Korrektheit (Test-based dev.)
- Terminierung (TOURING)
- Effizienz (Komplexität)

Formen (High to low) Menschl. Sprache, Pseudocode, Mathematische Ausdrücke, Quellcode, Binärcode

Divide & Conquer

Divide Zerlegen in kleinere Teilprobleme

Conquer Lösen der Teilprobleme mit gleicher Methode (rekursiv)

Merge Zusammenführen der Teillösungen

Effizienz

Raum/Zeit-Tradeoff: schnell + großvs. klein + langsam.

Programmlaufzeit/-allokationen	Komplexität
Einfluss äußerer Faktoren	Unabh.
Konkrete Größe	Asymptotische Schätzung

Inputgröße **n** Jeweils

- Best-case C_B
- Average-case C_A
- Worst-case C_W

Asymptotische /Speicherkomplexität

Groß-O-Notation Kosten $C_f(n)$ mit $g : \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{R} \exists c > 0 \exists n_0 > 0 \forall n \geq n_0$

Untere Schranke $\Omega(f)$
 $C_f(n) \geq c * g(n)$

Obere Schranke $O(f)$
 $C_f(n) \leq c * g(n)$

Exakte Schranke $\Theta(f)$
 $C_f(n) \in \Omega(f) \cap O(f)$
Polynom kten Grades $\in \Theta(n^k)$

(Beweis: g und c finden)

Groß-O	Wachstum	Klasse	
$O(1)$	Konstant		lösbar
$O(\log n)$	Logarithmisch		
$O(n)$	Linear		
$O(n \log n)$	Nlogn		
$O(n^2)$	Quadratisch	Polynomiell $O(n^k)$	
$O(n^3)$	Kubisch		hart
$O(2^n)$	Exponentiell	Exponentiell $O(\alpha^n)$	
$O(n!)$	Fakultät		
$O(n^n)$			

Rechenregeln

Elementare Operationen, Kontrollstr. $\in O(1)$

Schleifen $\in i$ Wiederholungen $* O(f)$ teuerste Operation

Abfolge $O(g)$ nach $O(f) \in O(\max(f; g))$

Rekursion $\in k$ Aufrufe $* O(f)$ teuerste Operation

Mastertheorem $a \geq 1, b > 1, \Theta > 0$

$T(n) = a * T(\frac{n}{b}) + \Theta(n^k)$
 $\Rightarrow \begin{cases} \Theta(n^k) & a < b^k \\ \Theta(n^k * \log n) & a = b^k \\ \Theta(n^{\log_b a}) & a > b^k \end{cases}$

Floor/Ceiling

Floor $\lfloor x \rfloor$ nach unten

Ceiling $\lceil x \rceil$ nach oben

Suchverfahren

Lineare Liste endlich, geordnete (nicht sortierte) Folge n Elemente
 $L := [a_0, \dots, a_n]$ gleichen Typs.

Array Sequenzielle Abfolge im Speicher, statisch, Index $O(1)$, schnelle Suchverfahren

Sequenziell $C_A(n) = \frac{1}{n} * \sum^n i = \frac{n+1}{2} \in O(n)$

Algorithm: Sequential Search
Input: Liste L , Predikat x
Output: Index i von x
for $i \leftarrow 0$ to $L.\text{len} - 1$ do
 if $x = L[i]$ then
 return i
 end
end
return -1

Auswahlproblem Finde i -kleinstes Element in unsortierter Liste $\in \Theta(n)$

Algorithm: i-Smallest Element
Input: Unsortierte Liste L , Level i
Output: Kleinstes Element x
 $p \leftarrow L[L.\text{len} - 1]$
for $k = 0$ to $L.\text{len} - 1$ do
 if $L[k] < p$ then
 Push($L_{<}, L[k]$)
 if $L[k] > p$ then
 Push($L_{>}, L[k]$)
 end
end
if $L_{<}.\text{len} = i - 1$ then
 return p
if $L_{<}.\text{len} > i - 1$ then
 return i -Smallest Element $L_{<}$
if $L_{<}.\text{len} < i - 1$ then
 return i -Smallest Element ($L_{>}, i - 1 - L_{<}.\text{len}$)
end

Sortierte Listen

Binär $C_W(n) = \lfloor \log_2 n \rfloor + 1, C_A(n) \approx \log_2 n \in O(\log n)$

Algorithm: Binary Search
Input: Sortierte Liste L , Predikat x
Output: Index i von x
if $L.\text{len} = 0$ then
 return -1
else
 $m \leftarrow \lfloor \frac{L.\text{len}}{2} \rfloor$
 if $x = L[m]$ then
 return m
 if $x < L[m]$ then
 return Binary Search
 $[L[0], \dots, L[m - 1]]$
 if $x > L[m]$ then
 return $m + 1$ + Binary Search
 $[L[m + 1], \dots, L[L.\text{len} - 1]]$
end

Sprung Kosten Vergleich a , Sprung b mit optimaler Sprungweite:

$m = \lfloor \sqrt{\frac{a}{b}} * n \rfloor$

$C_A(n) = \frac{1}{2} (\lceil \frac{n}{m} \rceil * a + m * b) \in O(\sqrt{n})$

Algorithm: Jump Search
Input: Sortierte Liste L , Predikat x
Output: Index i von x
 $m \leftarrow \lfloor \sqrt{n} \rfloor$
while $i < L.\text{len}$ do
 $i \leftarrow i + m$
 if $x < L[i]$ then
 return Search
 $[L[i - m], \dots, L[i - 1]]$
 end
end
return -1

- Rekursive $\in O(\sqrt[n]{n})$ Sprungsuche
- Partitionierung in Blöcke m möglich

Exponentiell $\in O(\log x)$

Algorithm: Exponential Search
Input: Sortierte Liste L , Predikat x
Output: Index i von x
while $x \geq L[i]$ do
 $i \leftarrow 2 * i$
end
return Search $[L[i/2], \dots, L[i - 1]]$

- Unbekanntes n möglich

Interpolation $C_A(n) = 1 + \log_2 \log_2 n, C_W(n) \in O(n)$

Algorithm: Searchposition
Input: Listengrenzen $[u, v]$
Output: Suchposition p
return $\lfloor u + \frac{x - L[u]}{L[v] - L[u]} (v - u) \rfloor$

Algorithm: Interpolation Search
Input: Sortierte Liste $[L[u], \dots, L[v]]$, Predikat x
Output: Index i von x
if $x < L[u] \vee x > L[v]$ then
 return -1
 $p \leftarrow \text{Searchposition}(u, v)$
if $x = L[p]$ then
 return p
if $x > L[p]$ then
 return Interpolation Search($p + 1, v, x$)
else
 return Interpolation Search($u, p - 1, x$)
end

Häufigkeitsordnungen mit Zugriffswahrscheinlichkeit $p_i: C_A(n) = \sum_{i=0}^n i * p_i$

Frequency-count Zugriffszähler pro Element

Transpose Tausch mit Vorgänger

Move-to-front

Verkettete Listen

Container Jedes Element p ist in der Form $p \rightarrow \boxed{(\text{key}) \mid \text{value} \mid \text{next}}$. Index $\in O(n)$

Löschen ∈ O(1)

```
Algorithm: Delete
Input: Zeiger p auf Vorgänger des löschendes Elements
if p ≠ ∅ ∧ p → next ≠ ∅ then
|   p → next ← (p → next) → next
end
```

- desh. sehr dynamisch

Suchen C_A(n) = $\frac{n+1}{2}$ ∈ O(n)


```
Algorithm: Search Linked List
Input: Verkettete Liste L, Predikat x
Output: Zeiger p auf x
p ← L.head while p → value ≠ x do
|   p ← p → next
end
return p
```

Doppelt Verkettet Zeiger auf Vorgänger

(key) | value | prev | next

- Bestimmung des Vorgängers ∈ O(1) statt O(n)
- Höherer Speicheraufwand

Skip



- Zeiger auf Ebene i zeigt zu nächstem 2ⁱ Element
- Suchen ∈ O(log n)

Perfekt Einfügen, Löschen ∈ O(n) (Vollst. Reorga.)

Randomisiert Höhe zufällig (keine vollst. Reorga.)
 $P(h) = \frac{1}{2^{h+1}}$: Einfügen, Löschen ∈ O(log n)

Spezielle Listen

ADT „Abstrakte Datentypen“

Stack S = |„TOP“, ... Operationen nur auf letztem Element ∈ O(1)

Queue Q = ||„HEAD“, ... , „TAIL“
Vorne Löschen, hinten einfügen ∈ O(1)

Priority Queue $P = \begin{bmatrix} p_0 & p_1 & \cdots & p_n \\ a_0 & a_1 & \cdots & a_n \end{bmatrix}$
Jedes Element hat Priorität; Entfernen von Element mit höchster („MIN“) Priorität

Sortierverfahren

Einfache Sortierverfahren O(n²)

Verbesserte Sortierverfahren O(n log n)

Große Datensätze sortieren

Spezielle Sortierverfahren O(n)

Algorithmen	Stabil	Speicher	Schlüsselvergleiche			Satzbewegungen			Komplexität
			C_{in}	C_{ex}	M_{in}	M_{ex}	M_{tr}		
Selection	#	1	$\frac{n(n-1)}{2}$	$\frac{n(n-1)}{2}$	$3 \cdot (n-1)$	$3 \cdot (n-1)$	$3 \cdot (n-1)$	$O(n^2)$	
Insertion	✓	1	$n-1$	n	$\frac{n(n-1)}{2}$	$2 \cdot (n-1)$	$n-1$		
Bubble	✓	1	$\frac{n(n-1)}{2}$	$\frac{n(n-1)}{2}$	0	$\frac{n(n-1)}{2}$	$\frac{n(n-1)}{2}$		
<hr/>									
			Best-case			Worst-case			
Shell	#	1	-	$n \log n$	$n \log n$	-	n^2	$O(n \log n)$	
Quick	#	n	-	$n \log n$	$n \log n$	-	n^2		
Tunes	#	n	-	$n \log n$	$n \log n$	-	$n \log n$		
Heap	#	1	-	$n \log n$	$n \log n$	-	$n \log n$		
Merge	✓	n	-	$n \log n$	$n \log n$	-	$n \log n$		
<hr/>									
Untere Schranke $\Omega(n \log n)$ für allg. Sortierverfahren									
Distribution	✓	n	-	n	n	-	$n \log n, n^2$	Speziell $\Omega(n)$	