

# 考研概率论

枫聆

2021 年 10 月 11 日

## 目录

<b>1</b>	<b>概率运算</b>	<b>2</b>
1.1	翻译事件要准确 . . . . .	2
1.2	贝叶斯的应用 . . . . .	2
1.3	随机变量函数 . . . . .	2
1.4	连续性判定 . . . . .	2
<b>2</b>	<b>正态分布</b>	<b>3</b>
2.1	线性运算 . . . . .	3
<b>3</b>	<b>期望和方差</b>	<b>4</b>
3.1	复杂随机变量函数 . . . . .	4
3.2	随机变量乘积 . . . . .	4
<b>4</b>	<b>三大分布</b>	<b>4</b>
4.1	三大分布重要性质的应用 . . . . .	4

## 概率运算

### 翻译事件要准确

**Example 1.1.** 某种产品由自动生产线进行生成, 一旦出现不合格品就立即对其进行调整, 经过调整后生产出的产品为不合格的概率为 0.1, 求两次调整之间至少产生 3 件产品的概率.

**hints** 设  $A_i = \{\text{一次调整之后生产的第 } i \text{ 件为次品}\}$ ,  $B = \{\text{两次调整之间至少产生 3 件产品}\}$ , 那么

$$P(B) = 1 - P(A_1) - P(A_2) = 1 - 0.1 - 0.1 * 0.9 = 0.81.$$

### 贝叶斯的应用

**Example 1.2.** 假设有两箱同种零件: 第一箱内装有 50 件, 其中 10 件一等品; 第二箱内装有 30 件, 其中 18 件一等品. 现从两箱中随意挑选一箱, 然后从箱中随机取两个零件, 试求在第一次取出的零件是一等品的条件下, 第二次取出一等品的概率.

**hints** 设事件  $A$  为选择第一个箱子, 事件  $B_1$  为第一次取出一等品, 事件  $B_2$  为第二次取出一等品. 这里要求的是一个条件概率  $P(B_2|B_1)$ , 首先我们用贝叶斯公式分别计算  $P(A|B_1)$  和  $P(\bar{A}|B_1)$ , 即

$$P(A|B_1) = \frac{P(A)P(B_1|A)}{P(A)P(B_1|A) + P(\bar{A})P(B_1|\bar{A})} = \frac{\frac{10}{50}}{\frac{10}{50} + \frac{18}{30}} = \frac{1}{4},$$

因此  $P(\bar{A}|B_1) = \frac{3}{4}$ . 于是

$$P(B_2|B_1) = P(B_2|AB_1)P(A|B_1) + P(B_2|\bar{A}B_1)P(\bar{A}|B_1) = \frac{9}{49} \times \frac{1}{4} + \frac{17}{29} \times \frac{3}{4}$$

### 随机变量函数

### 连续性判定

**Example 1.3.** 设随机变量  $X$  与  $Y$  相互独立,  $X$  服从参数为  $\lambda$  的指数分布,  $Y$  的分布律为  $P\{Y = -1\} = \frac{1}{2}$ ,  $P\{Y = 1\} = \frac{1}{2}$ . 判定  $Z = X + Y$  的分布函数  $F_Z(z)$  的连续性.

**hints** 求出  $F_Z(z)$  来判断是下策! 这里要结合分布函数的性质来做就比较简单, 如果  $F_Z(z)$  有间断点  $a$ , 那么它是左间断的, 即  $P\{Z = a\} = F(a) - F(a-0) > 0$ . 因此我们来求  $P\{Z = a\}$ ,

$$P\{Z = a\} = P\{X \leq a+1\}P\{Y = -1\} + P\{X \leq a-1\}P\{Y = 1\} = \frac{1}{2}[P\{X \leq a+1\} + P\{X \leq a-1\}] = 0$$

最后一个等式成立条件是因为  $X$  是连续的.

## 正态分布

### 线性运算

**Example 2.1.** 设  $X_1, X_2$  是两个独立的正态分布  $(\mu, \sigma^2)$ , 证明:  $X_1 - X_2$  和  $X_1 + X_2$  也是独立的.

[hints](#)

$$\text{Cov}(X_1 - X_2, X_1 + X_2) = D(X_1) - D(X_2) = 0,$$

且  $X_1 - X_2 \sim (0, 2\sigma^2), X_1 + X_2 \sim (2\mu, 2\sigma^2)$ .

## 期望和方差

### 复杂随机变量函数

**Example 3.1.** 相互独立的随机变量  $X_1$  和  $X_2$  均服从正态分布  $N(0, \frac{1}{2})$ , 求  $D(|X_1 - X_2|)$ .

**hints** 这里求期望不需要计算出  $|X_1 - X_2|$  的概率分布, 只需要确定  $X_1 - X_2$  概率分布即可, 设  $Z = X_1 - X_2$ , 那么显然有  $Z \sim N(0, 1)$ . 首先求  $E(|X_1 - X_2|)$

$$E(|X_1 - X_2|) = \int_{-\infty}^{+\infty} |z| f_z(z) dz = 2 \int_0^{+\infty} z \frac{1}{\sqrt{2\pi}} e^{-\frac{z^2}{2}} = \frac{\sqrt{2}}{\sqrt{\pi}}.$$

再来求  $D(|X_1 - X_2|)$

$$D(|X_1 - X_2|) = D(|Z|) = E(Z^2) - E^2(|Z|) = 1 - \frac{2}{\pi}.$$

**Example 3.2.** 设随机变量  $X$  的分布函数为  $F(x) = 0.4\Phi(\frac{x-5}{2}) + 0.6\Phi(\frac{x+1}{3})$ , 其中  $\Phi(x)$  为标准正态分布的分布函数, 求  $E(X)$ .

**hints** 常规思路是先求出  $f(x)$ , 再积分

$$\int_{-\infty}^{+\infty} \frac{x}{5} f(\frac{x-5}{2}) dx + \int_{-\infty}^{+\infty} \frac{x}{5} f(\frac{x+1}{3}) dx = \int_{-\infty}^{+\infty} (\frac{4}{5}t + 2) f(t) dt + \int_{-\infty}^{+\infty} (\frac{9}{5}t - \frac{3}{5}) f(t) dt = \frac{7}{5}.$$

也可以这样思考  $\Phi(\frac{x-5}{2}) \sim N(5, 4)$ ,  $\Phi(\frac{x+1}{3}) \sim N(-1, 9)$ , 因此  $E(X) = \frac{2}{5} \cdot 5 - 1 \cdot \frac{3}{5} = \frac{7}{5}$ .

### 随机变量乘积

**Example 3.3.** 设随机变量  $X$  服从标准正态分布  $N(0, 1)$ , 求  $E[(X - 2)^2 e^{2X}]$ .

**hints** 这里要用求随机变量函数期望的公式.

**Example 3.4.** 设随机变量  $X, Y$  不相关, 且  $E(X) = 2, E(Y) = 1, D(X) = 3$ , 求  $E[X(X + Y - 2)]$ .

**hints**

$$\text{Cov}(X, X + Y - 2) = E[X(X + Y - 2)] - E(X)E(X + Y - 2).$$

## 三大分布

### 三大分布重要性质的应用

**Example 4.1.** 设  $X_1, X_2, \dots, X_n$  来自正态总体  $N(\mu, \sigma^2)$  的简单随机样本, 求  $E \left\{ \sum_{i=1}^n X_i \left[ \sum_{j=1}^n (nX_j - \sum_{k=1}^n X_k)^2 \right] \right\}$ .

**hints**  $\bar{X}$  和  $S^2$  线性无关.

**Example 4.2.** 设  $X_1, X_2, \dots, X_n$  和  $Y_1, Y_2, \dots, Y_n$  分别来自正态总体  $N(\mu, \sigma^2)$  两个相互独立简单随机样本, 设它们样本方差分别为  $S_X^2$  和  $S_Y^2$ , 求统计量  $T = (n-1)(S_X^2 + S_Y^2)$  的方差  $DT$ .

[hints](#)  $\frac{(n-1)S^2}{\sigma^2} \sim \chi^2(n-1)$ .

**Example 4.3.** 设随机变量  $X \sim F(n, n)$ ,  $p_1 = P\{X \geq 1\}$ ,  $p_2 = P\{X \leq 1\}$ , 证明:  $p_1 = p_2$ .

[hints](#)  $X \sim F(n_1, n_2) \Rightarrow \frac{1}{X} \sim F(n_2, n_1)$ .