

# 考研高数习题集

枫聆

2021 年 9 月 29 日

## 目录

<b>1</b>	<b>行列式</b>	<b>2</b>
1.1	定义 . . . . .	2
1.2	化行阶梯形 . . . . .	4
1.3	按一行展开 . . . . .	4
1.4	按多行展开 . . . . .	5
1.5	特殊矩阵 . . . . .	5
1.6	数学归纳法 . . . . .	5
1.7	递推式 . . . . .	6
1.8	Laplace 展开 . . . . .	8
1.9	用矩阵运算拆开计算 . . . . .	8
<b>2</b>	<b>向量空间</b>	<b>11</b>
2.1	向量运算下的线性性质判定 . . . . .	11
2.2	向量组的极大线性无关组 . . . . .	11
<b>3</b>	<b>秩</b>	<b>12</b>
3.1	特殊矩阵的秩 . . . . .	12
3.2	矩阵运算中的秩 . . . . .	12
<b>4</b>	<b>方程组的解</b>	<b>14</b>
4.1	方程组性质 . . . . .	14
4.2	给定方程组解的情况 . . . . .	14
4.3	带参数的方程组解的情况 . . . . .	14

4.4	线性方程充要条件	14
4.5	齐次线性方程组的性质	15
4.6	非齐次线性方程组的性质	16
<b>5</b>	<b>矩阵运算</b>	<b>17</b>
5.1	矩阵乘法性质	17
5.2	幂运算	17
5.3	矩阵交换性	18
5.4	矩阵表示	19
5.5	特殊矩阵	19
<b>6</b>	<b>矩阵的逆</b>	<b>21</b>
6.1	复杂矩阵的逆	21
<b>7</b>	<b>矩阵等价</b>	<b>22</b>
7.1	判定等价	22
7.2	矩阵等价的性质	22
<b>8</b>	<b>矩阵相似</b>	<b>23</b>
8.1	相似判定	23
8.2	对角化判定	23
<b>9</b>	<b>二次型</b>	<b>23</b>
9.1	正定性的判定	23

## 行列式

### 定义

**Annotation 1.1.** 这类题特征

1. 按照行列式的完全展开式来计算某种特殊的矩阵
2. 给定某个具体的行列式值的基础上，通过行列式的性质来计算行列式.

**Example 1.2.** 证明: 如果在  $n$  阶行列式中, 第  $i_1, i_2, \dots, i_k$  行分别与第  $j_1, j_2, \dots, j_l$  列交叉位置的元素都是 0, 并且  $k + l > n$ , 那么这个行列式的值等于 0.

证明. 按照行列式的完全展开式, 每一项都必须包含第  $i_1, i_2, \dots, i_k$  行中位于不同列的元素, 则有  $k$  个元素. 由已知的条件, 第  $i_1, i_2, \dots, i_k$  行只与  $j_1, j_2, \dots, j_l$  之外的  $n-l$  元素可能不为零, 但是  $k > n-l$ , 说明每一项必取到 0, 因此行列式为 0.  $\square$

**Example 1.3.** 证明

$$\begin{vmatrix} a_1 + c_1 & b_1 + a_1 & c_1 + b_1 \\ a_2 + c_2 & b_2 + a_2 & c_2 + b_2 \\ a_3 + c_3 & b_3 + a_3 & c_3 + b_3 \end{vmatrix} = 2 \begin{vmatrix} a_1 & b_1 & c_1 \\ a_2 & b_2 & c_2 \\ a_3 & b_3 & c_3 \end{vmatrix}$$

**Example 1.4.** 行列式最大值 求元素为 1 和 0 的三阶行列式可取的最大值.

[hints](#) 从完全展开式我们应使得带正号的项尽可能的都是 1, 而带负号项尽可能是 0

1. 若 3 个正项都是 1, 那么此时行列式等于 0;
2. 若 2 个正项是 1, 此时任取一个 2 个项是正的行列式其行列式均等于 2, 且其他负项也都是 0, 例如

$$\begin{vmatrix} 0 & 1 & 1 \\ 1 & 0 & 1 \\ 1 & 1 & 0 \end{vmatrix}$$

综上最大值肯定就是 2.

**Example 1.5.** 设  $n \geq 2$ , 证明: 如果  $n$  阶矩阵  $A$  的元素为 1 或者  $-1$ , 则  $|A|$  为偶数.

[hints](#) 这个证明按行展开可能更简单

$$|A| = a_{11}A_{11} + a_{12}A_{12} + a_{13}A_{13},$$

其中三个代数余子式都是二阶行列式的正值或者负值, 那么我们来看一下元素为 1 或者  $-1$  的二阶行列式

$$\begin{vmatrix} b_{11} & b_{12} \\ b_{21} & b_{22} \end{vmatrix} = b_{11}b_{22} - b_{12}b_{21}$$

这里一共有 4 种可能的取值, 由  $b_{11}b_{22} = \pm 1, b_{12}b_{21} = \pm 1$  决定, 经过计算该二阶行列式取值可能为 0, 2, 因此  $|A|$  是由 3 个偶数相加得到的, 那么  $|A|$  也一定是偶数.

**Example 1.6.** 求元素为 1 或者  $-1$  的三阶行列式的最大值.

[hints](#) 从完全展开式出发, 三阶行列式有 6 项, 其中每一项只可能为  $-1$  和 1. 再有前面证明, 我们知道这样的三阶行列式的值只能是偶数, 那么最大的偶数就是 6 项全为 1 加起来为 6, 即

$$\begin{aligned} a_{11}a_{22}a_{33} &= 1, a_{12}a_{23}a_{31} = 1, a_{13}a_{21}a_{32} = 1 \\ -a_{13}a_{22}a_{31} &= 1, -a_{12}a_{21}a_{33} = 1, -a_{11}a_{23}a_{32} = 1 \end{aligned}$$

由此得出

$$\begin{aligned} a_{11}a_{22}a_{33}a_{12}a_{23}a_{31}a_{13}a_{21}a_{32} &= 1 \\ a_{13}a_{22}a_{31}a_{12}a_{21}a_{33}a_{11}a_{23}a_{32} &= -1 \end{aligned}$$

这是矛盾的. 因此我们再考虑行列式最大值为 4 的可能, 可以找到

$$\begin{vmatrix} 1 & -1 & -1 \\ -1 & 1 & -1 \\ 1 & 1 & 1 \end{vmatrix} = 1 + 1 + 1 + 1 - 1 + 1 = 4$$

那么这样的行列式的最大值为 4.

**Example 1.7.** 设  $n \leq 3$ , 证明: 元素为 1 或者 -1 的  $n$  阶行列式的绝对值不超过  $(n-1)!(n-1)$ .

[hints](#) 借助前面的例子做归纳.

**Example 1.8.** 设  $n \geq 2$ , 证明: 元素为 1 或 -1 的  $n$  阶行列式的值能被  $2^{n-1}$  整除.

[hints](#) 设  $|A|$  是这样的行列式, 首先将第一列上的  $(-1)$  所在行都提一个 -1 出来

$$|A| = (-1)^m \begin{vmatrix} 1 & b_{12} & \cdots & b_{1n} \\ 1 & b_{22} & \cdots & b_{2n} \\ \vdots & \vdots & \cdots & \vdots \\ 1 & b_{n2} & \cdots & b_{nn} \end{vmatrix} = (-1)^m \begin{vmatrix} 1 & b_{12} & \cdots & b_{1n} \\ 0 & c_{22} & \cdots & c_{2n} \\ \vdots & \vdots & \cdots & \vdots \\ 0 & c_{n2} & \cdots & c_{nn} \end{vmatrix}$$

其中  $c_{ij}$  值可能为 2, -2, 0, 因此从第 2 列到第  $n$  列都是可以提一个因子 2 出来, 最终就可以凑成  $2^{n-1}$ .

## 化行阶梯形

**Annotation 1.9.** 不是特殊矩阵的第一选择.

## 按一行展开

**Annotation 1.10.** 若是可以将某一行或者某一列消去, 只留下一个非零元素, 按行和按列展开是不错的选择.

**Example 1.11.** 计算

$$|A| = \begin{vmatrix} 1 & 2 & 3 & \cdots & n-1 & n \\ 1 & -1 & 0 & \cdots & 0 & 0 \\ 0 & 2 & -2 & \cdots & 0 & 0 \\ \vdots & \vdots & \vdots & & \vdots & \vdots \\ 0 & 0 & 0 & \cdots & n-1 & 1-n \end{vmatrix}$$

hints 可以考虑把所有列都加到第一列，再按第一列展开

$$|\mathbf{A}| = \begin{vmatrix} \frac{(1+n)n}{2} & 2 & 3 & \cdots & n-1 & n \\ 0 & -1 & 0 & \cdots & 0 & 0 \\ 0 & 2 & -2 & \cdots & 0 & 0 \\ \vdots & \vdots & \vdots & & \vdots & \vdots \\ 0 & 0 & 0 & \cdots & n-1 & n-1 \end{vmatrix} = \frac{(1+n)n}{2} \begin{vmatrix} -1 & 0 & \cdots & 0 & 0 \\ 2 & -2 & \cdots & 0 & 0 \\ \vdots & \vdots & & \vdots & \vdots \\ 0 & 0 & \cdots & n-1 & n-1 \end{vmatrix}$$

同样上述矩阵也是所有列加到第一列，最终有  $|\mathbf{A}| = (-1)^{n-1} \frac{(n+1)!}{2}$ .

## 按多行展开

**Annotation 1.12.** 好像没有直接使用拉普拉斯定理的习惯，比较特殊的分块矩阵可以考虑.

## 特殊矩阵

**Annotation 1.13.** 常见的特殊矩阵 <https://www.bilibili.com/read/cv266516>

1. 范德蒙德行列式
2. 爪型行列式

## 数学归纳法

**Annotation 1.14.** 通常证明手法也是按行或者列展开.

**Example 1.15.** 计算  $n$  阶行列式

$$D_n = \begin{vmatrix} x & 0 & 0 & \cdots & 0 & 0 & a_0 \\ -1 & x & 0 & \cdots & 0 & 0 & a_1 \\ 0 & -1 & x & \cdots & 0 & 0 & a_2 \\ \vdots & \vdots & \vdots & \cdots & \vdots & \vdots & \vdots \\ 0 & 0 & 0 & \cdots & -1 & x & a_{n-2} \\ 0 & 0 & 0 & \cdots & 0 & -1 & x + a_{n-1} \end{vmatrix}$$

证明. 当  $n = 2$  时, 有

$$D_2 = \begin{vmatrix} x & a_0 \\ -1 & x + a_1 \end{vmatrix} = x^2 + a_1x + a_0$$

假设对于上述形式的  $n-1$  阶行列式, 有

$$\begin{vmatrix} x & 0 & 0 & \cdots & 0 & 0 & a_0 \\ -1 & x & 0 & \cdots & 0 & 0 & a_1 \\ 0 & -1 & x & \cdots & 0 & 0 & a_2 \\ \vdots & \vdots & \vdots & \cdots & \vdots & \vdots & \vdots \\ 0 & 0 & 0 & \cdots & 0 & -1 & x + a_{n-2} \end{vmatrix} = x^{n-1} + a_{n-2}x^{n-2} + \cdots + a_1x + a_0$$

那么  $n$  阶行列式, 把它按第一行展开, 有

$$\begin{aligned} D_n &= x \begin{vmatrix} x & 0 & \cdots & 0 & 0 & a_1 \\ -1 & x & \cdots & 0 & 0 & a_2 \\ \vdots & \vdots & \cdots & \vdots & \vdots & \vdots \\ 0 & 0 & \cdots & -1 & x & a_{n-2} \\ 0 & 0 & \cdots & 0 & -1 & x + a_{n-1} \end{vmatrix} + (-1)^{1+n} a_0 \begin{vmatrix} -1 & x & 0 & \cdots & 0 & 0 \\ 0 & -1 & x & \cdots & 0 & 0 \\ \vdots & \vdots & \vdots & \cdots & \vdots & \vdots \\ 0 & 0 & 0 & \cdots & -1 & x \\ 0 & 0 & 0 & \cdots & 0 & -1 \end{vmatrix} \\ &= x(x^{n-1} + a_{n-1}x^{n-2} + \cdots + a_2x + a_1) + (-1)^{1+n} a_0 (-1)^{n-1} \\ &= x^n + a_{n-1}x^{n-1} + a_{n-2}x^{n-2} + \cdots + a_1x + a_0 \end{aligned}$$

□

## 递推式

**Example 1.16.** 计算  $n$  阶行列式

$$D_n = \begin{vmatrix} 2 & -1 & 0 & 0 & \cdots & 0 & 0 & 0 \\ -1 & 2 & -1 & 0 & \cdots & 0 & 0 & 0 \\ 0 & -1 & 2 & -1 & \cdots & 0 & 0 & 0 \\ \vdots & \vdots & \vdots & \vdots & & \vdots & \vdots & \vdots \\ 0 & 0 & 0 & 0 & \cdots & -1 & 2 & -1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & \cdots & 0 & -1 & 2 \end{vmatrix}$$

**hints** 显然  $D_1 = 2$ . 将  $D_n$  按第一列展开, 则有

$$D_n = 2D_{n-1} + \begin{vmatrix} -1 & 0 & 0 & \cdots & 0 & 0 & 0 \\ -1 & 2 & -1 & \cdots & 0 & 0 & 0 \\ \vdots & \vdots & \vdots & & \vdots & \vdots & \vdots \\ 0 & 0 & 0 & \cdots & -1 & 2 & -1 \\ 0 & 0 & 0 & \cdots & 0 & -1 & 2 \end{vmatrix} = 2D_{n-1} - D_{n-2}$$

这也意味着  $D_n - D_{n-1} = D_{n-1} - D_{n-2}$ , 可以马上推出  $D_n - D_{n-1} = D_2 - D_1 = 1$ , 即该行列式是一个等差数列  $D_n = 2 + (n-1) = n+1$ .

**Example 1.17.** 计算  $n$  阶行列式

$$D_n = \begin{vmatrix} a+b & ab & 0 & 0 & \cdots & 0 & 0 & 0 \\ 1 & a+b & ab & 0 & \cdots & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & a+b & ab & \cdots & 0 & 0 & 0 \\ \vdots & \vdots & \vdots & \vdots & & \vdots & \vdots & \vdots \\ 0 & 0 & 0 & 0 & \cdots & 1 & a+b & ab \\ 0 & 0 & 0 & 0 & \cdots & 0 & 1 & a+b \end{vmatrix}$$

其中  $a \neq b$ .

[hints](#) 还是按第一列展开

$$D_n = (a+b)D_{n-1} - \begin{vmatrix} ab & 0 & 0 & \cdots & 0 & 0 & 0 \\ 1 & a+b & ab & \cdots & 0 & 0 & 0 \\ \vdots & \vdots & \vdots & & \vdots & \vdots & \vdots \\ 0 & 0 & 0 & \cdots & 1 & a+b & ab \\ 0 & 0 & 0 & \cdots & 0 & 1 & a+b \end{vmatrix} = (a+b)D_{n-1} - abD_{n-2}.$$

注意其上最后一个等式成立的条件是  $a \neq 0$  和  $b \neq 0$ , 那么推出

$$\begin{aligned} D_n - aD_{n-1} &= b(D_{n-1} - aD_{n-2}) \Rightarrow D_n - aD_{n-1} = (D_2 - aD_1)b^{n-2} \\ D_n - bD_{n-1} &= a(D_{n-1} - bD_{n-2}) \Rightarrow D_n - bD_{n-1} = (D_2 - bD_1)a^{n-2} \end{aligned}$$

而  $D_1 = a+b$ ,  $D_2 = a^2 + ab + b^2$ . 因此

$$\begin{aligned} D_n - aD_{n-1} &= b^n \\ D_n - bD_{n-1} &= a^n \end{aligned}$$

所以  $D_n = \frac{b^{n+1} - a^{n+1}}{b-a}$ .

当  $a = 0$  时,  $D_n = b^n$ ; 当  $b = 0$  时,  $D_n = a^n$ .

## Laplace 展开

**Example 1.18.** 计算下述  $2n$  阶行列式

$$D_{2n} = \begin{vmatrix} a & & & & b \\ & \ddots & & & \\ & & a & b & \\ & & b & a & \\ & \ddots & & & \\ b & & & & a \end{vmatrix}$$

**hints** 尝试从第一行和最后一行展开, 于是得到

$$\begin{aligned} D_{2n} &= \begin{vmatrix} a & b \\ b & a \end{vmatrix} \cdot (-1)^{(1+2n)+(1+2n)} \cdot D_{2n-2} \\ &= (a^2 - b^2) D_{2n-2} \end{aligned}$$

而  $D_2 = a^2 - b^2$ , 因此  $D_{2n} = (a^2 - b^2)^n$

## 用矩阵运算拆开计算

**Example 1.19.** 设

$$s_k = x_1^k + x_2^k + \cdots + x_n^k, \quad k = 0, 1, 2, \dots,$$

设  $A = (a_{ij})_{n \times n}$ , 其中

$$a_{ij} = s_{i+j-2}, \quad i, j = 1, 2, \dots, n.$$

证明:  $|A| = \prod_{1 \leq j < i \leq n} (x_i - x_j)^2$ .

**hints** 这个左边是范德蒙行列式的通项的平方. 其中

$$a_{ij} = x_1^{i-1} x_1^{j-1} + x_2^{i-1} x_2^{j-1} + \cdots + x_n^{i-1} x_n^{j-1} = \sum_{r=1}^n x_r^{i-1} x_r^{j-1}.$$

因此

$$|A| = \begin{vmatrix} 1 & 1 & \cdots & 1 & 1 \\ x_1 & x_2 & \cdots & x_{n-1} & x_n \\ \vdots & \vdots & & \vdots & \vdots \\ x_1^{n-2} & x_2^{n-2} & \cdots & x_{n-1}^{n-2} & x_n^{n-2} \\ x_1^{n-1} & x_2^{n-1} & \cdots & x_{n-1}^{n-1} & x_n^{n-1} \end{vmatrix} \begin{vmatrix} 1 & x_1 & \cdots & x_1^{n-2} & x_1^{n-1} \\ 1 & x_2 & \cdots & x_2^{n-2} & x_2^{n-1} \\ \vdots & \vdots & & \vdots & \vdots \\ 1 & x_{n-1} & \cdots & x_{n-1}^{n-2} & x_{n-1}^{n-1} \\ 1 & x_n & \cdots & x_n^{n-2} & x_n^{n-1} \end{vmatrix}$$

显然这是两个范德蒙行列式的乘积



**Example 1.20.** 设

$$u_j = \sum_{i=1}^n c_i a_i^j, 1 \leq j < 2n.$$

令

$$\mathbf{A} = \begin{pmatrix} u_1 & u_2 & \cdots & u_n \\ u_2 & u_3 & \cdots & u_{n+1} \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ u_n & u_{n+1} & \cdots & u_{2n-1} \end{pmatrix}$$

证明: 对任意  $\beta \in \mathbb{R}^n$ , 线性方程组  $\mathbf{A}\mathbf{X} = \beta$  有唯一解的充分必要条件是  $a_1, a_2, \dots, a_n$  两两不等, 且  $a_i$  和  $c_i$  全不为 0 ( $i = 1, 2, \dots, n$ ).

[hints](#) 就是我们要考察行列式  $|\mathbf{A}|$ . 观察  $\mathbf{A}$  也是可以拆开的

$$\begin{aligned} \mathbf{A} &= \begin{pmatrix} c_1 & c_2 & \cdots & c_{n-1} & c_n \\ c_1 a_1 & c_2 a_1 & \cdots & c_{n-1} a_{n-1} & c_n a_n \\ \vdots & \vdots & & \vdots & \vdots \\ c_1 a_1^{n-2} & c_2 a_2^{n-2} & \cdots & c_{n-1} a_{n-1}^{n-2} & c_n a_n^{n-2} \\ c_1 a_1^{n-1} & c_2 a_2^{n-1} & \cdots & c_{n-1} a_{n-1}^{n-1} & c_n a_n^{n-1} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} a_1 & a_1^2 & \cdots & a_1^{n-1} & a_1^n \\ a_2 & a_2^2 & \cdots & a_2^{n-1} & a_2^n \\ \vdots & \vdots & & \vdots & \vdots \\ a_{n-1} & a_{n-1}^2 & \cdots & a_{n-1}^{n-1} & a_{n-1}^n \\ a_n & a_n^2 & \cdots & a_n^{n-1} & a_n^n \end{pmatrix} \\ &= c_1 \cdots c_n a_1 \cdots a_n \begin{pmatrix} 1 & 1 & \cdots & 1 & 1 \\ a_1 & a_2 & \cdots & a_{n-1} & a_n \\ \vdots & \vdots & & \vdots & \vdots \\ a_1^{n-2} & a_2^{n-2} & \cdots & a_{n-1}^{n-2} & a_n^{n-2} \\ a_1^{n-1} & a_2^{n-1} & \cdots & a_{n-1}^{n-1} & a_n^{n-1} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & a_1 & \cdots & a_1^{n-2} & a_1^{n-1} \\ 1 & a_2 & \cdots & a_2^{n-2} & a_2^{n-1} \\ \vdots & \vdots & & \vdots & \vdots \\ 1 & a_{n-1} & \cdots & a_{n-1}^{n-2} & a_{n-1}^{n-1} \\ 1 & a_n & \cdots & a_n^{n-2} & a_n^{n-1} \end{pmatrix} \\ &= c_1 \cdots c_n a_1 \cdots a_n \sum_{1 \leq j < i \leq n} (a_i - a_j)^2 \end{aligned}$$

**Example 1.21.** 计算  $n$  阶行列式

$$|\mathbf{A}| = \begin{vmatrix} a_1 - b_1 & a_1 - b_2 & \cdots & a_1 - b_n \\ a_2 - b_1 & a_2 - b_2 & \cdots & a_2 - b_n \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ a_n - b_1 & a_n - b_2 & \cdots & a_n - b_n \end{vmatrix}$$

hints 矩阵  $\mathbf{A}$  是可以拆开的

$$\mathbf{A} = \begin{pmatrix} a_1 & -1 \\ a_2 & -1 \\ \vdots & \vdots \\ a_{n-1} & -1 \\ a_n & -1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & 1 & \cdots & 1 & 1 \\ b_1 & b_2 & \cdots & b_{n-1} & b_n \end{pmatrix}$$

当  $n > 2$  时,  $\text{rank}(\mathbf{A}) \leq 2$ , 即  $|\mathbf{A}| = 0$ .

当  $n = 2$  时,  $|\mathbf{A}| = (a_2 - a_1)(b_2 - b_1)$ .

当  $n = 1$  时,  $|\mathbf{A}| = a_1 - b_1$ .

## 向量空间

### 向量运算下的线性性质判定

**Example 2.1.** 证明: 如果向量组  $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3$  线性无关, 那么向量组  $3\alpha_1 - \alpha_2, 5\alpha_2 + 2\alpha_3, 4\alpha_3 - 7\alpha_1$  [hints](#) 直接用线性无关的定义, 即

$$k_1(3\alpha_1 - \alpha_2) + k_2(5\alpha_2 + 2\alpha_3) + k_3(4\alpha_3 - 7\alpha_1) = \mathbf{0}$$

此时需要证明  $k_1 = k_2 = k_3$ , 展开上式

$$(3k_1 - 7k_3)\alpha_1 + (5k_2 - k_1)\alpha_2 + (2k_2 + 4k_3)\alpha_3 = \mathbf{0}.$$

根据已知条件, 于是得到下述方程组

$$\begin{cases} 3k_1 - 7k_3 = 0 \\ 5k_2 - k_1 = 0 \\ 2k_2 + 4k_3 = 0 \end{cases}$$

由此构造系数矩阵, 最后系数矩阵的行列式不为零, 即原方程只有零解, 命题得证.

### 向量组的极大线性无关组

**Annotation 2.2.** 若给定  $n$  个列向量  $\alpha_1, \dots, \alpha_n$ , 操作步骤为

1. 写出对应矩阵的形式  $A$ , 做初等行变换化行阶梯型矩阵  $D$ .
2. 观察行列式不为零最大子式所在的列, 它们构成一个极大线性无关组.

## 秩

### 特殊矩阵的秩

**Example 3.1.** 设  $n$  阶矩阵  $\mathbf{A}$ , 满足

$$|a_{ii}| > \sum_{\substack{j=1 \\ j \neq i}}^n |a_{ij}|, i = 1, 2, \dots, n.$$

证明  $\mathbf{A}$  的秩等于  $n$ . 这样的矩阵称为**主对角占优矩阵**.

**hints** 设  $\mathbf{A}$  的列向量为  $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_n$ , 那么只需证明  $\mathbf{A}$  的列向量都是线性无关的. 假设  $\mathbf{A}$  的列向量是线性相关的, 则存在

$$k_1 \alpha_1 + k_2 \alpha_2 + \dots + k_n \alpha_n = \mathbf{0},$$

其中  $k_1, k_2, \dots, k_n$  不全为 0. 取

$$|k_l| = \max\{|k_1|, |k_2|, \dots, |k_n|\}.$$

然后我们列向量的第  $l$  个分量有

$$k_1 a_{l1} + k_2 a_{l2} + \dots + k_n a_{ln} = 0,$$

等式两边除以  $k_l$ , 得到

$$a_{ll} = -\frac{k_1}{k_l} a_{l1} - \frac{k_2}{k_l} a_{l2} - \dots - \frac{k_n}{k_l} a_{ln} = -\sum_{\substack{j=1 \\ j \neq l}}^n \frac{k_j}{k_l} |a_{lj}|.$$

因此有

$$|a_{ll}| \leq \sum_{\substack{j=1 \\ j \neq l}}^n |a_{lj}|,$$

与前提条件矛盾. 从而  $\mathbf{A}$  等于  $n$ .

### 矩阵运算中的秩

**Example 3.2.** 证明:  $\text{rank}(\mathbf{A} + \mathbf{B}) \leq \text{rank}(\mathbf{A}) + \text{rank}(\mathbf{B})$ .

**hints** 设  $\mathbf{A} = (\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_n)$ ,  $\mathbf{B} = (\beta_1, \beta_2, \dots, \beta_n)$ , 那么  $\mathbf{A} + \mathbf{B} = (\alpha_1 + \beta_1, \alpha_2 + \beta_2, \dots, \alpha_n + \beta_n)$ . 设  $\mathbf{A}$  列向量的一个极大无关组  $\alpha_{i_1}, \alpha_{i_2}, \dots, \alpha_{i_n}$ ,  $\mathbf{B}$  列向量的一个极大无关组  $\beta_{j_1}, \beta_{j_2}, \dots, \beta_{j_n}$ . 显然  $\alpha_1 + \beta_1, \alpha_2 + \beta_2, \dots, \alpha_n + \beta_n$  可以由  $\alpha_{i_1}, \alpha_{i_2}, \dots, \alpha_{i_n}, \beta_{j_1}, \beta_{j_2}, \dots, \beta_{j_n}$  线性表出.

**Example 3.3.** 设  $\mathbf{A}$  为  $m \times n$  矩阵, 则

$$\text{rank}(\mathbf{A}\mathbf{A}^T) = \text{rank}(\mathbf{A}^T\mathbf{A}) = \text{rank}(\mathbf{A}).$$

[hints](#) 在 note 上记录了一种化行阶梯形的证明方法, 这里从判定  $n$  元齐次线性方程组  $(\mathbf{A}^T \mathbf{A})\mathbf{X} = \mathbf{0}$  与  $\mathbf{A}\mathbf{X} = \mathbf{0}$  同解出发, 同解意味着解空间维数相同, 从而对应的系数矩阵的秩相同.

若  $\boldsymbol{\eta}$  是  $\mathbf{A}\mathbf{X} = \mathbf{0}$  的一个解, 那么显然  $\boldsymbol{\eta}$  也是  $(\mathbf{A}^T \mathbf{A})\mathbf{X} = \mathbf{0}$  的解.

若  $\boldsymbol{\delta}$  是  $(\mathbf{A}^T \mathbf{A})\mathbf{X} = \mathbf{0}$  的解, 于是有  $(\mathbf{A}^T \mathbf{A})\boldsymbol{\delta} = \mathbf{0}$ , 将这个等式两边乘上  $\boldsymbol{\delta}^T$ , 得到

$$\boldsymbol{\delta}^T (\mathbf{A}^T \mathbf{A}) \boldsymbol{\delta} = \mathbf{0} \Rightarrow (\boldsymbol{\delta}^T \mathbf{A}^T) (\mathbf{A} \boldsymbol{\delta}) = \mathbf{0} \Rightarrow (\mathbf{A} \boldsymbol{\delta})^T (\mathbf{A} \boldsymbol{\delta}) = \mathbf{0}$$

那么设  $(\mathbf{A} \boldsymbol{\delta})^T = (c_1, c_2, \dots, c_n)$ , 那么则有

$$c_1^2 + c_2^2 + \dots + c_n^2 = 0,$$

因此  $c_1 = c_2 = \dots = c_n = 0$ , 所以  $\boldsymbol{\delta}$  也是  $\mathbf{A}\mathbf{X} = \mathbf{0}$  的解.

最后

$$\text{rank}(\mathbf{A}\mathbf{A}^T) = \text{rank}((\mathbf{A}^T)^T \mathbf{A}^T) = \text{rank}(\mathbf{A}^T) = \text{rank}(\mathbf{A}).$$

## 方程组的解

### 方程组性质

**Example 4.1.** 证明: 给定  $s$  个  $n$  线性方程组成的线性方程组, 如果该方程组的增广矩阵的第  $i$  个行向量  $\alpha_i$  可以由其余行向量线性表出, 即

$$\alpha_i = k_1 \alpha_1 + k_{i-1} \alpha_{i-1} + k_{i+1} \alpha_{i+1} + \cdots + k_s \alpha_s$$

那么将第  $i$  个方程去掉之后得到的方程组与原方程组通解.

**Example 4.2.** 设一个  $m \times n$  矩阵  $H$  的列向量组为  $\alpha_1, \cdots, \alpha_n$ . 证明:  $H$  的任意  $s$  列都线性无关当且仅当, 齐次线性方程组

$$x_1 \alpha_1 + \cdots + x_n \alpha_n = \mathbf{0}$$

的任一非零解的非零分量的数目大于  $s$ .

**hints** 必要性 若  $H$  的任意  $s$  列都线性无关. 假设上述线性方程存在一个非零解为

$$\eta = (0, \cdots, c_{i_1}, \cdots, c_{i_j}, \cdots)^T.$$

其中  $c_{i_1}, \cdots, c_{i_j}$  均不为零, 且  $l \leq s$ . 则

$$c_{i_1} \alpha_{i_1} + \cdots + c_{i_j} \alpha_{i_j} = \mathbf{0},$$

这意味着存在  $l$  列线性相关, 与前提矛盾, 因此任一非零解的非零分量的数目大于  $s$

充分性 若  $H$  的任一非零向量的非零分量的数目大于  $s$ . 假设有  $l \leq s$  个列向量线性相关

$$k_{i_1} \alpha_{i_1} + \cdots + k_{i_j} \alpha_{i_j} = \mathbf{0},$$

那么存在一个非零解, 即

$$\eta = (0, \cdots, k_{i_1}, \cdots, k_{i_j}, \cdots)^T.$$

就是将其他分量扩充为 0 即可, 这样和前提矛盾的. 因此  $H$  的任意  $s$  列都线性无关.

### 给定方程组解的情况

### 带参数的方程组解的情况

### 线性方程充要条件

**Annotation 4.3.** 系数矩阵的秩和增广矩阵的秩相同!

**Example 4.4.** 证明: 线性方程组

$$\begin{cases} a_{11}x_1 + a_{12}x_2 + \cdots + a_{1n}x_n = b_1, \\ a_{21}x_1 + a_{22}x_2 + \cdots + a_{2n}x_n = b_2, \\ \cdots \\ a_{m1}x_1 + a_{m2}x_2 + \cdots + a_{mn}x_n = b_m, \end{cases}$$

有解的当且仅当下述线性方程

$$\begin{cases} a_{11}x_1 + a_{21}x_2 + \cdots + a_{s1}x_m = 0, \\ a_{12}x_1 + a_{22}x_2 + \cdots + a_{s2}x_m = 0, \\ \cdots \\ a_{1m}x_1 + a_{2m}x_2 + \cdots + a_{sm}x_m = 0, \\ b_1x_1 + b_2x_2 + \cdots + b_mx_m = 1, \end{cases}$$

**hints** 设第一个方程组的系数矩阵为  $\mathbf{A}$ , 增广矩阵为  $\tilde{\mathbf{A}}$ . 那么第二个方程组的系数矩阵及增广矩阵分别为

$$\begin{aligned} \mathbf{B} &= \tilde{\mathbf{A}}^T \\ \tilde{\mathbf{B}} &= \begin{pmatrix} \mathbf{A}^T & \mathbf{0} \\ \boldsymbol{\beta} & 1 \end{pmatrix} \end{aligned}$$

其中  $\boldsymbol{\beta} = (b_1, \cdots, b_m)$ . 这里存在一些等式

$$\begin{aligned} \text{rank}(\mathbf{B}) &= \text{rank}(\tilde{\mathbf{A}}) \\ \text{rank}(\tilde{\mathbf{B}}) &= \text{rank}(\mathbf{A}) + 1. \end{aligned}$$

当  $\text{rank}(\mathbf{A}) = \text{rank}(\tilde{\mathbf{A}})$  时, 有  $\text{rank}(\mathbf{B}) < \text{rank}(\tilde{\mathbf{B}})$ .

当  $\text{rank}(\mathbf{B}) < \text{rank}(\tilde{\mathbf{B}})$  时, 有  $\text{rank}(\tilde{\mathbf{A}}) + 1 = \text{rank}(\mathbf{A}) + 1$ . 这里能得到这个结果是因为增广矩阵的秩那么等于系数矩阵的秩, 那么等于系数矩阵的秩加 1.

## 齐次线性方程组的性质

**Example 4.5.** 设  $n$  个的方程的  $n$  元齐次线性方程组的系数矩阵  $\mathbf{A}$  的行列式等于 0, 且  $\mathbf{A}$  的  $(k, l)$  元的代数余子式  $A_{kl} \neq 0$ . 证明  $\boldsymbol{\eta} = (A_{k1}, A_{k2}, \cdots, A_{kn})^T$  是原齐次线性方程组的一个基础解系.

**hints** 证明的要求暗示了解空间是一维的. 这是因为由  $A_{kl} \neq 0$ , 意味着  $\mathbf{A}$  存在一个  $n-1$  阶的子式行列式不为 0, 而  $|\mathbf{A}| = 0$ , 因此  $\text{rank}(\mathbf{A}) = n-1$ .

将该  $\boldsymbol{\eta}$  带入原方程, 当  $i = k$  时

$$a_{i1}A_{k1} + a_{i2}A_{k2} + \cdots + a_{in}A_{kn} = |\mathbf{A}| = 0;$$

当  $i \neq k$  时, 显然有

$$a_{i1}A_{k1} + a_{i2}A_{k2} + \cdots + a_{in}A_{kn} = 0.$$

因此  $\boldsymbol{\eta}$  的确是原方程组的一个解, 其中第  $k$  个分量  $A_{kl} \neq 0$ , 结合解空间是一维的, 从而  $\boldsymbol{\eta}$  是一个基础解系.

## 非齐次线性方程组的性质

**Example 4.6.** 给定  $n$  元非齐次线性方程组

$$x_1\boldsymbol{\alpha}_1 + x_2\boldsymbol{\alpha}_2 + \cdots + x_n\boldsymbol{\alpha}_n = \boldsymbol{\beta},$$

它的一个特解为  $\boldsymbol{\gamma}_0$  和基础解系为  $\boldsymbol{\eta}_1, \boldsymbol{\eta}_2, \cdots, \boldsymbol{\eta}_t$ . 令

$$\boldsymbol{\gamma}_1 = \boldsymbol{\gamma}_0 + \boldsymbol{\eta}_1, \boldsymbol{\gamma}_2 = \boldsymbol{\gamma}_0 + \boldsymbol{\eta}_2, \cdots, \boldsymbol{\gamma}_n = \boldsymbol{\gamma}_0 + \boldsymbol{\eta}_t.$$

那么该非齐次线性方程的解集可以表示为

$$U = \{k_0\boldsymbol{\gamma}_0 + k_1\boldsymbol{\gamma}_1 + \cdots + k_t\boldsymbol{\gamma}_t \mid k_0 + k_1 + \cdots + k_t = 1, k_i \in \mathbb{R}, i = 0, 2, \cdots, t\}$$

这个例子表明非齐次线性方程组也可以用有限个线性无关的解向量来表示解空间, 但是系数上是有限制的.



## 矩阵运算

### 矩阵乘法性质

**Example 5.1.** 设  $A$  和  $B$  均为  $n$  阶矩阵. 若  $A^2 = B^2$ , 不一定有  $A = B$  或者  $A = -B$ .

[hints](#) 首先  $A$  和  $B$  不一定交换, 即

$$A^2 - B^2 \neq (A + B)(A - B).$$

即使有  $A$  和  $B$ , 即

$$(A + B)(A - B) = 0,$$

也不一定有  $A + B = 0$  或者  $A - B = 0$ . 例如  $A = I_2$ ,  $B = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & -1 \end{pmatrix}$ .

### 幂运算

**Example 5.2.** 设  $A = \begin{pmatrix} 2 & 3 \\ 0 & 2 \end{pmatrix}$ , 求  $A^m$ .

[hints](#) 将  $A$  拆开

$$A = \begin{pmatrix} 2 & 0 \\ 0 & 2 \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} 0 & 3 \\ 0 & 0 \end{pmatrix} = 2I + 3B.$$

其中  $B = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}$ . 我们的目标很明确了是尝试用二项式展开, 因为这里

$$B^2 = 0.$$

还有一个关键是  $B$  和  $I$  是可交换的, 因此才有

$$(2I + 3B)(2I + 3B) \cdots (2I + 3B) = 2^m 3^m I^m B^m,$$

不然这里是用不了二项式展开的. 于是

$$A^m = (2I + 3B)^m = (2I)^m + C_m^1 (2I)^{m-1} 3B = 2^m I + 3m 2^{m-1} B = \begin{pmatrix} 2^m & 3m 2^{m-1} \\ 0 & 2^m \end{pmatrix}$$

**Example 5.3.** 设  $A = \begin{pmatrix} a & c \\ 0 & b \end{pmatrix}$ , 求  $A^m$ .

**hints** 这里是不能用二项式展开的，因为不确定  $\begin{pmatrix} a & 0 \\ 0 & b \end{pmatrix}$  和  $\begin{pmatrix} 0 & c \\ 0 & 0 \end{pmatrix}$  是否交换. 可以先写出前几项，猜结果用数学归纳法来证.

$$\begin{aligned} \mathbf{A}^2 &= \begin{pmatrix} a & c \\ 0 & b \end{pmatrix} \begin{pmatrix} a & c \\ 0 & b \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} a^2 & c(a+b) \\ 0 & b^2 \end{pmatrix} \\ \mathbf{A}^3 &= \begin{pmatrix} a^2 & c(a+b) \\ 0 & b^2 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} a & c \\ 0 & b \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} a^3 & c(a^2+ab+b^2) \\ 0 & b^3 \end{pmatrix} \\ \mathbf{A}^4 &= \begin{pmatrix} a^3 & c(a^2+ab+b^2) \\ 0 & b^3 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} a & c \\ 0 & b \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} a^4 & c(a^3+a^2b+ab^2+b^3) \\ 0 & b^4 \end{pmatrix} \end{aligned}$$

因此我们猜测其通项为

$$\mathbf{A}^m = \begin{pmatrix} a^m & c(a^{m-1} + a^{m-2}b + \cdots + ab^{m-2} + b^{m-1}) \\ 0 & b^m \end{pmatrix}$$

当  $m = 2$  时，显然是满足. 假设  $m = k - 1$  时满足，考虑  $m = k$  时. 根据幂运算，有

$$\begin{aligned} \mathbf{A}^k &= \mathbf{A}^{k-1} \mathbf{A} = \mathbf{A}^m = \begin{pmatrix} a^{k-1} & c(a^{k-2} + a^{k-3}b + \cdots + ab^{k-3} + b^{k-2}) \\ 0 & b^{k-1} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} a & c \\ 0 & b \end{pmatrix} \\ &= \begin{pmatrix} a^k & c(a^{k-1} + a^{k-2}b + \cdots + ab^{k-2} + b^{k-1}) \\ 0 & b^k \end{pmatrix} \end{aligned}$$

## 矩阵交换性

**Example 5.4.** 求与矩阵  $\mathbf{A}$  交换的所有矩阵，设

$$\mathbf{A} = \begin{pmatrix} 3 & 1 & 0 \\ 0 & 3 & 1 \\ 0 & 0 & 3 \end{pmatrix}$$

**hints** 首先拆一下  $\mathbf{A}$ ，即

$$\mathbf{A} = \begin{pmatrix} 3 & 0 & 0 \\ 0 & 3 & 0 \\ 0 & 0 & 3 \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix} = 3\mathbf{I} + \mathbf{B}$$

其中  $\mathbf{I}$  与任意矩阵都是可交换，于是

$$\mathbf{A}\mathbf{X} = \mathbf{X}\mathbf{A} \Leftrightarrow \mathbf{B}\mathbf{X} = \mathbf{X}\mathbf{B}$$

因此有等式

$$\begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x_{11} & x_{12} & x_{13} \\ x_{21} & x_{22} & x_{23} \\ x_{31} & x_{32} & x_{33} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} x_{11} & x_{12} & x_{13} \\ x_{21} & x_{22} & x_{23} \\ x_{31} & x_{32} & x_{33} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$$

可以得到

$$\begin{pmatrix} x_{21} & x_{22} & x_{23} \\ x_{31} & x_{32} & x_{33} \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 & x_{11} & x_{12} \\ 0 & x_{21} & x_{22} \\ 0 & x_{31} & x_{32} \end{pmatrix}$$

整理一下

$$\begin{cases} x_{21} = x_{31} = x_{32} = 0 \\ x_{22} = x_{11} = x_{33} \\ x_{23} = x_{12} \end{cases}$$

因此

$$\mathbf{X} = \begin{vmatrix} x_{11} & x_{12} & x_{13} \\ 0 & x_{11} & x_{12} \\ 0 & 0 & x_{11} \end{vmatrix}$$

其中  $x_{11}, x_{12}, x_{13} \in \mathbb{R}$ .

**Example 5.5.** 设  $\mathbf{D}$  为主对角线两两不相等的对角矩阵, 那么与  $\mathbf{D}$  可交换的矩阵一定是对角矩阵.

**Example 5.6.** 设  $\mathbf{A}$  与所有  $n$  阶矩阵都可交换, 则  $\mathbf{A}$  必为数量矩阵.

## 矩阵表示

**Example 5.7.** 任一  $n$  阶矩阵都可以表示成一个对称矩阵和斜对称矩阵之和, 并且表法唯一.

[hints](#) 设  $\mathbf{A} = \mathbf{A}_1 + \mathbf{A}_2$ , 其中  $\mathbf{A}_1$  为对称矩阵,  $\mathbf{A}_2$  为斜对称矩阵. 等式两边取转置, 得到  $\mathbf{A}^T = \mathbf{A}_1 - \mathbf{A}_2$ . 联立两个方程得到  $\mathbf{A}_1 = \frac{\mathbf{A} + \mathbf{A}^T}{2}$  和  $\mathbf{A}_2 = \frac{\mathbf{A} - \mathbf{A}^T}{2}$ .

## 特殊矩阵

**Example 5.8.** 令

$$\mathbf{C} = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 & 0 & \cdots & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 & \cdots & 0 & 0 \\ \vdots & \vdots & \vdots & \ddots & & \vdots & \vdots \\ 0 & 0 & 0 & 0 & \cdots & 0 & 1 \\ 1 & 0 & 0 & 0 & \cdots & 0 & 0 \end{pmatrix}$$

称  $C$  为  $n$  阶循环移位矩阵. 用  $C$  左乘一个矩阵, 就相当于把这个矩阵每一行向上移一行, 第一行移到最后一行; 用  $C$  右乘一个矩阵, 就相对于把这个矩阵的每一列想右移动一列, 最后一列移到第一列.

## 矩阵的逆

### 复杂矩阵的逆

**Example 6.1.** 若  $A^l = \mathbf{0}$ , 其中  $l$  是使得  $A^m = \mathbf{0}$  中最小的那个  $m$ , 如果存在这样  $l$ , 则称  $\mathbf{A}$  是一个幂零矩阵, 它的幂零指数为  $l$ . 证明在这种情况下  $\mathbf{I} - \mathbf{A}$  是可逆矩阵.

**hints** 这个是比较有构造性, 需要把相应的可逆矩阵构造出来, 即

$$\mathbf{I} - \mathbf{A}^l = \mathbf{0} \Rightarrow (\mathbf{I} - \mathbf{A})(\mathbf{I} + \mathbf{A} + \mathbf{A}^2 + \cdots + \mathbf{A}^{l-1}) = \mathbf{I} - \mathbf{A}^l = \mathbf{I},$$

这里可以把  $\mathbf{I} - \mathbf{A}^l = \mathbf{0}$  看做  $1 - x^n = 0$ , 那么  $\mathbf{I}$  这个方程的一个根, 把这个根先提出来, 就可以得到上面的结果.

## 矩阵等价

### 判定等价

**Annotation 7.1.** 遵循矩阵等价当且仅当它们秩相同.

### 矩阵等价的性质

**Example 7.2.** 设  $m \times n$  矩阵  $A$  的秩为  $r (r > 0)$ , 则  $A$  可以表示成  $r$  个秩为 1 的矩阵之和.

[hints](#) 根据  $A$  相似于它的标准型, 有

$$A = P \begin{pmatrix} I_r & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix} Q = PE_{11}Q + PE_{22}Q + \cdots + PE_{rr}Q$$

**Example 7.3.** 设  $m \times n$  矩阵  $A$ , 则  $A$  的秩为  $r$  当且仅当存在  $m \times r$  列满秩矩阵  $B$  与  $r \times n$  行满秩矩阵  $C$ , 使得  $A = BC$ .

[hints](#) 必要性 利用  $A$  等价于它的标准相似性

$$A = P \begin{pmatrix} I_r & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix} Q = (P_1, P_2) \begin{pmatrix} I_r & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} Q_1 \\ Q_2 \end{pmatrix} = (P_1, 0) \begin{pmatrix} Q_1 \\ Q_2 \end{pmatrix} = P_1 Q_1.$$

其中  $P_1$  是  $m \times r$  列满秩矩阵,  $Q_1$  是  $r \times n$  行满秩矩阵.

充分性 由矩阵乘法中秩的上界知道

$$\text{rank}(BC) \leq r.$$

再由矩阵乘法中秩的下界知道

$$\text{rank}(BC) \geq \text{rank}(B) + \text{rank}(C) - r = r.$$

因此  $\text{rank}(BC) = \text{rank}(A) = r$ .

## 矩阵相似

### 相似判定

**Proposition 8.1.** 常用判定矩阵相似的方法，遇题依次向下使用下述方法.

1. 必要条件: 相似必行列值相等;
2. 必要条件: 特征值相等;
3. 充分条件: 对于都可对角化的矩阵，判定其特征值是否相同;
4. 否命题的充分条件: 一个可对角化，一个不可对角化，则它们不相似;
5. 对于都不可对角的矩阵，同一个特征值的特征子空间的维数相同;
6. 对于都不可对角的矩阵，则对应的特征向量满足: 若  $B$  对应  $\lambda$  的特征向量  $\lambda$ ，则  $A$  对应  $\lambda$  的特征向量为  $P\alpha$ . 这里要求出可逆矩阵  $P$

### 对角化判定

**Proposition 8.2.** 常用判定对角化的方法，遇题依次向下使用下述方法

1. 实对称矩阵一定相似于对角矩阵;
2. 有  $n$  个不同的特征值，那么一定相似于对角矩阵;
3.  $n$  重特征值对应特征子空间是否为  $n$  维;

## 二次型

### 正定性的判定