

Разложение ДУ в ряд.

Дифференциальное уравнение с частными производными параболического типа в общем виде записывается следующим образом:

$$\frac{\delta^2 u}{\delta t^2} + d \frac{\delta u}{\delta t} = a \frac{\delta^2 u}{\delta x^2} + b \frac{\delta u}{\delta x} + cu + f(x, t)$$

1. Для явной разностной схемы.

Воспользуемся методами численного дифференцирования и разложим каждый член уравнения имеющий производную в конечную сумму:

- $\frac{\delta^2 u}{\delta t^2} = \frac{u_i^{k-1} - 2u_i^k + u_i^{k+1}}{\tau^2}$, где τ - шаг по временной сетке;
- $d \frac{\delta u}{\delta t} = d \frac{u_i^{k+1} - u_i^{k-1}}{2\tau}$
- $a \frac{\delta^2 u}{\delta x^2} = a \frac{u_{i-1}^k - 2u_i^k + u_{i+1}^k}{h^2}$, где h - шаг по пространственной сетке;
- $b \frac{\delta u}{\delta x} = b \frac{u_{i+1}^k - u_{i-1}^k}{2h}$;
- $cu = cu_i^k$;

Перепишем исходное уравнение:

$$\frac{u_i^{k-1} - 2u_i^k + u_i^{k+1}}{\tau^2} + d \frac{u_i^{k+1} - u_i^{k-1}}{2\tau} = a \frac{u_{i-1}^k - 2u_i^k + u_{i+1}^k}{h^2} + b \frac{u_{i+1}^k - u_{i-1}^k}{2h} + cu_i^k + f(x, t).$$

Сгруппируем коэффициенты при u с одинаковыми индексами:

$$u_i^{k+1} \left(\frac{1}{\tau^2} + \frac{d}{2\tau} \right) = \left(\frac{a}{h^2} - \frac{b}{2h} \right) u_{i-1}^k + \left(c + \frac{2}{\tau^2} - \frac{2a}{h^2} \right) u_i^k + \left(\frac{a}{h^2} + \frac{b}{2h} \right) u_{i+1}^k + f(x, t).$$

Непосредственно из этого уравнения находится значение функции на временном уровне $k+1$.

2. Для не явной разностной схемы.

Воспользуемся методами численного дифференцирования и разложим каждый член уравнения имеющий производную в конечную сумму:

- $\frac{\delta^2 u}{\delta t^2} = \frac{u_i^{k-1} - 2u_i^k + u_i^{k+1}}{\tau^2}$, где τ - шаг по временной сетке;
- $d \frac{\delta u}{\delta t} = d \frac{u_i^{k+1} - u_i^{k-1}}{2\tau}$
- $a \frac{\delta^2 u}{\delta x^2} = a \frac{u_{i-1}^{k+1} - 2u_i^{k+1} + u_{i+1}^{k+1}}{h^2}$, где h - шаг по пространственной сетке;
- $b \frac{\delta u}{\delta x} = b \frac{u_{i+1}^{k+1} - u_{i-1}^{k+1}}{2h}$;
- $cu = cu_i^{k+1}$;

Перепишем исходное уравнение:

$$\frac{u_i^{k-1} - 2u_i^k + u_i^{k+1}}{\tau^2} + d \frac{u_i^{k+1} - u_i^{k-1}}{2\tau} = a \frac{u_{i-1}^{k+1} - 2u_i^{k+1} + u_{i+1}^{k+1}}{h^2} + b \frac{u_{i+1}^{k+1} - u_{i-1}^{k+1}}{2h} + cu_i^{k+1} + f(x, t).$$

Сгруппируем коэффициенты при u с одинаковыми индексами:

$$u_i^{k-1} \left(\frac{1}{\tau^2} - \frac{d}{2\tau} \right) - \frac{2u_i^k}{\tau^2} - f(x, t) = \left(\frac{a}{h^2} - \frac{b}{2h} \right) u_{i-1}^{k+1} + \left(c - \frac{2a}{h^2} - \frac{d}{2\tau} - \frac{1}{\tau^2} \right) u_i^{k+1} - \left(\frac{a}{h^2} + \frac{b}{2h} \right) u_{i+1}^{k+1}.$$

Для нахождения значений функции u на уровне $k+1$ необходимо решить систему уравнений:

$$\begin{cases} i = 1; \dots \\ i = 2, N-1; \quad Au_{i-1}^{k+1} + Bu_i^{k+1} + Cu_{i+1}^{k+1} = d_i \\ i = N; \dots \end{cases}$$

где $A = \left(\frac{a}{h^2} - \frac{b}{2h} \right)$, $B = \left(c - \frac{2a}{h^2} - \frac{d}{2\tau} - \frac{1}{\tau^2} \right)$, $C = \left(\frac{a}{h^2} + \frac{b}{2h} \right)$, $d = u_i^{k-1} \left(\frac{1}{\tau^2} - \frac{d}{2\tau} \right) - \frac{2u_i^k}{\tau^2} - f(x, t)$.

Формирование уравнений при $i=1$ и $i=N$ рассмотрим в разделе посвященном краевые условия.

Примечание. Во всех формулах приведенных выше рассматривается $i \in [2, N-1]$, где N - количество узлов в сетке по координате x .

Первый и второй временные слои.

Исходя из формул приведенных выше становится очевидно, что необходимо знать значение функции на временных уровнях $k-1$ и k .

Для вычисления временного уровня 0 воспользуемся начальным условием $\psi_0(x)$:

$$u_i^0 = \psi_0(ih), \text{ где } h - \text{ шаг по координате } x, \quad i \in [0; N].$$

Для вычисления временного уровня 1 необходимо использовать условием $\psi_1(x)$. Поскольку это условие содержит производную воспользуемся аппроксимацией:

- По 2 точкам с 1 порядком.

$$\frac{u_i^1 - u_i^0}{\tau} = \psi_1(ih)$$

$$u_i^1 = u_i^0 + \psi_1(ih)\tau = \psi_0(ih) + \psi_1(ih)\tau$$

- По 2 точкам с 2 порядком.

Разложим в ряд Тейлора:

$$u_i^1 = u_i^0 + \frac{\delta u}{\delta t} \Big|_i^0 \tau + \frac{\delta^2 u}{\delta t^2} \Big|_i^0 \frac{\tau^2}{2}.$$

Из исходного уравнения известно, что $\frac{\delta^2 u}{\delta t^2} = a \frac{\delta^2 u}{\delta x^2} + b \frac{\delta u}{\delta x} + cu + f(x, t) - d \frac{\delta u}{\delta t}$. Подставим:

$$u_i^1 = u_i^0 + \frac{\delta u}{\delta t} \Big|_i^0 \tau + \left(a \frac{\delta^2 u}{\delta x^2} + b \frac{\delta u}{\delta x} + cu + f(x, t) - d \frac{\delta u}{\delta t} \right) \Big|_i^0 \frac{\tau^2}{2}.$$

Подставим граничные условия:

$$u_i^1 = \psi_0(ih) + \psi_1(ih)\tau + \left(a\ddot{\psi}_0(ih) + b\dot{\psi}_0(ih) + c\psi_0(ih) + f(x, t) - d\dot{\psi}_1(ih) \right) \frac{\tau^2}{2}.$$

Сгруппируем:

$$u_i^1 = \psi_0(ih) + \psi_1(ih)(\tau - d \frac{\tau^2}{2}) + \left(a\ddot{\psi}_0(ih) + b\dot{\psi}_0(ih) + c\psi_0(ih) + f(x, t) \right) \frac{\tau^2}{2}.$$

Краевые условия.

Краевые условия могут принимать вид:

1. Условия первого рода:

$$\begin{cases} \beta u(0, x) = \phi_l(t) \\ \delta u(l, x) = \phi_r(t) \end{cases}$$

В таком случае u_1^{k+1} и u_N^{k+1} находятся по формуле:

- Для явной разностной схемы
 $u_1^{k+1} = \frac{\phi_l(t)}{\beta}, u_N^{k+1} = \frac{\phi_r(t)}{\delta}.$
- Для не явной разностной схемы

$$\begin{cases} i = 1; & \beta u_1^{k+1} + 0u_2^{k+1} = \phi_l(t) \\ i = \overline{2, N-1}; & Au_{i-1}^{k+1} + Bu_i^{k+1} + Cu_{i+1}^{k+1} = d_i \\ i = N; & 0u_{N-1}^{k+1} + \delta u_N^{k+1} = \phi_r(t) \end{cases},$$

2. Условия второго рода:

$$\begin{cases} \frac{\delta u}{\delta x}(0, x) = \frac{\phi_l(t)}{\alpha} \\ \frac{\delta u}{\delta x}(l, x) = \frac{\phi_r(t)}{\gamma} \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} \frac{u_2^{k+1} - u_1^{k+1}}{h}(0, x) = \frac{\phi_l(t)}{\alpha} \\ \frac{u_N^{k+1} - u_{N-1}^{k+1}}{h}(l, x) = \frac{\phi_r(t)}{\gamma} \end{cases}$$

В таком случае u_1^{k+1} и u_N^{k+1} находятся по формуле:

- Для явной разностной схемы
 $u_1^{k+1} = u_2^{k+1} - h \frac{\phi_l(t)}{\alpha}, u_N^{k+1} = u_{N-1}^{k+1} + h \frac{\phi_r(t)}{\gamma}.$
- Для не явной разностной схемы

$$\begin{cases} i = 1; & -\frac{\alpha}{h}u_1^{k+1} + \frac{\alpha}{h}u_2^{k+1} = \phi_l(t) \\ i = \overline{2, N-1}; & Au_{i-1}^{k+1} + Bu_i^{k+1} + Cu_{i+1}^{k+1} = d_i \\ i = N; & -\frac{\gamma}{h}u_{N-1}^{k+1} + \frac{\gamma}{h}u_N^{k+1} = \phi_r(t) \end{cases},$$

3. Условия третьего рода:

$$\begin{cases} \alpha \frac{\delta u}{\delta x}(0, x) + \beta u(0, x) = \phi_l(t) \\ \gamma \frac{\delta u}{\delta x}(l, x) + \delta u(l, x) = \phi_r(t) \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} \alpha \frac{u_2^{k+1} - u_1^{k+1}}{h}(0, x) + \beta u_1^{k+1} = \phi_l(t) \\ \gamma \frac{u_N^{k+1} - u_{N-1}^{k+1}}{h}(l, x) + \delta u_N^{k+1} = \phi_r(t) \end{cases}$$

В таком случае u_1^{k+1} и u_N^{k+1} находятся по формуле:

- Для явной разностной схемы
 $u_1^{k+1} = \frac{\phi_l(t) - \frac{\alpha}{h}u_2^{k+1}}{\beta - \frac{\alpha}{h}}, u_N^{k+1} = \frac{\phi_r(t) + \frac{\gamma}{h}u_{N-1}^{k+1}}{\delta + \frac{\gamma}{h}}.$
- Для не явной разностной схемы

$$\begin{cases} i = 1; & \left(\beta - \frac{\alpha}{h}\right) u_1^{k+1} + \frac{\alpha}{h} u_2^{k+1} = \phi_l(t) \\ i = \overline{2, N-1}; & Au_{i-1}^{k+1} + Bu_i^{k+1} + Cu_{i+1}^{k+1} = d_i \\ i = N; & -\frac{\gamma}{h} u_{N-1}^{k+1} + \left(\delta + \frac{\gamma}{h}\right) u_N^{k+1} = \phi_r(t) \end{cases},$$

Теперь рассмотрим аппроксимацию с вторым порядком точности. Поскольку условия первого рода не требуют аппроксимации, а условия второго рода являются частным случаем условий третьего рода, будем рассматривать случай краевых условий третьего рода.

1. По 3 точкам.

$$\begin{cases} \alpha \frac{\delta u}{\delta x}(0, x) + \beta u(0, x) = \phi_l(t) \\ \gamma \frac{\delta u}{\delta x}(l, x) + \delta u(l, x) = \phi_r(t) \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} \alpha \frac{-3u_1^{k+1} + 4u_2^{k+1} - u_3^{k+1}}{2h}(0, x) + \beta u_1^{k+1} = \phi_l(t) \\ \gamma \frac{u_{N-3}^{k+1} - 4u_{N-2}^{k+1} + 3u_N^{k+1}}{2h}(l, x) + \delta u_N^{k+1} = \phi_r(t) \end{cases}$$

- Для явной разностной схемы

$$u_1^{k+1} = \frac{2h\phi_l(t) + \alpha u_3^{k+1} - 4\alpha u_2^{k+1}}{2h\beta - 3\alpha}, \quad u_N^{k+1} = \frac{2h\phi_r(t) + 4\gamma u_{N-1}^{k+1} - \gamma u_{N-2}^{k+1}}{2h\delta + 3\gamma}.$$

- Для не явной разностной схемы

$$\begin{cases} i = 1; \quad (\beta - \frac{3\alpha}{2h}) u_1^{k+1} + \frac{2\alpha}{h} u_2^{k+1} - \frac{\alpha}{2h} u_3^{k+1} = \phi_l(t) \\ i = \overline{2, N-1}; \quad Au_{i-1}^{k+1} + Bu_i^{k+1} + Cu_{i+1}^{k+1} = d_i \\ i = N; \quad (\delta + \frac{\gamma}{2h}) u_{N-3}^{k+1} + \frac{4\gamma}{2h} u_{N-1}^{k+1} - \frac{\alpha}{2h} u_3^{k+1} = \phi_r(t) \end{cases},$$

2. По 2 точкам.

$$\begin{cases} \alpha \frac{\delta u}{\delta x}(0, x) = \alpha \left(u_1^{k+1} + \frac{\delta u}{\delta x} \Big|_1^{k+1} h + \frac{\delta^2 u}{\delta x^2} \Big|_1^{k+1} \frac{h^2}{2} \right) \\ \gamma \frac{\delta u}{\delta x}(l, x) = \gamma \left(u_N^{k+1} + \frac{\delta u}{\delta x} \Big|_N^{k+1} h + \frac{\delta^2 u}{\delta x^2} \Big|_N^{k+1} \frac{h^2}{2} \right) \end{cases}$$

Вычислим все неизвестные компоненты:

$$\begin{aligned} \frac{\delta^2 u}{\delta x^2} \Big|_0^{k+1} &= \frac{b}{a} \frac{\delta u}{\delta x} - \frac{1}{a} \frac{\delta^2 u}{\delta t^2} - \frac{d}{a} \frac{\delta u}{\delta t} + \frac{c}{a} u + \frac{1}{a} f(x, t) \\ \frac{\delta u}{\delta x} \Big|_0^{k+1} &= \frac{u_2^{k+1} - u_1^{k+1}}{h} \\ \frac{\delta^2 u}{\delta t^2} &= \frac{u_1^{k-1} - 2u_1^k + u_1^{k+1}}{\tau^2} \\ \frac{\delta u}{\delta t} &= \frac{u_1^{k+1} - u_1^{k-1}}{2\tau} \end{aligned}$$

сделаем подстановку:

$$\begin{cases} \alpha \frac{\delta u}{\delta x}(0, x) = \alpha \left(u_2^{k+1} + \left(\frac{b}{a} \frac{u_2^{k+1} - u_1^{k+1}}{h} - \frac{1}{a} \frac{u_1^{k-1} - 2u_1^k + u_1^{k+1}}{\tau^2} - \frac{d}{a} \frac{u_1^{k+1} - u_1^{k-1}}{2\tau} + \frac{c}{a} u_1^{k+1} + \frac{1}{a} f(x, t) \right) \frac{h^2}{2} \right) \\ \gamma \frac{\delta u}{\delta x}(l, x) = \gamma \left(2u_N^{k+1} - u_{N-1}^{k+1} + \left(\frac{b}{a} \frac{u_N^{k+1} - u_{N-1}^{k+1}}{h} - \frac{1}{a} \frac{u_N^{k-1} - 2u_N^k + u_N^{k+1}}{\tau^2} - \frac{d}{a} \frac{u_N^{k+1} - u_N^{k-1}}{2\tau} + \frac{c}{a} u_N^{k+1} + \frac{1}{a} f(x, t) \right) \frac{h^2}{2} \right) \end{cases}$$

сгруппируем:

$$\begin{cases} \alpha \frac{\delta u}{\delta x}(0, x) = \alpha \left(u_1^{k+1} \left[\frac{ch^2}{2a} - \frac{h^2}{2a\tau^2} - \frac{dh^2}{4a\tau} - \frac{bh}{2a} \right] + u_1^{k-1} \left[-\frac{h^2}{2a\tau^2} - \frac{dh^2}{4a\tau} \right] + u_1^k \frac{h^2}{a\tau^2} + u_2^{k+1} \left[1 + \frac{bh}{2a} \right] + f(x, t) \frac{h^2}{2a} \right) \\ \gamma \frac{\delta u}{\delta x}(l, x) = \gamma \left(u_N^{k+1} \left[2 + \frac{bh}{2a} - \frac{h^2}{2a\tau^2} - \frac{dh^2}{4a\tau} + \frac{ch^2}{2a} \right] + u_N^{k-1} \left[\frac{dh^2}{4a\tau} - \frac{h^2}{2a\tau^2} \right] + u_N^k \frac{h^2}{a\tau^2} - u_{N-1}^{k+1} \left[1 + \frac{bh}{2a} \right] + f(x, t) \frac{h^2}{2a} \right) \end{cases}$$

Для краткости введем обозначения:

$$m_0 = \frac{ch^2}{2a} - \frac{h^2}{2a\tau^2} - \frac{dh^2}{4a\tau} - \frac{bh}{2a}; \quad z_0 = -\frac{h^2}{2a\tau^2} - \frac{dh^2}{4a\tau}; \quad s_0 = 1 + \frac{bh}{2a};$$

$$m_l = 2 + \frac{bh}{2a} - \frac{h^2}{2a\tau^2} - \frac{dh^2}{4a\tau} + \frac{ch^2}{2a}; \quad z_l = \frac{dh^2}{4a\tau} - \frac{h^2}{2a\tau^2}; \quad s_l = 1 + \frac{bh}{2a};$$

$$\begin{cases} \alpha \left(u_1^{k+1} m_0 + u_1^{k-1} z_0 + u_1^k \frac{h^2}{a\tau^2} + u_2^{k+1} s_0 + f(x, t) \frac{h^2}{2a} \right) + \beta u_1^{k+1} = \phi_l(t) \\ \gamma \left(u_N^{k+1} m_l + u_N^{k-1} z_l + u_N^k \frac{h^2}{a\tau^2} - u_{N-1}^{k+1} s_l + f(x, t) \frac{h^2}{2a} \right) + \delta u_N^{k+1} = \phi_r(t) \end{cases}$$

- Для явной разностной схемы

$$u_1^{k+1}(\alpha m_0 + \beta) = \phi_l(t) - \alpha \left(u_1^{k-1} z_0 + u_1^k \frac{h^2}{a\tau^2} + u_2^{k+1} s_0 + f(x, t) \frac{h^2}{2a} \right),$$

$$u_N^{k+1}(\gamma m_l + \delta) = \phi_r(t) - \gamma \left(u_N^{k-1} z_l + u_N^k \frac{h^2}{a\tau^2} - u_{N-1}^{k+1} s_l + f(x, t) \frac{h^2}{2a} \right)$$

- Для не явной разностной схемы

$$\begin{cases} i = 1; \quad u_1^{k+1}(\alpha m_0 + \beta) + \alpha u_2^{k+1} s_0 = \phi_l(t) - \alpha \left(u_1^{k-1} z_0 + u_1^k \frac{h^2}{a\tau^2} + f(x, t) \frac{h^2}{2a} \right) \\ i = \overline{2, N-1}; \quad A u_{i-1}^{k+1} + B u_i^{k+1} + C u_{i+1}^{k+1} = d_i \\ i = N; \quad u_N^{k+1}(\gamma m_l + \delta) - \gamma u_{N-1}^{k+1} s_l = \phi_r(t) - \gamma \left(u_N^{k-1} z_l + u_N^k \frac{h^2}{a\tau^2} + f(x, t) \frac{h^2}{2a} \right) \end{cases}$$