

3. školska zadaća

Grupe 1.05, 1.07

— A —

1. (2 boda) Nadite jednadžbu tangencijalne ravnine na plohu

$$z = x^2 - y^2$$

u točki $T(1, 1, 0)$.

2. (2 boda) Izračunajte približnu vrijednost izraza

$$\ln((0.1)^2 + (0.9)^2)$$

pomoću diferencijala.

3. (3 boda) Nadite onu točku na krivulji

$$\begin{cases} x = 2t^2 \\ y = 4t \\ z = -t^2 \end{cases}$$

u kojoj je tangenta paralelna s ravninom $3x + 4y - z + 2 = 0$.

4. (3 boda) Neka je

$$I(\alpha) = \int_0^{\sqrt{\alpha}} x \left(\int_0^x \sin \alpha t \, dt \right) dx.$$

Nadite derivaciju integrala $I(\alpha)$ po parametru α .

3. školska zadaća

Grupe 1.05, 1.07

— B —

1. (2 boda) Nadite jednadžbu tangencijalne ravnine na plohu

$$z = x - y^2$$

u točki $T(1, 1, 0)$.

2. (2 boda) Izračunajte približnu vrijednost izraza

$$\arctg((0.1)^2 + (0.9)^2)$$

pomoću diferencijala.

3. (3 boda) Nadite onu točku na krivulji

$$\begin{cases} x = 3t - 1 \\ y = 4t^2 \\ z = -2t^2 \end{cases}$$

u kojoj je tangenta paralelna s ravninom $4x - 3y + 7 = 0$.

4. (3 boda) Neka je

$$I(\alpha) = \int_{-\alpha^2}^{\alpha^2} \frac{1}{x} \left(\int_0^x e^{\alpha t} \, dt \right) dx.$$

Nadite derivaciju integrala $I(\alpha)$ po parametru α .

3. školska zadaća

Grupa 1.MAT

— A —

1. (3 boda) Zadane su dvije funkcije $z = f(x, y)$ i $z = g(x, y)$, od kojih samo jedna ima limes u točki $(0, 0)$, gdje su:

$$f(x, y) = \frac{x^2 - 2y^2}{\sqrt{x^4 + y^4}} \quad \text{i} \quad g(x, y) = xy \sin \frac{1}{x+y}.$$

Za jednu od funkciju $z = f(x, y)$ i $z = g(x, y)$ koja nema limes u točki $(0, 0)$, obrazložiti zašto ga nema?

2. (2 boda) Neka je $f = f(x, y)$ i $z = z(u, v) = f(u + \cos v, u - \sin v)$. Ako se zna da je

$$\frac{\partial f}{\partial x}(1, 0) = 2 \quad \text{i} \quad \frac{\partial f}{\partial y}(1, 0) = -1,$$

izračunati koliko je

$$4 \cos v \frac{\partial z}{\partial u} + \frac{\partial z}{\partial v}$$

u točki $u = 0$ i $v = 0$.

3. (3 boda) Primjenom diferencijala funkcije približno izračunati:

$$(0.98)^{0.99}$$

4. (2 boda) Koristeći derivaciju integrala po parametru izračunati integral:

$$I(\alpha) = \int_0^\infty \frac{1 - e^{\alpha x}}{xe^{4x}} dx, \quad \alpha < 4.$$

3. školska zadaća

Grupe 1.02, 1.04

— A —

1. (2 boda) Odredite sve $a \in \mathbb{R}$ tako da funkcija

$$f(x, y) = \begin{cases} \frac{x^3 + y^3 + x^2 y}{x^2 + y^2}, & \text{ako je } (x, y) \neq (0, 0) \\ a, & \text{inače} \end{cases}$$

bude neprekinuta u točki $O(0, 0)$.

2. (3 boda)

a) Napišite definiciju parcijalne derivacije $\frac{\partial f}{\partial z}$ funkcije

$$u = f(x, y, z)$$

u točki $T(x_0, y_0, z_0)$.

b) Odredite gradijent funkcije $f(x, y) = x \arcsin(x^2 y) + y \cos(xy^2)$ u točki $T(0, 0)$.

3. (2 boda) Odredite jednadžbu tangencijalne ravnine na plohu $z = x^y \ln x$ u točki $T(e, 1, e)$.

4. (3 boda)

a) Odredite $\frac{\partial z}{\partial u}$ ako je $z = f(x, y)$, pri čemu je $x = u \cdot v^2$ i $y = \ln(uv)$.

b) Primijenite rezultat dobiven u a) na funkciju $z = f(x, y) = \frac{y}{x}$ u točki za koju je $(u, v) = (e, 1)$.