

CATÁLOGO DE PRODUCTOS

Seleccionamos las mejores tecnologías del mundo
y las rediseñamos para producir más y mejor.





HERBICIDAS

pág. 5



CLARON® 36 / Cyhalofop p-butil 36 % - EC	pág. 6
DARREN® / Flumioxazin 48 % - SC	pág. 6
DASEN® / Benazolin-etil 50 % - SC	pág. 7
DASEN® PLUS / Benazolin-etil 20 % + Fomesafen 13,3 % - SC	pág. 7
ECTRAN® / Bispyribac-sodio 40 % - SC	pág. 8
FLOSIL® 50 / Fomesafen 50 % - SL	pág. 8
FLUSAN® / Diflufenican 50 % - SC	pág. 9
GLUFAN® / Glufosinato de amonio 20 % - SL	pág. 9
HALOX® 81 / Haloxifop-p-metil 81 % - EC	pág. 10
KATRIN® 80 / Imazapir 80 % - SP	pág. 10
KYLIAN® 48 / Cletodim 48 % - EC	pág. 11
LISI® 48 / Quinclorac 25 % - SC	pág. 11
MABYN® / 2,4-D Alquil - Mix 78,1 % (Eq. ác. 34 %) - SL	pág. 12
MANIAC® / Imazapic 70 % - SP	pág. 12
MARCH II® / Glifosato 66,2 % (Eq. ác. 54 %) - SL	pág. 13
MARCH MAX / Glifosato 75,7 % (Eq. ác. 68,8 %) - SG	pág. 13
MILLION® / Lactofen 24 % - EC	pág. 14
S-MILLION® / S-Lactofen 36 % - EC	pág. 14
MORRIGAN® / Diclosulam 84 % - WP	pág. 15
MULAN® / Flumetsulam 12 % - SC	pág. 15
MULAN® 48 / Flumetsulam 48 % - SC	pág. 16
PARAQUAT® 27,6 / Paraquat dicloruro 27,6 % - SL	pág. 16
SULFENAX® 50 / Sulfentrazone 50 % - SC	pág. 17
TALIS® / Flurocloridona 25 % - EC	pág. 17
TOP GROUND® / Imazapir 17,5 % + Imazapic 52,5 % - SP	pág. 18
TOP RICE® / Imazapic 17,5 % + Imazapir 52,5 % - SP	pág. 19
VEROSIL® 40 / Imazetapir 44,1 % (Eq. ác. 40 %) - SL	pág. 19

INSECTICIDAS

pág. 21



ADERYN / Dinotefuran 70 % - SP-SB	pág. 22
FLOUX® / Acetamiprid 2% + Lambdacialotrina 2 % - OD	pág. 22
IDRIS® / Flubendiamide 48 % - SC	pág. 23
KIER III® / Abamectina 0,18 % + Lufenuron 1,5 % + Bifentrin 1,8 % - EC	pág. 23
KIER III PLUS® / Abamectina 0,9 % + Lufenuron 7,5 % + Bifentrin 9 % - EC	pág. 24
TIEMBLA® / Tiametoxam 14,1% + Lambdacialotrina 10,6 % - SC	pág. 24
TREVOR® / Clorantraniliprole 20 % - SC	pág. 25

FUNGICIDAS

pág. 27



AZOXY PRO® / Azoxistrobina 20 % + Ciproconazole 8 % - SC	pág. 28
FORMAX III® / Azoxistrobina 5,62 % + Cyproconazole 3 % + Boscalid 6 % - SC	pág. 28
FORMAX NEO® / Boscalid 10 % + Difenconazole 15 % - SC	pág. 29
NIFRAN® / Fluazinam 50 % - SC	pág. 29

FITORREGULADORES

pág. 31



ABRIDOR® PLUS/ Thidiazuron 12 % + Diuron 6 % - OD	pág. 32
---	---------

COADYUVANTES

pág. 33



ZINAX® / EMAG 75 % - EC	pág. 34
-------------------------	---------

RECOMENDACIONES

pág. 35



CULTIVO DE SOJA	pág. 36
CULTIVO DE MAÍZ	pág. 37
CULTIVO DE TRIGO Y CEBADA	pág. 38
CULTIVO DE GIRASOL	pág. 39
CULTIVO DE SORGO	pág. 40
CULTIVO DE POROTO	pág. 41
CULTIVO DE ARROZ	pág. 42
CULTIVO DE ALGODÓN	pág. 43
CULTIVO DE MANÍ	pág. 44
CULTIVO DE ALFALFA	pág. 45
CULTIVO DE CAÑA DE AZÚCAR	pág. 46





HERBICIDAS



HERBICIDAS

CLARON / CLARON® 36

Cyhalofop-p-butil 36 % - EC (Concentrado Emulsionable)

Es un herbicida post-emergente, para el control de gramíneas, con acción sistémica y selectiva para cultivos de arroz de inundación y secano. Se absorbe rápidamente a través del follaje y se transloca a los tejidos meristemáticos de la planta donde ejerce su acción herbicida. La detención del crecimiento de las malezas comienza a las pocas horas de la aplicación. A los pocos días se observan: clorosis en las hojas y tallos, coloración que va del rojo al morado y necrosis en los puntos de crecimiento.

PRESENTACIÓN: Bidón de 20 Litros.

ACCIÓN: Sistémico.

FAMILIA QUÍMICA: Ariloxifenoxipropionato (FOP's).

MECANISMO DE ACCIÓN: Inhibidores de la acetil coenzima-A carboxilasa (ACCase) Grupo A.

MALEZAS: Capín.

CULTIVO: Arroz.

DOSIS: 0,75 -1 L/ha.

RECOMENDACIONES DE USO: Aplicar cuando las gramíneas están en activo crecimiento, las mismas deben tener entre 3 hojas verdaderas y 1 a 2 macollos. Para un control más efectivo, se debe proceder a inundar definitivamente el cultivo a las 24 horas posteriores a la aplicación del producto.

BANDA TOXICOLÓGICA: Verde.

DARREN / DARREN*

Flumioxazin 48 % - SC (Suspensión Concentrada)

DARREN es un herbicida selectivo de pre-siembra, para combatir malezas latifoliadas y supresión de gramíneas en los cultivos de soja, sorgo granífero, trigo, girasol y maíz. Puede ser aplicado en pre-emergencia y post-emergencia temprana de las malezas. Actúa por contacto, cuando es absorbido por las partes verdes de las malezas se activa por la luz, destruyendo la membrana celular, lo que produce una necrosis de los tejidos vegetales, y tiene un excelente poder residual en el suelo.

PRESENTACIÓN: Bidón de 5 Litros.

ACCIÓN: Sistémico, contacto y residual.

FAMILIA QUÍMICA: N-Feniltalimidas.

MECANISMO DE ACCIÓN: Inhibidor de la enzima protoporfirinógeno oxidasa (PPO). Grupo E.

MALEZA: Afata hembra, Albahaca silvestre, Ataco, Bejuco, Camambú, Campanilla, Capín arroz, Cardo asnal, Cardo negro, Cardo pendiente, Cardo ruso, Cebadilla, Cerraja, Chamico, Chinchilla, Cien nudos, Cola de zorro, Corregüela, Enredadera anual, Farolito, Flor de Santa Lucía, Gramillón, Gramón, Lagunilla, Lengua de vaca, Malva, Malva cimarrona, Morenita, Mostacilla, Nabo, Nabón, No me olvides, Ortiga, Ortiga mansa, Pasto braquiaria, Pasto colorado, Pasto de cuaresma, Quinoa blanca, Rabaniza, Rama negra, Ryegrass, Senecio, Sunchillo, Trébol de color blanco, Tutia, Verdolaga, Verónica, Violeta silvestre, Yuyo colorado.

CULTIVO: Cerezas, Ciruelas, Cítricos, Damasco, Durazno, Girasol, Maíz, Pelón, Soja, Sorgo granífero, Trigo y Vid.

DOSIS: Girasol, Maíz, Sorgo Granífero: 0,05 - 0,1 L/ha. Soja 0,104 - 0,156 L/ha. Trigo 0,1 - 0,12 L/ha.

RECOMENDACIONES DE USO: Entre la aplicación de DARREN y la siembra debe transcurrir: A: Para cultivo de Soja: 7 días. B: Para cultivo de Maíz y Sorgo granífero: 20-30 días. C: Para el cultivo de Girasol: 20-30 días para la dosis de 0,05 L/ha, 45-60 días para dosis superiores. D: Para Trigo: 15 días.

BANDA TOXICOLÓGICA: Verde.



Benazolin-etil 50 % - SC (Suspensión Concentrada)

Es un herbicida sistémico selectivo post-emergente que es absorbido principalmente por las hojas y traslocado rápidamente por el floema en las malezas de hoja ancha. Por su selectividad es recomendado en el cultivo de soja y maní. Transcurridas las 24 a 48 horas de la aplicación comienzan a manifestarse los primeros síntomas, detención de crecimiento, deformación de tallos y hojas, produciéndose su muerte a los 10 a 20 días.

PRESENTACIÓN: Bidón de 10 Litros.

ACCIÓN: Sistémico.

FAMILIA QUÍMICA: Benzotiazoles.

MECANISMO DE ACCIÓN: Acción similar al ácido indolacético (Auxinas sintéticas). GRUPO O.

MALEZA: Chamico, Malva, Quinoa, Yuyo Colorado.

CULTIVO: Soja y maní.

DOSIS: Soja 0,6 - 0,8 L/ha. Maní 0,5 - 0,6 L/ha.

RECOMENDACIONES DE USO: Debe aplicarse en el momento en que las malezas se encuentran en activo crecimiento y en condiciones de buena humedad y temperatura. En caso de síntomas de sequía o de bajas temperaturas, deben evitarse los tratamientos con DASEN. Aplicar en mezcla con March II. No aplicar con aceites.

BANDA TOXICOLÓGICA: Verde.



Benazolin-etil 20 % + Fomesafen 13,3 % - SC (Suspensión Concentrada)

Es una combinación exclusiva de benazolin-etil y fomesafen, dos principios activos herbicidas con diferentes mecanismos de acción, especialmente diseñada para control de Yuyo colorado, tanto en pre como en post-emergencia del cultivo de soja. La combinación de los efectos de contacto y sistema hace que el producto sea más contundente, disminuyendo la posibilidad de rebrotes, garantizando mayores controles de la maleza. Formulación exclusiva con excelente compatibilidad con el glifosato.

PRESENTACIÓN: Bidón de 20 Litros.

ACCIÓN: Sistémico y contacto.

FAMILIA QUÍMICA: Benzotiazoles - Difenileteres.

MECANISMO DE ACCIÓN: Acción similar al ácido indolacético (Auxinas sintéticas). GRUPO O. Inhibidor de la enzima protoporfirinógeno oxidasa (PPO). Grupo E.

MALEZA: Yuyo Colorado.

CULTIVO: Soja.

DOSIS: Soja: 1,5 L/ha.

RECOMENDACIONES DE USO: Aplicar una vez que todas las malezas hayan emergido y se encuentren en activo crecimiento. No aplicar con malezas de tamaño superior a los 12 cm. Aplicar en mezcla con March II. No aplicar con aceites.

BANDA TOXICOLÓGICA: Verde.

**ECTRAN / ECTRAN®****Bispyribac-sodio 40% - Suspensión Concentrada (SC)**

Es un herbicida post-emergente selectivo para el cultivo de arroz de inundación y secano. Permite controlar gramíneas, ciperáceas y latifoliadas.

PRESENTACIÓN: Botella de 1 Litro.

ACCIÓN: Sistémico.

FAMILIA QUÍMICA: Pirimidiniltiobenzoatos.

MECANISMO DE ACCIÓN: Inhibidor de la enzima acetolactato sintasa (ALS). Grupo B.

MALEZAS: **GRAMÍNEAS:** Capín de arroz, Chacrilla, Colas de Zorro, Pasto colorado, Pasto de cuaresma, Pasto braquiaria, Canutillo. Latifoliadas: Eclipsa, Barba de indio, Yuyo colorado, Saetilla, Verdolaga, Flor de Santa Lucia, Camambú, Lagunilla, Ludwigia, Capelonia, Cala de agua, Pontederia, Polygonum, Espina colorada.

CIPERÁCEAS: Cípero entrerriano, Chufa salvaje, Totorilla, Junquillo, Eleocharis, Cípero común.

CULTIVO: Arroz.

DOSIS: 0.1 L/ha.

RECOMENDACIONES DE USO: El producto debe ser aplicado 14 a 21 días luego de emergidas las plántulas de arroz y con malezas en estado de 2da a 5ta hoja verdadera (gramíneas y ciperáceas) ó en estado de roseta (latifoliadas) de hasta 10 cm de diámetro de las mismas. El tratamiento en el estado de activo crecimiento de las malezas es indispensable para que se produzca una buena absorción y traslocación del producto previo a la entrada del agua de inundación. Para lograr un control más efectivo debe inundarse definitivamente el cultivo 4 días después de la aplicación del producto.

BANDA TOXICOLÓGICA: Azul.

FLOSIL / FLOSIL® 50**Fomesafen 50 % - SL (Concentrado Soluble)**

Es un herbicida selectivo post-emergente absorbido por hojas y raíces. Controla malezas de hoja ancha. Actúa por contacto, por lo que requiere una aplicación cuidadosa para lograr una buena cobertura de las malezas y asegurar los mejores resultados.

PRESENTACIÓN: Bidón de 20 Litros.

ACCIÓN: Contacto.

FAMILIA QUÍMICA: Difenileteres.

MECANISMO DE ACCIÓN: Inhibidor de la enzima protoporfirinógeno oxidasa (PPO). Grupo E.

MALEZAS: Bejuco, Chamico, Malva Cimarrona, Torito, Abrojo grande, Cepa caballo, Cuernos del diablo, Chinchilla, Saetilla, Farolito, Girasolillo, Lagunilla, Lecherón, Nabo, Pasto cubano, Yuyo colorado, Quinoa blanca, Verdolaga.

CULTIVO: Maní, Poroto, Soja.

DOSIS: Soja y poroto: 0,35 - 0,7 L/ha. Maní: 0,15 - 0,2 L/ha.

RECOMENDACIONES DE USO: Mezclar siempre con humectante no iónico en la concentración recomendada por su fabricante.

Aplicar después de que todas las malezas hayan emergido, cuando las mismas sean jóvenes (preferentemente 5 cm) y en activo crecimiento. Usar dosis menores en caso de malezas de escaso desarrollo (2 a 4 hojas hasta 5 cm) y las dosis mayores en casos de malezas en estado más avanzado de desarrollo (5 a 8 hojas o hasta 10 cm y/o malezas difíciles).

BANDA TOXICOLÓGICA: Amarilla.



Diflufenican 50 % - SC (Suspensión Concentrada)

Es un herbicida pre-emergente, que controla malezas de hoja ancha susceptibles que afectan pasturas y cultivos de girasol. También se aplica en barbecho químico. La absorción del producto es por vía del hipocótilo, durante la germinación de las malezas.

PRESENTACIÓN: Bidón de 10 Litros.

ACCIÓN: Residual.

FAMILIA QUÍMICA: Piridincarboxamidas.

MECANISMO DE ACCIÓN: Inhibidor de la síntesis de caroteno. Grupo F1.

MALEZAS: Abrepuño amarillo, Afata hembra, Albahaca silvestre, Algodonosa / pelludilla, Bolsa del pastor, Calabacilla, Canchalagua, Capiquí, Cardo ruso, Chamico, Chinchilla, Enredadera anual, Lengua de vaca, Malva cimarrona, Manzanilla cimarrona, Mastuerzo, Morenita, Mostacilla, Nabo, Nabón, Ortiga, Ortiga mansa, Pensamiento silvestre, Perejillo, Quinoa, Rama negra, Sanguinaria, Verdolaga, Violeta silvestre, Vira vira, Yuyo colorado.

CULTIVOS: Girasol, Pasturas, Barbecho Químico.

DOSIS: Barbecho Químico: 0,2 - 0,3 L/ha siempre en mezcla con 1,8 L/ha de March II. Girasol: Según tipo de suelo. Solo: 0,2 - 0,3 L/ha. En mezcla: 0,150 L/ha. Praderas puras y consociadas: Siempre en mezclas: 0,1 L/ha.

RECOMENDACIONES DE USO: El producto está recomendado cuando existe invasión de malezas de hoja ancha susceptibles principalmente anuales, así como perennes, o un banco de semillas importante de las mismas, que afectan a las praderas puras y consociadas, y al cultivo de girasol. Su uso también está indicado, solo o en mezcla, para la realización de barbechos químicos, previos al cultivo de maíz o soja. Uso posicionado en pre emergencia de las malezas. No aplique cuando los vientos superen los 10 Km/h. No aplicar cuando se esperen lluvias a corto plazo.

BANDA TOXICOLÓGICA: Verde.



Glufosinato de amonio 20 % - SL (Concentrado Soluble)

Es un herbicida no selectivo para aplicaciones en barbecho químico y es un post emergente selectivo en aplicaciones de cobertura total sobre cultivos de maíz y soja resistente a Glufosinato de amonio. Altera el metabolismo amónico de las plantas, al mismo tiempo que inhibe de manera acentuada la fotosíntesis, generando una coloración amarilla clara en las partes verdes de las plantas, las cuales se marchitan y mueren al cabo de 2-5 días.

PRESENTACIÓN: Bidón 20 Litros.

ACCIÓN: Contacto.

FAMILIA QUÍMICA: Ácidos fosfínicos

MECANISMO DE ACCIÓN: Inhibidor de la enzima glutamina sintetasa (GS). Grupo 10.

MALEZAS: Abrojo grande, Amor Seco, Albahaca silvestre, Avena guacha, Bejucos, Bolsa de pastor, Capín arroz, Chamico, Chinchilla, Cebadilla, Cerraja, Lagunilla, Malva cimarrona, Manzanilla, Maíz guacho, Nabón, Ortiga, Pasto braquiaria, Pasto cuaresma, Pie de gallina, Poa, Quínoa blanca, Sorgo de Alepo de semilla, Verdolaga, Yuyo colorado, Yuyo bola, Sorgo de Alepo de rizoma, Rye Grass,

CULTIVO: Maíz y Soja resistente a Glufosinato de amonio. Áreas sin cultivo y frutales.

DOSIS: Maíz resistente a Glufosinato 1,5 a 3,5 l/ha. Barbecho químico 1,5 - 3,5 L/ha. Áreas sin cultivo y frutales 2,5 - 8 L/ha.

RECOMENDACIONES DE USO: Evitar las aplicaciones cuando las temperaturas sean menores que 10°C o mayores que 25°C, y/o en condiciones de estrés hídrico. Aplicar cuando las malezas se encuentren en activo crecimiento, empleando las dosis mayores sobre malezas de mayor tamaño. Aplicar con sulfato de Amonio para obtener mejores resultados.

BANDA TOXICOLÓGICA: Azul



Haloxifop-p-metil 81 % - EC (Concentrado Emulsionable)

Es un graminicida postemergente de acción sistémica selectivo para cultivos de soja, girasol, maní, poroto y algodón, controlando tanto gramíneas anuales como perennes. Las malezas tratadas con HALOX 81 detienen su crecimiento y las hojas muestran, a los pocos días de la aplicación, tonalidades violáceas, amarillas y finalmente marrones. En los rizomas, destruye inicialmente las yemas, y luego el tejido se necrosa.

PRESENTACIÓN: Bidón de 5 Litros.

ACCIÓN: Sistémico.

FAMILIA QUÍMICA: Ariloxifenoxipropionato (FOP's).

MECANISMO DE ACCIÓN: Inhibidores de la acetil coenzima-A carboxilasa (AC-Casa). Grupo A.

MALEZAS: Brachiaria plantaginea, Capín, Cola de zorro, Pasto de cuaresma, Pasto Morado, Pie de gallina, Gramón, Pasto bermuda, Sorgo de Alepo no resistente (Riz/Sem), Maíz guacho tolerante a glifosato.

CULTIVOS: Algodón, Girasol, Maní, Soja, Poroto.

DOSIS: 0,055 - 0,195 L/ha.

RECOMENDACIONES DE USO: Aplicar HALOX 81 siempre con el agregado de aceite mineral o EMAG (Zinax).

En lotes de siembra y laboreo tradicional se deberá trabajar el suelo antes de la siembra para asegurar homogeneidad en la emergencia de las malezas. No escardillar antes de la aplicación del producto. En lotes bajo siembra directa, aplicar cuando las malezas alcanzan la altura recomendada.

BANDA TOXICOLÓGICA: Amarilla.



Imazapir 80 % - SP (Polvo Soluble)

Herbicida sistémico para uso pre y post emergente de las malezas. Es absorbido tanto por follaje como por raíz y es de acción residual. Utilizado en cultivos de girasol tolerante a las imidazolinonas, así como en pre plantación de pino taeda. Una vez aplicado, las malezas detienen su desarrollo, ocurriendo la muerte de las mismas de 3 a 4 semanas. KATRIN 80 ejerce un control residual en las malezas susceptibles que germinan después de su aplicación. Se logra un excelente control de las malezas cuando las condiciones de humedad son óptimas.

PRESENTACIÓN: Pack x 1 kg (10 sobres hidrosolubles de 100 g c/u) + 5 L de Zinax.

ACCIÓN: Sistémico, residual.

FAMILIA QUÍMICA: Imidazolinonas.

MECANISMO DE ACCIÓN: Inhibidor de la enzima acetolactato sintetasa (ALS). Grupo B.

MALEZAS: Abrojo chico, Abrojo grande, Albahaca silvestre, Amor seco, Apio cimarrón, Bananita, Cebadilla del campo, Cebollín, Chamico, Charrua, Chinchilla, Chufa, Cola de zorro, Enredadera anual, Enredadera perenne, Flor de San Juan, Fumo bravo, Gramilla, Horquetera, Lecherón, Malva cimarrona, Maria mola, Matacampo, Mocopavo, Ortiga gigante, Paitén, Pasto bandera, Pasto de cuaresma, Pasto jesuita, Pasto yacaré, Pata de gallina, Peludilla, Quinoa, Roseta, Sanguinaria, Setaria, Tartago, Yuquery.

CULTIVO: Girasol IMI, Pino Taeda.

DOSIS: Girasol IMI: 0,100 kg/ha (1 Pack cada 10 hectáreas).

Pino Taeda: 0,5 kg/ha (1 Pack cada 2 hectáreas).

RECOMENDACIONES DE USO: Girasol: Aplicar en post-emergencia temprana del cultivo, evitando la superposición de la aplicación. Aprovechando el poder residual del producto para combatir las malezas hasta el sombreado de surco. Pino taeda: Se debe aplicar en pre-plantación. Preparar el terreno procurando una baja cantidad de rastrojo y restos leñosos que interfieran en la aplicación; en el caso de uso de rastra, dejarlo libre de terrones y grandes desniveles, aplicar el producto con maleza emergida y dejar transcurrir entre la aplicación del producto y la plantación del cultivo un período de 15 a 30 días.

BANDA TOXICOLÓGICA: Azul.

KYLIAN[®] 48

Cletodim 48 % - EC (Concentrado Emulsionable)

Es un herbicida selectivo postemergente sistémico, para el control de gramíneas anuales y perennes. Es rápidamente absorbido y translocado desde el follaje tratado hacia el sistema de raíces y puntos de crecimiento de la planta. Su acción herbicida sobre las malezas sensibles se traduce en una rápida reducción del vigor y crecimiento, y en la posterior clorosis y necrosis de las plantas.

PRESENTACIÓN: Bidón de 10 Litros.

ACCIÓN: Sistémico.

FAMILIA QUÍMICA: Ciclohexanodionas (DIM's).

MECANISMO DE ACCIÓN: Inhibidores de la acetil coenzima-A carboxilasa (ACCase). Grupo A.

MALEZA: Capín arroz, Pasto de cuaresma, Pie de gallina, Sorgo de Alepo de semilla y de rizoma, Trigo guacho, Gramón, Pasto bermuda, Pasto puna, Maíz guacho tolerante a glifosato, Paja viscachera, Pasto salado, Pelo de chanco.

CULTIVO: Alfalfa, Algodón, Cebolla, Girasol, Maní, Papa, Poroto, Soja, Barbecho químico.

DOSIS: Alfalfa, Algodón, Girasol, Maní, Papa, Soja: 0,2 - 0,5 L/ha. Cebolla: 0,5 L/ha. Barbecho químico: 0,2 - 0,7 L/ha. Aplicar siempre con 0,5 L/ha de ZINAX.

RECOMENDACIONES DE USO: Realizar los tratamientos con buenas condiciones de humedad en el suelo y con las malezas en activo crecimiento. Evitar la superposición durante la aplicación y que la deriva afecte a cultivos adyacentes. No realizar aplicaciones con altas temperaturas, baja humedad, vientos fuertes, presencia de rocío o ante probabilidad de lluvia. Se recomienda su aplicación con ZINAX.

BANDA TOXICOLÓGICA: Azul.

LISI[®]

Quinclorac 25 % - SC (Suspensión Concentrada)

Herbicida sistémico post-emergente selectivo, con efecto residual en el cultivo de arroz, indicado especialmente para el control de *Echinochloa* (Capín), como también para malezas de hoja ancha y otras gramíneas.

PRESENTACIÓN: Bidón de 5 Litros.

ACCIÓN: Sistémico.

FAMILIA QUÍMICA: Auxinas sintéticas.

MECANISMO DE ACCIÓN: Acción similar al ácido indolacético (Auxinas sintéticas).

MALEZAS: Capín resistente ALS, Pasto Colorado, Brachiaria, Bejuco.

CULTIVO: Arroz.

DOSIS: 1,3 L/ha. Capín 1,5 L/ha.

RECOMENDACIONES DE USO: No aplicar en situaciones con humedad relativa menor al 60%, vientos mayores que 10 Km/h. No utilizar el agua procedente de arrozales tratados con LISI para regar otros cultivos. Luego de la aplicación, cerrar la salida de agua por el mayor tiempo posible (mínimo 7 días).

BANDA TOXICOLÓGICA: Azul.

**2D MABYN / MABYN®****2,4-D Alquil - Mix 78,1 % (Eq. ác. 34 %) - SL (Concentrado Soluble)**

Exclusiva formulación de 2,4-D con comprobada ultra baja volatilidad. Permite aplicar dosis con cantidades menores de ingrediente activo por hectárea comparadas con las demás sales y ésteres de 2,4-D, manteniendo la misma eficacia. Sin olor. Herbicida sistémico y de acción hormonal, para el control de malezas de hoja ancha en barbecho. Mezcla de sales alquilamidopropildimetilamonio y dietilamonio del ácido 2,4-D.

PRESENTACIÓN: Bidón de 20 Litros**ACCIÓN:** Sistémico.**FAMILIA QUÍMICA:** Ácidos fenoxicarboxílicos (Auxinas sintéticas).**MECANISMO DE ACCIÓN:** Acción similar al ácido indolacético (Auxinas sintéticas). GRUPO O.**MALEZAS:** Cerraja (*Sonchus oleraceus*), Escoba amarilla (*Flaveria bidentis*), Yuyo Colorado (*Amarantus quitensis*), Mastuerzo (*Coronopus didymus*), Bolsa de pastor (*Capsella bursa-pastoris*), Arrancamaños (*Xanthium spinosum*), Chamico (*Datura ferox*), Quínoa (*Chenopodium album*), Rama negra (*Conyza sumatrensis*).**CULTIVO:** Barbecho.**DOSIS:** Barbecho 0,9 a 1,5 L/ha.**RECOMENDACIONES DE USO:** Utilizar dosis inferiores contra malezas susceptibles, cuando sean pequeñas y en condiciones climáticas y suelo óptimas. Utilizar las dosis mayores cuando la maleza esté más desarrollada, o se trate de malezas mediana susceptibilidad.**BANDA TOXICOLÓGICA:** Amarilla.**MANIAC / MANIAC®****Imazapic 70 % - SP (Polvo Soluble)**

Es un herbicida sistémico selectivo pre- y post-emergente que es absorbido tanto por follaje como por raíz y es de acción residual. Una vez aplicado, las malezas detienen su desarrollo y no ejercen competencia con el cultivo, ocurriendo la muerte de las mismas luego de 3 o 4 semanas. MANIAC ejerce un control residual en las malezas susceptibles que germinan después de la aplicación.

PRESENTACIÓN: Caja x 1,44 kg (4 sobres de aluminio de 360 g con 5 sobres hidrosolubles de 72 g c/u).**ACCIÓN:** Sistémico, residual.**FAMILIA QUÍMICA:** Imidazolinonas**MECANISMO DE ACCIÓN:** Inhibidor de la enzima acetolactato sintetasa (ALS). Grupo B.**MALEZAS:** Cebollín, Gramón, Sorgo de Alepo (Riz/Sem), Chufa, Pasto cuarema, Verdolaga, Chamico, Malva, Quínoa.**CULTIVO:** Maní, Caña de Azúcar.**DOSIS:** Maní: 0.07 - 0,08 kg/ha. Caña de Azúcar: 0,5 kg/ha.**RECOMENDACIONES DE USO:** Las dosis menores deben aplicarse en pre-emergencia del cultivo y las malezas. En caso que algunas malezas ya estén emergidas, no deben superar el estado de desarrollo de dos hojas. Para aplicaciones post-emergencia temprana emplear la dosis mayor indicada, especialmente si en el lote hay alta infestación. No aplicar en casos de falta de humedad prolongada y cuando las malezas presentan síntomas de marchitez. En todos los casos se debe agregar coadyuvante para la aplicación.**BANDA TOXICOLÓGICA:** Azul.

MARCH II / MARCH II®

Glifosato 66,2 % (54 % eq. ácido) - SL (Concentrado Soluble)

Herbicida para pre- y post-emergencia de cultivos RG. Herbicida no selectivo de control total, que controla gramíneas, ciperáceas y malezas de hoja ancha no resistentes. Los efectos sobre las malezas se observan después de 4-5 días de aplicado. Se inactiva rápidamente en contacto con el suelo, por lo tanto no deja residuos y se puede sembrar después de su aplicación.

PRESENTACIÓN: Bidón de 20 Litros.

ACCIÓN: Sistémico.

FAMILIA QUÍMICA: Glicinas.

MECANISMO DE ACCIÓN: Inhibidores de la enzima 5-enolpiruvilshikimato-3-fosfato sintetasa (EPSPS). Grupo G.

MALEZAS: GRAMÍNEAS: Capín/Pasto cañada, Capín, Cebadilla criolla, Cola de zorro, Pasto cuaresma, Sorgo de Alepo, Gramón, Cebollín, Cípero, Camalote, Yuyo sapo/Sunchillo. LATIFOLIADAS: Yuyo colorado, Quinoa, Enredadera anual, Ciennudos, Sanguinaria, Chamico, Amor seco, Chaetilla.

CULTIVOS: Alambrados, áreas no cultivadas, Barbecho químico, Vías férreas, Cítricos o Citrus, Frutales de pepita, Vid, Girasol, Maíz, Soja, Pasturas, Pinos, Trigo, Yerba mate, Té.

DOSIS: 1,6 - 2,9 L/ha para malezas anuales. 1,7 - 4,0 L/ha para malezas perennes.

RECOMENDACIONES DE USO: Aplicarse cuando las malezas se encuentran en activo crecimiento, con una altura menor a 15 cm, evitando aplicaciones sobre malezas cubiertas de tierra. No pulverizar si se prevén lluvias durante las 6 horas posteriores a la aplicación o cuando el follaje de las malezas esté mojado.

BANDA TOXICOLÓGICA: Azul.

MARCH MAX / MARCH MAX®

Glifosato 75,7 % (68,8 % eq. ácido) - SG (Gránulos solubles)

Es un herbicida no selectivo para el control postemergente de las malezas anuales y perennes. De acción sistemática, es absorbido por hojas y tallos verdes, siendo traslocado hacia las raíces y órganos vegetativos subterráneos, ocasionando la muerte total de las malezas emergidas.

PRESENTACIÓN: Bolsas de polietileno de 15 kg.

ACCIÓN: Sistémico.

FAMILIA QUÍMICA: Glicinas.

MECANISMO DE ACCIÓN: Inhibidores de la enzima 5-enolpiruvilshikimato-3-fosfato sintetasa (EPSPS) Grupo G.

MALEZAS: Capín/Pasto cañada, Capín, Cebadilla criolla, Cola de zorro, Pasto cuaresma, Yuyo Colorado, Quinoa, Enredadera anual, Sanguinaria, Chamico, Amor seco, Sorgo de Alepo, Gramón, Cebollín, Cípero/junquillo, Camalote, Pasto de guinea, Yuyo sapo.

CULTIVO: Soja RG, Maíz RG, Alfalfa RG, Algodón RG

DOSIS: Gramíneas anuales de 1 a 1,5 kg/ha. Gramíneas Perennes de 1,25 - 3 kg/ha. Latifoliadas anuales de 1,25 - 2,05 kg/ha.

RECOMENDACIONES DE USO: Aplicar cuando las malezas se encuentran en activo crecimiento, con altura menor a 15 cm, evitando aplicaciones sobre malezas cubiertas de tierra. No pulverizar si se prevén lluvias durante las 6 horas posteriores a la aplicación, o cuando el follaje de las malezas esté mojado.

BANDA TOXICOLÓGICA: Verde

**MILLION / MILLION®****Lactofen 24 % - EC (Concentrado Emulsionable)**

Es un herbicida post-emergente de contacto, selectivo para cultivos de soja y maní, que controla malezas latifoliadas. Cuando es absorbido por las partes verdes de las malezas se activa por la luz, destruyendo la membrana celular, lo que produce una necrosis de los tejidos vegetales.

PRESENTACIÓN: Bidón de 10 Litros.

ACCIÓN: Contacto.

FAMILIA QUÍMICA: Difenileteres.

MECANISMO DE ACCIÓN: Inhibidor de la enzima protoporfirinógeno oxidasa (PPO). Grupo E.

MALEZAS: Chamico, Chinchilla, Flor de Santa Lucía, Malva Cimarrona, Nabo, Yuyo Colorado, Verdolaga, Albahaca silvestre, Alkekenje, Farolito, Yuyo colorado resistente a ALS.

CULTIVOS: Maní, Soja.

DOSIS: Maní: 0,250 - 0,350 L/ha. Soja: 0,25 - 0,35 L/ha (0,6 L/ha para yuyo colorado dependiendo del tamaño).

RECOMENDACIONES DE USO: Aplicar una vez que todas las malezas hayan emergido, cuando las mismas sean jóvenes y en activo crecimiento. Para control de Yuyo Colorado en soja consultar por mezcla con DASEN.

El cultivo de maní debe presentar al menos 5 hojas verdaderas. El cultivo de soja debe presentar 2 a 3 hojas trifoliadas.

BANDA TOXICOLÓGICA: Verde.

S MILLION / S-MILLION®**S-LACTOFEN 36 % - EC (Concentrado Emulsionable)**

Herbicida post emergente de contacto y selectivo para SOJA y MANÍ, para el control de malezas difíciles latifoliadas, como Yuyo colorado. Innovadora formulación con 100 % isómero S, otorgando mayor actividad biológica, permitiendo reducir la dosis final al 50 % respecto a lactofen 24% y asegurando selectividad en el cultivo. La excelente calidad de formulación mejora la compatibilidad de la mezcla de tanque. El producto cuando se incorpora en agua forma una microemulsión que aumenta la biodisponibilidad del ingrediente activo, asegura una buena distribución en el caldo y garantiza una aplicación uniforme. Formulación sustentable, donde aplicamos principios de "Green Chemistry" (Química Verde)

PRESENTACIÓN: Bidón de 5 Litros.

ACCIÓN: Contacto.

FAMILIA QUÍMICA: Difenileteres.

MECANISMO DE ACCIÓN: Inhibidor de la enzima protoporfirinógeno oxidasa (PPO). Grupo E.

MALEZAS: Chamico, Malva cimarrona, Nabo, Yuyo colorado, Albahaca silvestre, Alkekenje, Farolito, Verdolaga, Chinchilla.

CULTIVOS: Maní, Soja.

DOSIS: Maní: 0,175 L/ha. Soja: 0,24 - 0,3 L/ha.

RECOMENDACIONES DE USO: Aplicar una vez que todas las malezas hayan emergido, cuando las mismas sean jóvenes y en activo crecimiento. Para control de Yuyo Colorado en soja consultar por mezcla con DASEN.

El cultivo de maní debe presentar al menos 5 hojas verdaderas. El cultivo de soja debe presentar 2 a 3 hojas trifoliadas.

BANDA TOXICOLÓGICA: Azul.

MORRIGAN / MORRIGAN®**Diclosulam 84 % - WP (Polvo Mojable)**

Es un herbicida selectivo para el control de las malezas de hoja ancha, que compiten con los cultivos de soja y maní. Es activo en pre-siembra, pre-emergencia y post-emergencia del cultivo. Para lograr controles eficientes deben producirse lluvias después de la aplicación, independientemente de la humedad del suelo.

PRESENTACIÓN: Caja x 5 kg. (10 sobres de aluminio con 5 sobres hidrosolubles de 100 g c/u).

ACCIÓN: Sistémico, residual.

FAMILIA QUÍMICA: Triazopirimidinas.

MECANISMO DE ACCIÓN: Inhibidor de la enzima acetolactato sintetasa (ALS). Grupo B.

MALEZAS: Abrojos, Bejuco, Campanilla, Capín, Chamico, Chinchilla, Cola de zorro, Ipomea, Malva, Pasto cuaresma, Pie de gallina, Quinoa, Rama negra, Saetilla o Amor seco, Verdolaga, Yuyo colorado.

CULTIVOS: Maní, Soja.

DOSIS: Soja: Pre siembra 0.03 kg/ha y post emergencia 0,016 kg/ha.

Maní: Pre siembra 0,024 kg/ha y post emergencia 0,015 kg/ha.

RECOMENDACIONES DE USO: En soja puede aplicarse en pre siembra, pre emergencia o en post emergencia. Siempre con malezas en activo crecimiento. En labranzas convencionales, aplicar MORRIGAN solo, a la dosis recomendada. En esquemas de siembra directa, es posible aplicar MORRIGAN + Glifosato como tratamiento de quemado desde 20 días antes, hasta la siembra. Para suelos sueltos con menos de 2 % de MO, aplicar MORRIGAN a una dosis de 0,024 kg/ha, ya que en los mismos el herbicida se encuentra más disponible que en suelos pesados. En Maní, aplicar inmediatamente después de la siembra y antes de la emergencia del cultivo, sobre suelo preparado y libre de malezas. Las lluvias posteriores a la aplicación incorporarán el producto y éste controlará a las malezas antes de su emergencia.

BANDA TOXICOLÓGICA: Verde.

MULAN / MULAN®**Flumetsulam 12 % - SC (Suspensión Concentrada)**

Herbicida residual y selectivo para el control de malezas de hoja ancha. Absorción foliar y radical, con rápida translocación vía xilema y floema, acumulándose en las regiones meristemáticas, por lo que las malezas detienen rápidamente su crecimiento.

PRESENTACIÓN: Bidón de 5 Litros.

ACCIÓN: Sistémico, residual.

FAMILIA QUÍMICA: Triazolopirimidinas.

MECANISMO DE ACCIÓN: Inhibidor de la enzima acetolactato sintetasa (ALS). Grupo B.

MALEZAS: Albahaca silvestre, Anagallis, Bolsa de pastor, Capiquí, Cardo negro, Cardo pendiente, Cardo ruso, Chinchilla, Enredadera anual, Flor morada, Girasol guacho, Lengua de vaca, Manzanilla cimarrona, Mastuerzo, Mostacilla, Nabo, Nabón, Ortiga mansa, Quinoa, Roseta, Sanguinaria, Verdolaga, Tupulo, Vznaga, Yuyo colorado.

CULTIVOS: Pasturas consociadas, Soja, Poroto, Maíz de germoplasma templado, Caña de azúcar.

DOSIS: Pasturas: Pre emergente: 0,4 - 0,6 L/ha. Post emergente: 0,2 - 0,24 L/ha.

RECOMENDACIONES DE USO: El suelo debe presentar condiciones adecuadas de humedad. La maleza tiene que estar en activo crecimiento. Pre-emergencia: Aplicar después de la siembra y antes de la emergencia de la pastura. Post-emergencia: Aplicar con malezas pequeñas (de cotiledón hasta 6 hojas o rosetas de 10 cm de diámetro) y a partir de que las leguminosas tengan 2-3 trifolios. Todas las aplicaciones deben ser hechas con el agregado de un adyuvante no iónico.

BANDA TOXICOLÓGICA: Azul.

**m48MULAN / MULAN® 48****Flumetsulam 48 % - SC (Suspensión Concentrada)**

Herbicida residual y selectivo para el control de malezas de hoja ancha. Puede ser aplicado al suelo en: pre-siembra anticipada, pre-siembra incorporado y pre-emergencia. En el caso de los tratamientos post-emergentes, la maleza tiene que estar en activo crecimiento. Para lograr un control óptimo en tratamientos de suelo, este debe presentar un nivel adecuado de humedad que permita la germinación de las malezas y la absorción del herbicida. Las malezas detienen rápidamente el crecimiento, dado que trabaja en las zonas meristemáticas. Es de absorción foliar y radical y es rápidamente transportado vía xilema y floema, acumulándose en las regiones meristemáticas.

PRESENTACIÓN: Bidón de 5 Litros.**ACCIÓN:** Sistémico, residual.**FAMILIA QUÍMICA:** Triazolopirimidinas.**MECANISMO DE ACCIÓN:** Inhibidor de la enzima acetolactato sintetasa (ALS). Grupo B.**MALEZAS:** Albahaca silvestre, Anagallis, Bolsa de pastor, Capiquí, Cardo negro, Cardo pendiente, Cardo ruso, Chinchilla, Enredadera anual, Flor morada, Girasol guacho, Lengua de vaca, Manzanilla cimarrona, Mastuerzo, Mostacilla, Nabón, Ortiga mansa, Quinoa, Roseta, Sanguinaria, Verdolaga, Vznaga, Yuyo colorado.**CULTIVOS:** Pasturas consociadas, Soja, Poroto, Maíz de germoplasma templado, Caña de azúcar.**DOSIS:** Pastura: Pre emergente: 0,1 - 0,15 L/ha y en Post emergente: 0,05 - 0,06 L/ha. Caña de azúcar: 0,250 - 0,35 L/ha. Soja: Pre siembra: 0,25 L/ha. Poroto: Pre emergente: 0,075 - 0,1 L/ha. Maíz: Pre emergente: 0,25 L/ha. Caña de azúcar: 0,25-0,35 L/ha.**RECOMENDACIONES DE USO:** El suelo debe presentar condiciones adecuadas de humedad. La maleza tiene que estar en activo crecimiento. Pre-emergencia: Aplicar después de la siembra y antes de la emergencia de la pastura. Post-emergencia: Aplicar con malezas pequeñas (de cotiledón hasta 6 hojas o rosetas de 10 cm de diámetro) y a partir de que las leguminosas tengan 2-3 trifolios. Todas las aplicaciones deben ser hechas con el agregado de un adyuvante no iónico.**BANDA TOXICOLÓGICA:** Verde.**PARAQUAT^{27,6} / PARAQUAT® 27,6 Agrofina****Paraquat Dicloruro 27,6 % - SL (Concentrado Soluble)**

Es un herbicida desecante que actúa en todos los tejidos vegetales verdes. Necesita de la fotosíntesis activa para manifestar su efecto herbicida, que se caracteriza por el colapso de la estructura celular y la desecación. En condiciones cálidas y soleadas, (alta velocidad de la fotosíntesis), la actividad herbicida se desarrolla rápidamente en unas pocas horas. En condiciones nubladas o hacia el fin del día, (fotosíntesis menos rápida), la acción se hace más lenta pero más efectiva, ya que el producto se transloca mejor en la planta.

PRESENTACIÓN: Bidón de 20 Litros.**ACCIÓN:** Contacto. No selectivo.**FAMILIA QUÍMICA:** Bipiridilos.**MECANISMOS DE ACCIÓN:** Inhibidores del fotosistema I. Grupo D.**CULTIVOS:** Acequias, Alambrados, Caminos, Alfalfa, Algodón, Alpiste, Arveja, Lenteja, Poroto, Banana o plátano, Cítricos o citrus, Forestales, Frutales de ca-rozo, Cereza, Ciruela, Damasco, Durazno, Frutales de pepita: Manzana, Membri-llo, Pera, Olivo, Té, Vid, Yerba mate, Barbecho químico, Caña de azúcar, Cultivos en línea (cereales, oleaginosas, viveros hortícola y ornamentales), Girasol. Hortalizas (Tomate, pimiento, puerro, cebolla, hinojo, perejil, bulbos y tubérculos), Maíz, Papa, Pasturas, Pasturas de leguminosas, Siembra directa: Soja, Sorgo, Trigo y Tung.**MALEZAS:** Control total.**DOSIS:** 1 - 4 L/ha según cultivos y momentos de aplicación.**RECOMENDACIONES DE USO:** Utilizar las dosis mayores cuando las malezas o el cultivo a desecar tengan abundante follaje o como primer tratamiento. Usar la dosis baja como segundo tratamiento o para tratar rebrotes. Es conveniente aplicar cuando las malezas son pequeñas y tienen una altura menor a 10 cm.**BANDA TOXICOLÓGICA:** Amarilla.

SULFENAX SO / SULFENAX® 50

Sulfentrazone 50 % - SC (Suspensión Concentrada)

Es un herbicida pre-siembra del cultivo y las malezas, selectivo para girasol, maní y soja. Pertenece al grupo de las “aril triazolinonas”. Se absorbe por las raíces de las plantas tratadas, controlando a las malezas mediante el proceso de “disrupción” de membrana, que se inicia por la Inhibición de la enzima protoporfirinogeno oxidasa (PPO), lo que interfiere en la biosíntesis de la clorofila, y genera la formación de intermediarios tóxicos. Las plantas que emergen del suelo tratado se tornan necróticas y mueren al poco tiempo de estar expuestas a la luz.

PRESENTACIÓN: Bidón de 5 litros.

ACCIÓN: Sistémica y residual.

FAMILIA QUÍMICA: Aril triazolinona.

MECANISMO DE ACCIÓN: Inhibidor de la enzima protoporfirinogeno oxidasa (PPO). Grupo E.

MALEZAS: Bowlesia, Cien nudos, Malva cimarrona, Peludilla, Quinoa blanca, Senecio, Verdolaga, Yuyo colorado, Químoa, Cardo Ruso,

CULTIVO: Soja, Girasol, Maní.

DOSIS: 0,25 - 0,4 L/ha.

RECOMENDACIONES DE USO: Las dosis están directamente relacionadas con las características de los lotes en que se utilizará el producto. Por ello se debe tener especialmente en cuenta el tipo de suelo, textura, contenido de materia orgánica, pH, relieve, etc. Usar dosis mayores en suelos de pH menores a 7.

BANDA TOXICOLÓGICA: Azul.

TALIS / TALIS®

Flurocloridona 25 % - EC (Concentrado Emulsionable)

Herbicida residual selectivo pre y post-emergente temprano que controla un amplio espectro de malezas, especialmente las de hoja ancha. Por su acción sistémica penetra por cotiledones, hojas jóvenes, y raíces y se transloca acropetalmente hacia hojas y tallos provocando la muerte de las malezas. El periodo de control de maleza se extiende por más de 90 días en distintos tipos de suelo sin afectar a los cultivos que siguen en la rotación. Se activa con escasa humedad en suelo, no se lava por lluvias.

PRESENTACIÓN: Bidón de 20 Litros.

ACCIÓN: Sistémico, residual.

FAMILIA QUÍMICA: Piridincarboximidas.

MECANISMOS DE ACCIÓN: Inhibidores de la enzima fitoeno desaturasa. Grupo F1.

MALEZAS: Abrojo grande, Albahaca silvestre, Bejuco, Bolsa del pastor, Capín arroz, Capiquí, Cardo, Chamico, Chinchilla, Cola de zorro, Enredadera anual, Malva cimarrona, Manzanilla, Mastuerzo, Mostacilla, Nabo, Nabón, Ortiga, Ortiga mansa, Pasto blanco, Pasto de cuaresma, Quinoa blanca, Rábano, Sanguinaria, Sorgo de Alepo de semilla, Verdolaga, Verdolaga rastrera, Verónica, Viola silvestre, Yuyo colorado.

CULTIVO: Girasol, Avena, Cebada, Centeno, Lenteja, Perejil, Zanahoria, Caña de azúcar, Papa, Algodón, Maíz, Trigo.

DOSIS: Avena, Cebada, Centeno, Lenteja, Perejil, Zanahoria, Girasol, Papa, Algodón y Maíz: 2 - 4 L/ha. 4 - 5,5 L/ha. Trigo: 0,3 - 0,5 L/ha.

RECOMENDACIONES DE USO: Avena, Cebada, Centeno, Lenteja, Perejil, Zanahoria aplicar inmediatamente luego de la siembra o plantación hasta 3 días luego de la misma, y previo a la emergencia de las malezas. Caña de Azúcar, Girasol, Papa, Algodón, Maíz, aplicar en pre emergencia en mezcla con Acetoclor 90%. Aplicar inmediatamente luego de la siembra o plantación hasta 3 días luego de la misma, y previo a la emergencia de las malezas. Trigo aplicar en post emergencia desde 3 hojas a macollaje y cuando las malezas se encuentren con 2 a 4 hojas.

BANDA TOXICOLÓGICA: Azul.

**TG TOP GROUND / TOP GROUND®****Imazapir 17,5 % + Imazapic 52,5 % - SP (Polvo Soluble)**

Es un herbicida con una elevada acción residual, más de 90 días, para aplicaciones pre-emergentes y post-emergentes tempranas de MAÍZ y SORGO IMI (tolerantes a imidazolinonas), aplicaciones en BARBECHOS LARGOS EN SOJA y aplicaciones pre emergentes en CAÑA DE AZÚCAR. TOP GROUND es un herbicida con acción de contacto, sistémico y residual. Estas características le permiten controlar malezas en pre-emergencia como en post-emergencia garantizando un período de control prolongado y sin competencia.

PRESENTACIÓN: Pack x 2,28 kg (4 sobres de aluminio con 5 sobres hidrosolubles de 114 g c/u) + 10 L Zinax.

ACCIÓN: Sistémico, residual.

FAMILIA QUÍMICA: Imidazolinonas.

MECANISMO DE ACCIÓN: Inhibidor de la enzima acetolactato sintetasa (ALS). Grupo B.

MALEZAS: Abrojo grande, Capín arroz, Cebollín, Chamico, Chinchilla, Chufa, Cola de zorro, Farolito, Girasolillo, Gramón, Malva cimarrona, Nabo, Pata de gallina, Pasto de cuaresma, Quinoa, Sorgo de Alepo (RIZ/SEM), Verdolaga, Yerba del pollo, Yuyo colorado, Rye grass.

CULTIVO: Barbecho largo a Soja, Caña de azúcar, Maíz y Sorgo IMI.

DOSIS: Soja: hasta 120 días antes de la siembra: 150 g/ha (1 pack cada 15 has). Hasta 90 días antes de la siembra: 114 g/ha (1 pack cada 20 has).

Caña de azúcar: Suelos livianos: 200 g/ha. Suelos pesados: 250 g/ha.

Maíz y sorgo IMI: 114 g/ha (1 Pack cada 20 ha)

RECOMENDACIONES DE USO: TOP GROUND debe ser activado por una pequeña cantidad de humedad del suelo después de la aplicación. Lluvias posteriores de 15-20 mm asegurarán la incorporación de los herbicidas a la matriz del suelo, garantizando su efectividad. En suelos con menos de 5% de materia orgánica y lluvias torrenciales en un corto periodo de tiempo, el producto puede estar expuesto a lixiviación disminuyendo su capacidad de control.

Soja (barbecho): Aplicar la dosis menor 90 días previo a la siembra y la dosis mayor 120 días previo a la siembra (comenzando a contar los días luego de la primera precipitación de 20 mm post aplicación). Caña de azúcar: Aplicar en pre emergencia del cultivo o antes de que brote la soca. Se puede aplicar en pre emergencia o post emergencia temprana de malezas. Para alcanzar la máxima actividad del producto, es preferible que las malezas se encuentren emergidas, que no superen las 4 hojas verdaderas y estén en un período de activo crecimiento.

Maíz (IMI): Debe presentar un estado de desarrollo superior a 6ta hoja desplegada con lígula visible. No aplicar en casos de falta de humedad prolongada y cuando la maleza presenta síntomas de marchitez.

Sorgo IMI: Sorgo Forrajero: Una aplicación en pre emergencia del cultivo. Sorgo Granífero: una aplicación entre la siembra y hasta 4 hojas verdaderas del cultivo.

BANDA TOXICOLOGICA: Azul.

TOP RICE / TOP RICE®

Imazapic 17,5 % + Imazapir 52,5 % - SP (Polvo Soluble)

TOP RICE es un herbicida con acción residual, para aplicación secuencial en pre-emergencia y post-emergencia temprana del cultivo de arroz tolerante a las imidazolinonas. El producto está recomendado para malezas susceptibles, gramíneas, ciperáceas y latifoliadas, tanto anuales como perennes. Debido a su actividad residual, controla malezas que nacen después de la aplicación, una vez que ha sido incorporado al suelo por precipitaciones adecuadas. Su acción herbicida, se complementa con la inundación temprana del cultivo.

PRESENTACIÓN: Pack x 2,8 kg (4 Sobres de aluminio con 5 sobres x 140 g c/u) + 1 Bidón de Zinax de 10 Litros.

FAMILIA QUÍMICA: Imidazolinonas

MECANISMO DE ACCIÓN: Inhibidor de la enzima acetolactato sintetasa (ALS). Grupo B.

MALEZAS: LATIFOLIADAS: Lagunilla, Porotillo, Duraznillo de agua, Verdolaga, Eclipta, Pata de loro, Eichornia. GRAMÍNEAS: Arroz colorado, Arroz guacho, Capín colorado, Capín arroz, Chacrilla, Pasto brachiaria, Pasto colchón, Cola de zorro, Pasto cuaresma, Pasto dulce, Gramón, Pastos de agua, Pasto moro. CIPERÁCEAS: Chufa, Junquillo, Totorilla.

CULTIVO: Arroz IMI.

DOSIS: Pre-emergencia: 0,140 kg/ha + Zinax. Post-emergencia: 0,140 kg/ha + Zinax.

RECOMENDACIONES DE USO: El producto debe ser aplicado en forma secuencial. Para la 1^{er} aplicación, en pre-emergencia, es necesario disponer de buena humedad en el suelo siendo favorecida la incorporación del producto al suelo por las lluvias posteriores a la aplicación. Por su acción residual, controla malezas que aún no han emergido, siempre y cuando las condiciones de humedad en el suelo sean las adecuadas. La 2^{da} aplicación, en post-emergencia temprana, se debe realizar con la adición de coadyuvante Zinax para mejorar la absorción foliar del producto. De 2 a 4 días luego de la aplicación post-emergente, se complementa la acción del producto con la inundación del cultivo. No aplicar en casos de falta de humedad prolongada y cuando las malezas o el cultivo de arroz presentan síntomas de marchitez.

BANDA TOXICOLÓGICA: Azul.

VEROSIL / VEROSIL® 40

Imazetapir 44,1 % (Eq. ác. 40 %) - SL (Concentrado Soluble).

Es un herbicida sistémico selectivo de acción residual, en aplicaciones post-emergentes es absorbido tanto por follaje como por raíz y es de acción residual. También tiene aplicación como herbicida selectivo pre-emergente en cultivo de Poroto. Ejerce un control residual en las malezas que germinan después de la aplicación. Para obtener un óptimo control, las condiciones de humedad deben ser tales que favorezcan un activo crecimiento de las malezas.

PRESENTACIÓN: Bidón de 10 Litros.

ACCIÓN: Sistémico, residual.

FAMILIA QUÍMICA: Imidazolinonas

MECANISMO DE ACCIÓN: Inhibidor de la enzima acetolactato sintetasa (ALS). Grupo B

MALEZAS: Abrojo, Abrojo grande, Afata, Amor seco, Bejuco, Bolsa de pastor, Capín, Capiquí, Cebada cerveza, Cebollín, Chamico, Chinchilla, Enredadera anual, Falsa biznaga, Farolito, Girasolillo, Lengua de vaca, Malva, Mastuerzo, Mostacilla, Nabo, Nabón, Ortiga, Ortiga mansa, Pasto colorado, Pasto cuaresma, Pasto puna, Perejilillo, Quinoa, Revienta caballo, Sanguinaria, Sorgo de Alepo (Riz/Sem), Trigo, Verdolaga, Yuyo colorado.

CULTIVOS: Alfalfa, Arveja, Maíz IMI, Maní, Poroto, Soja.

DOSIS: 0,25 L/ha.

RECOMENDACIÓN DE USO: Iniciar el control de las malezas desde su emergencia hasta la 4^{ta} hoja verdadera de ellas. En casos de alta infestación en el cultivo se consigue un control óptimo aplicando antes de la 2^{da} hoja verdadera de las malezas.

BANDA TOXICOLÓGICA: Verde.





INSECTICIDAS



Dinotefuran 70 % - SP-SB (Polvo Soluble en sobres hidrosolubles sellados)

Es un insecticida compuesto por dinotefuran, neonicotinoide de 3^{ra} generación con menor impacto ambiental del mercado. Presenta una acción rápida de volteo y prolongada persistencia, recomendado para el control de insectos succionadores. Su alta solubilidad le otorga una acción sistémica y translaminar, protegiendo al cultivo en forma integral, actuando por contacto e ingestión.

PRESENTACIÓN: Bolsas hidrosolubles selladas en caja x 5,1 kg.

VÍA DE INGRESO: Ingestión, sistémico y contacto.

FAMILIA QUÍMICA: Neonicotinoide de 3^a generación.

MECANISMO DE ACCIÓN: Modulador competitivo de receptores de acetilcolina nicotínicos.

PLAGAS: Chinche verde, Chinche de la alfalfa, Chinche de los cuernos, Alquiche chico, Trips, Chinche del tallo, Chinche horcias, Mosca minadora de la hoja,

CULTIVOS: Soja, arroz, algodón, papa.

DOSIS: 0,085 - 0,1 Kg/ha

RECOMENDACIÓN DE USO: Evitar aplicar en condiciones ambientales desfavorables (temperatura mayor a 40°C, HR menor a 40 %, viento mayor a 15 km/h).

BANDA TOXICOLÓGICA: Verde



Acetamiprid 2 % + Lambdacialotrina 2 % - OD (Dispersión Oleosa)

Es un insecticida que combina 2 ingredientes activos que aseguran una fuerte acción de contacto y una prolongada actividad residual para un amplio espectro de plagas en el cultivo de soja. Controla los organismos por ingestión y contacto. Posee alto poder de volteo y propiedades repelentes. Se presenta en una exclusiva formulación OD (Dispersión Oleosa) por lo cual no hace falta agregarle aceite para su uso, logrando una eficaz, rápida y segura acción del producto.

PRESENTACIÓN: Bidón de 10 Litros.

VÍA DE INGRESO: Contacto e ingestión.

FAMILIA QUÍMICA: Neonicotenoide (Acetamiprid) y Piretroide (Lambdacialotrina).

MECANISMO DE ACCIÓN: Acetamiprid: Agonista, antagonistas de los receptores de la acetilcolina/Interrumpe la transmisión nerviosa. Grupo 4.

Lambdacialotrina: Moduladores del canal de Sodio/Interfiere sobre el sistema nervioso central y periférico. Grupo 3.

PLAGAS: Alquiche chico, Picudo Negro de la Vaina, Picudo Grande de la Soja, Chinche verde, Chinche de la alfalfa, Oruga de las leguminosas, Oruga o isoca medidora, Trips, Tucuras, Arañuela roja común.

CULTIVOS: Soja.

DOSIS: 1 L/ha. No requiere agregado de aceite.

RECOMENDACIÓN DE USO: No es necesario el agregado de coadyuvantes, debido a que es una formulación lista para usar. Respetar las recomendaciones de uso (dosis y momento de aplicación) detalladas en el marbete. Antes de utilizar en mezcla con otros productos, se debe realizar una prueba a pequeña escala para evaluar la compatibilidad física.

BANDA TOXICOLÓGICA: Amarilla.



Flubendiamide 48 % - SC (Suspensión Concentrada)

Insecticida de primera línea tecnológica perteneciente a la clase química diamidas, recomendado para el control de las orugas más difíciles en una amplia gama de cultivos, selectivo en fauna benéfica y perfil favorable para el comercio de alimentos. Única flubendiamide banda verde.

PRESENTACIÓN: Bidón de 1 Litro.

VÍA DE INGRESO: Ingestión. Acción muscular y nerviosa. Produce un desbalance a nivel de fibras musculares, de forma inminente la larva deja de alimentarse y se paraliza. Controla incluso orugas mayores de 1,5 cm.

FAMILIA QUÍMICA: Diamidas.

MECANISMO DE ACCIÓN: Moduladores de receptores de ryanodine.

PLAGAS: Oruga medidora, Oruga de las leguminosas, Falsa medidora, Oruga bollera, Oruga de la hoja, Gusano cortador, Isoca de la espiga, Polilla del Tomate, Gusano de la pera y la manzana, Carpocapsa, Bicho canasto, Oruguita enrulada, Cogollero del maíz, Isoca de las coles, Isoca medidora, Oruga Cortadora Oruga militar tardía, Palomita transparente del zapallo, Gusano del brote del duraznero.

CULTIVOS: Soja, poroto, maíz, maíz dulce, algodón, tabaco, tomate, pera y manzano, brócoli, coliflor, lechuga, melón, sandía, zapallo, duraznero, ciruelo.

DOSIS: 0,2 - 0,1 L/ha dependiendo de cultivo y plaga (ver marbete).

RECOMENDACIONES DE USO: Aplicar según umbrales de daño económico (UDE) con el agregado de 0,5 L/ha de Zinax (EMAG). Lea atentamente el marbete antes de uso.

BANDA TOXICOLÓGICA: Verde.



Abamectina 0,18 % + Lufenuron 1,5 % + Bifentrin 1,8 %
EC (Concentrado Emulsionable)

Es una triple mezcla de insecticidas para el cultivo de soja, compuesta por abamectina, lufenuron y bifentrin, con gran poder de volteo y prolongado efecto residual. Está recomendado para el control de orugas defoliadoras. La presencia de abamectina refuerza la acción contra plagas de difícil control como arañas y trips.

PRESENTACIÓN: Bidón de 10 Litros.

VÍA DE INGRESO: Contacto e ingestión.

FAMILIA QUÍMICA: Benzoinureas (Lufenuron), Piretroides (Bifentrin) y Avermectina (Abamectina).

MECANISMO DE ACCIÓN: Lufenuron: Inhibidores de la biosíntesis de Quitina/Regulador de crecimiento. Grupo 15.

Bifentrin: Moduladores del canal de Sodio/Interfiere sobre el sistema nervioso central y periférico. Grupo 3.

Abamectina: Activadores del canal de cloruros/Interfiere sobre receptores nerviosos de GABA. Grupo 6.

PLAGAS: Oruga de las leguminosas, Isoca medidora, Trips y Arañuela roja común.

CULTIVOS: Soja.

DOSIS: 1 L/ha. No requiere agregado de aceite.

RECOMENDACIONES DE USO: No es necesario el agregado de coadyuvantes, debido a que es una formulación lista para usar. Respetar las recomendaciones de uso (dosis y momento de aplicación) detalladas en el marbete.

BANDA TOXICOLÓGICA: Amarilla.

**KIER III / KIER III PLUS®**

Abamectina 0,9 % + Lufenuron 7,5 % + Bifentrín 9 %
EC (Concentrado Emulsionable)

Triple mezcla compuesta por abamectina, lufenuron y bifentrin, con gran poder de volteo y prolongado efecto residual. Recomendado para el control de orugas defoliadoras y otras plagas de difícil control como arañuelas y trips. Formulación 5 veces más concentrada, cuyos componentes, junto con el agregado de Zinax, optimizan la actividad biológica de los ingredientes activos. La concentración permite reducir la utilización de bidones plásticos y los consumos asociados al transporte. Con enfoque en la sustentabilidad de las formulaciones, se garantiza entonces el control efectivo de las plagas reduciendo el consumo de recursos utilizados.

PRESENTACIÓN: Bidón de 5 Litros.

VÍA DE INGRESO: Contacto e ingestión.

FAMILIA QUÍMICA: Benzoilureas (Lufenuron), Piretroides (Bifentrin) y Avermectina (Abamectina).

MECANISMO DE ACCIÓN: Bifentrin: Actúa a nivel de los canales de sodio (Grupo 15).

Lufenuron: Inhibidor de la síntesis de quitina (IGR) (Grupo 3A).

Abamectina: Actúa modulando los canales de cloro (Grupo 6).

PLAGAS: Oruga de las leguminosas, Isoca medidora, Trips y Arañuela roja común.

CULTIVOS: Soja.

DOSIS: 0,2 L/ha + 0,5 L/ha Zinax (EMAG).

RECOMENDACIONES DE USO: Aplicar siempre con el agregado de 0,5 L/ha Zinax (EMAG). Respetar las recomendaciones de uso (dosis y momento de aplicación) detalladas en el marbete.

BANDA TOXICOLÓGICA: Amarilla.

TIEMBLA / TIEMBLA®

Tiametoxam 14,1% + Lambdacialotrina 10,6 % - SC (Suspensión Concentrada)

Es un insecticida foliar de amplio espectro, integrado por dos principios activos que poseen características complementarias. El tiametoxam, es un neonicotinoide sistémico de alta residualidad, que controla insectos succionadores, mientras la lambdacialotrina es un piretroide que actúa sobre insectos succionadores y masticadores, otorgando poder de volteo. De esta manera, se caracteriza por su buen poder de volteo y persistencia de control.

PRESENTACIÓN: Bidón de 5 Litros

VÍA DE INGRESO: Contacto e ingestión.

FAMILIA QUÍMICA: Neonicotenoide (Tiametoxam) y Piretroide (Lambdacialotrina).

MECANISMO DE ACCIÓN: Tiametoxam: Agonista, antagonistas de los receptores de la acetilcolina/Interrumpe la transmisión nerviosa. Grupo 4.

Lambdacialotrina: Moduladores del canal de Sodio/Interfiere sobre el sistema nervioso central y periférico. Grupo 3.

PLAGAS: Pulgón del algodónero, Pulgón azul, Pulgón negro, Pulgón de las leguminosas, Pulgón verde de los cereales, Pulgón de la espiga, Trips, Trips de los invernáculos, Oruga capullera, Mosca blanca, Mosca blanca de los invernáculos, Chinche tintórea, Picudo del Algodonero, Picudo negro de la vaina, Tucuras, Chinche verde, Chinche de la alfalfa, Alquiche chico, Oruga de la hoja y Oruga medidora.

CULTIVOS: Algodón, Cebolla, Durazno, Papa, Pasturas a base de Alfalfa, Soja, Tomate y Trigo.

DOSIS: Algodón, Cebolla, Papa: 0,2 L/ha. Pasturas a base de alfalfa: 0,075 - 0,2 L/ha. Soja: 0,150 - 200 L/ha. Tomate: 0,1 L en 100 L de agua. Trigo: 0,075 L/ha

RECOMENDACIONES DE USO: Respetar los umbrales de control para cada plaga y cultivo y los periodos de carencias entre la aplicación y la cosecha. Usar dentro de las 24 horas de haber realizado la mezcla de tanque, ya que la efectividad puede reducirse debido a la degradación del producto.

BANDA TOXICOLÓGICA: Azul.

**Clorantraniliprole 20 % - SC (Suspensión Concentrada)**

es un insecticida de última generación perteneciente a la familia química de las diamidas, recomendado para el control de orugas difíciles, como la oruga bolillera, en una amplia gama de cultivos. Su bajo impacto sobre la fauna benéfica lo convierte en el aliado perfecto para programas de manejo integrado de plagas (MIP), garantizando protección máxima y segura sin comprometer a los insectos benéficos.

PRESENTACIÓN: Botella x 1 Litro.

VÍA DE INGRESO: Contacto e ingestión.

FAMILIA QUÍMICA: Diamidas.

MECANISMO DE ACCIÓN: Moduladores de receptores de ryanodine.

PLAGAS: Isoca bolillera, Falsa medidora, Falsa medidora, Oruga del yuyo colorado, Oruga capullera, Gusano cogollero, Barrenador del tallo, Polilla del tomate, Oruga de la hoja, Polilla de la vid.

CULTIVOS: Soja, Maíz, Girasol, Tomate, Algodón, Vid, Frutales de Pepita y Carozo, y Poroto.

DOSIS: 0,03 L/ha (VER MARBETE según cultivo y plaga).

RECOMENDACIONES DE USO: Tratar el cultivo según umbrales de daño económico (UDE) con el agregado de 0,5 L/ha de Zinax (EMAG). Se recomienda rotar el uso de TREVOR® o cualquier otro producto perteneciente al Grupo 28 de insecticidas con productos de diferentes modos de acción. No realizar más de 2 aplicaciones a un mismo cultivo. Lea atentamente el marbete antes de uso.

BANDA TOXICOLÓGICA: Verde.





FUNGICIDAS

**AZOXY PRO / AZOXY PRO®****Azoxistrobina 20 % + Ciproconazole 8 % - SC (Suspensión Concentrada)**

Es un fungicida de acción sistémica y de contacto. Por su alta persistencia y rápida acción, combina la destacada acción preventiva y antiesporulante de azoxistrobina con el efecto curativo y erradicante de ciproconazole. La mezcla de ambos principios activos determina una acción combinada, bloqueando el proceso respiratorio y la síntesis de ergosterol en los hongos. Esta acción asegura un amplio espectro de control durante un período prolongado y reduce el riesgo de aparición de cepas resistentes. Para una óptima absorción recomendamos su aplicación con aceite metilado ZINAX.

PRESENTACIÓN: Bidón de 5 Litros.**FAMILIA QUÍMICA:** Estrobirulina (Azoxistrobina) y Triazol (Ciproconazole).**ACCIÓN:** Azoxystrobina: Preventiva y antiesporulante. Ciproconazole: Curativo y erradicante.**MECANISMO DE ACCIÓN:** Azoxystrobina: Respiración/Resistencia y acción tipo estrobirulina: Inhibición a nivel mitocondrial. Grupo 11. Ciproconazole: Biosíntesis de esteroides en las membranas/Inhibición de la demetilación. Grupo 3.**ENFERMEDADES:** Alternaria, Antracnosis, Escaldadura, Fusarium del maíz, Mancha amarilla del trigo, Mancha de la hoja del trigo, Mancha en red en cebada, Mancha gris de la hoja del sorgo, Mancha marrón de la soja, Mancha ojo de rana en soja, Mancha púrpura de la semilla, Podredumbre de la espiga del maíz, Podredumbre del tallo y raíz del maíz, Roya amarilla del trigo, Roya anaranjada del trigo, Roya asiática de Soja, Roya común del maíz, Roya del sorgo, Septorios, Tizón del Norte, Tizón del tallo y de la vaina en soja, Viruela tardía del maní, Viruela temprana del maní.**CULTIVOS:** Soja, Maíz, Trigo, Cebada, Maní, Poroto, Ajo, Avena, Cebada cervicera, Maíz pisingallo, Sorgo.**DOSIS:** Ajo: 0,45 L/ha. Avena: 0,3 - 0,4 L/ha, Cebada cervicera: 0,4 L/ha, Maíz y Maíz pisingallo: 0,5 L/ha. Maní: 0,440 L/ha. Poroto: 0,3 - 0,4 L/ha. Soja: 0,25 - 0,3 L/ha. Sorgo: 0,5 L/ha, Trigo: 0,4 L/ha.**RECOMENDACIONES DE USO:** Respetar las recomendaciones de uso (dosis y momento de aplicación) detalladas en el marbete. Agreguese primero la dosis de AZOXY PRO y luego la de ZINAX directamente al tanque y sin dilución.**BANDA TOXICOLÓGICA:** Azul.**FORMAX III / FORMAX III®****Azoxistrobina 5,62 % + Ciproconazole 3 % + Boscalid 6 % - SC (Suspensión Concentrada)**

FORMAX III es un fungicida sistémico para el control de enfermedades foliares en los cultivos de soja y maní, compuesto por 3 principios activos de diferentes modos de acción. Por un lado, se combina la destacada acción preventiva y antiesporulante de azoxistrobina, perteneciente al grupo de las estrobilurinas, con el efecto curativo y erradicante de ciproconazole, perteneciente al grupo de los triazoles. El tercer componente, Boscalid, es una carboxamida, de acción sistémica local y que se transloca translaminariamente. De esta manera, se logra tener una herramienta para el manejo de resistencias, con una mayor residualidad en el control de enfermedades por el agregado de la carboxamida.

PRESENTACIÓN: Bidón de 5 Litros.**FAMILIA QUÍMICA:** Carboxamida (Boscalid), Estrobirulina (Azoxistrobina) y Triazol (Ciproconazole).**ACCIÓN:** Boscalid: Preventiva y curativa. Azoxystrobina: Preventiva y antiesporulante. Ciproconazole: Curativo y erradicante.**MECANISMO DE ACCIÓN:** Boscalid: Respiración/Inhibición al transporte en cadena de la mitocondria. Grupo 7. Azoxystrobina: Respiración/Resistencia y acción tipo estrobirulina: Inhibición a nivel mitocondrial. Grupo 11. Ciproconazole: Biosíntesis de esteroides en las membranas/Inhibición de la demetilación. Grupo 3.**ENFERMEDADES:** Mancha marrón de las hojas, Mancha púrpura de la semilla, Viruela tardía, Viruela temprana.**CULTIVOS:** Maní, Soja**DOSIS:** Maní: 1,1 L/ha. Soja: 0,75 L/ha.**RECOMENDACIONES DE USO:** Aplicar siempre con el agregado de 0,5 L/ha Zinax (EMAG). **Maní:** Realizar la primera aplicación con la aparición de los primeros síntomas y repetir en caso de ser necesario a los 21 días.**Soja:** A partir de R3 hasta R6, cuando se observen los primeros síntomas en la planta. En caso de persistir condiciones favorables para la enfermedad y ante la aparición de nuevas pústulas, realizar una segunda aplicación.**BANDA TOXICOLÓGICA:** Azul

FORMAX NEO / FORMAX NEO®

Boscalid 10 % + Difenconazole 15 % - SC (Suspensión Concentrada)

Difenconazole es un fungicida sistémico perteneciente al grupo de los triazoles (Grupo 3), que actúa como inhibidor de la biosíntesis de esteroides de membrana. Provee acción preventiva duradera y acción curativa contra un amplio rango de enfermedades. Dentro de los triazoles es uno de los más efectivos para el control de las enfermedades de soja y maní, complementándose muy bien con el efecto residual de la carboxamida Boscalid, de acción sistémica local y que se transloca translaminarmente. De esta manera, se logra tener una herramienta para el manejo de resistencias, con una mayor residualidad en el control de enfermedades por el agregado de la carboxamida. Sustentabilidad: FORMAX NEO es banda verde y la dosis promedio es un 40 % menos que su antecesor FORMAX III.

PRESENTACIÓN: Bidón de 5 Litros.

FAMILIA QUÍMICA: Carboxamida (boscalid) y Triazol (Difenconazole).

ACCIÓN: Preventivo, antiesporulante, curativo, erradicante, sistémico.

MECANISMO DE ACCIÓN: Difenconazole: Inhibe la síntesis de Ergosterol (Grupo 3). Boscalid: Inhibe el complejo II en la mitocondria. (Grupo 7).

ENFERMEDADES: Mancha marrón, Mancha púrpura de la semilla o Tizón de la hoja; Viruela tardía, Viruela temprana.

CULTIVOS: Maní, Soja

DOSIS: Maní: 0,65 L/ha. Soja: 0,45 L/ha

RECOMENDACIONES DE USO: Aplicar siempre con el agregado de 0,5 L/ha Zinax (EMAG). **Maní:** Realizar la primera aplicación con la aparición de los primeros síntomas y repetir en caso de ser necesario a los 21 días.

Soja: A partir de R3 hasta R6, cuando se observen los primeros síntomas en la planta. En caso de persistir condiciones favorables para la enfermedad y ante la aparición de nuevas pústulas, realizar una segunda aplicación.

BANDA TOXICOLÓGICA: Verde.

NIFRAN / NIFRAN®

Fluazinam 50 % - SC (Suspensión Concentrada)

Fungicida de contacto, con efecto preventivo y residual, que brinda una muy buena protección sobre el complejo de hongos.

Al ser un fungicida multisitio es una excelente alternativa para prevenir la aparición de cepas resistentes a otros grupos de fungicidas. Resiste el lavado por lluvia.

PRESENTACIÓN: Bidón de 5 Litros.

FAMILIA QUÍMICA: Fenil piridinaminas.

ACCIÓN: Preventivo.

MODO DE ACCIÓN: Multisitio. Actúa interrumpiendo la formación de energía en varios sitios metabólicos dentro de la célula del hongo. Grupo 29.

ENFERMEDADES: Podredumbre gris, Tizón tardío de la papa, Sclerotinia.

CULTIVOS: Maní, Papa, Poroto, Vid.

DOSIS: Maní: 1 L/ha, Papa: 0,4 - 0,6 L/ha, Poroto: 0,75 - 1 L/ha, Vid: 0,8 L/ha.

RECOMENDACIONES DE USO: En caso de que el cultivo o sus subproductos se destinen a la exportación, deberá conocerse el límite máximo de residuos del país de destino. Respetar las recomendaciones de uso (dosis y momento de aplicación) detalladas en el marbete.

BANDA TOXICOLÓGICA: Verde





FITORREGULADORES



ABRIDOR PLUS / ABRIDOR PLUS®

Thidiazuron 12 % + Diuron 6% - OD (Dispersión Oleosa)

Es un defoliante cuyo uso en el cultivo de algodón produce la caída de las hojas aun cuando están verdes, quedando las plantas sin residuos foliares que puedan teñir, ensuciar o dañar la fibra de algodón en su cosecha. Adicionalmente se observa una reducción de rebrotes posteriores, durante un cierto tiempo. El uso de ABRIDOR PLUS permite la cosecha mecánica y manual, facilitando la recolección de capullos y reduciendo el tiempo de cosecha.

PRESENTACIÓN: Bidón de 5 Litros.

ACCIÓN: Sistémico.

FAMILIA QUÍMICA: Regulador del crecimiento (Thidiazuron) y Ureas (Diuron).

MECANISMO DE ACCIÓN: Thidiazuron: Regulador del crecimiento. Diuron: Inhibidores de la fotosíntesis en el Fotosistema II. Grupo C2.

CULTIVO: Algodón.

DOSIS: 0,5 L/ha.

RECOMENDACIONES DE USO: Con temperaturas promedio del día mayores que los 22°C, alta luminosidad, buena humedad del suelo, cultivos parejos, se favorece la acción del producto.

Las temperaturas medias menores que los 22°C, cultivos densos e irregulares, lluvias inmediatas después de la aplicación y fuerte enmalezamiento, son factores que retrasan o limitan la acción del producto. No debiendo llover dentro de las 24 h. posteriores a la aplicación. No aplicar en condiciones de sequía, ni en horas de fuerte insolación.

BANDA TOXICOLÓGICA: Verde.



COADYUVANTES



/ ZINAX® (EMAG)

Ester metilado de ácidos grasos de aceite de soja 75 % - EC (Concentrado Emulsionable).

Coadyuvante para mezclar con otros plaguicidas. Actúa como vehículo, haciendo más eficiente el mojado y mejorando la absorción foliar de los plaguicidas en las plantas. Adherente, mejorando la adherencia sobre la hoja, protegiendo al producto, reduciendo el lavado por lluvias, permaneciendo más tiempo para facilitar la absorción y reduciendo el escurrimiento. Anti evaporante, reduciendo pérdidas de productos y ayudando a la deposición.

PRESENTACIÓN: Bidón de 20 Litros.

DOSIS: La dosis recomendada varían entre el 0,2% y el 0,5% del volumen de aplicación. Seguir las recomendaciones específicas del fabricante o formulador del producto fitosanitario que se habrá de aplicar.

RECOMENDACIONES DE USO: Se recomienda el uso de ZINAX únicamente junto con plaguicidas (herbicidas, insecticidas y fungicidas) recomendados por el Departamento Técnico de AGROFINA S.A.

BANDA TOXICOLÓGICA: Verde.




RECOMENDACIONES EN LA APLICACIÓN PARA DISTINTOS CULTIVOS.



CULTIVO DE SOJA

● HERBICIDA ● INSECTICIDA ● FUNGICIDA



BARBECHO
LARGO

BARBECHO CORTO
PRIMAVERA

PRE EMERGENCIA

POST EMERGENCIA

TOP GROUND® Imazapic 52,5 % + Imazapir 17,5 %
MABYN® 2,4-D Alquil-Mix 78,1 % (Eq. ác. 34 %)
DARREN® Flumioxazin 48 %
MORRIGAN® Diclosulam 84 %
MARCH II® Glifosato 66,2 % (Eq. ác. 54 %)
MARCH MAX® Glifosato 75,7 % (Eq. ác. 68,8 %)
FLUSAN® Diflufenican 50 %
SULFENAX 50® Sulfentrazone 50 %
MILLION® Lactofen 24 %


S-MILLION®
DASEN®
DASEN PLUS®
FLOSIL® 50
HALOX® 81
KYLIAN® 48
VEROSIL® 40
S-METOLACLORO 96®

S-Lactofen 36 %
 Benazolin-etil 50 %
 Benazolin.etil 20 % + Fomesafen 13,3 %
 Fomesafen 50 %
 Haloxifop 81 %
 Cletodim 48 %
 Imazetapir 44,1 % (Eq. ác. 40 %)
 S-Metolaclo 96 %

KIER III® Abamectina 0,18 %
 + Lufenuron 1,5 % + Bifentrin 1,8 %
KIER III PLUS® Abamectina 0,9 %
 + Lufenuron 7,5 % + Bifentrin 9 %
IDRIS® Flubendiamide 48 %
TIEMBLA® Tiametoxam 14,1 % + Lambdaialotrina 10,6 %
FLOUX® Acetamiprid 2 % + Lambdaialotrina 2 %
ADERYN® Dinotefuran 70 %
TREVOR® Clorantraniliprole 20 %
AZOXY PRO® Azoxistrobina 20 % + Ciproconazole 8 %
FORMAX NEO® Difenconazole 15 % + Boscalid 10 %

CULTIVO DE MAÍZ

● HERBICIDA ● INSECTICIDA ● FUNGICIDA



BARBECHO

PRE EMERGENCIA

POST EMERGENCIA

TALIS®

MARCH II®

MARCH MAX®

MABYN®

FLUSAN®

ATRAFINA®

Flurocloridona 25 %

Glifosato 66,2 % (Eq. ác. 54 %)

Glifosato 75,7 % (Eq. ác. 68,8 %)

2,4-D Alquil-Mix 78,1 % (Eq. ác. 34 %)

Diflufenican 50 %

Atrazina 90 %

MULAN®

DARREN®

TOP GROUND®

GLUFAN®

VEROSIL® 40

S-METOLACLORO 96®

Flumetsulam 12 %

Flumioxazin 48 %

Imazapir 17,5 % + Imazapic 52,5 %

Glufosinato de Amonio 20 %

Imazetapir 44,1 % (Eq. ác. 40 %)

S-Metolaclo 96 %

IDRIS®

TREVOR®

Flubendiamide 48 %


Clorantraniliprole 20 %

AZOXY PRO®

Azoxistrobina 20 % + Ciproconazole 8 %

CULTIVO DE TRIGO Y CEBADA

● HERBICIDA ● INSECTICIDA ● FUNGICIDA




FLUSAN® Diflufenican 50 %
MARCH II® Glifosato 66,2 % (Eq. ác. 54 %)
MARCH MAX® Glifosato 75,7 % (Eq. ác. 68,8 %)
MABYN® 2,4-D Alquil-Mix 78,1 % (Eq. ác. 34 %)
TALIS® Flurocloridona 25 %
DARREN® Flumioxazin 48 %

TIEMBLA® Tiametoxam 14,1 % + Lambdacialotrina 10,6 %
AZOXY PRO® Azoxistrobina 20 % + Ciproconazole 8 %

CULTIVO DE GIRASOL

● HERBICIDA ● INSECTICIDA




MARCH II® Glifosato 66,2 % (Eq. ác. 54 %)
MARCH MAX® Glifosato 75,7 % (Eq. ác. 68,8 %)
TALIS® Flurocloridona 25 %
SULFENAX® 50 Sulfentrazone 50 %
DARREN® Flumioxazín 48 %
S-METOLACLORO 96® S-Metolaclo 96 %

TALIS® Flurocloridona 25 %
FLUSAN® 50 Diflufenican 50 %
KYLIAN® 48 Cletodim 48 %
HALOX® 81 Haloxifop-p-metil 81 %
KATRIN® 80 Imazapir 80 %

TREVOR® Clorantraniliprole 20 %

CULTIVO DE SORGO

● HERBICIDA ● FUNGICIDA




MARCH II®
MARCH MAX®
MABYN®
GLUFAN®
DARREN®
TOP GROUND®
ATRAFINA 90®
S-METOLACLORO 96®

Glifosato 66,2 % (Eq. ác. 54 %)
 Glifosato 75,7 % (Eq. ác. 68,8 %)
 2,4-D Alquil-Mix 78,1 % (Eq. ác. 34 %)
 Glufosinato de Amonio 20 %
 Flumioxazin 48 % - Incorporado 20 -30 DAS (1°)
 Imazapir 17,5 % + Imazapic 52,5 %
 Atrazina 90 %
 S-Metolaclo 96 %
 (*) previamente con el antídoto de herbicida fluxofenim 96 % p/v

AZOXY PRO® Azoxistrobina 20 % + Ciproconazole 8 %

CULTIVO DE POROTO

● HERBICIDA ● INSECTICIDA ● FUNGICIDA



MARCH II®
MARCH MAX®
FLOSIL®
VEROSIL® 40

Glifosato 66,2 % (Eq. ác. 54 %)
Glifosato 75,7 % (Eq. ác. 68,8 %)
Fomesafen 50 %
Imazetapir 44,1 % (Eq. ác. 40 %)

MULAN®
KYLIAN® 48
HALOX® 81
S-METOLACLORO 96®

Flumetsulam 12 %
Cletodim 48 %
Haloxifop-p-metil 81 %
S-Metolaclo 96 %

IDRIS®
TREVOR®


Flubendiamide 48 %
Clorantraniliprole 20 %

AZOXY PRO®
NIFRAN®

Azoxistrobina 20 % + Ciproconazole 8 %
Fluazinam 50 %

CULTIVO DE ARROZ

● HERBICIDA ● INSECTICIDA




TOP RICE® Imazapir 52,5 % + Imazapic 17,5 %
MARCH II® Glifosato 66,2 % (Eq. ác. 54 %)
MARCH MAX® Glifosato 75,7 % (Eq. ác. 68,8 %)
MABYN® 2,4-D Alquil-Mix 78,1 % (Eq. ác. 34 %)

ECTRAN® Bispiribac 40 %
TOP RICE® Imazapir 52,5 % + Imazapic 17,5 %
LISI® Quinclorac 25 %
CLARON 36® Cyhalofop butil 36 %

ADERYN® Dlnotefuran 70 %

CULTIVO DE ALGODÓN

● HERBICIDA ● INSECTICIDA ● FITORREGULADOR




MARCH II® Glifosato 66,2 % (Eq. ác. 54 %)
MARCH MAX® Glifosato 75,7 % (Eq. ác. 68,8 %)
MABYN® 2,4-D Alquil-Mix 78,1 % (Eq. ác. 34 %)

TALIS® Flurocloridona 25 %
KYLIAN® 48 Cletodim 48 %
HALOX® 81 Haloxifop-p-metil 81 %
S-METOLACLORO 96® S-Metolaclo 96 %

TIEMBLA® Tiametoxam 14,1 % + Lambdacialotrina 10,6 %
IDRIS® Flubendiamide 48 %
ADERYN® Dinotefuran 70 %
TREVOR® Clorantraniliprole 20 %
ABRIDOR® PLUS Thidiazuron 12 % + Diuron 6 %

CULTIVO DE MANÍ

● HERBICIDA ● FUNGICIDA



BARBECHO CORTO
PRIMAVERA

PRE EMERGENCIA

POST EMERGENCIA


MORRIGAN® Diclosulam 84 %
MARCH II® Glifosato 66,2 % (Eq. ác. 54 %)
MARCH MAX® Glifosato 75,7 % (Eq. ác. 68,8 %)
SULFENAX® 50 Sulfentrazone 50 %
MANIAC® Imazapic 70 %
FLOSILO® 50 Fomesafen 50 %
S-METOLACLORO 96® S-Metolaclo 96 %

MABYN® 2,4-D Alquil-Mix 78,1 % (Eq. ác. 34 %)
MILLION® Lactofen 24 %
S-MILLION® S-Lactofen 36 %
KYLIAN® 48 Cletohim 48 %
HALOX® 81 Haloxifop-p-metil 81 %
DASEN® Benazolin-etil 50 %
VEROSIL® 40 Imazetapir 44,1 % (Eq. ác. 40 %)

AZOXY PRO® Azoxistrobina 20 % + Ciproconazole 8 %
FORMAX NEO® Difenconazole 15 % + Boscalid 10 %
NIFRAN® Fluazinam 50 %

CULTIVO DE ALFALFA

● HERBICIDA ● INSECTICIDA



MARCH II®
MARCH MAX®

Glifosato 66,2 % (Eq. ác. 54 %)
Glifosato 75,7 % (Eq. ác. 68,8 %)

MULAN®
KYLIAN® 48


Flumetsulam 12 %
Cletodim 48 %

VEROSIL® 40
TIEMBLA®

Imazetapir 44,1 % (Eq. ác. 40 %)
Tiametoxam 14,1 % + Lambdacialotrina 10,6 %

CULTIVO DE CAÑA DE AZÚCAR

HERBICIDA



BARBECHO

PRE EMERGENCIA

POST EMERGENCIA

MARCH II® Glifosato 66,2 % (Eq. ác. 54 %)
MARCH MAX® Glifosato 75,7 % (Eq. ác. 68,8 %)
ATRAFINA 90® Atrazina 90 %

TOP GROUND® Imazapir 17,5 % + Imazapic 52,5 %
MABYN® 2,4-D Alquil-Mix 78,1 % (Eq. ác. 34 %)

TALIS® Flurocloridona 25 %
MULAN® Flumetsulam 12 %



