

PRECAUCIONES: • ¡ALTO! LEA LA ETIQUETA ANTES DE USAR EL PRODUCTO • MANTENER ALEJADO DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS Y DE PERSONAS INEXPERTAS. • NO TRANSPORTAR NI ALMACENAR CON ALIMENTOS. • INUTILIZAR LOS ENVASES VACÍOS PARA EVITAR OTROS USOS. • EN CASO DE INTOXICACIÓN LLEVAR ESTA ETIQUETA AL MÉDICO. • EL PRESENTE PRODUCTO DEBE SER COMERCIALIZADO Y APLICADO DANDO CUMPLIMIENTO A LAS NORMATIVAS PROVINCIALES Y MUNICIPALES VIGENTES. • PELIGRO. SU USO INCORRECTO PUEDE PROVOCAR DAÑOS A LA SALUD Y AL AMBIENTE. LEA ATENTAMENTE LA ETIQUETA.

MEDIDAS PRECAUTORIAS GENERALES: Este producto es nocivo si es ingerido o absorbido por la piel. Evitar todo contacto con la piel, ojos y ropa. Para su seguridad durante la preparación y aplicación: Utilizar ropa protectora adecuada, guantes impermeables, protección facial y botas de goma. No comer, beber, ni fumar durante el manipuleo del producto. Evitar el contacto con el pulverizado. No destapar picos ni boquillas con la boca. Para su seguridad después del tratamiento: cambiarse y lavar la ropa inmediatamente. Lavarse adecuadamente con abundante agua y jabón. Guardar el sobrante de **GLUFAN PLUS** en su envase original, bien cerrado.

RIESGOS AMBIENTALES: **Toxicidad para aves:** Prácticamente no tóxico. **Toxicidad para peces:** Ligeramente tóxico. Evitar la contaminación de cursos de agua con el producto o líquidos de lavado de tanques. **Toxicidad para abejas:** Virtualmente no tóxico.

MEDIDAS DE MITIGACIÓN: Para mitigar los efectos que este herbicida puede tener sobre los organismos acuáticos, es imprescindible implementar el uso de zonas buffer con cobertura vegetal permanente adyacentes a las áreas agrícolas, con el fin de minimizar la contaminación de ríos, arroyos, lagunas, lagos y otros espejos de agua. En la aplicación de este herbicida con equipos terrestres, se debe dejar sin tratar una franja mínima de 10 metros de distancia desde el cuerpo de agua; en el caso de pulverizaciones aéreas, esta franja no debe ser menor que 25 metros. La limpieza y enjuague de equipos pulverizadores debe realizarse siempre con agua corriente.

TRATAMIENTO DE REMANENTES Y CALDOS DE APLICACIÓN: Preparar la cantidad de producto que se va a utilizar, evitando remanentes. El caldo remanente no se podrá reutilizar en otra oportunidad. El mismo debe ser eliminado en forma segura, sin contaminar aguas cercanas. El producto remanente en el tanque de la pulverizadora puede diluirse agregando agua limpia en una cantidad igual a cinco veces el volumen de caldo existente. Se puede aplicar este nuevo preparado sobre barbechos, caminos y áreas no cultivadas ni pastoreadas, alejadas de centros poblados y lugares de tránsito frecuente de personas.

TRATAMIENTO Y MÉTODO DE DESTRUCCIÓN DE ENVASES VACÍOS: El lavado debe realizarse durante la carga de la pulverizadora e inmediatamente después de vaciado el envase, y antes de la aplicación. Este procedimiento debe realizarse con el EPP (elementos de protección personal) puesto e indicado en esta etiqueta. Se puede utilizar la técnica de Triple lavado o la de Lavado a presión, según corresponda (Norma IRAM 12.069). Asegurarse de que el agua utilizada para el lavado de los envases, independientemente de la técnica utilizada, provenga de un depósito de agua limpia, diferente del caldo de aplicación. **Técnica de Triple Lavado:** Llene el envase vacío con agua hasta 1/4 de la capacidad del envase. Luego cierre el envase y agite enérgicamente en todas direcciones durante 30 segundos. Vierta el agua de lavado en el tanque del equipo aplicador de manera que sea utilizado para la aplicación. Realizar este procedimiento tres veces. **Técnica de Lavado a Presión:** Mantener el bidón vacío en forma invertida sobre el pico lavador que posee la pulverizadora durante 30 segundos. Verificar que el agua, producto del lavado, sea vertida nuevamente al tanque de la pulverizadora. Una vez realizada la técnica elegida, perfore el envase por su base para evitar su reutilización, sin dañar la etiqueta. Los envases inutilizados deberán ser trasladados y entregados al centro de acopio más cercano de Campo Limpio.

ALMACENAMIENTO: Almacenar en lugar fresco, ventilado, seco y lejos de fuentes de calor o fuego. Mantener en su envase original herméticamente cerrado.

DERRAMES: En caso de derrame del producto o del caldo de aspersión ya preparado, crear una barrera de contención y cubrir con material absorbente inerte (como cal hidratada, arena seca o tierra) para absorber el producto. Una vez seco, recoger con pala y acondicionar el material en un tambor. Disponer o reciclar en establecimientos autorizados. No permitir que el derrame alcance desagües o cursos de agua. Informar a la autoridad competente si el producto alcanza fuentes de agua o alcantarillados. Llevar a cabo todas las operaciones con ropa protectora, guantes, máscara respiratoria y antiparras.

PRIMEROS AUXILIOS: En caso de intoxicación llamar al médico. **Inhalación:** Llevar a la persona afectada a un lugar ventilado. Si no respira aplicar respiración artificial.

Piel: Retirar las ropas y el calzado contaminados y lavar de inmediato con abundante agua, aplicando luego un jabón neutro, sin frotar las zonas afectadas. Si se presentaran síntomas de irritación (enrojecimiento, picazón, etc.), solicitar inmediata atención médica. **Ojos:** en caso de contacto con los ojos, lavar de inmediato con abundante agua por al menos 10 a 15 minutos, manteniendo los párpados bien abiertos durante el procedimiento. Continuar enjuagando por lo menos durante 15 minutos. Consultar inmediatamente a un oftalmólogo si presenta enrojecimiento, picazón o quemazón. **Ingestión:** Requerir inmediata atención médica. No inducir el vómito en ausencia del médico. Si el vómito se produce espontáneamente, mantener a la persona afectada sentada e inclinada hacia delante para evitar la broncoaspiración. Enjuagar la boca y suministrar agua. Sólo cuando el paciente esté consciente dar a beber 1 o 2 vasos de agua.

ADVERTENCIA PARA EL MÉDICO: Clase III. PRODUCTO LIGERAMENTE PELIGROSO. Categoría inhalatoria: II (NOCIVO) LEVE IRRITANTE DERMAL (CUIDADO) Categoría IV: Evitar el contacto con la piel y la ropa. Corrosivo ocular (PELIGRO) Clase III: Moderadamente irritante. Sensibilización Cutánea: No sensibilizante dermal. Antídoto: No se conoce antídoto específico. Aplicar tratamiento sintomático.

SÍNTOMAS DE INTOXICACIÓN AGUDA: Desórdenes gastrointestinales, dificultad para respirar, dolor de cabeza, dolor de estómago, náuseas, vómitos, diarrea. Irritación en mucosas, piel y ojos.

CONSULTAS EN CASOS DE INTOXICACIÓN:

C.A.B.A.: Unidad Toxicológica del Hospital General de Niños Dr. Ricardo Gutiérrez. Tel.: (011) 4962-6666 y 4962-2247 Conmutador: (011) 4962-9280 / 9212, Centro Toxicológico del Htal de Clínicas J. de San Martín. Tel.: (011) 5950-8804 y 5950-8806, **BUENOS AIRES:** Haedo, Centro Nacional de Intoxicaciones Policlínico Prof. A. Posadas. Tel.: (011) 4654-6648 y 4658-7777. Conmutador: (011) 4658-5001 al 19 (int. 1102/03). **CORDOBA:** Hospital de Niños: Corrientes 643 Tel.: (0351) 4586406 y 6455. **ROSARIO:** Hospital de Niños de Rosario. Tel.: (0341) 430-3533 ó 481 3611/3612. **TAS:** (0341) 448-0077 ó 424-2727. **MENDOZA:** Hospital Central Tel.: (0261) 423-4913.



HERBICIDA
GRUPO 10

GLUFAN
PLUS

Concentrado Soluble (SL)

Composición

glufosinato de amonio: 4-[hidroxi(metil)fosfinoil]-DL-homoalaninato de amonio.....40 g
solvente y coadyuvantes...c.s.p100 ml

LEA ÍNTEGRAMENTE ESTA ETIQUETA ANTES DE UTILIZAR EL PRODUCTO

Inscripto en SENASA con el N° 41.763

Fecha de Vencimiento y Lote: Ver Envase

NOTA: AGROFINA S.A. no se responsabiliza de los daños y perjuicios de cualquier naturaleza que se deriven del uso incorrecto de este producto, diferente del indicado en este rótulo, ya que su aplicación se efectuará fuera de control del vendedor, empleando técnicas particulares y en condiciones ambientales variables. AGROFINA S.A. garantiza la calidad de GLUFAN PLUS y su estabilidad hasta la fecha de vencimiento indicada, siempre que se mantenga en su envase original inviolado y almacenado en locales adecuados que sean secos, bien aireados y al resguardo de la luz solar.

Registrado por:

AGROFINA

Camino Santa Ana S/N, (C2800), Zárate, Prov. de Bs. As. | Argentina
Tel.: 54 11 4501.6800

agrofina@agrofina.com.ar | www.agrofina.com.ar

NO INFLAMABLE

ORIGEN ARGENTINA

Contenido neto: 20 L



CUIDADO

GLUFANPIUS_BIDON_18/06/2025



PANTONE 356



PANTONE 384



PANTONE 186



PANTONE BLACK



PANTONE 293



PANTONE 321

GENERALIDADES:

GENERALIDADES DEL PRODUCTO: **GLUFAN PLUS** es un herbicida post-emergente selectivo en aplicaciones de cobertura total solamente sobre maíces que indiquen la posibilidad de dicho uso en los rótulos y en bolsas de semillas híbridas de maíz resistente a Glufosinato de amonio. El producto actúa por contacto y tiene cierta acción sistémica, también puede ser utilizado en aplicaciones no selectivas sobre áreas sin cultivo y montes frutales. La traslocación ocurre predominantemente entre hojas siguiendo un sentido acropétalo, es decir, desde las hojas inferiores a las superiores. Actúa neutralizando la síntesis de glutamina, acumulándose amoniaco, y al mismo tiempo inhibiendo la fotosíntesis.

INSTRUCCIONES PARA EL USO:

Preparación: Llenar el depósito del equipo pulverizador hasta la mitad con agua. Agregar la cantidad requerida de **GLUFAN PLUS** con el agitador en marcha y terminar de llenar el depósito con agua.

Equipos, volúmenes y técnicas de aplicación: Se recomienda la aplicación con equipos terrestres provistos de un buen sistema de agitación. Aplicar volúmenes de 100 L a 150 L de agua por hectárea, con una presión de 40 a 70 libras/pulg² usando pastillas abanico plano 8002, 8003 y 11002 y 11003; para lograr 40 - 50 gotas/cm². Es importante que la aplicación asegure una cobertura uniforme de las hojas de las malezas por el caldo de pulverización.

RECOMENDACIONES DE USO:

CUADRO DE MALEZAS Y MOMENTO DE APLICACIÓN:

USO: HERBICIDA POST-EMERGENTE SELECTIVO

CULTIVO	MALEZAS QUE CONTROLA	DOSIS	MOMENTOS DE APLICACIÓN
MAIZ LL, resistente a Glufosinato de amonio estado de 3 a 4 hojas	Abrojo grande (<i>Xanthium cavanillesii</i>) Amor Seco (<i>Bidens pilosa</i>) Bejuocos (<i>Ipomea spp.</i>) Capín arroz (<i>Echinochloa crus-galli</i>) Chamico (<i>Datura ferox</i>) Chinchilla (<i>Tagetes bonariensis</i>) Lagunilla (<i>Alternanthera philoxeroides</i>) Malva cimarrona (<i>Anoda cristata</i>) Pasto braquiaria (<i>Brachiaria extensa</i>) Pasto cuaresma (<i>Digitaria sanguinalis</i>) Pie de gallina (<i>Eleusine indica</i>) Quinoa blanca (<i>Chenopodium album</i>) Sorgo de Alepo de semilla (<i>Sorghum halepense</i>) Verdolaga (<i>Portulaca oleracea</i>) Yuyo colorado (<i>Amaranthus quitensis</i>)	0,75 a 1 L/ha + Sulfato de amonio 1 % v/v	Cuando el cultivo tiene 3 a 4 hojas. Emplear las dosis más bajas en los primeros estadios vegetativos de las malezas latifoliadas (2-4 hojas) y al comienzo del macollaje en gramíneas. Las dosis más altas son para malezas de mayor tamaño.
	Sorgo de Alepo de rizoma (<i>Sorghum halepense</i>)	1,25 a 1,75 L/ha + Sulfato de amonio 1 % v/v	Cuando el cultivo tiene de 3 a 4 hojas. Aplicar en estadios vegetativos de la maleza de 2 a 6 hojas. Emplear siempre tensioactivo a la concentración indicada.

USO: HERBICIDA POST-EMERGENTE NO SELECTIVO

CULTIVO	MALEZAS QUE CONTROLA	DOSIS	MOMENTOS DE APLICACIÓN
Áreas sin cultivo. Frutales	Abrojo grande (<i>Xanthium cavanillesii</i>); Albahaca silvestre (<i>Galinsoga parviflora</i>); Avena guacha, Cizinia, Avena negra, Avena invasora (<i>Avena fatua</i>); Bolsa del pastor, Zurrón del pastor (<i>Capsella bursa pastoris</i>); Capín arroz (<i>Echinochloa crus-galli</i>); Capiquí (<i>Stellaria media</i>); Cardo ruso (<i>Salsola kali</i>); Cebadilla (<i>Bromus mollis</i>); Cebadilla chaqueña (<i>Bromus auleticus</i>); Cebadilla criolla, Cebadilla australiana, Cebadilla; (<i>Bromus catharticus/wildenowii</i>); Cerraja (<i>Sonchus oleraceus</i>); Chamico (<i>Datura ferox</i>); Cola de zorro (<i>Setaria viridis</i>); Enredadera anual (<i>Polygonum convolvulus</i>); Flor de pajarito (<i>Fumaria agraria</i>); Hierba cana (<i>Senecio vulgaris</i>); Maíz guacho (<i>Zea mays</i>); Manzanilla (<i>Matricaria chamomilla</i>); Manzanilla cimarrona (<i>Anthemis cotula</i>); Morenita (<i>Kochia scoparia</i>); Nabón (<i>Raphanus sativus</i>); Ortiga (<i>Urtica urens</i>); Pasto cuaresma (<i>Digitaria sanguinalis</i>); Poa (<i>Poa annua</i>); Quinoa blanca (<i>Chenopodium album</i>); Ryegrass (<i>Lolium multiflorum</i>); Trébol de olor blanco (<i>Melilotus albus</i>); Trigo guacho (<i>Triticum spp.</i>); Valda (<i>Flaveria bidentis</i>); Verdolaga (<i>Portulaca oleracea</i>); Yuyo bola (<i>Amaranthus albus</i>); Yuyo colorado (<i>Amaranthus quitensis</i>).	1,25 a 2,5 L/ha + Sulfato de amonio 1 % v/v	Cuando comienza el estado de desarrollo vegetativo de las latifoliadas o el comienzo de macollaje de las gramíneas
	Agropiro invasor, Grama menor, Grama oficial, Cruera, Crouch grass (<i>Elytrigia repens</i>); Algarrobilla fina (<i>Hoffmanseggia falcaria</i>); Cebollín (<i>Cyperus rotundus</i>); Chufa salvaje (<i>Cyperus esculentus var. Leptostachyus</i>); Corregüela (<i>Convolvulus arvensis</i>); Gramilla dulce (<i>Paspalum distichum</i>); Gramón, Gramilla, Pasto bermuda, Pata de perdiz (<i>Cynodon dactylon</i>); Lengua de vaca (<i>Rumex crispus</i>); Sorgo de Alepo (<i>Sorghum halepense</i>); Trébol blanco (<i>Trifolium repens</i>).	2,5 a 4 L/ha + Sulfato de amonio 1 % v/v	

RESTRICCIONES DE USO: Periodo de carencia: En maíz transgénico grano consumo, uso posicionado; para forraje fresco dejar pasar 35 días entre aplicación y cosecha de grano. En caso de que el cultivo o sus subproductos se destinen a la exportación, deberán conocerse el límite máximo de residuos del país de destino y observar el período de carencia que corresponda a ese valor de tolerancia.

Tiempo de reingreso: Reingresar al área tratada una vez transcurridas 24 h de la última aplicación.

COMPATIBILIDAD: Es compatible con herbicidas residuales a base de Alaclor, Atrazina, Diurón, Linurón y Simazina.

FITOTOXICIDAD: El producto no ha manifestado síntomas de fitotoxicidad en los cultivos registrados, siguiendo las dosis y recomendaciones que figuran en esta etiqueta. Tener en cuenta siempre el orden de adición de productos: WG→WP→SG→SP→SC→OD→EC→SL

“CONSULTE CON UN INGENIERO AGRÓNOMO”

