

node_1
-START- あなたは、新薬の臨床試験第Ⅲ相に参加する内科の医師です。
あなたの担当している患者についてです。
患者は54歳男性です。
その患者は、2日前に、近年世界的に流行している新型感染症の中等症と診断されました。
この感染症は、未だ有効な治療法が確立されておらず、あなたの参加している臨床試験で扱われる新しい薬剤が世界初の有効薬として期待されています。
この薬剤は、異なる疾患に用いられており、その疾患における有効性と副作用については立証されています。
そこで、この患者が、臨床試験の参加要件を満たしていると判断したあなたは、患者に臨床試験の参加について説明をすることにしました。
この研究は、参加した被験者全員に、新しい薬剤と、有効成分の含まないプラセボ薬のどちらか一方をランダムに割り当て、一定期間投与し、を調べます。
この時、割り当てられた薬がどちらであるかは、投与する医師にも、投与される患者にもわかりません。
個々の患者の臨床試験参加については、患者の中止希望があった時、薬による有害事象が認められた時、患者が死亡した時のいずれかにおいて終了が可能となります。
あなたは、臨床試験についてプロトコルに沿って適切に説明し、患者も内容を理解した上で同意をし、臨床試験が実施されることとなりました。

edge_100 次へ。

node_2
臨床試験を開始してから1週間後、新しい薬剤の治療効果は著しく、あなたは、他の患者の状態から、その患者が新しい薬剤とプラセボ薬のどちらを投与されているか予想がつくようになってしまいました。
あなたの担当の患者は、恐らくプラセボ薬を投与されていると考えられ、状態は日増しに悪化しています。
あなたは、その患者に、「自分が投与されている薬はどちらだと考えるか？」と質問されました。
この状況における対応として、あなたの考えに近いものを以下の選択肢から1つ選択してください。

edge_5 恐らくプラセボ薬であると、
考えていることを伝える。

edge_6 最初に説明した通り、
知らされていないため、
答えられないと返答する。

edge_7 どうしてそんなことを聞くのですかと質問する。

node_4
患者は、あなたの質問に対し、「薬が効いている気がなくて不安です。」と述べました。
この状況における対応として、あなたの考えに近いものを以下の選択肢から1つ選択してください。

edge_10 恐らくプラセボ薬であると、
考えていることを伝える。

edge_11 医師には薬の内容は知らされていないため、
答えられないと返答する。

node_3
あなたの回答を聞き、患者は、「やはりそうですか。」と回答しました。
そして更に、患者は、「このままだと死んでしまうと思うので、参加を中止したい。」と申し出ました。
この状況における対応として、あなたの考えに近いものを以下の選択肢から1つ選択してください。

edge_8 臨床試験参加を中止しても、
結果は変わらないだろうことを説明し、
臨床試験の継続を説得する。

edge_9 患者の希望に従い、
臨床試験参加を中止する。

node_5
患者は、臨床試験参加を継続することとしました。

node_6
患者の臨床試験参加は中止されることとなりました。

edge_12 次へ。

edge_13 次へ。

node_7
やがて、感染症の症状が悪化し、無治療と同様の経過を辿り、患者は亡くなりました。
この患者の死について、あなたの考えに近いものを以下の選択肢から1つ選択してください。

edge_14 新薬を投与されていたとしても、
救命できたかどうかはわからない上、
今後の医学の発展のために、
必要な死であった。

edge_15 この臨床試験は、
予め倫理審査で承認された手順に沿って適切に行われたとはいえ、
新薬が割り当てられていれば救命できたかもしれないのは不公平である。

edge_16 臨床試験のインフォ-ムド・コンセントは適切に行われ、
患者は自分の意思で同意したため、
この結末は患者の自己責任である。

edge_17 臨床試験に参加することで治る希望があったのに関わらず、
この結果は患者にとって残酷だ。

edge_18 上記のいずれでもない。

node_8
臨床試験は無事終了しました。
-END-