

إعطاء الحقن داخل الأدمة

الأهداف: (purpose)

١. لتحديد خطر أي تفاعل تأقي / تفاعل تحسسي من الأدوية.(اختبار التحسس)
٢. لأداء اختبار السلين .

الأدوات: (equipment)

١. سجل المريض
٢. عربة الأدوية
٣. زجاجة أو أمبولة الدواء
٤. مبرد (إذا الأمبول لم يُخدش)
٥. قطعة شاش صغيرة الحجم(قطعة قطن ناشف)
٦. مسحات كحولية
٧. إبرة ومحقنه من الحجم المناسب (حقنة أنسولين)
٨. سرنج ٥ مل لحل الدواء
٩. صندوق السلامة
١٠. قلم أزرق
١١. وعاء كلوي

الإجراء: (procedure)

U لم يتم	S تم	التبرير	الخطوات	م
أ - تحضير الدواء				
		تضمن إعطاء الدواء الصحيح والجرعة الصحيحة.	تأكد من تعليمات الطبيب من ملف المريض وقارنها مع سجل الأدوية وحضر بطاقة الدواء	١-
		لمنع انتقال العدوى	اغسل اليدين	٢-
		لتوفير الوقت وزيادة الكفاءة	اجمع الأدوات	٣-
		ضمان الدواء الصحيح للمريض الصحيح	اختر الأمبول /الزجاجة الصحيحة (اقرأ اللاصقة أول مرة) ونقارن مع بطاقة الأدوية ودقق : ١-اسم المريض ٢-رقم السرير ٣-جرعة الدواء ، التكرار ٤-طريق الإعطاء ٥-تاريخ ووقت الإعطاء .	٤-
		تحافظ على السلامة	دقق تاريخ انتهاء الصلاحية وأي تغيرات في اللون والقوام	٥-

٦-	احسب الجرعة (اقرأ اللاصقة مرة ثانية)	تضمن إعطاء الجرعة الصحيحة	
٧-	اسحب الجرعة الصحيحة من الزجاجاة أو الأمبولة : تحدد الكمية ب ٠,١ مل من الدواء المحلول بـ (٤-٥) مل تمتد إلى ١ مل سيروم مالح ويحقن ٠,١ مل من الممدد الأخير(في حال اجراء اختبار التحسس)	تعطي الجرعة الدقيقة	
ب-تحضير المريض			
٨-	أحضر صينية الدواء إلى جانب المريض		
٩-	حدد المريض بتدقيق شريط التعريف والسؤال عن اسم المريض . قارن مع بطاقة الدواء	تضمن السلامة	
١٠-	اشرح الإجراء للمريض	لتقليل قلق المريض و كسب تعاونه	
١١-	أسدل الستائر أو أغلق الباب	تحافظ على الخصوصية	
١٢-	اختر موضع الحقن (الناحية الأمامية من الثلث المتوسط من الساعد)	موضع الحقن يجب أن يكون خال من الحالات الغير طبيعية التي قد تتداخل مع امتصاص الدواء .	
١٣-	ساعد المريض لاتخاذ الوضعية المريحة	لسهولة تطبيق الأجراء	
ج- إعطاء الدواء:			
١٤-	نظف الموضع بمسحة مطهرة في حركة دائرية ثابتة. استخدم الاحتكاك من مركز الموضع وتحرك ٢ أنش للخارج. دعه يجف ل ١٥ ثانية.	يزيل العمل الميكانيكي للمسحة الإفرازات التي تحتوي الكائنات الحية المجهرية.	
١٥-	أزل غطاء أو غمد الإبرة بسحبه مباشرة من الإبرة	تمنع إبره من ملامسة جوانب الغطاء. تمنع نزع وتجنب تداخل المحور	
١٦-	امسك السرنية بين أبهام سبابة اليد المسيطرة مع الحافة المائلة للإبرة موجهة للأعلى (شطفة الإبرة)	الحقن السهل يتطلب الاستغلال الصحيح لأجزاء السرنج. مع توجيه حافة الإبرة للأعلى، الدواء أقل احتمالية لأن يكون مترسبا داخل الأنسجة تحت الأدمة.	
١٧-	باليد غير المسيطرة، شد الجلد على الموضع بالسبابة والإبهام.	تخترق الإبرة الجلد المشدود بسهولة أكثر.	
١٨-	مع توجيه الإبرة تقريبا ضد جلد المريض، أدخلها ببطء في زاوية (٥-١٥ درجة) حتى تحس بمقاومة. ثم ادفع الإبرة خلال البشرة تقريبا ل ٣ ملليمتر تحت سطح الجلد. رأس الإبرة يمكن أن يرى خلال الجلد.	تضمن رأس إبره في الأدمة	
١٩-	أحقن الدواء ببطء. عادة، تحس بالمقاومة. إذا لم تكن، الإبرة عميقة أكثر من اللازم انزع وأبدأ ثانية.	يقلل الحقن البطيء الانزعاج في الموضع. الطبقة الجلدية ضيقة ولا تتمدد بسهولة عندما المحلول يحقن (لا تتجاوز ٠,١ مليلتر - ٠,٥ مليلتر).	
٢٠-	بينما تحقن دواء، لاحظ أن الفقاعة الصغيرة المشابهة لعضة البعوضة	تشير الفقاعة إلى الدواء مترسب داخل الأدمة.	

			تظهرُ على سطح الجلد.	
٢١-		تدعم النسيج حول موضع الحقن لتقليل الانزعاج أثناء سحب الإبرة. لتقليل الانزعاج أثناء سحب الإبرة.	اسحب الإبرةً بينما تُطبَّقُ قطعة القطن الجافة بلطف على الموضع.	
٢٢-		التدليك قد ينشر الدواء إلى طبقات النسيج التحتية ويُغير نتائج الاختبار.	لا تُدَلِّك (تفرك) الموضع.	
٢٣-		تُمنَعُ الأدوية للمرضى وموظفي الرعاية الصحية.	تخلّص من الإبرة غير المُغطاة في صندوق السلامة.	
٢٤-		موضع الحقن يجب أن يقيّم في فترات مُختلفة لتحديد نتائج الاختبار. علامة القلم تُسهّل إيجاد الموضع.	ارسم دائرة بنصف قطر ٣ سم حول محيط موضع الحقن. قيم موضع الحقن بعد ٧٢ ساعة في حال إجراء اختبار السلين و ضمن (١٠-١٥) دقيقة في حال إجراء اختبار التحسس للأدوية.	
٢٥-		لمنع رد الفعل التحسسي	إذا ظهرت أعراض (طفح جلدي ، احمرار، صلابه ، حكة) مكان الحقن لا تعط الدواء وأخبر الطبيب.	
٢٦-		تعطي المريض إحساس العافية	ساعد المريض لاتخاذ وضعية مريحة.	
٢٧-		للمحافظة على بيئة نظيفة وتُخفِض انتقال الكائنات الدقيقة	أعد الأدوات واغسل اليدين	
٢٨-		التفاعل التآقي الحادّ مُميّزٌ بضيق النفس، أزيز تنفس وانخماص دوري.	إبقى مع المريض ولاحظ لأيّ تفاعل تحسسي.	
٢٩-		التوثيق في الوقت المناسب يمنع أخطاء الإعطاء مستقبلاً ويوصل العناية المعطاة	وثق في ملف المريض و سجل الأدوية ما يلي: اسم الدواء ،الجرعة ، وقت الإعطاء، طريق الإعطاء، مكان الحقن ،استجابة المريض ، ملاحظات التمرريض، اسم الممرض وتوقيعه	

*S:satisfactory- U:unsatisfactory

ملاحظات المُدرّس: يُؤدّي الطالب في مختبر المهارات أو على المريض أو ضمن المجتمع . سجل عدد المحاولات التي قام بها الطالب قبل الوصول إلى انجاز جيد للمهارة.

اسم وتوقيع المُدرّس: _____ التاريخ: _____