

Homogena linjära system
Med konstanta koefficienter

$$\vec{X} = \begin{pmatrix} k_1 \\ k_2 \end{pmatrix} e^{\lambda t} = \vec{K} e^{\lambda t}$$

$$\vec{X}' = \mathbf{A} \vec{X}$$

$$\vec{K} \lambda e^{\lambda t} = \mathbf{A} \vec{K} e^{\lambda t}$$

$$(\mathbf{A} - \lambda \mathbf{I}) \vec{K} = \vec{0}$$

Skilda reella egenvärden

Upprepade reella egenvärden

- Tillräckligt många linjärt oberoende egenvektorer
- För få linjärt oberoende egenvektorer

Komplex egenvärden

[z.c.8.2.2.]

$$\begin{cases} \frac{dx}{dt} = 2x + 2y \\ \frac{dy}{dt} = x + 3y \end{cases} \quad \begin{pmatrix} x' \\ y' \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 2 & 2 \\ 1 & 3 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix}$$

$$0 = \begin{vmatrix} 2-\lambda & 2 \\ 1 & 3-\lambda \end{vmatrix} = (2-\lambda)(3-\lambda) - 2 = \lambda^2 - 5\lambda + 4$$

$$(\lambda - 1)(\lambda - 4) = 0$$

$$\lambda_1 = 1, \lambda_2 = 4$$

Bestäm en egenvektor till varje egenvärde.

Insättning i $(\mathbf{A} - \lambda \mathbf{I})\vec{v} = \vec{0}$ ger:

$$\lambda_1 = 1 \quad \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 1 & 2 \end{pmatrix} \vec{v}_1 = \vec{0} \quad \vec{v}_1 = \begin{pmatrix} 2 \\ -1 \end{pmatrix}$$

$$\lambda_2 = 4 \quad \begin{pmatrix} -2 & 2 \\ 1 & -1 \end{pmatrix} \vec{v}_2 = \vec{0} \quad \vec{v}_2 = \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \end{pmatrix}$$

$$\vec{X} = C_1 \begin{pmatrix} 2 \\ -1 \end{pmatrix} e^t + C_2 \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \end{pmatrix} e^{4t}$$

[z.c.8.2.19.]

$$\begin{cases} \frac{dx}{dt} = 3x - y \\ \frac{dy}{dt} = 9x - 3y \end{cases} \quad \begin{pmatrix} x' \\ y' \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 3 & -1 \\ 9 & -3 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix}$$

$$3 \frac{dx}{dt} = \frac{dy}{dt} \text{ men även } \begin{vmatrix} 3 & -1 \\ 9 & -3 \end{vmatrix} = 0$$

$$\therefore \lambda_{1,2} = 0$$

Bestäm en egenvektor till varje egenvärde.

Insättning i $(\mathbf{A} - \lambda \mathbf{I})\vec{v} = \vec{0}$ ger:

$$\begin{pmatrix} 3 & -1 \\ 9 & -3 \end{pmatrix} \vec{v}_1 = \vec{0} \Leftrightarrow \vec{v}_1 = \begin{pmatrix} 1 \\ 3 \end{pmatrix}$$

Ansätt andra lösningen $\vec{X}_2 = (t\vec{L} + \vec{P})e^{\lambda_1 t}$

$$(t\vec{L} + \vec{P})e^{\lambda_1 t} + \vec{L}e^{\lambda_1 t} = \mathbf{A}\vec{L}te^{\lambda_1 t} + \mathbf{A}\vec{P}e^{\lambda_1 t}$$

$$\vec{L} = (\mathbf{A} - \lambda_1 \mathbf{I})\vec{L}t + (\mathbf{A} - \lambda_1 \mathbf{I})\vec{P}$$

$$t^1: \quad (\mathbf{A} - \lambda_1 \mathbf{I})\vec{L} = \vec{0}$$

$$t^0: \quad (\mathbf{A} - \lambda_1 \mathbf{I})\vec{P} = \vec{L}$$

\vec{L} är en egenvektor

$$\begin{pmatrix} 3 & -1 \\ 9 & -3 \end{pmatrix} \vec{p} = \begin{pmatrix} 1 \\ 3 \end{pmatrix} \quad \vec{p} = \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \end{pmatrix}$$

$$\vec{X} = C_1 \begin{pmatrix} 1 \\ 3 \end{pmatrix} + C_2 \left[\begin{pmatrix} 1 \\ 3 \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \end{pmatrix} \right]$$

[z.c.8.2.36.]

$$\begin{cases} \frac{dx}{dt} = 4x + 5y \\ \frac{dy}{dt} = -2x + 6y \end{cases} \quad \begin{pmatrix} x' \\ y' \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 4 & 5 \\ -2 & 6 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix}$$

$$0 = \begin{vmatrix} 4-\lambda & 5 \\ -2 & 6-\lambda \end{vmatrix} = (4-\lambda)(6-\lambda) + 10 = (\lambda-5)^2 + 9$$

$$\lambda_{1,2} = 5 \pm 3i$$

$$\begin{pmatrix} 4-5-3i & 5 \\ -2 & 6-5-3i \end{pmatrix} \vec{v}_1 = \begin{pmatrix} -1-3i & 5 \\ -2 & 1-3i \end{pmatrix} \vec{v}_1 = \vec{0} \Leftrightarrow \vec{v}_1 = \begin{pmatrix} 1-3i \\ 2 \end{pmatrix}$$

$$\vec{Z} = e^{(5+3i)t} \begin{pmatrix} 1-3i \\ 2 \end{pmatrix} = e^{5t} (\cos 3t + i \sin 3t) \left(\begin{pmatrix} 1 \\ 2 \end{pmatrix} + i \begin{pmatrix} -3 \\ 0 \end{pmatrix} \right)$$

$$\begin{cases} \vec{X}_1 = \Re \vec{Z} = e^{5t} \left(\begin{pmatrix} 1 \\ 2 \end{pmatrix} \cos 3t + \begin{pmatrix} 3 \\ 0 \end{pmatrix} \sin 3t \right) = e^{5t} \begin{pmatrix} \cos 3t + 3 \sin 3t \\ 2 \cos 3t \end{pmatrix} \\ \vec{X}_2 = \Im \vec{Z} = e^{5t} \left(\begin{pmatrix} -3 \\ 0 \end{pmatrix} \cos 3t + \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \end{pmatrix} \sin 3t \right) = e^{5t} \begin{pmatrix} \sin 3t - 3 \cos 3t \\ 2 \sin 3t \end{pmatrix} \\ \vec{X} = C_1 \vec{X}_1 + C_2 \vec{X}_2 \end{cases}$$

[z.c.8.3.13.]

$$\vec{X}' = \begin{pmatrix} 1 & -1 \\ 1 & 1 \end{pmatrix} \vec{X} = \begin{pmatrix} \cos t \\ \sin t \end{pmatrix} e^t$$

Bestäm en fundamentalmatris $\Phi(t)$!

$$\vec{X}' = \begin{pmatrix} 1 & -1 \\ 1 & 1 \end{pmatrix} \vec{X}$$

$$0 = \begin{vmatrix} 1-\lambda & -1 \\ 1 & 1-\lambda \end{vmatrix} = (1-\lambda)^2 + 1$$

$$\lambda_{1,2} = 1 \pm i$$

Bestäm en komplex egenvektor!

Insättning i $(\mathbf{A} - \lambda \mathbf{I})\vec{v} = \vec{0}$ ger:

$$\begin{pmatrix} 1-(1+i) & -1 \\ 1 & 1-(1+i) \end{pmatrix} \vec{v}_1 = \begin{pmatrix} -i & -1 \\ 1 & -i \end{pmatrix} \vec{v}_1 = \vec{0} \Leftrightarrow \vec{v}_1 = \begin{pmatrix} 1 \\ -i \end{pmatrix}$$

$$\vec{Z} = e^{(1+i)t} \begin{pmatrix} 1 \\ -i \end{pmatrix} = e^t \underbrace{(\cos t + i \sin t)}_{\text{cis } t = e^{it}} \left(\begin{pmatrix} 1 \\ 0 \end{pmatrix} + i \begin{pmatrix} 0 \\ -1 \end{pmatrix} \right)$$

$$\begin{cases} \vec{X}_1 = \Re \vec{Z} = e^t \left(\begin{pmatrix} 1 \\ 0 \end{pmatrix} \cos t + \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \end{pmatrix} \sin t \right) = e^t \begin{pmatrix} \cos t \\ \sin t \end{pmatrix} \\ \vec{X}_2 = \Im \vec{Z} = e^t \left(\begin{pmatrix} 0 \\ -1 \end{pmatrix} \cos t + \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \end{pmatrix} \sin t \right) = e^t \begin{pmatrix} \sin t \\ -\cos t \end{pmatrix} \end{cases}$$

Fundamentalmatrisen: $\Phi(t) = e^t \begin{pmatrix} \sin t & \cos t \\ -\cos t & \sin t \end{pmatrix}$

$$\vec{X}_p \Phi(t) \vec{U} = \Phi(t) \int \Phi^{-1}(t) \vec{F}(t) dt$$

$$\Phi^{-1}(t) = e^{-t} \begin{pmatrix} \sin t & -\cos t \\ \cos t & \sin t \end{pmatrix}$$

$$\vec{U} = \int e^{-t} \begin{pmatrix} \sin t & -\cos t \\ \cos t & \sin t \end{pmatrix} e^t \begin{pmatrix} \cos t \\ \sin t \end{pmatrix} dt = \int \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \end{pmatrix} dt = \begin{pmatrix} 0 \\ t \end{pmatrix}$$

$$\vec{X}_p = e^t \begin{pmatrix} \sin t & -\cos t \\ \cos t & \sin t \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 0 \\ t \end{pmatrix} = e^t \begin{pmatrix} t \cos t \\ t \sin t \end{pmatrix}$$

$$\vec{X} = \Phi(t) \vec{C} + \Phi(t) \vec{U} = e^t \begin{pmatrix} \sin t & \cos t \\ -\cos t & \sin t \end{pmatrix} \vec{C} + e^t \begin{pmatrix} t \cos t \\ t \sin t \end{pmatrix}$$