

$$g(x) = \sum_{i=0}^n a_n(x) \frac{d^n y}{dx^n}$$

$g(x) \neq 0$ — inhomogen
 $g(x) = 0$ — homogen

[z.c.4.1.7.]

$$x(t) = c_1 \cos \omega t = c_2 \sin \omega t$$

är den allmänna lösningen till

$$x'' + \omega^2 x = 0$$

Visa att den lösningen som uppfyller

$$x(0) = x_0 \quad (1) \quad \text{sam} \quad x'(0) = x_1 \quad (2)$$

är

$$x(t) = x_0 \cos \omega t + \frac{x_1}{\omega} \sin \omega t$$

$x(t)$ uppfyller (1):

$$x_0 = c_1 \cos 0 + c_2 \sin 0 \Leftrightarrow x_0 = c_1$$

$x(t)$ uppfyller (2):

$$x'(t) = -\omega c_1 \sin \omega t + \omega c_2 \cos \omega t$$

$x'(0) = x_1$:

$$x_1 = -c_1 \omega \sin 0 + c_2 \omega \cos 0 = c_2 \omega$$

Funktionerna $\prod_{i=0}^n f_i$ är linjärt beroende om det finns konstanter, $\prod_{i=0}^n C_i$,
 så att $\sum_{i=0}^n C_i f_i = 0$

[z.c.4.1.17.]

$$f_1(x) = 5, \quad f_2(x) = \cos^2 x, \quad f_3(x) = \sin^2 x$$

Linjärt beroende?

$$\cos^2 x + \sin^2 x = 1 = f_2 + f_3$$

$$c_2 = c_3$$

$$c_1 f_1 + c_2 f_2 + c_3 f_3 = 0$$

$$c_1 f_1 + c_2 f_2 + c_2 f_3 = 0$$

$$c_1 f_1 + c_2 (f_2 + f_3) = 0$$

$$c_1 \cdot 5 + c_2 \cdot 1 = 0$$

$$c_2 = -5c_1$$

$$c_1 \cdot 5 - 5c_1 \cdot 1 = 0$$

$$5(c_1 - c_1) = 0$$

$$0 = 0$$

Linjärt beroende!

[z.c.4.1.40.]

Är $f_1(x) = e^{x+2}$ och $f_2(x) = e^{x-3}$ linjärt beroende?

$$f_1(x) = e^{x+2} = e^2 e^x = k_1 e^x$$

$$f_2(x) = e^{x-3} = e^{-3} e^x = k_2 e^x$$

Ja, båda är på formen ke^x .

[z.c.4.1.23.]

Visa att funktionerna e^{-3x} & e^{4x} utgör en fundamental mängd till ekvationen

$$y'' - y' - 12y = 0$$

1) Antalet funktioner är lika många som ekvations ordningsnummer:

$$\text{"ordning"} = 2 \asymp 2 = \text{"funktioner"}$$

2) Funktionerna är lösningar till ekvationen. (Kolla själv!)

3) $W(e^{-3x}; e^{4x}) \neq 0$:

$$W(f_1; f_2) = \begin{vmatrix} f_1 & f_2 \\ f_1' & f_2' \end{vmatrix}$$

$$W(e^{-3x}; e^{4x}) = \begin{vmatrix} e^{-3x} & e^{4x} \\ -3e^{-3x} & 4e^{4x} \end{vmatrix} = (4+3)e^{(4-3)x} = 7e^x \neq 0$$

[z.c.4.2.9.]

Lös $x^2 y'' - 7xy' + 16y = 0$, om $y_1 = x^4$ är en lösning!

Substitution: $y \triangleq y_1 \cdot u$

$$y' = (y_1 u)' = y_1' u + y_1 u'$$

$$y'' = (y_1' u + y_1 u')' = (y_1' u)' + (y_1 u')' = y_1'' u + 2y_1' u' + y_1 u''$$

$$\begin{aligned} 0 &= x^2 y'' - 7xy' + 16y = \\ &= x^2 y_1'' u + 2x^2 y_1' u' + x^2 y_1 u'' - 7xy_1' u - 7xy_1 u' + 16y_1 u = \\ &= u \cdot (x^2 y_1'' - 7xy_1' + 16y_1)_0 + u' \cdot (2x^2 y_1' - 7xy_1) + u'' x^2 y_1 = \\ &= \{[\dots]_0 = 0\} = u' \cdot (2x^2 y_1' - 7xy_1) + u'' x^2 y_1 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} 0 &= u' \cdot (2x^2 y_1' - 7xy_1) + u'' x^2 y_1 &= \{v \triangleq u' \mid v' = u''\} &= \\ &= v' x^2 y_1 + v \cdot (2x^2 y_1' - 7xy_1) &= \{y_1 = x^4 \mid y_1' = 4x^3\} &= \\ &= v' x^6 + v \cdot (8x^5 - 7x^5) = \\ &= v' x^6 + vx^5 \end{aligned}$$

$$0 = v'x + v$$

$$0 = (vx)'$$

$$C = vx$$

$$v = C/x$$

$$v = u' = C/x$$

$$\frac{du}{dx} = \frac{C}{x} \Leftrightarrow du = \frac{C}{x} dx \Leftrightarrow \int du = \int \frac{C}{x} dx \Leftrightarrow u = C \ln|x| + D$$

$$y = y_1 u = x^4 (C \ln|x| + D)$$

$$y = Cx^4 \ln|x| + Dx^4 \quad \text{Allmän lösning}$$

Metod 2:

$$y'' + P(x)y' + Q(x)y = 0 \quad (*) \quad \text{Homogen}$$

Om y_1 löser (*) så kan en andra lösning skrivas som

$$y_2(x) = y_1(x) \int \frac{e^{-\int P(x)dx}}{(y_1(x))^2} dx$$

Prova metoden på [z.c.4.2.9.]!

[z.c.4.6.1.]

$$y'' + y = \sec x$$

$$1) \quad y'' + y = 0$$

Hjälpekvation: $m^2 + 1 = 0$ Kolla 4.3 kap.
 $m_{1,2} = \pm i$

$$\begin{aligned} y_h &= e^{\Re m} (c_1 \cos(|\Im m| \cdot x) + c_2 \sin(|\Im m| \cdot x)) = \\ &= e^0 (c_1 \cos(1 \cdot x) + c_2 \sin(1 \cdot x)) = \\ &= e^0 (c_1 \cos x + c_2 \sin x) = (c_1 \underbrace{\cos x}_{y_1} + c_2 \underbrace{\sin x}_{y_2}) \end{aligned}$$

$$y_p = (y_1 \cdot u_1 + y_2 \cdot u_2)(x)$$

$$2) \quad u_1(x), \quad u_2(x) \quad ?$$

$$\begin{vmatrix} y_1 & y_2 \\ y_1' & y_2' \end{vmatrix} = W(y_1; y_2) = \begin{vmatrix} \cos x & \sin x \\ -\sin x & \cos x \end{vmatrix} = \cos^2 x + \sin^2 x = 1$$

$$W_1 = \begin{vmatrix} 0 & y_2 \\ f(x) & y_2' \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} 0 & \sin x \\ \sec x & \cos x \end{vmatrix} = -\tan x$$

$$W_2 = \begin{vmatrix} y_1 & 0 \\ y_1' & f(x) \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} \cos x & 0 \\ -\sin x & \sec x \end{vmatrix} = 1$$

$$u_1' = -\tan x = -\frac{\sin x}{\cos x}$$

$$u_2' = 1$$

$$u_2 = x$$

$$u_1 = \int -\frac{\sin x}{\cos x} dx = \left\{ \begin{array}{l} v = \cos x \\ dv = -\sin x \, dx \end{array} \right\} = \int \frac{dv}{v} = \ln |v| = \ln |\cos x|$$

$$y_p = y_1 u_1 + y_2 u_2 = \cos x \cdot \ln |\cos x| + x \sin x$$

$$y = y_h + y_p = c_1 \cos x + c_2 \sin x + \cos x \cdot \ln |\cos x| + x \sin x$$