

Exercice 1 : (Intégrale)

Soit $f \in C_0(\mathbb{R})$ et $y_0 \in \mathbb{R}$. On considère le problème de Cauchy

$$y'(t) = f(t), \quad y(t_0) = y_0, \quad t \in [t_0, t_0 + T]$$

1. Donner la solution exacte de cette équation.
2. Trouver des formules explicites donnant les solutions approchées de $y(t_0 + T)$ en la résolvant par la méthode d'Euler, la méthode du point milieu (i.e. la méthode de Runge) et la méthode de Runge-Kuta RK4 avec un pas constant.

Exercice 2 : (Euler explicite et point milieu)

Écrire deux fonctions (Xcas ou Python) prenant en argument une fonction $f : \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}$, des réels $t_0, y_0 \in \mathbb{R}$ et $T > 0$ et un entier N et retournant la valeur approchée de la solution du problème de Cauchy $y' = f(t, y)$, $y(t_0) = y_0$ au temps $t = t_0 + T$ par :

1. la méthode d'Euler
2. la méthode du point milieu

avec un pas constant $h = T/N$.

Tester ces fonctions pour $f(t, y) = 1$, $f(t, y) = t$ et $f(t, y) = t^2$; expliquez quand c'est le cas pourquoi les résultats ne varient pas avec N . Testez ensuite pour $f(t, y) = y$, $f(t, y) = ty$ et $f(t, y) = y + \cos(t)$, pour y_0 prenant les valeurs -1 , 0 et 1 .

Exercice 3 : (Erreurs d'arrondi)

Soit le problème de Cauchy

$$y'(t) = y, \quad y(0) = 1, \quad t \in [0, 1]$$

1. Rappeler la solution exacte de l'équation puis donner la solution approchée y_N de $y(1)$ par la méthode du point milieu avec un pas constant $h = 1/N$. Montrer que $y_N \rightarrow y(1)$ quand $N \rightarrow \infty$.
2. Donner une majoration de l'erreur locale de la forme $|e_n| \leq Ch^3$ où C est une constante indépendante de n que l'on déterminera, en déduire une majoration de l'erreur globale.
3. On suppose qu'à chaque pas il y a une erreur d'arrondi ϵ_n , de sorte que la solution approchée est donnée par

$$\begin{cases} w_{n+1} &= w_n + hf\left(t_n + \frac{h}{2}, w_n + \frac{h}{2}f(t_n, w_n)\right) + \epsilon_n \\ w_0 &= 1 \end{cases}, \quad f(t, y) = y$$

Montrer la majoration suivante de l'erreur globale

$$E = \max_{0 \leq n < N} |y(t_n) - w_n| \leq M \left(\frac{C}{N^2} + N\epsilon \right) \quad (1)$$

avec $M \leq e^{1.5}$ et $\epsilon = \max_{0 \leq n < N} |\epsilon_n|$. En prenant $\epsilon = 1\text{e-}15$, trouver le nombre d'itérations optimal N_{opt} en minimisant le membre de droite de l'inégalité (1).

4. En utilisant la fonction numérique de l'exercice précédent, donner les valeurs numériques de l'erreur $|y(1) - w_N|$ pour différentes valeurs de N comprises entre 10^4 et 10^6 . Comparez vos résultats avec votre prédiction théorique de N_{opt} .

Exercice 4 : (Équation d'ordre > 1)

On considère l'équation différentielle

$$x'' = x \quad (2)$$

1. On pose $y = x + x'$ et $z = x - x'$. Trouver les équations différentielles du premier ordre vérifiées par y et z , et en déduire x .
2. Donner l'algorithme permettant de trouver une solution approchée de (2) par la méthode d'Euler. Écrire une fonction (Python, Xcas) qui résout (2) pour les conditions initiales $x(0) = 1$ et $x'(0) = 2$ par cette méthode, et tracer les solutions exactes et approchées.

Exercice 5 : (Runge-Kutta 4)

Écrire une fonction (Xcas ou Python) prenant en argument

- une fonction $f : \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}$
- des réels $t_0, y_0 \in \mathbb{R}$ et $T > 0$
- un entier N

et retournant un vecteur donnant les valeurs approchées de la solution du problème de Cauchy $y' = f(t, y)$, $y(t_0) = y_0$ au temps $t_n = t_0 + nhT$, $0 \leq n < N$, par la méthode de Runge-Kutta RK4 avec un pas constant $h = T/N$. Testez votre fonction sur quelques exemples pour lesquels vous connaissez la solution exacte. Tracez la courbe de l'erreur $y(t_n) - y_n$ en fonction du temps.

Exercice 6 : (Euler implicite)

Écrire une fonction (Python, Xcas) implémentant la méthode d'Euler implicite, et comparer numériquement les erreurs avec Euler explicite par exemple pour $y' = y$, $y(0) = 1$.

Exercice 7 : (Pas variable)

Soit $f : (t, y) \in \mathbb{R}^2 \mapsto f(t, y) \in \mathbb{R}$ une fonction lipschitzienne en y de rapport k . Soit $t_0 < t_1 < \dots < t_N = t_0 + T$. On pose $p_n = f(t_n, y_n)$ et $h_n = t_{n+1} - t_n$ pour tout $n = 0, \dots, N-1$.

1. Montrer que l'erreur locale (erreur de consistance) e_n de la méthode d'Euler avec les pas variables h_n vaut :

$$e_n = \frac{h_n}{2}(p_{n+1} - p_n) + o(h_n)$$

2. On veut contrôler le pas h_n de manière à ce que l'erreur globale théorique (c'est-à-dire sans prendre en compte les erreurs d'arrondis) $E_{\text{th}} = \max_{0 \leq n < N} \{|y(t_n) - y_n|\}$ soit inférieure à une valeur $\delta > 0$ fixée à l'avance. Montrer que, pour h_n suffisamment petit, une condition suffisante pour avoir $E_{\text{th}} \leq \delta$ est :

$$\frac{|p_{n+1} - p_n|}{2} < \frac{\delta}{MT} \quad \text{avec} \quad M = e^{kT}.$$

3. Modifier votre fonction de l'exercice 2.1) en prenant un pas variable $h_n \in [h_{\min}, h_{\max}]$ (les pas minimum h_{\min} et maximum h_{\max} seront donnés en arguments de la fonction) tel que $h_0 = \sqrt{h_{\min} h_{\max}}$ et
 - si $\frac{|p_{n+1} - p_n|}{2} < \frac{\delta}{3MT}$ alors $h_{n+1} = \min\{1.25h_n, h_{\max}\}$
 - si $\frac{|p_{n+1} - p_n|}{2} > \frac{\delta}{MT}$ alors $h_{n+1} = 0.8h_n$ avec arrêt si $h_{n+1} < h_{\min}$ ou si $n = 0$.
 - sinon $h_{n+1} = h_n$

Application : résoudre numériquement

$$\begin{cases} y' &= \frac{y}{1-t} \\ y(0) &= 1 \end{cases}, \quad t \in [0, 0.8] \quad (3)$$

avec une précision $\delta = 10^{-2}$. Trouver la solution exacte de (3). Pourquoi selon vous la précision obtenue est-elle meilleure que 10^{-2} ?