

<i>Rodzaj dokumentu:</i>	Zasady oceniania rozwiązań zadań
<i>Egzamin:</i>	Egzamin maturalny
<i>Przedmiot:</i>	Matematyka
<i>Poziom:</i>	Poziom podstawowy
<i>Formy arkusza:</i>	MMA-P0-100 (wersje arkusza: A i B), MMA-P0-200, MMA-P0-300, MMA-P0-400, MMA-P0-600, MMA-P0-700, MMA-P0-Q00, MMA-P0-K00, MMAU-P0-100
<i>Termin egzaminu:</i>	8 maja 2024 r.
<i>Data publikacji dokumentu:</i>	28 czerwca 2024 r.

Uwagi ogólne:

1. Akceptowane są wszystkie rozwiązania merytorycznie poprawne i spełniające warunki zadania.
2. Jeżeli zdający poprawnie rozwiąże zadanie i otrzyma poprawny wynik, lecz w końcowym zapisie przekształca ten wynik i popełnia przy tym błąd, to może uzyskać maksymalną liczbę punktów.
3. Jeżeli zdający popełni błędy rachunkowe, które na żadnym etapie rozwiązania nie upraszczają i nie zmieniają danego zagadnienia, lecz stosuje poprawną metodę i konsekwentnie do popełnionych błędów rachunkowych rozwiązuje zadanie, to może otrzymać co najwyżej $(n - 1)$ punktów (gdzie n jest maksymalną możliwą do uzyskania liczbą punktów za dane zadanie).

Zadanie 1. (0–1)

Wymagania egzaminacyjne 2024 ¹	
Wymaganie ogólne	Wymaganie szczegółowe
II. Wykorzystanie i tworzenie informacji. 1. Interpretowanie i operowanie informacjami przedstawionymi w tekście, zarówno matematycznym, jak i popularnonaukowym, a także w formie wykresów, diagramów, tabel.	Zdający: I.7) stosuje interpretację geometryczną i algebraiczną wartości bezwzględnej, rozwiązuje równania i nierówności typu: [...] $ x + 3 \geq 4$.

Zasady oceniania

1 pkt – odpowiedź poprawna.

0 pkt – odpowiedź niepoprawna albo brak odpowiedzi.

Rozwiązanie

Wersja A

B

Wersja B

B

¹ Rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki z dnia 10 czerwca 2022 r. w sprawie wymagań egzaminacyjnych dla egzaminu maturalnego przeprowadzanego w roku szkolnym 2022/2023 i 2023/2024 (Dz.U. 2022, poz.1246).

Zadanie 2. (0–1)

Wymagania egzaminacyjne 2024	
Wymaganie ogólne	Wymaganie szczegółowe
I. Sprawność rachunkowa. Wykonywanie obliczeń na liczbach rzeczywistych, także przy użyciu kalkulatora, stosowanie praw działań matematycznych przy przekształcaniu wyrażeń algebraicznych oraz wykorzystywanie tych umiejętności przy rozwiązywaniu problemów w kontekstach rzeczywistych i teoretycznych.	Zdający: I.4) stosuje [...] prawa działań na potęgach [...].

Zasady oceniania

1 pkt – odpowiedź poprawna.

0 pkt – odpowiedź niepoprawna albo brak odpowiedzi.

Rozwiązanie

Wersja A

B

Wersja B

C

Zadanie 3. (0–2)

Wymagania egzaminacyjne 2024	
Wymaganie ogólne	Wymaganie szczegółowe
IV. Rozumowanie i argumentacja. 1. Przeprowadzanie rozumowań, także kilkuetapowych, podawanie argumentów uzasadniających poprawność rozumowania, odróżnianie dowodu od przykładu.	Zdający: I.2) przeprowadza proste dowody dotyczące podzielności liczb całkowitych i reszt z dzielenia nie trudniejsze niż dowód podzielności przez 24 iloczynu czterech kolejnych liczb naturalnych.

Zasady oceniania2 pkt – przekształcenie wyrażenia $n^2 + (n + 1)^2 + (n + 2)^2$ do postaci

$$3(n^2 + 2n + 1) + 2$$

ALBO

– przekształcenie wyrażenia $n^2 + (n + 1)^2 + (n + 2)^2$ do postaci $3n^2 + 6n + 5$ oraz zapisanie, że składniki $3n^2$ oraz $6n$ są podzielne przez 3, a reszta z dzielenia liczby 5 przez 3 jest równa 2,

ALBO

– zapisanie, że n , $n + 1$, $n + 2$, to trzy kolejne liczby całkowite, więc dokładnie jedna z nich jest podzielna przez 3, a dwie pozostałe nie są podzielne przez 3 oraz zapisanie, że kwadrat liczby podzielnej przez 3 jest podzielny przez 3, a kwadrat

liczby niepodzielnej przez 3 przy dzieleniu przez 3 daje resztę 1, **oraz** zapisanie wniosku, że reszta z dzielenia przez 3 liczby $n^2 + (n + 1)^2 + (n + 2)^2$ jest równa 2.

1 pkt – przekształcenie wyrażenia $n^2 + (n + 1)^2 + (n + 2)^2$ do postaci

$$n^2 + n^2 + 2n + 1 + n^2 + 4n + 4$$

ALBO

- zapisanie, że n , $n + 1$, $n + 2$, to trzy kolejne liczby naturalne, więc dokładnie jedna z nich jest podzielna przez 3, a dwie pozostałe nie są podzielne przez 3 **oraz** zapisanie, że kwadrat liczby podzielnej przez 3 jest podzielny przez 3, a kwadrat liczby niepodzielnej przez 3 przy dzieleniu przez 3 daje resztę 1.

0 pkt – rozwiązanie, w którym zastosowano niepoprawną metodę, albo brak rozwiązania.

Uwagi:

1. Jeżeli zdający sprawdza prawdziwość tezy tylko dla wybranych wartości n , to otrzymuje **0 punktów** za całe rozwiązanie.
2. Jeżeli zdający przyjmuje np. $n = 3k + r$, gdzie $k \in \mathbb{N}$ i r jest resztą z dzielenia liczby n przez 3 (lub $n = 2k + r$, gdzie $k \in \mathbb{N}$ i r jest resztą z dzielenia liczby n przez 2), i przeprowadzi pełne rozumowanie dla wszystkich przypadków, to otrzymuje **2 punkty**.
Gdy przeprowadzi pełne rozumowanie dla co najmniej połowy przypadków, ale nie przeprowadzi pełnego rozumowania dla wszystkich przypadków, to otrzymuje **1 punkt** za całe rozwiązanie.
3. Jeżeli zdający rozpatruje tylko jeden przypadek $n = 3k + 2$, to otrzymuje **0 punktów** za całe rozwiązanie.

Przykładowe pełne rozwiązania

Sposób I

Przekształcamy równoważnie dane wyrażenie

$$\begin{aligned} n^2 + (n + 1)^2 + (n + 2)^2 &= n^2 + n^2 + 2n + 1 + n^2 + 4n + 4 \\ &= 3n^2 + 6n + 5 = 3 \cdot (n^2 + 2n + 1) + 2 \end{aligned}$$

Ponieważ n jest liczbą naturalną, więc $n^2 + 2n + 1$ jest liczbą naturalną.

Zatem $3 \cdot (n^2 + 2n + 1)$ jest wielokrotnością liczby 3.

Stąd $3 \cdot (n^2 + 2n + 1) + 2$ przy dzieleniu przez 3 daje resztę 2.

To należało wykazać.

Sposób II

Liczby n , $n + 1$, $n + 2$ to trzy kolejne liczby naturalne, więc dokładnie jedna z nich jest podzielna przez 3, a dwie pozostałe nie są podzielne przez 3.

Kwadrat liczby podzielnej przez 3 jest również podzielny przez 3.

Kwadrat liczby niepodzielnej przez 3 daje przy dzieleniu przez 3 resztę 1.

Zatem suma reszt z dzielenia przez 3 liczby $n^2 + (n + 1)^2 + (n + 2)^2$ jest równa $0 + 1 + 1 = 2$.

To należało wykazać.

Zadanie 4. (0–1)

Wymagania egzaminacyjne 2024	
Wymaganie ogólne	Wymaganie szczegółowe
I. Sprawność rachunkowa. Wykonywanie obliczeń na liczbach rzeczywistych, także przy użyciu kalkulatora, stosowanie praw działań matematycznych przy przekształcaniu wyrażeń algebraicznych oraz wykorzystywanie tych umiejętności przy rozwiązywaniu problemów w kontekstach rzeczywistych i teoretycznych.	Zdający: I.1) wykonuje działania ([...] logarytmowanie) w zbiorze liczb rzeczywistych.

Zasady oceniania

1 pkt – odpowiedź poprawna.

0 pkt – odpowiedź niepoprawna albo brak odpowiedzi.

Rozwiązanie

Wersja A

C

Wersja B

B

Zadanie 5. (0–1)

Wymagania egzaminacyjne 2024	
Wymaganie ogólne	Wymaganie szczegółowe
I. Sprawność rachunkowa. Wykonywanie obliczeń na liczbach rzeczywistych, także przy użyciu kalkulatora, stosowanie praw działań matematycznych przy przekształcaniu wyrażeń algebraicznych oraz wykorzystywanie tych umiejętności przy rozwiązywaniu problemów w kontekstach rzeczywistych i teoretycznych.	Zdający: II.1) stosuje wzory skróconego mnożenia na: $(a + b)^2$, $(a - b)^2$, $a^2 - b^2$.

Zasady oceniania

1 pkt – odpowiedź poprawna.

0 pkt – odpowiedź niepoprawna albo brak odpowiedzi.

Rozwiązanie

Wersja A

B

Wersja B

D

Zadanie 6. (0–1)

Wymagania egzaminacyjne 2024	
Wymaganie ogólne	Wymaganie szczegółowe
III. Wykorzystanie i interpretowanie reprezentacji. 1. Stosowanie obiektów matematycznych i operowanie nimi, interpretowanie pojęć matematycznych.	Zdający: III.3) rozwiązuje nierówności liniowe z jedną niewiadomą.

Zasady oceniania

1 pkt – odpowiedź poprawna.

0 pkt – odpowiedź niepoprawna albo brak odpowiedzi.

Rozwiązanie

Wersja A

D

Wersja B

D

Zadanie 7. (0–1)

Wymagania egzaminacyjne 2024	
Wymaganie ogólne	Wymaganie szczegółowe
III. Wykorzystanie i interpretowanie reprezentacji. 1. Stosowanie obiektów matematycznych i operowanie nimi, interpretowanie pojęć matematycznych.	Zdający: III.6) rozwiązuje równania wymierne postaci $\frac{V(x)}{W(x)} = 0$, gdzie wielomiany $V(x)$ i $W(x)$ są zapisane w postaci iloczynowej.

Zasady oceniania

1 pkt – odpowiedź poprawna.

0 pkt – odpowiedź niepoprawna albo brak odpowiedzi.

RozwiązanieWersja A
BWersja B
B**Zadanie 8. (0–1)**

Wymagania egzaminacyjne 2024	
Wymaganie ogólne	Wymagania szczegółowe
III. Wykorzystanie i interpretowanie reprezentacji. 1. Stosowanie obiektów matematycznych i operowanie nimi, interpretowanie pojęć matematycznych.	Zdający: II.2) [...] mnoży wielomiany jednej i wielu zmiennych. III.5) rozwiązuje równania wielomianowe postaci $W(x) = 0$ dla wielomianów [...], które dają się doprowadzić do postaci iloczynowej metodą wyłączania wspólnego czynnika przed nawias [...].

Zasady oceniania

1 pkt – odpowiedź poprawna.

0 pkt – odpowiedź niepełna lub niepoprawna albo brak odpowiedzi.

RozwiązanieWersja A
PFWersja B
FP

Zadanie 9. (0–3)

Wymagania egzaminacyjne 2024	
Wymaganie ogólne	Wymaganie szczegółowe
IV. Rozumowanie i argumentacja. 4. Stosowanie i tworzenie strategii przy rozwiązywaniu zadań, również w sytuacjach nietypowych.	Zdający: III.5) rozwiązuje równania wielomianowe postaci $W(x) = 0$ dla wielomianów [...] takich, które dają się doprowadzić do postaci iloczynowej [...] metodą grupowania.

Zasady oceniania

3 pkt – poprawna metoda rozwiązania równania i obliczenie wszystkich rozwiązań równania:

$$(-\sqrt{3}), \sqrt{3}, 2.$$

2 pkt – przekształcenie lewej strony równania do postaci iloczynu wielomianów stopnia co najwyżej drugiego **oraz** rozwiązanie jednego z równań wynikającego z tego rozkładu, np.:

$$(x - 2)(x^2 - 3) = 0 \text{ i } x = 2,$$

$$(x - 2)(x^2 - 3) = 0 \text{ i } x = -\sqrt{3} \text{ oraz } x = \sqrt{3}$$

ALBO

– przekształcenie równania $x^3 - 2x^2 - 3x + 6 = 0$ do postaci alternatywy dwóch równań: kwadratowego i liniowego **oraz** rozwiązanie jednego z nich:

$$(x - 2 = 0, x^2 - 3 = 0) \text{ oraz } x = 2,$$

$$(x - 2 = 0, x^2 - 3 = 0) \text{ oraz } (x = -\sqrt{3}, x = \sqrt{3}),$$

ALBO

– rozłożenie wielomianu $W(x) = x^3 - 2x^2 - 3x + 6$ na czynniki liniowe:

$$W(x) = (x - 2)(x - \sqrt{3})(x + \sqrt{3}),$$

ALBO

– przekształcenie równania $x^3 - 2x^2 - 3x + 6 = 0$ do postaci alternatywy trzech równań liniowych: $(x - 2 = 0, x - \sqrt{3} = 0, x + \sqrt{3} = 0)$,

ALBO

– obliczenie jednego z pierwiastków wielomianu $W(x) = x^3 - 2x^2 - 3x + 6$ **oraz** poprawne podzielenie wielomianu W przez odpowiedni dwumian, np.

$$x = 2 \text{ i } (x^3 - 2x^2 - 3x + 6) : (x - 2) = x^2 - 3.$$

1 pkt – zapisanie wielomianu $W(x) = x^3 - 2x^2 - 3x + 6$ w postaci iloczynu wielomianów stopnia co najwyżej drugiego, np. $W(x) = (x - 2)(x^2 - 3)$

ALBO

– przekształcenie równania $x^3 - 2x^2 - 3x + 6 = 0$ do postaci alternatywy dwóch równań: $(x - 2 = 0, x^2 - 3 = 0)$,

ALBO

- przekształcenie równania $x^3 - 2x^2 - 3x + 6 = 0$ do postaci $x^2(x - 2) - 3(x - 2) = 0$ lub do postaci $x^2(x - 2) = 3(x - 2)$ **oraz** zapisanie rozwiązania $x = 2$,
ALBO
- zapisanie jednego z rozwiązań równania $x^3 - 2x^2 - 3x + 6 = 0$ **oraz** zapisanie sprawdzenia, że ta liczba spełnia to równanie.

0 pkt – rozwiązanie, w którym zastosowano niepoprawną metodę, albo brak rozwiązania.

Uwagi:

1. Jeżeli zdający zapisze tylko trzy poprawne rozwiązania równania, to otrzymuje **1 punkt** za całe rozwiązanie.
2. Jeżeli zdający uzyska trzy poprawne pierwiastki wielomianu, lecz traktuje równanie jako nierówność (podaje zbiór rozwiązań w postaci przedziału / sumy przedziałów), to otrzymuje **2 punkty** za całe rozwiązanie.
3. Jeżeli przy przekształcaniu lewej strony równania do postaci iloczynu zdający zapisuje czynnik $(x - 2)$ z wykładnikiem 2, to może otrzymać co najwyżej **2 punkty** za całe rozwiązanie (**1 punkt** za rozwiązanie równania $(x - 2)^2 = 0$ i **1 punkt** za rozwiązanie równania $x^2 - 3 = 0$).
4. Jeżeli zdający zamiast równania $(x - 2)(x^2 - 3) = 0$ zapisze $(x - 2) \pm (x^2 - 3) = 0$, ale z dalszego rozwiązania wynika, że traktuje lewą stronę równania jak iloczyn i rozwiąże zadanie do końca, to może otrzymać co najwyżej **2 punkty** za całe rozwiązanie (**1 punkt** za rozwiązanie równania $x - 2 = 0$ i **1 punkt** za rozwiązanie równania $x^2 - 3 = 0$).
5. Jeżeli zdający przy przekształcaniu równania do postaci $(x - 2)(x^2 - 3) = 0$ popełni błąd i zapisze:

$$x^2(x + 2) - 3(x - 2) = 0$$
 lub

$$x^2(x - 2) + 3(x - 2) = 0$$
 lub

$$x^2(x - 2) - 3(x + 2) = 0$$
 lub

$$x(x^2 + 3) - 2(x^2 - 3) = 0$$
 lub

$$x(x^2 - 3) + 2(x^2 - 3) = 0$$
 lub

$$x(x^2 - 3) - 2(x^2 + 3) = 0$$
 a następnie:
 - 5.1. zapisze równanie $(x - 2)(x^2 - 3) = 0$ lub poprawną alternatywę ($x - 2 = 0$ lub $x^2 - 3 = 0$) i konsekwentnie rozwiąże zadanie do końca, to otrzymuje co najwyżej **2 punkty** za całe rozwiązanie (**1 punkt** za rozwiązanie równania $x - 2 = 0$ i **1 punkt** za rozwiązanie równania $x^2 - 3 = 0$).
 - 5.2. zapisze równanie $(x - 2)(x^2 + 3) = 0$ lub błędną alternatywę ($x - 2 = 0$ lub $x^2 + 3 = 0$) i zapisze rozwiązanie $x = 2$, to otrzymuje **1 punkt** za całe rozwiązanie.
 - 5.3. zapisze równanie $(x + 2)(x^2 - 3) = 0$ lub błędną alternatywę

$(x + 2 = 0 \text{ lub } x^2 - 3 = 0)$ i zapisze oba rozwiązania równania $x^2 - 3 = 0$:
 $x = -\sqrt{3}$ oraz $x = \sqrt{3}$, to otrzymuje **1 punkt** za całe rozwiązanie.

5.4. zapisze błędne równanie (w którym jedna ze stron jest równa 0, a druga jest iloczynem wielomianów stopni dodatnich), inne niż w uwagach 5.2 oraz 5.3, np.
 $(x - 2)(x + 2)(x^2 \pm 3) = 0$ lub błędną alternatywę inną niż w uwagach 5.2 oraz 5.3, np. $(x - 2 = 0 \text{ lub } x + 2 = 0 \text{ lub } x^2 \pm 3 = 0)$, to otrzymuje **0 punktów** za całe rozwiązanie.

6. Jeżeli zdający, przekształcając równanie $x^3 - 2x^2 - 3x + 6 = 0$, popełni jeden błąd (który nie jest błędem znaku) albo dwa błędy znaku i otrzyma równanie trzeciego stopnia, które ma trzy rozwiązania rzeczywiste, oraz konsekwentnie rozwiąże zadanie do końca, to otrzymuje **1 punkt** za całe rozwiązanie.

7. Jeżeli zdający dzieli obustronnie równanie $x^2(x - 2) = 3(x - 2)$ przez dwumian $(x - 2)$ z podaniem odpowiedniego założenia i uzyska tylko dwa poprawne rozwiązania $x = \sqrt{3}$ oraz $x = -\sqrt{3}$, to otrzymuje **2 punkty** za całe rozwiązanie, a jeżeli uzyska tylko jedno z tych rozwiązań, to otrzymuje **1 punkt** za całe rozwiązanie.

8. Jeżeli zdający dzieli obustronnie równanie $x^2(x - 2) = 3(x - 2)$ przez dwumian $(x - 2)$ bez podania odpowiedniego założenia i uzyska tylko dwa poprawne rozwiązania $x = \sqrt{3}$ oraz $x = -\sqrt{3}$, to otrzymuje **1 punkt** za całe rozwiązanie, a jeżeli uzyska tylko jedno z tych rozwiązań, to otrzymuje **0 punktów** za całe rozwiązanie.

Przykładowe pełne rozwiązania

Sposób I

Przekształcamy równanie równoważnie i stosujemy metodę grupowania wyrazów:

$$x^3 - 2x^2 - 3x + 6 = 0$$

$$x^2(x - 2) - 3(x - 2) = 0$$

$$(x - 2)(x^2 - 3) = 0$$

$$(x - 2)(x - \sqrt{3})(x + \sqrt{3}) = 0$$

$$x - 2 = 0 \text{ lub } x - \sqrt{3} = 0 \text{ lub } x + \sqrt{3} = 0$$

$$x = 2 \text{ lub } x = \sqrt{3} \text{ lub } x = -\sqrt{3}$$

Rozwiązaniami równania są liczby: $(-\sqrt{3})$, $\sqrt{3}$, 2.

Sposób II

Przekształcamy równanie równoważnie i stosujemy metodę grupowania wyrazów:

$$x^3 - 2x^2 - 3x + 6 = 0$$

$$x(x^2 - 3) - 2(x^2 - 3) = 0$$

$$(x - 2)(x^2 - 3) = 0$$

$$(x-2)(x-\sqrt{3})(x+\sqrt{3})=0$$

$$x-2=0 \quad \text{lub} \quad x-\sqrt{3}=0 \quad \text{lub} \quad x+\sqrt{3}=0$$

$$x=2 \quad \text{lub} \quad x=\sqrt{3} \quad \text{lub} \quad x=-\sqrt{3}$$

Rozwiązaniami równania są liczby: $(-\sqrt{3})$, $\sqrt{3}$, 2.

Sposób III

Obliczamy $W(2) = 0$ i stwierdzamy, że liczba 2 jest pierwiastkiem wielomianu

$$W(x) = x^3 - 2x^2 - 3x + 6.$$

Zatem wielomian W jest podzielny przez dwumian $(x-2)$. Dzielimy wielomian W przez dwumian $(x-2)$ i otrzymujemy

$$(x^3 - 2x^2 - 3x + 6) : (x - 2) = x^2 - 3$$

$$\text{Zatem } W(x) = (x-2)(x^2-3) = (x-2)(x-\sqrt{3})(x+\sqrt{3}).$$

Obliczamy pierwiastki wielomianu $W(x)$:

$$(x-2)(x-\sqrt{3})(x+\sqrt{3})=0$$

$$x-2=0 \quad \text{lub} \quad x-\sqrt{3}=0 \quad \text{lub} \quad x+\sqrt{3}=0$$

$$x=2 \quad \text{lub} \quad x=\sqrt{3} \quad \text{lub} \quad x=-\sqrt{3}$$

Rozwiązaniami równania są liczby: $(-\sqrt{3})$, $\sqrt{3}$, 2.

Zadanie 10. (0–1)

Wymagania egzaminacyjne 2024	
Wymaganie ogólne	Wymaganie szczegółowe
III. Wykorzystanie i interpretowanie reprezentacji. 2. Dobieranie i tworzenie modeli matematycznych przy rozwiązywaniu problemów praktycznych i teoretycznych.	Zdający: IV.2) stosuje układy równań do rozwiązywania zadań tekstowych.

Zasady oceniania

1 pkt – odpowiedź poprawna.

0 pkt – odpowiedź niepoprawna albo brak odpowiedzi.

Rozwiązanie

Wersja A

A

Wersja B

D

Zadanie 11. (0–1)

Wymagania egzaminacyjne 2024	
Wymaganie ogólne	Wymaganie szczegółowe
II. Wykorzystanie i tworzenie informacji. 1. Interpretowanie i operowanie informacjami przedstawionymi w tekście, zarówno matematycznym, jak i popularnonaukowym, a także w formie wykresów, diagramów, tabel.	Zdający: IV.1) rozwiązuje układy równań liniowych z dwiema niewiadomymi, podaje interpretację geometryczną układów [...] sprzecznych.

Zasady oceniania

1 pkt – odpowiedź poprawna.

0 pkt – odpowiedź niepoprawna albo brak odpowiedzi.

Rozwiązanie

Wersja A

A

Wersja B

C

Zadanie 12. (0–1)

Wymagania egzaminacyjne 2024	
Wymaganie ogólne	Wymaganie szczegółowe
III. Wykorzystanie i interpretowanie reprezentacji. 1. Stosowanie obiektów matematycznych i operowanie nimi, interpretowanie pojęć matematycznych.	Zdający: V.5) interpretuje współczynniki występujące we wzorze funkcji liniowej.

Zasady oceniania

1 pkt – odpowiedź poprawna.

0 pkt – odpowiedź niepoprawna albo brak odpowiedzi.

Rozwiązanie

Wersja A

D

Wersja B

B

Zadanie 13. (0–1)

Wymagania egzaminacyjne 2024	
Wymaganie ogólne	Wymaganie szczegółowe
III. Wykorzystanie i interpretowanie reprezentacji. 1. Stosowanie obiektów matematycznych i operowanie nimi, interpretowanie pojęć matematycznych.	Zdający: V.6) wyznacza wzór funkcji liniowej na podstawie informacji o jej wykresie lub o jej własnościach.

Zasady oceniania

1 pkt – odpowiedź poprawna.

0 pkt – odpowiedź niepoprawna albo brak odpowiedzi.

RozwiązanieWersja A
DWersja B
A**Zadanie 14.1. (0–1)**

Wymagania egzaminacyjne 2024	
Wymaganie ogólne	Wymaganie szczegółowe
II. Wykorzystanie i tworzenie informacji. 1. Interpretowanie i operowanie informacjami przedstawionymi w tekście, zarówno matematycznym, jak i popularnonaukowym, a także w formie wykresów, diagramów, tabel.	Zdający: V.4) odczytuje z wykresu funkcji: [...] przedziały, w których funkcja przyjmuje wartości większe (nie mniejsze) lub mniejsze (nie większe) od danej liczby [...].

Zasady oceniania

1 pkt – odpowiedź poprawna.

0 pkt – odpowiedź niepoprawna albo brak odpowiedzi.

Rozwiązanie

[−2, 4]

Kryteria uwzględniające specyficzne trudności w uczeniu się matematyki

Jeśli zdający pomyli porządek liczb na osi liczbowej, np. zapisze zbiór rozwiązań nierówności w postaci $[4, -2]$, to otrzymuje **1 punkt**.

Zadanie 14.2. (0–1)

Wymagania egzaminacyjne 2024	
Wymaganie ogólne	Wymaganie szczegółowe
II. Wykorzystanie i tworzenie informacji. 2. Używanie języka matematycznego do tworzenia tekstów matematycznych, w tym do opisu prowadzonych rozumowań i uzasadniania wniosków, a także do przedstawiania danych.	Zdający: V.9) wyznacza wzór funkcji kwadratowej na podstawie informacji o tej funkcji lub o jej wykresie.

Zasady oceniania

1 pkt – odpowiedź poprawna.

0 pkt – odpowiedź niepoprawna albo brak odpowiedzi.

Rozwiązanie

Wersja A

B

Wersja B

A

Zadanie 14.3. (0–1)

Wymagania egzaminacyjne 2024	
Wymaganie ogólne	Wymaganie szczegółowe
II. Wykorzystanie i tworzenie informacji. 1. Interpretowanie i operowanie informacjami przedstawionymi w tekście, zarówno matematycznym, jak i popularnonaukowym, a także w formie wykresów, diagramów, tabel.	Zdający: V.3) odczytuje i interpretuje wartości funkcji określonych za pomocą [...] wykresów [...].

Zasady oceniania

1 pkt – odpowiedź poprawna.

0 pkt – odpowiedź niepoprawna albo brak odpowiedzi.

Rozwiązanie

Wersja A

A

Wersja B

C

Zadanie 14.4. (0–2)

Wymagania egzaminacyjne 2024	
Wymaganie ogólne	Wymaganie szczegółowe
II. Wykorzystanie i tworzenie informacji. 1. Interpretowanie i operowanie informacjami przedstawionymi w tekście, zarówno matematycznym, jak i popularnonaukowym, a także w formie wykresów, diagramów, tabel.	Zdający: V.12) na podstawie wykresu funkcji $y = f(x)$ szkicuje wykresy funkcji $y = f(x - a)$, [...] $y = f(-x)$.

Zasady oceniania

2 pkt – dwie poprawne odpowiedzi.

1 pkt – jedna poprawna odpowiedź.

0 pkt – odpowiedź niepoprawna albo brak odpowiedzi.

Rozwiązanie

Wersja A

A

E

Wersja B

A

E

Zadanie 15. (0–1)

Wymagania egzaminacyjne 2024	
Wymaganie ogólne	Wymaganie szczegółowe
III. Wykorzystanie i interpretowanie reprezentacji. 1. Stosowanie obiektów matematycznych i operowanie nimi, interpretowanie pojęć matematycznych.	Zdający: VI.1) oblicza wyrazy ciągu określonego wzorem ogólnym.

Zasady oceniania

1 pkt – odpowiedź poprawna.

0 pkt – odpowiedź niepełna lub niepoprawna albo brak odpowiedzi.

Rozwiązanie

Wersja A

PF

Wersja B

PF

Zadanie 16. (0–1)

Wymagania egzaminacyjne 2024	
Wymaganie ogólne	Wymagania szczegółowe
III. Wykorzystanie i interpretowanie reprezentacji. 2. Dobieranie i tworzenie modeli matematycznych przy rozwiązywaniu problemów praktycznych i teoretycznych.	Zdający: VI.2) w prostych przypadkach bada, czy ciąg jest rosnący, czy malejący; VI.6) wykorzystuje własności ciągów [...] geometrycznych, do rozwiązywania zadań [...].

Zasady oceniania

1 pkt – odpowiedź poprawna.

0 pkt – odpowiedź niepełna lub niepoprawna albo brak odpowiedzi.

Rozwiązanie

Wersja A

B2

Wersja B

A2

Zadanie 17. (0–2)

Wymagania egzaminacyjne 2024	
Wymaganie ogólne	Wymagania szczegółowe
IV. Rozumowanie i argumentacja. 4. Stosowanie i tworzenie strategii przy rozwiązywaniu zadań, również w sytuacjach nietypowych.	Zdający: VI.4) stosuje wzór na n -ty wyraz i na sumę n początkowych wyrazów ciągu arytmetycznego.

Zasady oceniania

2 pkt – zastosowanie poprawnej metody i obliczenie różnicy ciągu: $r = -2$.

1 pkt – zapisanie układu równań pozwalającego obliczyć r , np.:

$$-1 = a_1 + 2r \quad \text{oraz} \quad -165 = \frac{2a_1 + 14r}{2} \cdot 15,$$

$$-1 = a_1 + 2r \quad \text{oraz} \quad a_{15} = a_1 + 14r \quad \text{oraz} \quad -165 = \frac{a_1 + a_{15}}{2} \cdot 15,$$

$$a_3 = -1 \quad \text{oraz} \quad -165 = \frac{(a_3 - 2r) + (a_3 + 12r)}{2} \cdot 15$$

ALBO

– zapisanie równania z jedną niewiadomą r , np.:

$$(-1 - 2r) + (-1 - r) + (-1) + (-1 + r) + \dots + (-1 + 12r) = -165,$$

$$\frac{2(-1 - 2r) + 14r}{2} \cdot 15 = -165,$$

$$\frac{(-1 - 2r) + (-1 + 12r)}{2} \cdot 15 = -165,$$

ALBO

- obliczenie ósmego wyrazu ciągu (a_n) z wykorzystaniem własności ciągu arytmetycznego: $a_8 = -11$ (dla sposobów IV oraz V),

ALBO

- zapisanie kolejnych piętnastu początkowych wyrazów ciągu (a_n) :
3, 1, -1, -3, -5, -7, -9, -11, -13, -15, -17, -19, -21, -23, -25.

0 pkt – rozwiązanie, w którym zastosowano niepoprawną metodę, albo brak rozwiązania.

Uwagi:

1. Jeżeli zdający myli ciąg arytmetyczny z geometrycznym, to otrzymuje **0 punktów** za całe rozwiązanie, o ile nie nabył prawa do innej liczby punktów.
2. Jeżeli zdający zapisze tylko $r = -2$, to otrzymuje **1 punkt** za całe rozwiązanie.
3. Jeżeli zdający błędnie interpretuje liczbę (-165) jako piętnasty wyraz ciągu, to otrzymuje **0 punktów** za całe rozwiązanie.

Przykładowe pełne rozwiązania

Sposób I

Korzystamy ze wzorów na n -ty wyraz i sumę n początkowych wyrazów ciągu arytmetycznego i otrzymujemy układ równań

$$\begin{cases} -1 = a_1 + 2r \\ -165 = \frac{2a_1 + 14r}{2} \cdot 15 \end{cases}$$

Przekształcając ten układ równoważnie, otrzymujemy

$$\begin{cases} -1 = a_1 + 2r \\ -11 = a_1 + 7r \end{cases}$$

Odejmując stronami równania układu, otrzymujemy

$$\begin{aligned} 10 &= -5r \\ r &= -2 \end{aligned}$$

Różnica ciągu jest równa (-2) .

Sposób II

Suma kolejnych piętnastu początkowych wyrazów ciągu arytmetycznego jest równa (-165) , zatem

$$\begin{aligned} a_1 + a_2 + a_3 + \dots + a_{15} &= -165 \\ (a_3 - 2r) + (a_3 - r) + a_3 + (a_3 + r) + (a_3 + 2r) + \dots + (a_3 + 12r) &= -165 \\ 15a_3 + (-2r - r + 0 + r + 2r + 3r + \dots + 12r) &= -165 \end{aligned}$$

gdzie $a_3 = -1$, a suma piętnastu liczb $(-2r - r + 0 + r + 2r + 3r + \dots + 12r)$ jest równa

$$\frac{-2r + 12r}{2} \cdot 15 = 75r$$

Zatem

$$15 \cdot (-1) + 75r = -165$$

$$75r = -150$$

$$r = -2$$

Różnica ciągu jest równa (-2) .

Sposób III

Suma kolejnych piętnastu początkowych wyrazów ciągu arytmetycznego jest równa (-165) , zatem

$$\frac{a_1 + a_{15}}{2} \cdot 15 = -165$$

$$a_1 + a_{15} = -22$$

$$(a_3 - 2r) + (a_3 + 12r) = -22$$

$$2a_3 + 10r = -22$$

Stąd i z tego, że $a_3 = -1$, otrzymujemy

$$2 \cdot (-1) + 10r = -22$$

Zatem

$$10r = -20$$

$$r = -2$$

Różnica ciągu jest równa (-2) .

Sposób IV

Suma kolejnych piętnastu początkowych wyrazów ciągu arytmetycznego jest równa (-165) , zatem

$$a_1 + a_2 + a_3 + \dots + a_{15} = -165$$

$$(a_8 - 7r) + (a_8 - 6r) + \dots + a_8 + \dots + (a_8 + 6r) + (a_8 + 7r) = -165$$

$$15a_8 = -165$$

$$a_8 = \frac{-165}{15} = -11$$

Korzystamy z własności ciągu arytmetycznego i otrzymujemy

$$\begin{aligned}a_8 &= a_3 + 5r \\ -11 &= -1 + 5r \\ r &= -2\end{aligned}$$

Różnica ciągu jest równa (-2) .

Sposób V

Korzystamy z własności ciągu arytmetycznego i otrzymujemy równania:

$$\begin{aligned}a_8 &= \frac{a_7 + a_9}{2} \\ a_8 &= \frac{a_6 + a_{10}}{2} \\ a_8 &= \frac{a_5 + a_{11}}{2} \\ a_8 &= \frac{a_4 + a_{12}}{2} \\ a_8 &= \frac{a_3 + a_{13}}{2} \\ a_8 &= \frac{a_2 + a_{14}}{2} \\ a_8 &= \frac{a_1 + a_{15}}{2}\end{aligned}$$

Zatem

$$\begin{aligned}a_1 + a_2 + \dots + a_{14} + a_{15} &= (a_1 + a_{15}) + (a_2 + a_{14}) + \dots + (a_7 + a_9) + a_8 = \\ &= 15a_8 = -165\end{aligned}$$

Stąd $a_8 = -11$. Ponieważ

$$a_8 = a_3 + 5r$$

więc otrzymujemy

$$\begin{aligned}-11 &= -1 + 5r \\ r &= -2\end{aligned}$$

Różnica ciągu jest równa (-2) .

Zadanie 18. (0–2)

Wymagania egzaminacyjne 2024	
Wymaganie ogólne	Wymagania szczegółowe
II. Wykorzystanie i tworzenie informacji. 1. Interpretowanie i operowanie informacjami przedstawionymi w tekście, zarówno matematycznym, jak i popularnonaukowym, a także w formie wykresów, diagramów, tabel.	Zdający: VII.1) wykorzystuje definicje funkcji [...] tangens dla kątów od 0° do 180° [...]; VII.2) korzysta z wzorów $\sin^2 \alpha + \cos^2 \alpha = 1$, $\operatorname{tg} \alpha = \frac{\sin \alpha}{\cos \alpha}$.

Zasady oceniania

2 pkt – wybranie dwóch odpowiedzi, z których obie są poprawne.

1 pkt – wybranie jednej lub dwóch odpowiedzi, z których jedna jest poprawna.

0 pkt – odpowiedź niepoprawna albo brak odpowiedzi.

Rozwiązanie

Wersja A

BF

Wersja B

CF

Zadanie 19. (0–1)

Wymagania egzaminacyjne 2024	
Wymaganie ogólne	Wymagania szczegółowe
IV. Rozumowanie i argumentacja. 4. Stosowanie i tworzenie strategii przy rozwiązywaniu zadań, również w sytuacjach nietypowych.	Zdający: VII.2) korzysta z wzorów $\sin^2 \alpha + \cos^2 \alpha = 1$, $\operatorname{tg} \alpha = \frac{\sin \alpha}{\cos \alpha}$.

Zasady oceniania

1 pkt – odpowiedź poprawna.

0 pkt – odpowiedź niepoprawna albo brak odpowiedzi.

Rozwiązanie

Wersja A

B

Wersja B

A

Zadanie 20. (0–1)

Wymagania egzaminacyjne 2024	
Wymaganie ogólne	Wymaganie szczegółowe
III. Wykorzystanie i interpretowanie reprezentacji. 1. Stosowanie obiektów matematycznych i operowanie nimi, interpretowanie pojęć matematycznych.	Zdający: VIII.7) stosuje twierdzenia: [...] o dwusiecznej kąta [...].

Zasady oceniania

1 pkt – odpowiedź poprawna.

0 pkt – odpowiedź niepoprawna albo brak odpowiedzi.

RozwiązanieWersja A
BWersja B
B**Zadanie 21. (0–1)**

Wymagania egzaminacyjne 2024	
Wymaganie ogólne	Wymaganie szczegółowe
II. Wykorzystanie i tworzenie informacji. 1. Interpretowanie i operowanie informacjami przedstawionymi w tekście, zarówno matematycznym, jak i popularnonaukowym, a także w formie wykresów, diagramów, tabel.	Zdający: VIII.11) stosuje funkcje trygonometryczne do wyznaczania długości odcinków w figurach płaskich oraz obliczania pól figur.

Zasady oceniania

1 pkt – odpowiedź poprawna.

0 pkt – odpowiedź niepoprawna albo brak odpowiedzi.

RozwiązanieWersja A
DWersja B
B

Zadanie 22. (0–1)

Wymagania egzaminacyjne 2024	
Wymaganie ogólne	Wymaganie szczegółowe
IV. Rozumowanie i argumentacja. 1. Przeprowadzanie rozumowań, także kilkuetapowych, podawanie argumentów uzasadniających poprawność rozumowania, odróżnianie dowodu od przykładu.	Zdający: VIII.5) stosuje własności kątów wpisanych i środkowych.

Zasady oceniania

1 pkt – odpowiedź poprawna.

0 pkt – odpowiedź niepoprawna albo brak odpowiedzi.

Rozwiązanie

Wersja A
C

Wersja B
D

Zadanie 23. (0–1)

Wymagania egzaminacyjne 2024	
Wymaganie ogólne	Wymaganie szczegółowe
III. Wykorzystanie i interpretowanie reprezentacji. 1. Stosowanie obiektów matematycznych i operowanie nimi, interpretowanie pojęć matematycznych.	Zdający: IX.2) posługuje się równaniem prostej na płaszczyźnie w postaci kierunkowej, w tym wyznacza równanie prostej o zadanych własnościach (takich jak na przykład [...] prostopadłość do innej prostej [...]).

Zasady oceniania

1 pkt – odpowiedź poprawna.

0 pkt – odpowiedź niepoprawna albo brak odpowiedzi.

Rozwiązanie

Wersja A
A

Wersja B
C

Zadanie 24. (0–2)

Wymagania egzaminacyjne 2024	
Wymaganie ogólne	Wymaganie szczegółowe
IV. Rozumowanie i argumentacja. 4. Stosowanie i tworzenie strategii przy rozwiązywaniu zadań, również w sytuacjach nietypowych.	Zdający: IX.3) oblicza odległość dwóch punktów w układzie współrzędnych.

Zasady oceniania

2 pkt – zastosowanie poprawnej metody i obliczenie długości boku BC : $|BC| = \sqrt{52}$.

1 pkt – zapisanie współrzędnych punktu C : $C = (14, 8)$

ALBO

– zapisanie współrzędnych punktu D : $D = (2, 12)$,

ALBO

– zapisanie współrzędnych środka S boku AB : $S = (4, 4)$ **oraz** zapisanie równości $|BC| = 2|PS|$,

ALBO

– zapisanie równości $\overrightarrow{CB} = 2 \cdot \overrightarrow{PA} + \overrightarrow{AB}$ **oraz** obliczenie współrzędnych wektorów \overrightarrow{PA} i \overrightarrow{AB} : $\overrightarrow{PA} = [-8, -1]$ oraz $\overrightarrow{AB} = [12, -4]$,

ALBO

– obliczenie długości odcinków AB , AP oraz BP i cosinusa kąta α oraz cosinusa kąta $(180^\circ - \alpha)$, gdzie $\alpha = |\angle APB|$: $|AB| = 4\sqrt{10}$ oraz $|AP| = \sqrt{65}$, oraz $|BP| = \sqrt{41}$, oraz $\cos \alpha = -\frac{27}{\sqrt{65} \cdot \sqrt{41}}$, oraz $\cos(180^\circ - \alpha) = \frac{27}{\sqrt{65} \cdot \sqrt{41}}$.

0 pkt – rozwiązanie, w którym zastosowano niepoprawną metodę, albo brak rozwiązania.

Uwagi:

1. Jeżeli zdający korzysta z punktów kratowych oraz błędnie zaznaczy w układzie współrzędnych co najmniej jeden z punktów A , B , C , P i na tej podstawie oblicza długość odcinka BC , to otrzymuje **0 punktów** za całe rozwiązanie (o ile nie nabył praw do innej punktacji).
2. Jeżeli zdający korzysta z punktów kratowych oraz poprawnie zaznaczy w układzie współrzędnych punkty A , B , C , P , lecz błędnie odczyta współrzędne jednego z tych punktów, i na tej podstawie oblicza długość odcinka BC , to otrzymuje **1 punkt** za całe rozwiązanie.
3. Jeżeli zdający obliczy długość odcinka BC , korzystając z przybliżonych wartości funkcji trygonometrycznych, to może otrzymać co najwyżej **1 punkt** za całe rozwiązanie.

Przykładowe pełne rozwiązania

Sposób I

Punkt P jest środkiem przekątnej AC . Ze wzoru na współrzędne środka odcinka otrzymujemy

$$\frac{-2 + x_c}{2} = 6 \quad \text{oraz} \quad \frac{6 + y_c}{2} = 7$$

Zatem $C = (14, 8)$.

Obliczamy długość odcinka BC :

$$|BC| = \sqrt{(14 - 10)^2 + (8 - 2)^2} = \sqrt{16 + 36} = \sqrt{52} = 2\sqrt{13}$$

Sposób II

Punkt P jest środkiem przekątnej BD . Ze wzoru na współrzędne środka odcinka otrzymujemy

$$\frac{10 + x_d}{2} = 6 \quad \text{oraz} \quad \frac{2 + y_d}{2} = 7$$

Zatem $D = (2, 12)$.

Obliczamy długość odcinka BC :

$$|BC| = |AD| = \sqrt{(2 + 2)^2 + (12 - 6)^2} = \sqrt{16 + 36} = \sqrt{52} = 2\sqrt{13}$$

Sposób III

Obliczamy współrzędne punktu S środka odcinka AB :

$$S = \left(\frac{-2 + 10}{2}, \frac{6 + 2}{2} \right)$$
$$S = (4, 4)$$

Obliczamy długość odcinka BC :

$$|BC| = 2|PS| = 2\sqrt{(4 - 6)^2 + (4 - 7)^2} = 2\sqrt{4 + 9} = 2\sqrt{13}$$

Zadanie 25.1. (0–1)

Wymagania egzaminacyjne 2024	
Wymaganie ogólne	Wymaganie szczegółowe
II. Wykorzystanie i tworzenie informacji. 1. Interpretowanie i operowanie informacjami przedstawionymi w tekście, zarówno matematycznym, jak i popularnonaukowym, a także w formie wykresów, diagramów, tabel.	Zdający: X.4) oblicza [...] pola powierzchni graniastosłupów [...].

Zasady oceniania

1 pkt – odpowiedź poprawna.

0 pkt – odpowiedź niepoprawna albo brak odpowiedzi.

Rozwiązanie

Wersja A

C

Wersja B

A

Zadanie 25.2. (0–1)

Wymagania egzaminacyjne 2024	
Wymaganie ogólne	Wymaganie szczegółowe
II. Wykorzystanie i tworzenie informacji. 1. Interpretowanie i operowanie informacjami przedstawionymi w tekście, zarówno matematycznym, jak i popularnonaukowym, a także w formie wykresów, diagramów, tabel.	Zdający: X.2) posługuje się pojęciem kąta między prostą a płaszczyzną.

Zasady oceniania

1 pkt – odpowiedź poprawna.

0 pkt – odpowiedź niepoprawna albo brak odpowiedzi.

Rozwiązanie

Wersja A

D

Wersja B

D

Zadanie 26. (0–1)

Wymagania egzaminacyjne 2024	
Wymaganie ogólne	Wymaganie szczegółowe
III. Wykorzystanie i interpretowanie reprezentacji. 2. Dobieranie i tworzenie modeli matematycznych przy rozwiązywaniu problemów praktycznych i teoretycznych.	Zdający: X.5) wykorzystuje zależność między objętościami graniastosłupów oraz ostrosłupów podobnych.

Zasady oceniania

1 pkt – odpowiedź poprawna.

0 pkt – odpowiedź niepoprawna albo brak odpowiedzi.

Rozwiązanie

4

Zadanie 27. (0–1)

Wymagania egzaminacyjne 2024	
Wymaganie ogólne	Wymaganie szczegółowe
III. Wykorzystanie i interpretowanie reprezentacji. 2. Dobieranie i tworzenie modeli matematycznych przy rozwiązywaniu problemów praktycznych i teoretycznych.	Zdający: XI.2) zlicza obiekty, stosując reguły mnożenia [...].

Zasady oceniania

1 pkt – odpowiedź poprawna.

0 pkt – odpowiedź niepoprawna albo brak odpowiedzi.

Rozwiązanie

Wersja A

C

Wersja B

D

Zadanie 28. (0–1)

Wymagania egzaminacyjne 2024	
Wymaganie ogólne	Wymaganie szczegółowe
IV. Rozumowanie i argumentacja. 2. Dostrzeganie regularności, podobieństw oraz analogii, formułowanie wniosków na ich podstawie i uzasadnianie ich poprawności.	Zdający: XII.2) oblicza średnią arytmetyczną [...].

Zasady oceniania

1 pkt – odpowiedź poprawna.

0 pkt – odpowiedź niepoprawna albo brak odpowiedzi.

RozwiązanieWersja A
AWersja B
C**Zadanie 29. (0–1)**

Wymagania egzaminacyjne 2024	
Wymaganie ogólne	Wymaganie szczegółowe
I. Sprawność rachunkowa. Wykonywanie obliczeń na liczbach rzeczywistych, także przy użyciu kalkulatora, stosowanie praw działań matematycznych przy przekształcaniu wyrażeń algebraicznych oraz wykorzystywanie tych umiejętności przy rozwiązywaniu problemów w kontekstach rzeczywistych i teoretycznych.	Zdający: XII.2) [...] znajduje medianę [...].

Zasady oceniania

1 pkt – odpowiedź poprawna.

0 pkt – odpowiedź niepoprawna albo brak odpowiedzi.

RozwiązanieWersja A
CWersja B
B

Zadanie 30. (0–2)

Wymagania egzaminacyjne 2024	
Wymaganie ogólne	Wymaganie szczegółowe
III. Wykorzystanie i interpretowanie reprezentacji. 2. Dobieranie i tworzenie modeli matematycznych przy rozwiązywaniu problemów praktycznych i teoretycznych.	Zdający: XII.1) oblicza prawdopodobieństwo w modelu klasycznym.

Zasady oceniania

2 pkt – zastosowanie poprawnej metody obliczenia prawdopodobieństwa zdarzenia A

i uzyskanie poprawnego wyniku: $P(A) = \frac{13}{25}$.

1 pkt – wypisanie wszystkich zdarzeń elementarnych lub obliczenie/podanie liczby tych zdarzeń: $|\Omega| = 5 \cdot 5$ lub sporządzenie tabeli o 25 polach odpowiadających zdarzeniom elementarnym, z których co najmniej jedno pole jest wypełnione, lub sporządzenie pełnego drzewa stochastycznego

ALBO

– wypisanie (lub zaznaczenie w tabeli) wszystkich zdarzeń elementarnych sprzyjających zdarzeniu A i niewypisanie żadnego niewłaściwego,

ALBO

– podanie liczby wszystkich zdarzeń elementarnych sprzyjających zdarzeniu A :

$|A| = 13$, o ile nie zostały zliczone błędne pary,

ALBO

– sporządzenie fragmentu drzewa stochastycznego, które zawiera wszystkie gałęzie sprzyjające zdarzeniu A oraz zapisanie prawdopodobieństwa na co najmniej jednym odcinku każdego z etapów doświadczenia,

ALBO

– podanie prawdopodobieństwa jednoelementowego zdarzenia (elementarnego): $\frac{1}{25}$,

ALBO

– zapisanie tylko $P(A) = \frac{13}{25}$.

0 pkt – rozwiązanie, w którym zastosowano niepoprawną metodę, albo brak rozwiązania.

Uwagi:

1. Jeżeli zdający zapisuje tylko liczby 13 lub 25 i z rozwiązania nie wynika znaczenie tych liczb, to otrzymuje **0 punktów** za całe rozwiązanie.

2. Jeżeli zdający rozważa losowanie bez zwracania, to otrzymuje **0 punktów**.

Przykładowe pełne rozwiązania*Sposób I*

Zdarzeniami elementarnymi są wszystkie uporządkowane pary liczb (x, y) , gdzie $x, y \in \{5, 6, 7, 8, 9\}$.

Liczbę wszystkich zdarzeń elementarnych obliczamy, korzystając z reguły mnożenia.

Moc zbioru Ω jest równa $5 \cdot 5 = 25$.

Liczbę wszystkich zdarzeń elementarnych sprzyjających zdarzeniu A obliczamy, korzystając z reguły mnożenia i reguły dodawania. Suma dwóch liczb naturalnych jest liczbą parzystą, gdy sumujemy dwie liczby parzyste lub dwie liczby nieparzyste. Stąd moc zbioru A jest równa $3 \cdot 3 + 2 \cdot 2 = 13$.

Zatem prawdopodobieństwo zdarzenia A jest równe $\frac{13}{25}$.

Sposób II

W tabeli literą A zaznaczamy zdarzenia elementarne sprzyjające zdarzeniu A (pary liczb, których suma jest liczbą parzystą).

	5	6	7	8	9
5	A		A		A
6		A		A	
7	A		A		A
8		A		A	
9	A		A		A


Moc zbioru Ω jest równa 25.

Zdarzeń sprzyjających wylosowaniu liczb, których suma jest parzysta, jest 13.

Zatem prawdopodobieństwo zdarzenia A jest równe $\frac{13}{25}$.

Sposób III (drzewo stochastyczne)

Rysujemy drzewo stochastyczne rozważanego doświadczenia.



Prawdopodobieństwo zdarzenia A jest równe

$$P(A) = \frac{2}{5} \cdot \frac{2}{5} + \frac{3}{5} \cdot \frac{3}{5} = \frac{13}{25}$$

Zadanie 31. (0–4)

Wymagania egzaminacyjne 2024	
Wymaganie ogólne	Wymaganie szczegółowe
III. Wykorzystanie i interpretowanie reprezentacji. 2. Dobieranie i tworzenie modeli matematycznych przy rozwiązywaniu problemów praktycznych i teoretycznych.	Zdający: XIII) rozwiązuje zadania optymalizacyjne w sytuacjach dających się opisać funkcją kwadratową.

Zasady oceniania dla sposobów I–V

4 pkt – poprawna metoda obliczenia obu wymiarów prostokąta oraz podanie poprawnego wyniku: $x = 4,5$ m oraz $y = 3$ m.

3 pkt – zapisanie poprawnego wzoru na sumę pól trzech prostokątów jako funkcji zmiennej x
oraz obliczenie argumentu, dla którego ta funkcja przyjmuje wartość największą:
 $x = 4,5$ m
ALBO

- zapisanie poprawnego wzoru na sumę pól trzech prostokątów jako funkcji zmiennej y
oraz obliczenie argumentu, dla którego ta funkcja przyjmuje wartość największą:
 $y = 3$ m,
 ALBO
 - zapisanie poprawnego wzoru na pole jednego prostokąta jako funkcji zmiennej x
oraz obliczenie argumentu, dla którego ta funkcja przyjmuje wartość największą:
 $x = 4,5$ m,
 ALBO
 - zapisanie poprawnego wzoru na pole jednego prostokąta jako funkcji zmiennej y
oraz obliczenie argumentu, dla którego ta funkcja przyjmuje wartość największą:
 $y = 3$ m.
- 2 pkt – zapisanie poprawnego wzoru na sumę pól trzech prostokątów w zależności od jednej zmiennej, np.: $P(x) = 3x\left(6 - \frac{2}{3}x\right)$, $P(x) = x(18 - 2x)$, $P(y) = 3\left(9 - \frac{3}{2}y\right)y$
 ALBO
- zapisanie poprawnego wzoru na pole jednego prostokąta w zależności od jednej zmiennej, np.: $P(x) = x\left(6 - \frac{2}{3}x\right)$, $P(y) = \left(9 - \frac{3}{2}y\right)y$.
- 1 pkt – zapisanie poprawnego związku między wymiarami jednego wybiegu a całkowitą długością siatki, np. $4x + 6y = 36$.
- 0 pkt – rozwiązanie, w którym zastosowano niepoprawną metodę, albo brak rozwiązania.

Uwagi:

1. Jeżeli zdający przyjmie $P = kxy$, gdzie $k > 0$ i $k \neq 1$, i $k \neq 3$, ale nie zapisze, że dla przyjętej wartości współczynnika k pole P osiąga wartość największą wtedy i tylko wtedy, gdy największą wartość osiąga iloczyn xy , to może otrzymać co najwyżej **3 punkty** (za zapisanie warunku początkowego, za obliczenie wymiaru x oraz obliczenie wymiaru y adekwatnie do obranego sposobu rozwiązania).
2. Jeżeli zdający zapisze błędną zależność między wymiarami jednego wybiegu a całkowitą długością siatki, ale jest ona postaci $ax + by = 36$, gdzie $a, b \in \{2, 3, 4, 5, 6\}$, i rozwiąże zadanie konsekwentnie do końca, to może otrzymać co najwyżej **3 punkty** za całe rozwiązanie (za konsekwentne: wyznaczenie wzoru funkcji pola, obliczenie wymiaru x oraz obliczenie wymiaru y , adekwatnie do obranego sposobu rozwiązania).
3. Jeżeli zdający zapisze poprawnie warunek początkowy $4x + 6y = 36$, a następnie sumę pól trzech prostokątów (lub pole jednego prostokąta) jako funkcję P jednej zmiennej i otrzyma wartość pierwszej współrzędnej wierzchołka paraboli zawierającej wykres funkcji P , która leży poza właściwą dziedziną funkcji P , to może otrzymać co najwyżej **2 punkty** za całe rozwiązanie (za zapisanie warunku początkowego i wzoru na sumę pól lub pole jednego prostokąta).
 Jeżeli natomiast zdający zapisze błędny warunek początkowy, ale taki jak wymieniony w uwadze 2., a następnie konsekwentnie do tego warunku wyznaczy sumę pól trzech prostokątów (lub pole jednego prostokąta) jako funkcję P jednej zmiennej i otrzyma wartość pierwszej współrzędnej wierzchołka paraboli zawierającej wykres funkcji P , która

leży poza dziedziną odpowiadającą wyznaczonej przez zdającego funkcji P , to może otrzymać co najwyżej **1 punkt** za całe rozwiązanie (za wyznaczenie wzoru funkcji P).

4. Jeżeli zdający zapisze sumę pól trzech prostokątów (lub pole jednego prostokąta) jako funkcję P jednej zmiennej, a następnie obliczy wartości tej funkcji dla pierwszej współrzędnej wierzchołka i dwóch argumentów leżących symetrycznie względem pierwszej współrzędnej wierzchołka, i nie odwoła się do własności wykresu funkcji kwadratowej, to otrzymuje co najwyżej **3 punkty** za całe rozwiązanie.
5. Jeżeli zdający nie zapisze sumy pól trzech prostokątów (lub jednego prostokąta) jako funkcji jednej zmiennej, a jedynie oblicza wartości pola dla wybranych par liczb x oraz y i na tej podstawie wskazuje największą wartość pola, to za całe rozwiązanie otrzymuje **0 punktów**, o ile nie nabył prawa do innej liczby punktów.
6. Jeżeli zdający oblicza największą wartość funkcji P , korzystając z rachunku różniczkowego, i nie uzasadni, że w punkcie będącym miejscem zerowym pochodnej funkcji P jest największa wartość funkcji P , to może otrzymać co najwyżej **3 punkty** za całe rozwiązanie.
- Za poprawne uzasadnienie, że w punkcie będącym miejscem zerowym pochodnej funkcji P jest największa wartość funkcji P , można uznać sytuację, gdy zdający bada znak pochodnej (np. szkicując wykres funkcji, która w ten sam sposób jak pochodna zmienia znak, i zaznaczając na rysunku, np. znakami „+” i „-”, znak pochodnej) **oraz**:
- opisuje (słownie lub graficznie - np. przy użyciu strzałek) monotoniczność funkcji P
 - LUB
 - zapisuje, że dla wyznaczonego miejsca zerowego pochodnej, funkcja P ma maksimum lokalne i jest to jednocześnie jej największa wartość,
 - LUB
 - zapisuje, że dla wyznaczonego miejsca zerowego pochodnej, funkcja P ma maksimum lokalne i jest to jedyne ekstremum tej funkcji.

Zasady oceniania dla sposobu VI

4 pkt – poprawna metoda obliczenia obu wymiarów prostokąta oraz podanie poprawnego wyniku: $x = 4,5$ m oraz $y = 3$ m.

3 pkt – zapisanie, że spośród prostokątów o danym obwodzie największe pole ma kwadrat

oraz zapisanie układu równań $\begin{cases} 4x + 6y = 36 \\ 2x = 3y \end{cases}$ **oraz** obliczenie $x = 4,5$ m

ALBO

– zapisanie, że spośród prostokątów o danym obwodzie największe pole ma kwadrat

oraz zapisanie układu równań $\begin{cases} 4x + 6y = 36 \\ 2x = 3y \end{cases}$ **oraz** obliczenie $y = 3$ m.

2 pkt – zapisanie, że spośród prostokątów o danym obwodzie największe pole ma kwadrat

oraz zapisanie układu równań $\begin{cases} 4x + 6y = 36 \\ 2x = 3y \end{cases}$

1 pkt – zapisanie związku między wymiarami prostokąta, np. $4x + 6y = 36$.

0 pkt – rozwiązanie, w którym zastosowano niepoprawną metodę, albo brak rozwiązania.

Przykładowe pełne rozwiązania*Sposób I*

Przyjmijmy oznaczenia jak na rysunku w zadaniu. Długość siatki użytej do wykonania ogrodzenia – po uwzględnieniu warunków zadania – można zapisać równaniem

$$4x + 6y = 36$$

Stąd wyznaczamy y : $y = 6 - \frac{2}{3}x$.

Z warunków zadania wynika, że

$$x > 0 \quad \text{ i } \quad y > 0$$

Niech P oznacza sumę pól podstaw trzech wybiegów.

Suma pól podstaw trzech wybiegów jest równa polu prostokąta o bokach długości x oraz $3y$.
Zatem

$$P = 3xy$$

Sumę pól podstaw trzech wybiegów zapisujemy jako funkcję jednej zmiennej x . W tym celu podstawiamy $y = 6 - \frac{2}{3}x$ i otrzymujemy

$$P(x) = 3x \left(6 - \frac{2}{3}x \right) = -2x^2 + 18x$$

Wyznaczamy dziedzinę funkcji P . Wykorzystamy związek między wymiarami x i y oraz wykorzystamy warunki, jakie te wymiary spełniają

$$y = 6 - \frac{2}{3}x > 0 \quad \text{ oraz } \quad x > 0$$

Zatem

$$x < 9 \quad \text{ oraz } \quad x > 0$$

Zmienna x może przyjmować wartości z przedziału $(0, 9)$.

Wykresem funkcji P jest fragment paraboli skierowanej ramionami do dołu. Obliczamy pierwszą współrzędną wierzchołka paraboli:

$$p = -\frac{18}{2 \cdot (-2)} = 4,5 \in (0, 9)$$

Zatem funkcja P przyjmuje wartość największą dla argumentu $4,5$.

Obliczamy drugi wymiar, dla którego suma pól podstaw trzech wybiegów jest największa

$$y = 6 - \frac{2}{3} \cdot 4,5 = 3$$

Suma pól podstaw trzech wybiegów jest największa, gdy: $x = 4,5$ m oraz $y = 3$ m.

Sposób II

Przyjmijmy oznaczenia jak na rysunku w zadaniu. Długość siatki użytej do wykonania ogrodzenia – po uwzględnieniu warunków zadania – można zapisać równaniem

$$4x + 6y = 36$$

Stąd wyznaczamy x : $x = 9 - \frac{3}{2}y$.

Z warunków zadania wynika, że

$$x > 0 \quad \text{i} \quad y > 0$$

Niech P oznacza sumę pól podstaw trzech wybiegów.

Suma pól podstaw trzech wybiegów jest równa polu prostokąta o bokach długości x oraz $3y$.
Zatem

$$P = 3xy$$

Sumę pól podstaw trzech wybiegów zapisujemy jako funkcję jednej zmiennej y . W tym celu podstawiamy $x = 9 - \frac{3}{2}y$ i otrzymujemy

$$P(y) = 3\left(9 - \frac{3}{2}y\right)y = -\frac{9}{2}y(y - 6)$$

Wyznaczamy dziedzinę funkcji P . Wykorzystamy związek między wymiarami x i y oraz wykorzystamy warunki, jakie te wymiary spełniają

$$x = 9 - \frac{3}{2}y > 0 \quad \text{oraz} \quad y > 0$$

Zatem

$$y < 6 \quad \text{oraz} \quad y > 0$$

Zmienna y może przyjmować wartości z przedziału $(0, 6)$.

Wykresem funkcji P jest fragment paraboli skierowanej ramionami do dołu. Pierwsza współrzędna wierzchołka paraboli jest średnią arytmetyczną pierwiastków równania:

$$-\frac{9}{2}y(y - 6) = 0$$

Zatem pierwsza współrzędna wierzchołka paraboli jest równa

$$p = \frac{0 + 6}{2} = 3 \in (0, 6)$$

Zatem funkcja P przyjmuje wartość największą dla argumentu 3.

Obliczamy drugi wymiar, dla którego suma pól podstaw trzech wybiegów jest największa:

$$x = 9 - \frac{3}{2} \cdot 3 = 4,5$$

Suma pól podstaw trzech wybiegów jest największa, gdy: $x = 4,5$ m oraz $y = 3$ m.

Sposób III

Przyjmijmy oznaczenia jak na rysunku w zadaniu. Niech z oznacza łączną szerokość trzech wybiegów. Wtedy $z = 3y$.

Długość siatki użytej do wykonanie ogrodzenia – po uwzględnieniu warunków zadania – można zapisać równaniem

$$4x + 2z = 36$$

Stąd wyznaczamy z : $z = 18 - 2x$.

Z warunków zadania wynika, że

$$x > 0 \quad \text{ i } \quad z > 0$$

Niech P oznacza sumę pól podstaw trzech wybiegów.

Suma pól podstaw trzech wybiegów jest równa polu prostokąta o bokach długości x oraz z .
Zatem

$$P = xz$$

Sumę pól podstaw trzech wybiegów zapisujemy jako funkcję jednej zmiennej x . W tym celu podstawiamy $z = 18 - 2x$ i otrzymujemy

$$P(x) = x(18 - 2x) = -2x^2 + 18x$$

Wyznaczamy dziedzinę funkcji P . Wykorzystamy związek między wymiarami x i z oraz wykorzystamy warunki, jakie te wymiary spełniają

$$z = 18 - 2x > 0 \quad \text{ oraz } \quad x > 0$$

Zatem

$$x < 9 \quad \text{ oraz } \quad x > 0$$

Zmienna x może przyjmować wartości z przedziału $(0, 9)$.

Wykresem funkcji P jest fragment paraboli skierowanej ramionami do dołu. Obliczamy pierwszą współrzędną wierzchołka paraboli:

$$p = -\frac{18}{2 \cdot (-2)} = 4,5 \in (0, 9)$$

Zatem funkcja P przyjmuje wartość największą dla argumentu 4,5.

Obliczamy drugi wymiar, dla którego suma pól podstaw trzech wybiegów jest największa:

$$z = 18 - 2 \cdot 4,5 = 18 - 9 = 9$$

$$y = \frac{z}{3} = \frac{9}{3} = 3$$

Suma pól podstaw trzech wybiegów jest największa, gdy $x = 4,5$ m oraz $y = 3$ m.