Hybrid Gradient Boosting + BiLSTM untuk Prediksi Polusi Udara:

Perbandingan Adil terhadap Rujukan SARIMA+BiLSTM (Necula et al., 2025)

Madajabbar Palapa Hakim, S.Kom — Tugas Mata Kuliah "Algorithms and Complexity"

Abstrak

Prediksi konsentrasi polutan udara (PM10, PM2.5, NO2) adalah masalah deret waktu dengan komponen musiman dan non-linear. Rujukan [7] (Necula et al., 2025) mengajukan hibrida SARIMA+BiLSTM: tahap-1 SARIMA menangkap tren/musiman, tahap-2 BiLSTM mengoreksi residual. Karya ini mereplikasi protokol rujukan dan mengganti tahap-1 SARIMA dengan gradient boosting (XGBoost), dengan tahap-2 BiLSTM yang identik. Pada protokol apple-to-apple (test 720 hari, window 120, horizon 1/7/30), XGBoost+BiLSTM menurunkan RMSE di semua 9 sel (3 polutan × 3 horizon), dengan perbaikan terbesar pada horizon-1: PM2.5 2.65×, PM10 2.52×, NO2 1.97×. Hasil ini menunjukkan nilai tambah GBM sebagai pengganti SARIMA dalam arsitektur hibrida neural.

1. Pendahuluan

Polusi udara berdampak kesehatan serius; prediksi akurat konsentrasi PM10, PM2.5, dan NO2 penting untuk sistem peringatan dini. Model statistik klasik (SARIMA) baik untuk komponen linear-musiman tetapi lemah pada pola non-linear; jaringan saraf (LSTM/BiLSTM) unggul pada non-linearitas tetapi butuh data besar. Hibrida statistik+neural menggabungkan keduanya.

Necula et al. [7] membangun hibrida SARIMA+BiLSTM (juga varian Attention dan Fourier) pada data harian Rumania 2019–2023 (1.826 baris; PM10, PM2.5, NO2). Karya ini mengambil protokol yang sama tetapi mengganti tahap-1 SARIMA dengan gradient boosting. Pertanyaan penelitian: apakah GBM lebih baik daripada SARIMA sebagai tahap-1 ketika tahap-2 neural dibuat identik?

2. Data dan Metode

2.1 Data

Data mengikuti rujukan [7]: konsentrasi harian PM10, PM2.5, NO2, 1.826 hari. Preprocessing: parsing tanggal, pengurutan, transformasi Box-Cox pada setiap seri, dan standardisasi MinMax pada residual (scaler di-fit hanya pada data latih untuk menghindari informasi leakage).

2.2 Arsitektur hibrida

Hibrida dua tahap:

• Tahap-1 (dasar): rujukan memakai SARIMA (auto_arima + statsmodels SARIMAX). Karya ini menggantinya dengan XGBoost (gradient boosting) dan LightGBM sebagai pembanding. Fit pada latih, forecast test 720 hari.

• Tahap-2 (koreksi residual): BiLSTM dua lapis (64–512 unit), Dropout 0.1–0.5, memetakan deret residual ke prediksi residual. Arsitektur & tuning sama untuk kedua tahap-1 agar adil.

• Output hybrid: final = prediksi tahap-1 + prediksi residual tahap-2.

2.3 Protokol evaluasi (apple-to-apple)

Split tunggal: latih = 1.106 hari, test = 720 hari (sama persis dengan rujukan). Window = 120 hari. Horizon = 1/7/30 hari. Metrik: RMSE, MAE, MAPE (semua pada skala Box-Cox, konsisten dengan rujukan). Rujukan dinilai ulang pada pipeline yang sama tanpa mengubah hyperparameter; perbandingan langsung SARIMA vs XGBoost pada tahap-1 dengan tahap-2 identik.

3. Hasil

Tabel 1 menyajikan perbandingan adil antara model rujukan SARIMA+BiLSTM dan model penelitian ini XGBoost+BiLSTM, mengikuti format Tabel 8 pada Necula et al. (2025). Kolom menyajikan RMSE, MAE, dan MAPE untuk tiap polutan pada horizon 1, 7, dan 30 hari.

Tabel 1. Perbandingan model: RMSE, MAE, dan MAPE untuk PM10, PM2.5, dan NO2 pada berbagai horizon.

Pollutant	Model	RMSE	MAE	MAPE (%)
PM10	1-Day Horizon			
	SARIMA + BiLSTM (rujukan)	0.4095	0.3003	11.67
	XGBoost + BiLSTM	0.1623	0.1195	4.87


	(penelitian ini)			
PM10	7-Day Horizon			
	SARIMA + BiLSTM (rujukan)	0.3925	0.2813	11.31
	XGBoost + BiLSTM (penelitian ini)	0.3393	0.2574	10.28
PM10	30-Day Horizon			
	SARIMA + BiLSTM (rujukan)	0.4048	0.3026	11.85
	XGBoost + BiLSTM (penelitian ini)	0.2896	0.2154	8.45
PM2.5	1-Day Horizon			
	SARIMA + BiLSTM (rujukan)	0.3293	0.2579	12.92
	XGBoost + BiLSTM (penelitian ini)	0.1242	0.0913	4.94
PM2.5	7-Day Horizon			
	SARIMA + BiLSTM (rujukan)	0.3200	0.2517	12.28
	XGBoost + BiLSTM (penelitian ini)	0.2698	0.2025	10.73
PM2.5	30-Day Horizon			
	SARIMA + BiLSTM (rujukan)	0.3199	0.2547	12.20
	XGBoost + BiLSTM (penelitian ini)	0.2401	0.1829	9.63
NO2	1-Day Horizon			
	SARIMA +	1.7172	1.3604	14.13

	BiLSTM (rujukan)			
	XGBoost + BiLSTM (penelitian ini)	0.8704	0.6846	7.54
NO2	7-Day Horizon			
	SARIMA + BiLSTM (rujukan)	1.6997	1.3438	14.11
	XGBoost + BiLSTM (penelitian ini)	1.5405	1.2215	13.64
NO2	30-Day Horizon			
	SARIMA + BiLSTM (rujukan)	1.6345	1.2898	13.91
	XGBoost + BiLSTM (penelitian ini)	1.3851	1.0964	11.72


Tabel mengikuti format Tabel 8 pada Necula et al. (2025). Semua metrik pada skala Box-Cox (sama seperti rujukan).

3.1 Grafik perbandingan seri

Gambar 1–2 menampilkan seri aktual vs prediksi untuk SARIMA+BiLSTM (merah, rujukan) dan XGBoost+BiLSTM (hijau, karya ini) pada horizon 1/7/30 untuk PM2.5 dan NO2. Pada horizon-1, prediksi XGBoost jauh lebih mengikuti fluktuasi aktual; perbedaan menyempit seiring horizon bertambah (konsisten dengan rasio RMSE yang mendekati 1 pada h7/h30).



Gambar 1. Perbandingan seri PM2.5 (Box-Cox) — aktual vs SARIMA+BiLSTM vs XGBoost+BiLSTM, horizon 1/7/30.



Gambar 2. Perbandingan seri NO2 — aktual vs SARIMA+BiLSTM vs XGBoost+BiLSTM, horizon 1/7/30.

4. Diskusi

• Konsistensi: XGBoost+BiLSTM unggul di 9/9 sel. Perbaikan terbesar di horizon-1 (PM2.5 2.65×; PM10 2.52×; NO2 1.97×), mengecil di h7 dan h30. Ini menunjukkan GBM lebih baik menangkap pola jangka pendek yang non-linear daripada SARIMA.

• Interpretasi: SARIMA mengasumsikan struktur linear dan cocok untuk musiman jangka panjang; sebaliknya XGBoost (tree ensemble) menangkap interaksi non-linear dan fitur lokal, sehingga unggul pada residual jangka pendek. Tahap-2 BiLSTM yang identik menunjukkan perbedaan semata-mata berasal dari tahap-1.

• Perbandingan dengan rujukan: pada rujukan, hibrida SARIMA+BiLSTM hanya mereduksi RMSE 3–11% vs SARIMA polos (Tabel 7 pada [7]); pada penelitian ini, mengganti SARIMA dengan XGBoost memberi reduksi hingga 62% vs SARIMA+BiLSTM (PM2.5 h1: 0.3293 → 0.1242). Perlu dicatat kedua angka diukur pada pipeline berbeda (rujukan memakai split yang sama tetapi pipeline tuning sendiri), sehingga perbandingan lintas-paper bersifat indikatif.

• Keterbatasan: split tunggal (bukan multi-fold) seperti rujukan → estimasi error bervariansi tinggi; hasil ini adalah indikasi, bukan klaim statistik kuat. Data adalah satu kota (Rumania), sehingga generalisasi ke kota lain perlu diuji. Hyperparameter sarima & GBM tidak dicari ulang secara ekshaustif di paper ini.

5. Kesimpulan

Mengganti SARIMA dengan XGBoost pada tahap-1 arsitektur hibrida SARIMA+BiLSTM rujukan meningkatkan akurasi di semua 9 kombinasi polutan-horizon pada protokol apple-to-apple. Perbaikan terbesar pada horizon-1 (hingga 2.65×). Karya ini menebus kelemahan rujukan (scaler di-fit pada test = information leakage; single-split) dengan protokol yang lebih

bersih dan reproduktibel. Arah lanjut: multi-fold roll-forward, hiperparameter tuning ekshaustif, dan uji lintas kota.

Referensi

[7] Necula, C.; Hauer, M.; Fotache, D.; Hurbean, E. Advanced Hybrid Models for Air Pollution Forecasting: Combining SARIMA and BiLSTM Architectures. Electronics 2025, 14(3), 549. https://doi.org/10.3390/electronics14030549

Data & kode rujukan: github.com/elephant2015/Code4PollutantsBiLSTM