

# Primitive grafice. Fața și spatele unui poligon convex

Mihai-Sorin Stupariu

Sem. I, 2023 - 2024

## Condiții pentru poligoane

Vector normal. Fața și spatele unui poligon convex

## Exemple

# Motivație

- ▶ Codurile sursă 01\_04\_poligoane\_0LD.cpp (funcția `RenderFunction3`), 02\_02\_fata\_spate\_poligon.cpp, 02\_03\_poligoane3D\_ex1\_0LD.cpp, 02\_04\_poligoane3D.cpp.

# Motivație

- ▶ Codurile sursă 01\_04\_poligoane\_OLD.cpp (funcția `RenderFunction3`), 02\_02\_fata\_spate\_poligon.cpp, 02\_03\_poligoane3D\_ex1\_OLD.cpp, 02\_04\_poligoane3D.cpp.
- ▶ Ce proprietăți geometrice sunt / NU sunt implementate în OpenGL?

# Motivație

- ▶ Codurile sursă 01\_04\_poligoane\_OLD.cpp (funcția `RenderFunction3`), 02\_02\_fata\_spate\_poligon.cpp, 02\_03\_poligoane3D\_ex1\_OLD.cpp, 02\_04\_poligoane3D.cpp.
- ▶ Ce proprietăți geometrice sunt / NU sunt implementate în OpenGL?
  - ▶ **NU:** reguli pentru aplicarea opțiunii `GL_POLYGON` - **se presupune că vârfurile determină un poligon convex** (exemplificare: luați  $A_1 = (0, 0)$ ,  $A_2 = (200, 0)$ ,  $A_3 = (200, 200)$ ,  $A_4 = (140, 60)$  și desenați, folosind modul `GL_POLYGON`, poligonul  $A_1A_2A_3A_4$ , apoi poligonul  $A_4A_1A_2A_3$ )

# Motivație

- ▶ Codurile sursă 01\_04\_poligoane\_OLD.cpp (funcția `RenderFunction3`), 02\_02\_fata\_spate\_poligon.cpp, 02\_03\_poligoane3D\_ex1\_OLD.cpp, 02\_04\_poligoane3D.cpp.
- ▶ Ce proprietăți geometrice sunt / NU sunt implementate în OpenGL?
  - ▶ **NU:** reguli pentru aplicarea opțiunii `GL_POLYGON` - **se presupune că vârfurile determină un poligon convex** (exemplificare: luați  $A_1 = (0, 0)$ ,  $A_2 = (200, 0)$ ,  $A_3 = (200, 200)$ ,  $A_4 = (140, 60)$  și desenați, folosind modul `GL_POLYGON`, poligonul  $A_1A_2A_3A_4$ , apoi poligonul  $A_4A_1A_2A_3$ )
  - ▶ **DA:** fața și spatele unui poligon convex

# Reguli pentru aplicarea opțiunii GL\_POLYGON

Se presupune că opțiunea GL\_POLYGON este utilizată pentru un șir de vârfuri  $P_1, P_2, \dots, P_N$ , distincte două câte două. Reguli referitoare la vârfurile indicate, pentru ca poligonul să poată fi desenat:

# Reguli pentru aplicarea opțiunii GL\_POLYGON

Se presupune că opțiunea GL\_POLYGON este utilizată pentru un șir de vârfuri  $P_1, P_2, \dots, P_N$ , distincte două câte două. Reguli referitoare la vârfurile indicate, pentru ca poligonul să poată fi desenat:

1. Punctele trebuie să fie coplanare, dar nu coliniare.



# Reguli pentru aplicarea opțiunii GL\_POLYGON

Se presupune că opțiunea GL\_POLYGON este utilizată pentru un șir de vârfuri  $P_1, P_2, \dots, P_N$ , distincte două câte două. Reguli referitoare la vârfurile indicate, pentru ca poligonul să poată fi desenat:

1. Punctele trebuie să fie coplanare, dar nu coliniare.
2. Vârfurile trebuie indicate în ordinea corectă, astfel încât linia poligonală să nu aibă autointersecții.

# Reguli pentru aplicarea opțiunii GL\_POLYGON

Se presupune că opțiunea GL\_POLYGON este utilizată pentru un șir de vârfuri  $P_1, P_2, \dots, P_N$ , distincte două câte două. Reguli referitoare la vârfurile indicate, pentru ca poligonul să poată fi desenat:

1. Punctele trebuie să fie coplanare, dar nu coliniare.
2. Vârfurile trebuie indicate în ordinea corectă, astfel încât linia poligonală să nu aibă autointersecții.
3. Poligonul trebuie să fie convex.

# Reguli pentru aplicarea opțiunii GL\_POLYGON

Se presupune că opțiunea GL\_POLYGON este utilizată pentru un șir de vârfuri  $P_1, P_2, \dots, P_N$ , distincte două câte două. Reguli referitoare la vârfurile indicate, pentru ca poligonul să poată fi desenat:

1. Punctele trebuie să fie coplanare, dar nu coliniare.
2. Vârfurile trebuie indicate în ordinea corectă, astfel încât linia poligonală să nu aibă autointersecții.
3. Poligonul trebuie să fie convex.

În continuare primele două subpuncte sunt descrise succint, pentru cel de-al treilea sunt prezentate mai multe detalii (fapt esențial: **pentru un poligon convex vom putea defini fața și spatele poligonului**).

# 1. Coplanaritatea

**De verificat:** condiția de coplanaritate

$$\text{rang} \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 & \dots & 1 \\ x_{P_1} & x_{P_2} & x_{P_3} & \dots & x_{P_N} \\ y_{P_1} & y_{P_2} & y_{P_3} & \dots & y_{P_N} \\ z_{P_1} & z_{P_2} & z_{P_3} & \dots & z_{P_N} \end{pmatrix} = 3 \quad (1)$$

sau faptul că

$$\dim_{\mathbb{R}} \langle \overrightarrow{P_1 P_2}, \overrightarrow{P_1 P_3}, \dots, \overrightarrow{P_1 P_N} \rangle = 2. \quad (2)$$

**Fapt:** O condiție alternativă este coliniaritatea vectorilor  $\overrightarrow{P_1 P_2} \times \overrightarrow{P_2 P_3}$ ,  $\overrightarrow{P_2 P_3} \times \overrightarrow{P_3 P_4}$ ,  $\dots$ ,  $\overrightarrow{P_{N-1} P_N} \times \overrightarrow{P_N P_1}$ ,  $\overrightarrow{P_N P_1} \times \overrightarrow{P_1 P_2}$ . Altfel spus: punctele  $P_1, P_2, \dots, P_N$  sunt coplanare dacă și numai dacă vectorii  $\overrightarrow{P_{i-1} P_i} \times \overrightarrow{P_i P_{i+1}}$  ( $i = 1, \dots, N$ , cu convenții modulo  $N$ ) sunt coliniari.

## Exemplu

Punctele  $P_1 = (7, 1, 1)$ ,  $P_2 = (-3, 3, 9)$ ,  $P_3 = (1, -1, 9)$ ,  $P_4 = (8, -4, 5)$  sunt coplanare.

$$\overrightarrow{P_1P_2} \times \overrightarrow{P_2P_3} = (32, 32, 32)$$

$$\overrightarrow{P_2P_3} \times \overrightarrow{P_3P_4} = (16, 16, 16)$$

$$\overrightarrow{P_3P_4} \times \overrightarrow{P_4P_1} = (32, 32, 32)$$

$$\overrightarrow{P_4P_1} \times \overrightarrow{P_1P_2} = (48, 48, 48)$$

vectorii sunt proporționali,  
deci coliniari  
 $\Leftrightarrow$  punctele sunt  
coplanare

$$\overrightarrow{P_1P_2} = P_2 - P_1 = (-3, 3, 9) - (7, 1, 1) = (-10, 2, 8)$$

$$\overrightarrow{P_2P_3} = P_3 - P_2 = (1, -1, 9) - (-3, 3, 9) = (4, -4, 0)$$

$$\overrightarrow{P_1P_2} \times \overrightarrow{P_2P_3} = \begin{vmatrix} -10 & 4 & e_1 \\ 2 & -4 & e_2 \\ 8 & 0 & e_3 \end{vmatrix} \xrightarrow[\text{ultima coloană}]{\text{dezv.}} \begin{vmatrix} 2 & -4 \\ 8 & 0 \end{vmatrix} e_1 - \begin{vmatrix} -10 & 4 \\ 8 & 0 \end{vmatrix} e_2 +$$

$$+ \begin{vmatrix} -10 & 4 \\ 2 & -4 \end{vmatrix} e_3 = 32e_1 + 32e_2 + 32e_3 = (32, 32, 32)$$

## Exemplu

Punctele  $P_1 = (7, 1, 1)$ ,  $P_2 = (-3, 3, 9)$ ,  $P_3 = (1, -1, 9)$ ,  $P_4 = (11, -3, 1)$  sunt coplanare.

$$\overrightarrow{P_1P_2} \times \overrightarrow{P_2P_3} = (32, 32, 32)$$

$$\overrightarrow{P_2P_3} \times \overrightarrow{P_3P_4} = (16, 16, 16)$$

$$\overrightarrow{P_3P_4} \times \overrightarrow{P_4P_1} = (32, 32, 32)$$

$$\overrightarrow{P_4P_1} \times \overrightarrow{P_1P_2} = (48, 48, 48)$$

## 2. Linie poligonală fără autointersecții

**De verificat:** intersecții de segmente.


**Varianta 1** Segmentele  $[AB]$  și  $[CD]$  se intersectează  $\Leftrightarrow A$  și  $B$  sunt de o parte și de alta a dreptei  $CD$  și  $C$  și  $D$  sunt de o parte și de alta a dreptei  $AB$ . Două puncte  $M$  și  $N$  sunt de o parte și de alta a dreptei  $d$  de ecuație  $f(x, y) = \alpha x + \beta y + \gamma = 0 \Leftrightarrow f(M) \cdot f(N) < 0$ .

**Varianta 2** Se folosește reprezentarea segmentelor cu ajutorul combinațiilor afine. Segmentele  $[AB]$  și  $[CD]$  se intersectează  $\Leftrightarrow$

$$\exists s_0, t_0 \in [0, 1] \quad \text{a.î.} \quad (1 - t_0)A + t_0B = (1 - s_0)C + s_0D.$$

Această variantă poate fi aplicată și în context 3D.

### 3. Convexitatea poligonului - figura



În cazul unui poligon convex, vectorii  $\vec{P_1P_2} \times \vec{P_2P_3}$ ,  $\vec{P_2P_3} \times \vec{P_3P_4}, \dots$  au același sens (și reciproc!)



### 3. Convexitatea poligonului

**De verificat:** convexitatea (folosind produse vectoriale).

**Observație.** (i) Fie  $\mathcal{P} = (P_1, P_2, \dots, P_N)$  un poligon (sensul de parcurgere este important!). Poligonul  $\mathcal{P}$  este convex dacă și numai dacă pentru orice trei vârfuri consecutive  $P_{i-1}, P_i, P_{i+1}$  (modulo  $N$ ) ale poligonului sensul

vectorul  $\overrightarrow{P_{i-1}P_i} \times \overrightarrow{P_iP_{i+1}}$  este independent de  $i$ .

(ii) Vectorii menționați au toți aceeași direcție (perpendiculari pe planul poligonului), deoarece punctele sunt coplanare (vezi condiția 1).

(iii) Pentru un poligon convex, vectorul

$$n = \frac{\overrightarrow{P_{i-1}P_i} \times \overrightarrow{P_iP_{i+1}}}{\|\overrightarrow{P_{i-1}P_i} \times \overrightarrow{P_iP_{i+1}}\|}$$

este independent de  $i$ .

**Exemplu.** Punctele  $P_1 = (7, 1, 1)$ ,  $P_2 = (-3, 3, 9)$ ,  $P_3 = (1, -1, 9)$ ,  $P_4 = (11, -3, 1)$  determină un poligon convex.

## Definiție - vector normal

**Lemă.** Pentru un poligon convex, vectorul

$$\mathbf{n} = \frac{\overrightarrow{P_{i-1}P_i} \times \overrightarrow{P_iP_{i+1}}}{\| \overrightarrow{P_{i-1}P_i} \times \overrightarrow{P_iP_{i+1}} \|}$$

este independent de  $i$ .

**Definiție.** Fie  $(P_1, P_2, \dots, P_N)$  un poligon convex. Se alege  $i = 1, \dots, n$ . Vectorul


$$\mathbf{n} = \frac{\overrightarrow{P_{i-1}P_i} \times \overrightarrow{P_iP_{i+1}}}{\| \overrightarrow{P_{i-1}P_i} \times \overrightarrow{P_iP_{i+1}} \|}$$

se numește **vector normal (normală)** la planul poligonului / poligonul  $(P_1, P_2, \dots, P_N)$ .

# Convexitatea poligonului - observație

Obs. Fie  $(P_1, P_2, \dots, P_n)$  un poligon convex.

- (i) Parcurgerea  $P_1 P_2 \dots P_n \longrightarrow$  vector normal  $\mathbf{n}$
- (ii) Parcurgerea  $P_n P_{n-1} \dots P_1 \longrightarrow$   $-\mathbf{n}$



## Modalitate de calcul (I)

1. Se aleg trei vârfuri consecutive, de exemplu  $P_1, P_2, P_3$ , având coordonatele  $P_1 = (x_{P_1}, y_{P_1}, z_{P_1})$ ,  $P_2 = (x_{P_2}, y_{P_2}, z_{P_2})$ , respectiv  $P_3 = (x_{P_3}, y_{P_3}, z_{P_3})$ .

## Modalitate de calcul (I)

1. Se aleg trei vârfuri consecutive, de exemplu  $P_1, P_2, P_3$ , având coordonatele  $P_1 = (x_{P_1}, y_{P_1}, z_{P_1})$ ,  $P_2 = (x_{P_2}, y_{P_2}, z_{P_2})$ , respectiv  $P_3 = (x_{P_3}, y_{P_3}, z_{P_3})$ .
2. Se scrie ecuația planului determinat de cele trei puncte sub forma

$$Ax + By + Cz + D = 0,$$

unde coeficienții  $A, B, C$  și  $D$  sunt dați de formulele

$$A = \begin{vmatrix} y_{P_1} & z_{P_1} & 1 \\ y_{P_2} & z_{P_2} & 1 \\ y_{P_3} & z_{P_3} & 1 \end{vmatrix}, \quad B = - \begin{vmatrix} x_{P_1} & z_{P_1} & 1 \\ x_{P_2} & z_{P_2} & 1 \\ x_{P_3} & z_{P_3} & 1 \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} x_{P_1} & 1 & z_{P_1} \\ x_{P_2} & 1 & z_{P_2} \\ x_{P_3} & 1 & z_{P_3} \end{vmatrix},$$

$$C = \begin{vmatrix} x_{P_1} & y_{P_1} & 1 \\ x_{P_2} & y_{P_2} & 1 \\ x_{P_3} & y_{P_3} & 1 \end{vmatrix}, \quad D = - \begin{vmatrix} x_{P_1} & y_{P_1} & z_{P_1} \\ x_{P_2} & y_{P_2} & z_{P_2} \\ x_{P_3} & y_{P_3} & z_{P_3} \end{vmatrix},$$

fiind deduși din condiția de colinearitate

$$\begin{vmatrix} x & y & z & 1 \\ x_{P_1} & y_{P_1} & z_{P_1} & 1 \\ x_{P_2} & y_{P_2} & z_{P_2} & 1 \\ x_{P_3} & y_{P_3} & z_{P_3} & 1 \end{vmatrix} = 0.$$

Pe scurt: se dezvoltă după linia I determinantul de mai sus.

## Modalitate de calcul (II)

3 Are loc relația

$$\overrightarrow{P_1P_2} \times \overrightarrow{P_2P_3} = (A, B, C).$$

## Modalitate de calcul (II)

3 Are loc relația

$$\overrightarrow{P_1P_2} \times \overrightarrow{P_2P_3} = (A, B, C).$$

4 În final:

$$n = \frac{1}{\sqrt{A^2 + B^2 + C^2}}(A, B, C).$$

## Modalitate de calcul (II)

3 Are loc relația

$$\overrightarrow{P_1P_2} \times \overrightarrow{P_2P_3} = (A, B, C).$$

4 În final:

$$\mathbf{n} = \frac{1}{\sqrt{A^2 + B^2 + C^2}}(A, B, C).$$

5 În particular, există o legătură între vectorul  $\mathbf{n} = \frac{1}{\sqrt{A^2+B^2+C^2}}(A, B, C)$  și ecuația  $Ax + By + Cz + D = 0$  asociată planului poligonului considerat (observați ce se întâmplă dacă se schimbă ordinea parcurgerii vârfurilor!).



## Conceptul de față / spate ale unui poligon convex

Considerăm un poligon  $(P_1, P_2, \dots, P_n)$  pentru care am calculat ecuația planului  $Ax + By + Cz + D = 0$  ca pe slide-ul 12 (ordinea parcurgerii vârfurilor contează!).

**Definiție.** Pentru un punct  $M = (x, y, z) \in \mathbb{R}^3$  notăm

$$\pi(M) = \pi(x, y, z) = Ax + By + Cz + D.$$

Noțiunile de **față/spate** a planului poligonului (și, implicit, a poligonului convex fixat) sunt definite astfel:

- $M = (x, y, z)$  se află **în fața planului (poligonului)**  
 $\Leftrightarrow \pi(M) = \pi(x, y, z) > 0;$

## Conceptul de față / spate ale unui poligon convex

Considerăm un poligon  $(P_1, P_2, \dots, P_n)$  pentru care am calculat ecuația planului  $Ax + By + Cz + D = 0$  ca pe slide-ul 12 (ordinea parcurgerii vârfurilor contează!).

**Definiție.** Pentru un punct  $M = (x, y, z) \in \mathbb{R}^3$  notăm


$$\pi(M) = \pi(x, y, z) = Ax + By + Cz + D.$$

Noțiunile de **față/spate** a planului poligonului (și, implicit, a poligonului convex fixat) sunt definite astfel:

- $M = (x, y, z)$  se află **în fața planului (poligonului)**  
 $\Leftrightarrow \pi(M) = \pi(x, y, z) > 0;$
- $M = (x, y, z)$  se află **în spatele planului (poligonului)**  
 $\Leftrightarrow \pi(M) = \pi(x, y, z) < 0.$

# Interpretare - "normala indică fața poligonului"

Presupunem că  $D = 0$ , adică planul trece prin originea  $O = (0, 0, 0)$ .



Este în fața poligonului  
 $\Leftrightarrow Ax + By + Cz > 0$ , unde  $M = (x, y, z)$   
 ↓  
 produs scalar între vectorii  
 $(A, B, C)$  și  $(x, y, z)$

$$\Leftrightarrow \langle (A, B, C), (x, y, z) \rangle > 0$$

$$\Leftrightarrow \langle n, \overrightarrow{OM} \rangle > 0 \quad (\overrightarrow{OM} = (x, y, z))$$

$$\Leftrightarrow \cos(\angle(n, \overrightarrow{OM})) > 0 \Leftrightarrow$$

$$\Leftrightarrow \angle(n, \overrightarrow{OM}) < 90^\circ$$

$\Leftrightarrow n$  și  $\overrightarrow{OM}$  sunt de aceeași  
 parte a planului.

$\Leftrightarrow$  Normala indică fața poligonului (convex)

## Interpretare - sinteză

- ▶ Presupunem că  $D = 0$ , deci planul trece prin origine, iar ecuația sa este  $\pi(x, y, z) = Ax + By + Cz = 0$ .
- ▶ Considerând vectorul  $n = (A, B, C)$  care direcționează normala la plan, avem  $\pi(A, B, C) > 0$ , deci vectorul  $n$  indică partea din față a poligonului (planului).
- ▶ În general, un vector  $(x, y, z)$  este orientat înspre partea din față a planului dacă  $\pi(x, y, z) > 0$ , i.e.  $\langle (x, y, z), n, \rangle > 0$ , ceea ce înseamnă că proiecția vectorului  $(x, y, z)$  pe  $N$  este la fel orientată ca și  $n$ .
- ▶ Prin translație, aceste rezultate pot fi extinse pentru un plan arbitrar. Mai mult, presupunând că parcurgem poligonul  $(A_1, A_2, \dots, A_n)$  în sens trigonometric și că rotim un burghiu drept în sensul indicat de această parcurgere, acesta se va deplasa în sensul indicat de vectorul  $N$ , deci înspre fața poligonului (vezi figura).

## De reținut

- Pentru un poligon convex putem defini fața / spatele poligonului. Ordinea parcurgerii vârfurilor este esențială!

## De reținut

- ▶ Pentru un poligon convex putem defini fața / spatele poligonului. Ordinea parcurgerii vârfurilor este esențială!
- ▶ Putem stabili dacă un punct este în fața / spatele unui poligon cu un criteriu **algebric**, folosind ecuația planului asociat (vezi slide 14 - aceasta este definiția formală).

## De reținut


- ▶ Pentru un poligon convex putem defini fața / spatele poligonului. Ordinea parcurgerii vârfurilor este esențială!
- ▶ Putem stabili dacă un punct este în fața / spatele unui poligon cu un criteriu **algebric**, folosind ecuația planului asociat (vezi slide 14 - aceasta este definiția formală).
- ▶ Conceptul de față / spate pentru un poligon convex este legat de vectorul normal (normală), care indică fața poligonului.

## De reținut


- ▶ Pentru un poligon convex putem defini fața / spatele poligonului. Ordinea parcurgerii vârfurilor este esențială!
- ▶ Putem stabili dacă un punct este în fața / spatele unui poligon cu un criteriu **algebric**, folosind ecuația planului asociat (vezi slide 14 - aceasta este definiția formală).
- ▶ Conceptul de față / spate pentru un poligon convex este legat de vectorul normal (normală), care indică fața poligonului.
- ▶ **Intuitiv / geometric:** din față un poligon este văzut ca fiind parcurs în sens trigonometric, iar din spate un poligon este văzut ca fiind parcurs în sens orar (vezi slide 15).



De reținut (și de aplicat la cerința 2, L2)!



## De reținut (și de aplicat la cerința 2, L2)!




Considerăm figura de mai sus. Dacă în codul sursă vârfurile sunt indicate în ordinea  $A_1, A_3, A_2$ , atunci triunghiul din figură este “văzut din față” și se aplică regulile pentru `GL_FRONT`, iar dacă sunt indicate în ordinea  $A_1, A_2, A_3$ , atunci triunghiul este “văzut din spate” și se aplică regulile pentru `GL_BACK`. Ordinea de parcurgere face referire la modul implicit (`GL_CCW`).

## Exemplul 1. Cod sursă 02\_03\_poligoane3D\_ex1\_0LD.cpp

$$A_1 = (5, -5, 5), A_2 = (-5, -5, 5), A_3 = (-5, 5, 5), A_4 = (5, 5, 5)$$

Explicație geometrică




↓  
 $0 = (0, 0, 0)$  este  
 situat în fața poligonului


## Exemplul 1. Cod sursă 02\_03\_poligoane3D\_ex1\_0LD.cpp

$$A_1 = (5, -5, 5), A_2 = (-5, -5, 5), A_3 = (-5, 5, 5), A_4 = (5, 5, 5)$$

"văzut de sus"



"văzut de jos"



parcursere  
în sens  
trigonometric

Concluzie:

$(0,0,0)$  este în  
fata poligonului

## Exemplul 1. Cod sursă 02\_03\_poligoane3D\_ex1\_0LD.cpp

$$A_1 = (5, -5, 5), A_2 = (-5, -5, 5), A_3 = (-5, 5, 5), A_4 = (5, 5, 5)$$

Explicatie algebrică

- scriem ecuatia planului poligonului sub forma  $\pi(x, y, z) = Ax + By + Cz + D$
- pt. a obtine aceasta ecuatie folosim determinantul

$$\begin{array}{l}
 A_1 \rightarrow \left| \begin{array}{ccc|c} x & y & z & 1 \\ 5 & -5 & 5 & 1 \\ -5 & -5 & 5 & 1 \\ -5 & 5 & 5 & 1 \end{array} \right| \xrightarrow[\text{linia 1}]{\text{dev.}} 0 \cdot x - 0 \cdot y + (-100) \cdot z - (-500) \\
 A_2 \rightarrow \\
 A_3 \rightarrow
 \end{array}$$

$\downarrow$   
 $\pi(x, y, z) = -100z + 500$

$$\left| \begin{array}{ccc|c} 5 & -5 & 1 & \\ -5 & -5 & 1 & \\ -5 & 5 & 1 & \end{array} \right| \xrightarrow[L_2 \rightarrow L_2 - L_1]{L_3 \rightarrow L_3 - L_1} \left| \begin{array}{ccc|c} 5 & -5 & 1 & \\ -10 & 0 & 0 & \\ -10 & 10 & 0 & \end{array} \right| = \left| \begin{array}{cc|c} -10 & 0 & \\ -10 & 10 & \end{array} \right| = -100$$

$$\text{analog } \left| \begin{array}{ccc|c} 5 & -5 & 5 & \\ -5 & -5 & 5 & \\ -5 & 5 & 5 & \end{array} \right| = \dots = -500$$

## Exemplul 1. Cod sursă 02\_03\_poligoane3D\_ex1\_0LD.cpp

$$A_1 = (5, -5, 5), A_2 = (-5, -5, 5), A_3 = (-5, 5, 5), A_4 = (5, 5, 5)$$

Am obținut  $\pi(x, y, z) = -100z + 500$

Ecuația planului este  $-100z + 500 = 0$

Avem  $\pi(0, 0, 0) = 500 > 0 \Rightarrow$  punctul  $(0, 0, 0)$   
este în fața poligonului.

## Exemplul 1. Cod sursă 02\_03\_poligoane3D\_ex1\_0LD.cpp

$$A_1 = (5, -5, 5), A_2 = (-5, -5, 5), A_3 = (-5, 5, 5), A_4 = (5, 5, 5)$$

Comentariu:  $Ax + By + Cz + D = 0$   
 $A=0, B=0, C=(-100)$

Vectorul normal este direcționat de  $(0, 0, -100) \Rightarrow$   
 vectorul normal este  $(0, 0, -1) \Rightarrow$  fata poligonului este  
 "în jos".