

Fonctions de Parking

Tessa Lelièvre-Osswald

Encadrant : Matthieu Josuat-Vergès

IRIF - Pôle Combinatoire

30 août 2020

Introduction : Combinatoire

- **Combinatoire** : domaine des mathématiques et de l'informatique théorique étudiant les ensembles finis *structurés* par leur énumération et leur comptage.
- **Branches principales** :
 - ▶ combinatoire *énumérative* : dénombrement.
 - ▶ combinatoire *bijective* : déduire une égalité entre les cardinaux de deux classes combinatoires en bijection.
- **Classe combinatoire** : ensemble \mathcal{A} muni d'une application $\mathcal{A} \rightarrow \mathbb{N}$, appelée *taille*.

Introduction : Exemples

- **Classes combinatoires :**

- ▶ Mots de longueur n sur l'alphabet $\{0, 1\}$: $|\{0, 1\}^n| = 2^n$
- ▶ Permutations de $\{1, \dots, n\}$: $|\mathfrak{S}_n| = n!$
- ▶ k -cycles de \mathfrak{S}_n : $|\mathfrak{S}_n^k| = \frac{n!}{(n-k)!k}$

- **Bijection : $\mathfrak{S}_n \longleftrightarrow {}^{n+1}\mathfrak{S}_{n+1}$:**

- ▶ $\mathfrak{S}_n \rightarrow {}^{n+1}\mathfrak{S}_{n+1}$: Soit $\sigma = a_1 \dots a_n$ notre permutation.
 $\sigma' = (n+1 \ a_1 \dots a_n) \in {}^{n+1}\mathfrak{S}_{n+1}$.
- ▶ ${}^{n+1}\mathfrak{S}_{n+1} \rightarrow \mathfrak{S}_n$: Soit $\sigma' = (a_1 \dots a_{n+1})$ notre permutation circulaire.
Notons i l'indice tel que $a_i = n+1$. $\sigma = a_{i+1} \dots a_{n+1} a_1 \dots a_{i-1} \in \mathfrak{S}_n$.
$$\frac{(n+1)!}{(n+1 - (n+1))!(n+1)} = \frac{(n+1)!}{0!(n+1)} = \frac{n!(n+1)}{n+1} = n!$$

Introduction : Chemins de Dyck

- **Mot de Dyck** : $\mathcal{D}_n = \{w \in \{0, 1\}^{2n}$
respectant les deux conditions } :

- ▶ $|w|_0 = |w|_1 = n$
- ▶ Pour tout préfixe w' de w ,
 $|w'|_0 \leq |w'|_1$


- **Chemin de Dyck** :

- ▶ Chaque 1 devient un pas Nord (\uparrow)
- ▶ Chaque 0 devient un pas Est (\rightarrow)

- $d_n = |\mathcal{D}_n| = \text{Cat}(n) = \frac{1}{n+1} \binom{2n}{n}$

- Exemple :

$$w = 1011010100$$



Introduction : Chemins de Dyck

- **Mot de Dyck étiquetté :**

$\mathcal{LD}_n = \{w \in \{0, \dots, n\}^{2n} \text{ respectant les quatre conditions } \}$:

- ▶ $|w|_0 = |w|_{\neq 0} = n$
- ▶ Pour tout préfixe w' de w , $|w'|_0 \leq |w'|_{\neq 0}$
- ▶ Pour tout $i \in \{1, \dots, n\}$, $|w|_i = 1$
- ▶ Les entiers non-nuls consécutifs sont en ordre croissant.


- **Chemin de Dyck étiquetté :**

- ▶ Chaque $i \neq 0$ devient un pas Nord (\uparrow) étiquetté par i
- ▶ Chaque 0 devient un pas Est (\rightarrow)

- $ld_n = |\mathcal{LD}_n| = (n+1)^{n-1}$

- Exemple :

$$w = 4015002030$$



Introduction : Fonctions de Parking

- **Fonction de Parking primitive** : $\mathcal{PF}'_n = \{(a_1, \dots, a_n) \mid 1 \leq a_i \leq i \text{ pour tout } i \text{ entre } 1 \text{ et } n, \text{ et } a_i \leq \dots \leq a_n\}$
 - ▶ Exemple : $(1, 1, 3, 3, 4) \in \mathcal{PF}'_5$
 - ▶ Contre-exemple : $(1, 1, 3, 2, 4) \notin \mathcal{PF}'_5$
- $pf'_n = |\mathcal{PF}'_n| = \text{Cat}(n) = \frac{1}{n+1} \binom{2n}{n}$
- **Fonction de Parking** : $\mathcal{PF}_n = \{(a_1, \dots, a_n) \text{ dont le tri croissant } (b_1, \dots, b_n) \in \mathcal{PF}'_n\}$
 - ▶ Exemple : $(1, 1, 3, 2, 4) \in \mathcal{PF}_5$
 - ▶ Contre-exemple : $(2, 1, 4, 5, 4) \notin \mathcal{PF}_5$
- $pf_n = |\mathcal{PF}_n| = (n+1)^{n-1}$

Introduction : Posets

- **Poset** : Ensemble \mathcal{E} partiellement ordonné : ensemble muni d'une *relation d'ordre* \preccurlyeq permettant de comparer certains couples d'éléments de l'ensemble, muni de propriétés :
 - ▶ Réflexivité : $e \in \mathcal{E} \rightarrow e \preccurlyeq e$
 - ▶ Anti-symétrie : $e_1 \preccurlyeq e_2 \wedge e_2 \preccurlyeq e_1 \rightarrow e_1 = e_2$
 - ▶ Transitivité : $e_1 \preccurlyeq e_2 \wedge e_2 \preccurlyeq e_3 \rightarrow e_1 \preccurlyeq e_3$
- **Exemple** :
 - ▶ $\mathcal{E} = \mathbb{N} \times \mathbb{N}$
 - ▶ $\preccurlyeq : (a, b) \preccurlyeq (c, d)$ ssi $a \leq c$ et $b \leq d$
 - ▶ $(3, 8)$ et $(2, 9)$ sont incomparables

Plan

1 Des posets pour le cas classique

- Posets classiques primitifs
- Posets classiques non-primitifs

2 Des posets pour le cas rationnel

- Le cas rationnel
- Posets rationnels primitifs
- Posets rationnels non-primitifs

3 Conclusion

Plan

1 Des posets pour le cas classique

- Posets classiques primitifs
- Posets classiques non-primitifs

2 Des posets pour le cas rationnel

- Le cas rationnel
- Posets rationnels primitifs
- Posets rationnels non-primitifs

3 Conclusion

1.1) Des relations de couverture pour \mathcal{D}_n et \mathcal{PF}'_n

- $\mathcal{D}_n : w \succ_d w'$, s'il existe deux mots w_1 et w_2 tels que :
 - ▶ $w = w_1 \textcolor{red}{0} 1 w_2$
 - ▶ $w' = w_1 \textcolor{red}{1} 0 w_2$
- Si $w_1 \succ_d w_2$, alors le chemin de Dyck correspondant à w_2 est *au dessus* de celui correspondant à w_1 , et la *différence* entre les deux chemins est un carré de côté 1.
- $\mathcal{PF}'_n : f \succ g$ s'il existe i tel que :
 - ▶ $f = (a_1, \dots, a_{i-1}, a_i, \quad a_{i+1}, \dots, a_n)$
 - ▶ $g = (a_1, \dots, a_{i-1}, a_i - \textcolor{red}{1}, a_{i+1}, \dots, a_n)$

1.1) **Bijection** entre les deux ensembles



- $\mathcal{PF}'_n \rightarrow \mathcal{D}_n$:

- ▶ $f = (a_1, \dots, a_n) \in \mathcal{PF}'_n$.
- ▶ $l_i =$ nombre d'occurrences de i dans f .
- ▶ Mot de Dyck correspondant : $\underbrace{1 \dots 1}_{l_1} 0 \underbrace{1 \dots 1}_{l_2} 0 \dots \underbrace{1 \dots 1}_{l_n} 0$.

- $\mathcal{D}_n \rightarrow \mathcal{PF}'_n$:

- ▶ $w \in \mathcal{D}_n$.
- ▶ Considérons son chemin de Dyck.
- ▶ $s_i =$ abscisse du i^e pas Nord. $a_i = s_i + 1$.
- ▶ Fonction de parking primitive correspondante : (a_1, \dots, a_n) .

1.1) Posets **bijectifs** obtenus pour \mathcal{D}_4 et \mathcal{PF}'_4



1.1) Théorème Principal

1.2) Des relations de couverture pour \mathcal{LD}_n et \mathcal{PF}_n

- \mathcal{LD}_n : $w \succ_{ld} w'$ s'il existe l, r, x, x', y, z , et z' tels que :
 - ▶ l est le mot vide, ou finit par un 0
 - ▶ r est le mot vide, ou commence par un 0
 - ▶ $x = x_1x_2\cdots$ avec $x_i > 0$ pour tout i
 - ▶ $z = z_1z_2\cdots$ avec $z_i > 0$ pour tout i
 - ▶ $x' = x$ où y est correctement inséré en ordre croissant
 - ▶ y apparait dans z , et $z' = z$ où y a été supprimé
 - ▶ $w = l\mathbf{x}0\mathbf{z}r$ et $w' = l\mathbf{x}'0\mathbf{z}'r$
- Si $w_1 \succ_{ld} w_2$, alors le chemin de Dyck correspondant à w_2 est *au dessus* de celui correspondant à w_1 , et la *différence* entre les deux chemins est un carré de côté 1.
- \mathcal{PF}_n : on garde la même relation que pour \mathcal{PF}'_n .

1.2) Bijection entre les deux ensembles

- $\mathcal{PF}_n \rightarrow \mathcal{LD}_n$:


- ▶ $f = (a_1, \dots, a_n) \in \mathcal{PF}_n$.
- ▶ $im_i : \{j \mid a_j = i\}$.
- ▶ $im_{i,1}, \dots, im_{i,k_i}$ = éléments de im_i triés par ordre croissant.
- ▶ Mot de Dyck décoré correspondant :

$$\underbrace{im_{1,1} \cdots im_{1,k_1}}_{im_1} 0 \underbrace{im_{2,1} \cdots im_{2,k_2}}_{im_2} 0 \cdots \underbrace{im_{n,1} \cdots im_{n,k_n}}_{im_n} 0.$$


- $\mathcal{LD}_n \rightarrow \mathcal{PF}_n$:

- ▶ $w \in \mathcal{LD}_n$. Considérons son chemin de Dyck.
- ▶ s_i = abscisse du i^e pas Nord.
- ▶ $label(i)$ = étiquette du i^e pas Nord.
- ▶ $dist_i = \{label(j) \mid s_j = i\}$. Si $j \in dist_i$ alors $a_j = i + 1$.
- ▶ Fonction de parking correspondante : (a_1, \dots, a_n) .

1.2) Posets **bijectifs** obtenus pour \mathcal{LD}_3 et \mathcal{PF}_3



1.2) Posets **bijectifs** obtenus pour \mathcal{LD}_3 et \mathcal{PF}_3



1.2) Conjecture Principale

Plan

1 Des posets pour le cas classique

- Posets classiques primitifs
- Posets classiques non-primitifs

2 Des posets pour le cas rationnel

- Le cas rationnel
- Posets rationnels primitifs
- Posets rationnels non-primitifs

3 Conclusion

2.1) Chemins de Dyck rationnels

- **Mot de Dyck rationnel :**

$\mathcal{R}_{a,b} = \{w \in \{0,1\}^{a+b} \text{ respectant les trois conditions } \}$:


- ▶ Pour tout préfixe w' de w , $\frac{a}{b}|w'|_0 \leq |w'|_1$
- ▶ $|w|_0 = b$
- ▶ $|w|_1 = a$

- **Chemin de Dyck rationnel :**

- ▶ Chaque 1 devient un pas Nord (\uparrow)
- ▶ Chaque 0 devient un pas Est (\rightarrow)


- $r_{a,b} = |\mathcal{R}_{a,b}| = \text{Cat}(a,b) = \frac{1}{a+b} \binom{a+b}{a}$

- Exemple : $w = 1110111010 \in \mathcal{R}_{7,3}$



2.1) Chemins de Dyck rationnels

- $w = 10100100 \in \mathcal{R}_{3,5}$



2.1) Chemins de Dyck rationnels

- **Mot de Dyck rationnel étiquetté :**

$\mathcal{LR}_{a,b} = \{w \in \{0, \dots, a\}^{a+b} \text{ respectant les cinq conditions} \}$:


- ▶ Pour tout préfixe w' de w , $\frac{a}{b}|w'|_0 \leq |w'|_{\neq 0}$
- ▶ Pour tout $i \in \{1, \dots, a\}$, $|w|_i = 1$
- ▶ $|w|_0 = a$ et $|w|_{\neq 0} = b$
- ▶ Les entiers non-nuls consécutifs sont en ordre croissant.

- **Chemin de Dyck rationnel étiquetté :**

- ▶ Chaque $i \neq 0$ devient un pas Nord (\uparrow) étiquetté par i
- ▶ Chaque 0 devient un pas Est (\rightarrow)


- $lr_{a,b} = |\mathcal{LR}_{a,b}| = b^{a-1}$

- Exemple : $w = 2456017030 \in \mathcal{LR}_{7,3}$



2.1) Chemins de Dyck rationnels

- Exemple : $w = 20130000 \in \mathcal{LR}_{3,5}$





2.1) Fonctions de parking rationnelles

- **Fonction de Parking rationnelle primitive** : $\mathcal{PF}'_{a,b} = \{(a_1, \dots, a_a) \mid 1 \leq a_i \leq 1 + \frac{b}{a}(i-1) \text{ pour tout } i \text{ entre } 1 \text{ et } a, \text{ et } a_i \leq \dots \leq a_a\}$
 - ▶ Exemple : $(1, 1, 1, 2, 2, 2, 3) \in \mathcal{PF}'_{7,3}$
 - ▶ Contre-exemple : $(1, 1, 2, 2, 2, 2, 3) \notin \mathcal{PF}'_{7,3}$
 - ▶ Exemple : $(1, 2, 4) \in \mathcal{PF}'_{3,5}$
- $pf'_{a,b} = |\mathcal{PF}'_{a,b}| = \text{Cat}(a, b) = \frac{1}{a+b} \binom{a+b}{a}$
- **Fonction de Parking rationnelle** : $\mathcal{PF}_{a,b} = \{(a_1, \dots, a_a) \text{ dont le tri croissant } (b_1, \dots, b_a) \in \mathcal{PF}'_{a,b}\}$
 - ▶ Exemple : $(3, 1, 2, 2, 1, 2, 1) \in \mathcal{PF}_{7,3}$
 - ▶ Exemple : $(4, 1, 2) \in \mathcal{PF}_{3,5}$
- $pf_{a,b} = |\mathcal{PF}_{a,b}| = b^{a-1}$



2) Relations et bijections

On utilise ici les mêmes relations et bijections que dans le cas classique.


2.2) Posets **bijectifs** pour $\mathcal{R}_{5,3}$ et $\mathcal{PF}'_{5,3}$




2.2) Posets **bijectifs** pour $\mathcal{R}_{3,7}$ et $\mathcal{PF}'_{3,7}$





2.3) Posets **bijectifs** pour $\mathcal{LR}_{5,2}$ et $\mathcal{PF}_{5,2}$



2.3) Posets **bijectifs** pour $\mathcal{LR}_{5,2}$ et $\mathcal{PF}_{5,2}$



2.3) Posets **bijectifs** pour $\mathcal{LR}_{2,7}$ et $\mathcal{PF}_{2,7}$



Plan

1 Des posets pour le cas classique

- Posets classiques primitifs
- Posets classiques non-primitifs

2 Des posets pour le cas rationnel

- Le cas rationnel
- Posets rationnels primitifs
- Posets rationnels non-primitifs

3 Conclusion