

Магний.

Системный обзор. Marie-Laure Derom et al. Nutr Neurosci. 2013 Sep. Больше потребление магния ассоциируется с уменьшениями симптомов депрессии.

[Magnesium and depression: a systematic review - PubMed \(nih.gov\)](#)

РКИ. Afsaneh Rajizadeh et al. Nutrition. 2017 Mar. 500мг магния оксида в течение 8 недель улучшали симптомы депрессии и давали статистически значимое снижение баллов по шкале Бека. [Effect of magnesium supplementation on depression status in depressed patients with magnesium deficiency: A randomized, double-blind, placebo-controlled trial - PubMed \(nih.gov\)](#)

Мета-анализ.

Front Psychiatry. 2023; 14: 1333261. Published online 2023 Dec 22. doi: 10.3389/fpsyt.2023.1333261

Дополнительный прием магния положительно влияет на течение депрессии.

[Magnesium supplementation beneficially affects depression in adults with depressive disorder: a systematic review and meta-analysis of randomized clinical trials - PMC \(nih.gov\)](#)

Популяционное исследование. Emily K Tarleton et al. J Am Board Fam Med. 2015 Mar-Apr. 2015. Низкое потребление магния (<184мг/сутки) значительно коррелирует с рисками развития депрессии. [Magnesium intake and depression in adults - PubMed \(nih.gov\)](#)

Обзор. Kamonwan Tangvoraphonkchai et al. Adv Chronic Kidney Dis. 2018 May. Дефицит магния в сыворотке крови ассоциирован с атеросклерозом, сердечно-сосудистыми патологиями, аритмиями и сердечной недостаточностью.

[Magnesium and Cardiovascular Disease - PubMed \(nih.gov\)](#)

Мета-анализ. Xuexian Fang et al. BMC Med. 2016.

Каждый инкремент в 100мг пищевого магния снижает риски инфаркта на 20% и риски инсульта на 7%. Повышенное потребление магния снижает смертность. [Dietary magnesium intake and the risk of cardiovascular disease, type 2 diabetes, and all-cause mortality: a dose-response meta-analysis of prospective cohort studies - PubMed \(nih.gov\)](#)

Когортное исследование.

Front Cardiovasc Med. 2022; 9: 936772. Published online 2022 Aug 12. doi: 10.3389/fcvm.2022.936772

Суточное потребление магния >320мг ассоциируется со сниженным риском

развития ССЗ, артериальной гипертензии и смертности от всех причин/смертности от ССЗ.

[Dietary magnesium and risk of cardiovascular and all-cause mortality after myocardial infarction: A prospective analysis in the Alpha Omega Cohort - PMC \(nih.gov\)](#)

Мета-анализ. Xi Zhang et al. Hypertension. 2016 Aug.

Потребление ~300мг элементарного магния в виде добавок значительно снижает артериальное давление.

[Effects of Magnesium Supplementation on Blood Pressure: A Meta-Analysis of Randomized Double-Blind Placebo-Controlled Trials - PubMed \(nih.gov\)](#)

Position paper. Oliver Micke et al. Dtsch Med Wochenschr. 2020 Nov. По мнению практикующих врачей Германии дефицит магния наблюдается у 33% обычных людей, 50% спортсменов и 72% беременных женщин. [\[Magnesium: Relevance for general practitioners - a position paper of the Society for Magnesium Research e. V\] - PubMed \(nih.gov\)](#)

Обзор. Rebecca B Costello et al. Adv Nutr. 2016. Вплоть до 50% американцев не дотягивают до Estimated Average Requirement (EAR) по потреблению магния. [Perspective: The Case for an Evidence-Based Reference Interval for Serum Magnesium: The Time Has Come - PubMed \(nih.gov\)](#)

Мета-анализ.

Саплементарный магний снижает воспалительный процесс.

<https://pdfs.semanticscholar.org/55a1/d7318cf5e1fb41f7f92ccb945fe0fe2d9c1f.pdf>

Мета-анализ.

Luis E Simental-Mendia et al. Curr Pharm Des. 2017. Саплементарный магний снижает уровень С-реактивного белка.

[Effect of Magnesium Supplementation on Plasma C-reactive Protein Concentrations: A Systematic Review and Meta-Analysis of Randomized Controlled Trials - PubMed \(nih.gov\)](#)

Мета-анализ. Bianca Cristina Antunes Alves Marques et al. High Blood Press Cardiovasc Prev. 2020 Feb. Дополнительный прием магния положительно сказывается на функции сосудистого эндотелия у людей с высоким ИМТ и ведущих не здоровый образ жизни. [Effects of Oral Magnesium Supplementation on](#)

[Vascular Function: A Systematic Review and Meta-analysis of Randomized Controlled Trials - PubMed \(nih.gov\)](#)

Мета-анализ.

BMC Complementary Medicine and Therapies

volume 21, Article number: 125 (2021)

Дополнительный приём магния (вплоть до 3х1000мг «не элементарного» в день) положительно влияет на сон пожилых людей с диагностированной бессонницей.

<https://bmccomplementmedtherapies.biomedcentral.com/articles/10.1186/s12906-021-03297-z>

Мета-анализ.

European Journal of Clinical Nutrition volume 70, pages1354–1359 (2016)

Дополнительный прием магния помогает контролировать уровень глюкозы и улучшает все маркеры углеводного обмена.

<https://www.nature.com/articles/ejcn2016154>

Мета-анализ.

Liwei Luo. 2023

Дополнительный прием магния помогает контролировать уровень глюкозы при гестационном диабете.

[https://www.ejog.org/article/S0301-2115\(23\)00858-8/abstract](https://www.ejog.org/article/S0301-2115(23)00858-8/abstract)

Обзор. Joëlle C Schutten et al. Adv Chronic Kidney Dis. 2018 May.

Недостаточное потребление магния являются одной из причин развития артериальной гипертензии. [Magnesium and Blood Pressure: A Physiology-Based Approach - PubMed \(nih.gov\)](#)

Обзор. Mark Houston. J Clin Hypertens (Greenwich). 2011 Nov.

Повышенное потребление калия и магния может быть также эффективно для снижения артериального давления, как и медикаментозные интервенции. [The role of magnesium in hypertension and cardiovascular disease - PubMed \(nih.gov\)](#)

Обзор. Mengying Han et al. Hypertens Res. 2024 Feb.

Люди, потребляющее наибольшее количество магния наименее склонны к развитию артериальной гипертензии, диабета и дислипидемии. [Associations between dietary magnesium intake and hypertension, diabetes, and hyperlipidemia - PubMed \(nih.gov\)](#)

Системный обзор. Front Neurol. 2019; 10: 852.

Каждый инкремент в 100мг элементарного магния снижает риски инсульта на 2%. [The Effect of Magnesium Intake on Stroke Incidence: A Systematic Review and Meta-Analysis With Trial Sequential Analysis - PMC \(nih.gov\)](#)

Когортное исследование. Wang, M., Peng, J., Yang, C. et al. Magnesium intake and all-cause mortality after stroke: a cohort study.

Верхний квартиль потребления магния у перенесших инсульт людей (300-330мг) имел на 40% сниженную смертность по отношению к самому нижнему (180-210мг). <https://nutritionj.biomedcentral.com/articles/10.1186/s12937-023-00886-1#citeas>

Популяционное ретроспективное исследование. J Alzheimers Dis Rep. 2020; 4(1): 399–404. Published online 2020 Sep 28. Prepublished online 2020 Sep 8. doi: 10.3233/ADR-200220 (<https://doi.org/10.3233%2FADR-200220>)

Среди пожилых людей с деменцией чаще встречаются люди с дефицитом магния, а не наоборот. Взаимосвязь высокого уровня магния в сыворотке крови и риска развития деменции не доказана. [Association Between Serum Magnesium Levels and Alzheimer's Disease or Mixed Dementia Patients: A Population-Based Retrospective Controlled Study - PMC \(nih.gov\)](#)

Мета-анализ. Inge Groenendijk et al. Bone. 2022 Jan.

Высокое потребление магния положительно сказывается на денситометрии костей у людей старше 60 лет.

[Impact of magnesium on bone health in older adults: A systematic review and meta-analysis - PubMed \(nih.gov\)](#)

Мета-анализ. Mohammad Effatpanah et al. Psychiatry Res. 2019 Apr.

Дефицит магния прямо коррелирует с частоты возникновения СДВГ.

[Magnesium status and attention deficit hyperactivity disorder \(ADHD\): A meta-analysis](#)

[- PubMed \(nih.gov\)](#)

РКИ. BMC Pediatr. 2021; 21: 178. Published online 2021 Apr 17.

Дополнительный прием магния(6мг/кг веса) и Вит Д облегчает симптоматику СДВГ к детей.[The effect of vitamin D and magnesium supplementation on the mental health status of attention-deficit hyperactive children: a randomized controlled trial - PMC \(nih.gov\)](#)

Системный обзор MDPI. Nutrients. 2023 Dec; 15(24): 5127. Published online 2023 Dec 16.Дефицит магния негативно сказывается на сократительной способности мышц, производстве АТФ и преждевременных возрастных изменениях в скелетной мускулатуре. Доп прием магия оправдан в силу его эффективности и относительной дешевизны.

<https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC10745813/>

Мультивитамины.

Мета-анализ.

Прием мультивитаминов способствует снижению артериального давления у людей с диагностированной гипертонией.

[Effects of Multivitamin and Multiminerall Supplementation on Blood Pressure: A Meta-Analysis of 12 Randomized Controlled Trials - PubMed \(nih.gov\)](#)

Мета-анализ. J Alzheimers Dis. 2012;29(3):561-9. doi: 10.3233/JAD-2011-111751.

Мультивитамины способны улучшать краткосрочную память. 10 исследований, n=3200.

[The effects of multivitamins on cognitive performance: a systematic review and meta-analysis - PubMed \(nih.gov\)](#)

Мета-анализ. Psychosom Med. 2013 Feb;75(2):144-53. doi:

10.1097/PSY.0b013e31827d5fbd. Epub 2013 Jan 29.

Комплексные добавки с витаминами и минералами положительно влияют на настроение и уровень стресса.

[Effects of vitamin and mineral supplementation on stress, mild psychiatric symptoms, and mood in nonclinical samples: a meta-analysis - PubMed \(nih.gov\)](#)

Мета-анализ и системный обзор. BMJ. 2005 Apr 16; 330(7496): 871.

Прием мультивитаминов незначительно облегчает течение болезней у пожилых людей.

[Role of multivitamins and mineral supplements in preventing infections in elderly people: systematic review and meta-analysis of randomised controlled trials - PMC \(nih.gov\)](#)

Мета-анализ и системный обзор. Nutrients. 2014 Feb 28;6(3):931-49. doi: 10.3390/nu6030931.

Прием мультивитаминов снижает риски возникновения катаракты.

[The effect of multivitamin/mineral supplements on age-related cataracts: a systematic review and meta-analysis - PubMed \(nih.gov\)](#)

Кохрейновский обзор. Cochrane Database Syst Rev. 2016 May 6;2016(5):CD004073.

Прием мультивитаминов с железом и фолиевой кислотой снижает риски замершей беременности.

[Vitamin supplementation for preventing miscarriage - PubMed \(nih.gov\)](#)

Системный обзор. Am J Obstet Gynecol. 2017 Oct;217(4):404.e1-404.e30. doi: 10.1016/j.ajog.2017.03.029. Epub 2017 Apr 2.

Прием мультивитаминов в развитых странах имеют небольшую корреляцию с уменьшенной частотой недоразвитости новорожденных.

[Multivitamin use and adverse birth outcomes in high-income countries: a systematic review and meta-analysis - PubMed \(nih.gov\)](#)

Мета-анализ. Clin Pharmacol Ther. 2007 May;81(5):685-91. doi: 10.1038/sj.clpt.6100100. Epub 2007 Feb 21.

Прием мультивитаминов во время беременности снижает риски педиатрических онкологий.

[Prenatal multivitamin supplementation and rates of pediatric cancers: a meta-analysis - PubMed \(nih.gov\)](#)

Обзор. J Formos Med Assoc. 2018 Jan;117(1):6-13. doi: 10.1016/j.jfma.2017.08.005. Epub 2017 Sep 3.

Дополнительный прием витамина Д и мультивитаминов снижает риски развития преэклампсии во время беременности.

[Vitamins supplementation affects the onset of preeclampsia - PubMed \(nih.gov\)](#)

Ревью. Combs, G. F., Jr, Clark, L. C. & Turnbull, B. W. An analysis of cancer prevention by selenium. Biofactors 14, 153–159 (2001).

Дополнительный прием селена в количестве 1.5мкг/1кг веса статистически значимо снижает риски развития онкологических заболеваний.

[An analysis of cancer prevention by selenium - PubMed \(nih.gov\)](#)

Пилотное исследование. J Altern Complement Med. 2013 Aug;19(8):704-8. doi: 10.1089/acm.2011.0840. Epub 2013 Feb 4.

Дозы тиамина в 600-1500мг в сутки способны бороться с синдромом хронической усталости у людей с язвенным колитом и болезнью Крона.

[Thiamine and fatigue in inflammatory bowel diseases: an open-label pilot study - PubMed \(nih.gov\)](#)

Репорт. BMJ Case Rep. 2013; 2013: bcr2013009289.

Высокие дозы тиамина облегчают симптоматику у людей больных Паркинсоном.

[Case Report: High-dose thiamine as initial treatment for Parkinson's disease - PMC \(nih.gov\)](#)

РКИ. Neurology. 1998 Feb;50(2):466-70. doi: 10.1212/wnl.50.2.466.

Высокие дозы рибофлавина (400мг/сутки) могут облегчать симптомы мигрени.

[Effectiveness of high-dose riboflavin in migraine prophylaxis. A randomized controlled trial - PubMed \(nih.gov\)](#)

Ревью. World J Mens Health. 2021 Jan;39(1):31-37.

Клинический дефицит витамина Д(<20нг/мл) значительно растит риски появления эректильной дисфункции, в то время как его устранение(>35нг/мл) является профилактической мерой.

[:: WJMH :: World Journal of Men's Health](#)

Исследование. Cl Norman Shealy International institute of Holistic Medicine 2009

Ежедневный прием 50000ед витамина Д и 100мкг витамина К2 в течение 3-6 месяцев в среднем увеличивали длину полового члена на 12мм.

[\(PDF\) Enhanced Growth of the Adult Penis With Vitamin D 3 \(researchgate.net\)](#)

Ретроспективный анализ. *Laboratory Medicine*, Volume 49, Issue 2, May 2018, Pages 123–129,

Из 74т анализов на витамин Д только 780 заходили за 80нг/мл и только 89 превышали 120нг/мл. Симптомы токсичности продемонстрировали лишь 4 человека.

[Vitamin D Toxicity: A 16-Year Retrospective Study at an Academic Medical Center | Laboratory Medicine | Oxford Academic \(oup.com\)](#)

Мета-анализ. Sci Rep. 2017; 7: 4769. Published online 2017 Jul 6

Уровень гомоцистеина линейно/значительно коррелирует со смертностью от всех причин.

[Association between Homocysteine Levels and All-cause Mortality: A Dose-Response Meta-Analysis of Prospective Studies - PMC \(nih.gov\)](#)

Интернациональный консенсус. J Alzheimers Dis Rep. 2020; 4(1): 399–404.

Люди с более высоким уровнем гомоцистеина статистически чаще страдают от деменции. Это характерно даже для уровней >11 мкмоль/л при общепринятой норме 5-15.

[Homocysteine and Dementia: An International Consensus Statement - PMC \(nih.gov\)](#)

Ревью. Proc Nutr Soc. 2004 Nov;63(4):597-603. doi: 10.1079/pns2004390.

Витамины Б6, Б9, Б12 эффективно снижают уровень гомоцистеина.

[B-vitamins, homocysteine metabolism and CVD - PubMed \(nih.gov\)](#)

Ежовик.

Пилотное исследование. Front Aging Neurosci. 2020; 12: 155.

49 недель приема ежовика улучшают показатели людей с Альцгеймером средней и легкой тяжести.

[Prevention of Early Alzheimer's Disease by Erinacine A-Enriched Hericium erinaceus Mycelia Pilot Double-Blind Placebo-Controlled Study - PMC \(nih.gov\)](#)

РКИ. Biomed Res. 2010 Aug;31(4):231-7.

После 4х недель приема ежовика у людей, страдающих от депрессии снижается раздражительность и тревожность.

[Reduction of depression and anxiety by 4 weeks Hericium erinaceus intake - PubMed \(nih.gov\)](#)

Статья. Evid Based Complement Alternat Med. 2019; 2019: 7861297.

Прием ежовика помогает в лечении множества невротических расстройств и психических заболеваний и предположительно усиливает выработку

нейротрофического фактора роста.

[Heridium erinaceus Improves Mood and Sleep Disorders in Patients Affected by Overweight or Obesity: Could Circulating Pro-BDNF and BDNF Be Potential Biomarkers? - PMC \(nih.gov\)](#)

Статья. Int J Mol Sci. 2020 Jan; 21(1): 163.

Прием ежовика может помогать в лечении депрессии при помощи множества разных механизмов.

[Therapeutic Potential of Heridium erinaceus for Depressive Disorder - PMC \(nih.gov\)](#)

Статья. World J Gastroenterol. 2023 May 28; 29(20): 3048–3065.

Ежовик обладает большим количеством противовоспалительных и даже иммуномодулирующих свойств, что делает его потенциально интересным веществом для профилактики колитов, болезни Крона, диабета и множества других болезней, связанных с ЖКТ.

[Heridium erinaceus, a medicinal fungus with a centuries-old history: Evidence in gastrointestinal diseases - PMC \(nih.gov\)](#)

