

Вопрос: Как можно сместить приоритет на тренировку задней поверхности бедра, если при любых тазодоминантных движениях она очень быстро забивается?

Ответ: Мне так кажется, что при такой постановке вопроса, ответ можно найти в самом вопросе. У большинства людей ЗПБ действительно по-большей части состоит из белых волокон, а поэтому, в базовых упражнениях может “выпадать” первой.

Решается это очень просто, начинаешь тренировку со сгибаний голени в любом формате(как по мне многоповторный предпочтителен), а базовые упражнения уже идешь делать потом. Таким образом всему должно будет хватить стимула. Все равно в приседах бицепс бедра особо не работает, а даже та же румынка или становая в приоритете грузит ягодичные.

Конечно не универсальный способ, и если цель развить 1ПМ в становой- возможно же не совсем оптимально, но.. как я люблю говорить,- всегда важен контекст. Вот в данном контексте это збс и четко.

Вопрос: На подготовке постоянно болят локти и бицепсы. Особенно это чувствуется, когда на следующий день после жима делаю присед, что можно предпринять?

Ответ: Во-первых я думаю, что надо поиграться с тренировочной программой и сделать так, чтоб тяжелый жим и присед либо были в один день, либо как можно дальше друг от друга(условно понедельник и пятница, в пятницу естественно надо делать то, что наказывает локти/битки в меньшей степени). Я бы при этом скорее склонялся к тому, что все пихнуть в один день, так как наш организм лучше переживает 1 пик воспалительного процесса в неделю, нежели 2.

Во-вторых, не стоит забывать, что толерантность к нагрузкам можно и нужно развивать, а это значит, что многоповторный тренинг бицепса/трицепса никто не отменял, не стоит об этом забывать. В худшем случае накачаешь руки и будут обращать внимание девочки(и тренер приревнует), а в лучшем,- реально станешь прочнее.

В-третьих 1-2 раза в неделю юзать НПВС это вполне себе ок и норм. Напроксен, аркоксия, мовалис, целебрекс,- выбирай не хочу. Ниаминамид, серрапептаза и ибутаморен фоном,- эт тоже ок, норм и вообще желательно.

Вопрос: Правда ли, что ягодичный мостик это хорошее упражнение для рехаба поясницы и профилактики грыж?

Ответ: Да, однозначно ягодичный мостик это ок и норм, когда нужно “укрепить”(ненавижу это слово) поясницу. Более того, это в целом хорошее упражнение на низ тела для всех спинальников, особенно тогда, когда приседы в полную амплитуду с адекватной нагрузкой временно недоступны(наша задача в любом случае сделать так, чтоб со временем делать их стало возможным).

Другой вопрос в том, что многие малоадекватные люди пытаются ставить какие-то рекорды в этом упражнении и тем самым во многом сокращают его пользу. Вопрос в том, что относительно простые движения можно выводить на очень высокий уровень интенсивности за счет ухудшения техники и в этом случае ягодичный мостик сейчас может даже поспорить с подъемом штанги на бицепс. Иными словам, можно делать это настолько отвратительно, что все профиты упражнения перевешиваются неадекватной нагрузкой на ОДА. Поэтому.. средняя интенсивность и средне-высокий объем- вот тут надо применять подобную тактику.

Вопрос: Сколько времени новичку в спортзале стоит находиться на профиците и сколько ккал можно приплюсовать к текущему потреблению?

Ответ: Я думаю, что ответ на этот вопрос будет очень сильно разниться от человека к человеку. Важно также учитывать, что крайне желательно было бы, чтобы этот человек был с самим собой честным, особенно когда речь идет о его проценте жира.

Кто-то весом 60 килограмм и с 10% жира вполне себе может словить свои кайф и от профицита в 1000ккал ради того, чтобы немного закабанеть. И в то же время, некто с весом 90 килограмм и с 25% жира- скорее всего просто разжиреет если будет придерживаться такого же подхода.

Обычно, когда человек только начинает ходить в спортзал, я лично рекомендую просто поднять потребление белка до 1.5+ грамма на килограмм веса и сделать так, чтобы это вошло в привычку. Также полезно поучиться подбирать себе продуктовую корзину исходя из своего самочувствия и есть преимущественно те продукты, которые улучшают спортивный перформанс и не вызывают дискомфорта в ЖКТ. Это база.

Вопрос: Через сколько времени я увижу профиты от приема перорального миноксидила?

Ответ: Здесь важно понимать, что мы все немножко разные и то же самое касается и наших волосяных фолликул. Если судить по тому, что докладывают пользователи с реддита,- то к концу первого месяца сильно сокращается потеря волос, а к концу второго,- можно уже замечать прирост нового пушка.

Ощутимые результаты люди обычно видят спустя 3-4 месяца, что вполне себе естественно, когда речь о перестройке метаболизма тех или иных мягких тканей. Ну и да, не стоит забывать, что гипертрихоз(рост волос на всём теле) тоже вполне себе возможен, а поэтому.. желательно следить за тем, чтобы ваша женщина по ошибке не глотала эти таблетки.

Вопрос: Если я чувствую большую задержку воды, как от ибутаморена, так и от гормона роста, есть ли смысл принимать препараты по типу форсиги для того, чтобы нивелировать подобную побочку?

Ответ: Во-первых надо понимать, что и гормон роста и грелин-миметики, повышающие