
Task 1 - Temperatur i 2025



Resultater


Statistikk	Temperatur (°C)
Gjennomsnitt	7.87
Median	8.30
Minimum	-15.50
Maksimum	23.70

365 dager med temperaturdata i hvert undersøkt år.

Kort diskusjon

Årsmiddelet i Ås var 7,87 °C, mens medianen var 8,30 °C. Den laveste døgnmiddeltemperaturen var -15,50 °C og den høyeste 23,70 °C. Dette er gjennomsnitt for hele døgn, så temperaturene kan ha vært både lavere og høyere i løpet av dagen.

Task 2 - Temperatur og nedbør




Resultater

365 dager med nedbørdata. Temperatur vises i °C på venstre y-akse, og døgnnedbør i mm på høyre y-akse. Temperaturserien bruker PT0H og nedbørserien PT18H.

Kort diskusjon

Temperaturlinjen viser årstidsvariasjonen, mens nedbørsøylene viser større variasjon fra dag til dag. Enkelte døgn skiller seg ut med mye nedbør. De to y-aksene har forskjellige enheter, så høyden på en søyle kan ikke sammenlignes direkte med temperaturlinjen. Målingene har også ulik døgnavgrensning.

Task 3 - 1925 sammenlignet med 2025



Resultater

Statistikk	1925 (°C)	2025 (°C)
Gjennomsnitt	5.28	7.87
Median	5.30	8.30
Minimum	-20.70	-15.50
Maksimum	24.30	23.70

365 dager med temperaturdata i hvert undersøkt år.

Kort diskusjon

Årsmiddelet var 5,28 °C i 1925. Det gjør 2025 omtrent 2,6 °C varmere i denne sammenligningen. Likevel var den høyeste døgnmiddeltemperaturen litt høyere i 1925: 24,30 °C mot 23,70 °C. Det viser at et varmere år ikke nødvendigvis har den varmeste enkeltdagen. To enkeltår er ikke nok til å si noe sikkert om langsiktige klimaendringer.

Task 4 - Hetebølger

Resultater

365 dager med maksimumstemperaturdata. Antall hetebølger: **1**. Periode: **16.-22. juli 2025** (7 dager).


YAML-oppsummering

dates:
- 2025-07-16 - 2025-07-22
station_id: SN17850
station_name: ÅS
year: 2025

Kort diskusjon

Vi fant én hetebølge, fra 16. til 22. juli 2025, med maksimumstemperatur på minst 27 °C i sju sammenhengende dager. Resultatet gjelder døgnserien PT18H. Her er maksimumstemperaturen avgjørende; middeltemperaturen ville gitt en annen vurdering.

Task 5 - Glidende gjennomsnitt



Resultater

Daglig middeltemperatur vises som punkter og 7-dagers glidende gjennomsnitt som linje. Beregningen krever sju gyldige observasjoner og gir 359 gjennomsnittsverdier i 2025.

Kort diskusjon

Sjudagersgjennomsnittet gjør temperaturutviklingen lettere å følge, men skjuler noen av de korte svingningene. Linjen reagerer senere på raske endringer fordi den også bygger på de seks foregående dagene. De første seks dagene har ingen verdi fordi beregningen krever sju målinger.