

MAF 261 - Estatística Experimental

Prof. Fernando de Souza Bastos

Instituto de Ciências Exatas e Tecnológicas
Universidade Federal de Viçosa
Campus UFV - Florestal

2018

Sumário

- 1 Delineamento Inteiramente Casualizado
- 2 Quadro de tabulação dos dados
- 3 Modelo Estatístico
- 4 Análise de Variância
- 5 Coeficiente de Variação
- 6 Exemplos

No Delineamento Inteiramente Casualizado (DIC) a distribuição dos tratamentos às unidades experimentais é feita inteiramente ao acaso. Os outros delineamentos experimentais, por exemplo: blocos casualizados e quadrado latino, se originam do DIC pelo uso de restrição na casualização. O DIC utiliza apenas os princípios básicos da repetição e da casualização.

Como não faz restrições na casualização, o uso do DIC pressupõe que as unidades experimentais estão sob condições homogêneas. Estas condições homogêneas geralmente são obtidas em locais com ambientes controlados tais como laboratórios, estufas e casas de vegetação.

A título de exemplo, considere um experimento instalado no DIC com I tratamentos e J repetições. A coleta de dados da pesquisa pode ser resumida, num quadro do tipo a seguir:

| Repetições | Tratamentos | | | |
|------------|-------------|----------|-----|----------|
| | 1 | 2 | ... | I |
| 1 | Y_{11} | Y_{21} | ... | Y_{I1} |
| 2 | Y_{12} | Y_{22} | ... | Y_{I2} |
| ... | ... | ... | ... | ... |
| J | Y_{1J} | Y_{2J} | ... | Y_{IJ} |
| Totais | T_1 | T_2 | ... | T_I |

Deste quadro pode-se retirar algumas informações de interesse:

- Número de unidades experimentais: $N = I \times J$

Deste quadro pode-se retirar algumas informações de interesse:

- Número de unidades experimentais: $N = I \times J$

- Total geral: $G = \sum_{i=1}^I \sum_{j=1}^J Y_{ij} = \sum_{i=1}^I T_i = Y_{..}$

Deste quadro pode-se retirar algumas informações de interesse:

- Número de unidades experimentais: $N = I \times J$

- Total geral: $G = \sum_{i=1}^I \sum_{j=1}^J Y_{ij} = \sum_{i=1}^I T_i = Y_{..}$

- Total para o tratamento i : $T_i = \sum_{j=1}^J Y_{ij} = Y_{i.}$

Deste quadro pode-se retirar algumas informações de interesse:

- Número de unidades experimentais: $N = I \times J$

- Total geral: $G = \sum_{i=1}^I \sum_{j=1}^J Y_{ij} = \sum_{i=1}^I T_i = Y_{..}$

- Total para o tratamento i : $T_i = \sum_{j=1}^J Y_{ij} = Y_{i.}$

- Média para o tratamento i : $\mu_i = \frac{T_i}{J}$

Deste quadro pode-se retirar algumas informações de interesse:

- Número de unidades experimentais: $N = I \times J$

- Total geral: $G = \sum_{i=1}^I \sum_{j=1}^J Y_{ij} = \sum_{i=1}^I T_i = Y_{..}$

- Total para o tratamento i : $T_i = \sum_{j=1}^J Y_{ij} = Y_{i.}$

- Média para o tratamento i : $\mu_i = \frac{T_i}{J}$

- Média geral do experimento: $\mu = \frac{G}{IJ}$

Modelo Estatístico

Existe um modelo estatístico específico para cada tipo de delineamento. O modelo estatístico identifica quais são as fontes de variação dos valores de uma variável resposta em estudo. Para os dados oriundos de um experimento instalado segundo o DIC, o seguinte modelo estatístico deve ser utilizado nas análises estatísticas:

$$Y_{ij} = \mu + t_i + e_{ij}$$

em que, Y_{ij} é o valor observado para a variável resposta obtido para o i -ésimo tratamento em sua j -ésima repetição; μ é a média de todos os valores possíveis da variável resposta; t_i é o efeito do tratamento i no valor observado Y_{ij} , ou seja, $t_i = \mu_i - \mu$; Por fim, e_{ij} é o erro experimental associado ao valor observado Y_{ij} , isto é, $e_{ij} = Y_{ij} - \mu_i$.

O erro experimental ocorre em todos os experimentos, porque não é possível controlar o efeito de fontes de variações que ocorrem de forma aleatória e desconhecida. Este erro é o responsável pela variação observada entre as observações obtidas nas repetições para cada tratamento.

Análise de Variância

É uma técnica de análise estatística que permite decompor a variação total, ou seja, a variação existente entre todas as observações, na variação devido à diferença entre os efeitos dos tratamentos e na variação devido ao acaso, que também é denominada de erro experimental ou resíduo.

No entanto, para que esta técnica seja empregada é necessário que sejam satisfeitas as seguintes pressuposições:

- 1 os efeitos do modelo estatístico devem ser aditivos;

No entanto, para que esta técnica seja empregada é necessário que sejam satisfeitas as seguintes pressuposições:

- 1 os efeitos do modelo estatístico devem ser aditivos;
- 2 os erros experimentais devem ser normalmente distribuídos, independentes, com média zero e com variância comum.

Partindo do modelo estatístico, pode-se decompor a variação entre os valores observados nas diferentes causas de variabilidade, como demonstrado a seguir.

Considere o modelo estatístico para um experimento instalado segundo o DIC:

$$Y_{ij} = \mu + t_i + e_{ij}$$

Considere o modelo estatístico para um experimento instalado segundo o DIC:

$$Y_{ij} = \mu + t_i + e_{ij}$$

Fazendo $t_i = \mu_i - \mu$ e $e_{ij} = Y_{ij} - \mu_i$, tem-se:

Considere o modelo estatístico para um experimento instalado segundo o DIC:

$$Y_{ij} = \mu + t_i + e_{ij}$$

Fazendo $t_i = \mu_i - \mu$ e $e_{ij} = Y_{ij} - \mu_i$, tem-se:

$$Y_{ij} - \mu = (\mu_i - \mu) + (Y_{ij} - \mu_i),$$

Considere o modelo estatístico para um experimento instalado segundo o DIC:

$$Y_{ij} = \mu + t_i + e_{ij}$$

Fazendo $t_i = \mu_i - \mu$ e $e_{ij} = Y_{ij} - \mu_i$, tem-se:

$$Y_{ij} - \mu = (\mu_i - \mu) + (Y_{ij} - \mu_i),$$

Substituindo μ , μ_i e e_{ij} por seus estimadores tem-se:

Considere o modelo estatístico para um experimento instalado segundo o DIC:

$$Y_{ij} = \mu + t_i + e_{ij}$$

Fazendo $t_i = \mu_i - \mu$ e $e_{ij} = Y_{ij} - \mu_i$, tem-se:

$$Y_{ij} - \mu = (\mu_i - \mu) + (Y_{ij} - \mu_i),$$

Substituindo μ , μ_i e e_{ij} por seus estimadores tem-se:

$$Y_{ij} - \hat{\mu} = (\hat{\mu}_i - \hat{\mu}) + (Y_{ij} - \hat{\mu}_i),$$

elevando ambos os membros ao quadrado e aplicando o somatório, temos:

$$\sum_{i=1, j=1}^{I, J} (Y_{ij} - \hat{\mu})^2 = \sum_{i=1, j=1}^{I, J} [(\hat{\mu}_i - \hat{\mu}) + (Y_{ij} - \hat{\mu}_i)]^2$$

$$\Rightarrow \sum_{i=1, j=1}^{I, J} (Y_{ij} - \hat{\mu})^2 = \sum_{i=1, j=1}^{I, J} (\hat{\mu}_i - \hat{\mu})^2 + \sum_{i=1, j=1}^{I, J} (Y_{ij} - \hat{\mu}_i)^2 + \sum_{i=1, j=1}^{I, J} \text{duplos produtos}$$

É fácil mostrar que $\sum_{i=1, j=1}^{I, J} \text{duplos produtos} = 0$. Logo, podemos escrever, simplificadamente:

$$SQ_{Total} = SQ_{Trat} + SQ_{Res}$$

Por meio destas fórmulas, pode-se obter os valores para as respectivas somas de quadrados. No entanto, essas fórmulas demandam muitos cálculos. Fórmulas de mais fácil aplicação podem ser obtidas, conforme é mostrado a seguir. Inicialmente trabalharemos com a fórmula da SQ_{Total} . Tem-se:

$$SQ_{Total} = \sum_{i=1, j=1}^{I, J} (Y_{ij} - \hat{\mu})^2$$

Por meio destas fórmulas, pode-se obter os valores para as respectivas somas de quadrados. No entanto, essas fórmulas demandam muitos cálculos. Fórmulas de mais fácil aplicação podem ser obtidas, conforme é mostrado a seguir. Inicialmente trabalharemos com a fórmula da SQ_{Total} . Tem-se:

$$SQ_{Total} = \sum_{i=1, j=1}^{I, J} (Y_{ij} - \hat{\mu})^2$$

Desenvolvendo o quadrado perfeito,

$$\sum_{i=1, j=1}^{I, J} (Y_{ij} - \hat{\mu})^2 = \sum_{i=1, j=1}^{I, J} (Y_{ij}^2 - 2\hat{\mu}Y_{ij} + \hat{\mu}^2)$$

aplicando-se as propriedades de somatório, temos:

$$\sum_{i=1, j=1}^{I, J} (Y_{ij} - \hat{\mu})^2 = \sum_{i=1, j=1}^{I, J} Y_{ij}^2 - 2\hat{\mu} \sum_{i=1, j=1}^{I, J} Y_{ij} + \sum_{i=1, j=1}^{I, J} \hat{\mu}^2 \quad (1)$$

$$= \sum_{i=1, j=1}^{I, J} Y_{ij}^2 - 2\hat{\mu} \sum_{i=1, j=1}^{I, J} Y_{ij} + IJ\hat{\mu}^2 \quad (2)$$

Sabemos que $\hat{\mu} = \frac{\sum_{i=1}^I \sum_{j=1}^J Y_{ij}}{IJ}$, assim:

$$\sum_{i=1}^I \sum_{j=1}^J (Y_{ij} - \hat{\mu})^2 = \sum_{i=1}^I \sum_{j=1}^J Y_{ij}^2 - 2 \left(\frac{\sum_{i=1}^I \sum_{j=1}^J Y_{ij}}{IJ} \right) \sum_{i=1}^I \sum_{j=1}^J Y_{ij} + IJ \left(\frac{\sum_{i=1}^I \sum_{j=1}^J Y_{ij}}{IJ} \right)^2$$

simplificando tem-se,

$$\sum_{i=1, j=1}^{I, J} (Y_{ij} - \hat{\mu})^2 = \sum_{i=1, j=1}^{I, J} Y_{ij}^2 - 2 \frac{\left(\sum_{i=1, j=1}^{I, J} Y_{ij} \right)^2}{IJ} + \frac{\left(\sum_{i=1, j=1}^{I, J} Y_{ij} \right)^2}{IJ}$$

Finalmente, temos:

$$SQTotal = \sum_{i=1, j=1}^{I,J} (Y_{ij} - \hat{\mu})^2 = \sum_{i=1, j=1}^{I,J} Y_{ij}^2 - \frac{\left(\sum_{i=1, j=1}^{I,J} Y_{ij} \right)^2}{IJ}$$

que é a fórmula mais prática para se calcular a SQTotal.

Para a $SQ_{Tratamentos}$ tem-se:

$$SQ_{Trat} = \sum_{i=1, j=1}^{I, J} (\hat{\mu}_i - \hat{\mu})^2$$

Para a SQTratamentos tem-se:

$$SQTrat = \sum_{i=1, j=1}^{I, J} (\hat{\mu}_i - \hat{\mu})^2$$

desenvolvendo o quadrado perfeito,

$$\sum_{i=1, j=1}^{I, J} (\hat{\mu}_i - \hat{\mu})^2 = \sum_{i=1, j=1}^{I, J} (\hat{\mu}_i^2 - 2\hat{\mu}\hat{\mu}_i + \hat{\mu}^2)$$

aplicando-se as propriedades de somatório, temos:

$$\sum_{i=1, j=1}^{I, J} (\hat{\mu}_i - \hat{\mu})^2 = \sum_{i=1, j=1}^{I, J} \hat{\mu}_i^2 - 2\hat{\mu} \sum_{i=1, j=1}^{I, J} \hat{\mu}_i + \sum_{i=1, j=1}^{I, J} \hat{\mu}^2 \quad (3)$$

$$= J \sum_{i=1}^I \hat{\mu}_i^2 - 2\hat{\mu} J \sum_{i=1}^I \hat{\mu}_i + IJ\hat{\mu}^2 \quad (4)$$

A média geral e a média para tratamentos podem ser escritas respectivamente como:

$$\hat{\mu} = \frac{\sum_{i=1}^I \sum_{j=1}^J Y_{ij}}{IJ} \text{ e } \hat{\mu}_i = \frac{T_i}{J}$$

Substituindo na expressão anterior, tem-se:

$$\sum_{i=1}^I \sum_{j=1}^J (\hat{\mu}_i - \hat{\mu})^2 = J \sum_{i=1}^I \frac{T_i^2}{J^2} - 2 \left(\frac{\sum_{i=1}^I \sum_{j=1}^J Y_{ij}}{IJ} \right) J \sum_{i=1}^I \frac{T_i}{J} + IJ \left(\frac{\sum_{i=1}^I \sum_{j=1}^J Y_{ij}}{IJ} \right)^2$$

Sabe-se que $T_i = \sum_{j=1}^J Y_{ij}$, então:

$$\sum_{i=1, j=1}^{I, J} (\hat{\mu}_i - \hat{\mu})^2 = J \sum_{i=1}^I \frac{T_i^2}{J^2} - 2 \left(\frac{\sum_{i=1, j=1}^{I, J} Y_{ij}}{IJ} \right) J \left(\frac{\sum_{j=1}^J Y_{ij}}{J} \right) + IJ \left(\frac{\sum_{i=1, j=1}^{I, J} Y_{ij}}{IJ} \right)^2$$

simplificando, tem-se:

$$\sum_{i=1}^I \sum_{j=1}^J (\hat{\mu}_i - \hat{\mu})^2 = \sum_{i=1}^I \frac{T_i^2}{J} - 2 \frac{\left(\sum_{i=1}^I \sum_{j=1}^J Y_{ij} \right)^2}{IJ} + \frac{\left(\sum_{i=1}^I \sum_{j=1}^J Y_{ij} \right)^2}{IJ}$$

finalmente tem-se:

$$SQTrat = \sum_{i=1}^I \sum_{j=1}^J (\hat{\mu}_i - \hat{\mu})^2 = \sum_{i=1}^I \frac{T_i^2}{J} - \frac{\left(\sum_{i=1}^I \sum_{j=1}^J Y_{ij} \right)^2}{IJ}$$

A fórmula anterior é utilizada quando o número de repetições é igual para todos os tratamentos. No caso em que o número de repetições varia de acordo com o tratamento a fórmula apropriada é:

$$SQ_{Trat} = \sum_{i=1}^I \frac{T_i^2}{r_i} - \frac{\left(\sum_{i=1}^I \sum_{j=1}^{r_i} Y_{ij} \right)^2}{N}$$

em que, N é o número de unidades experimentais $= \sum_{i=1}^I r_i$, e r_i é número de unidades experimentais do tratamento i .

Por fim, A Soma de Quadrados do Resíduo (SQ_{Res}) é obtida por diferença,

$$SQ_{Res} = SQ_{Total} - SQ_{Trat}$$

O quadro da análise de variância, geralmente denotada por ANOVA (ANalysis Of VAriance) para a análise de um experimento instalado segundo o DIC, com igual número de repetições para todos os tratamentos é do seguinte tipo:

| FV | GL | SQ | QM | F | $F_{tab;\alpha}$ |
|-------------|------------|---------|--------------------------|------------------------|-----------------------|
| Tratamentos | $(I - 1)$ | SQTrat | $\frac{SQTrat}{I - 1}$ | $\frac{QMTrat}{QMRes}$ | $[(I - 1); I(J - 1)]$ |
| Resíduo | $I(J - 1)$ | SQRes | $\frac{SQRes}{I(J - 1)}$ | | |
| Total | IJ-1 | SQTotal | | | |

A partir das SQ_{Trat} e SQ_{Res} , obtém-se os respectivos quadrados médios, por meio do quociente entre a soma de quadrados com o respectivo número de graus de liberdade.

A partir das SQ_{Trat} e SQ_{Res} , obtém-se os respectivos quadrados médios, por meio do quociente entre a soma de quadrados com o respectivo número de graus de liberdade.

Para se concluir se existe diferença entre tratamentos, calcula-se o valor de F , que é obtido pelo quociente do QM_{Trat} com o QM_{Res} . Este valor de F calculado deve ser comparado com o valor de F tabelado, o qual é obtido na tabela de distribuição da variável aleatória F , de acordo com o nível de significância do teste, graus de liberdade para tratamentos e graus de liberdade para resíduo.

As hipóteses para o teste F da análise de variância para tratamentos são as seguintes: $H_0 : \mu_1 = \dots = \mu_I = \mu$, o que equivale a dizer que todos os possíveis contrastes entre as médias dos tratamentos, são estatisticamente nulos, ao nível de probabilidade que foi executado o teste.

As hipóteses para o teste F da análise de variância para tratamentos são as seguintes: $H_0 : \mu_1 = \dots = \mu_I = \mu$, o que equivale a dizer que todos os possíveis contrastes entre as médias dos tratamentos, são estatisticamente nulos, ao nível de probabilidade que foi executado o teste. $H_a : \text{não } H_0$, o que equivale a dizer que existe pelo menos um contraste entre as médias dos tratamentos, estatisticamente diferentes de zero, ao nível de probabilidade que foi realizado o teste.

A regra decisória para o teste F é a seguinte:

- Se o valor do F calculado for maior ou igual ao valor do F tabelado, então rejeita-se H_0 e conclui-se que os tratamentos tem efeito diferenciado ao nível de significância em que foi realizado o teste;

A regra decisória para o teste F é a seguinte:

- Se o valor do F calculado for maior ou igual ao valor do F tabelado, então rejeita-se H_0 e conclui-se que os tratamentos tem efeito diferenciado ao nível de significância em que foi realizado o teste;
- Se o valor de F calculado for menor que o valor do F tabelado, então não rejeita-se H_0 e conclui-se que os tratamentos têm efeitos iguais ao nível de significância em que foi realizado o teste.

Coeficiente de Variação

O coeficiente de variação é calculado da seguinte maneira:

$$CV = \frac{\sqrt{QMRes}}{\hat{\mu}} \cdot 100$$

O CV é utilizado para avaliação da precisão de experimentos. Quanto menor o CV mais preciso tende a ser o experimento.

Vantagens e Desvantagens do delineamento inteiramente casualizado

Vantagens:

- Não existem exigências quanto ao número de tratamentos e repetições;

Vantagens e Desvantagens do delineamento inteiramente casualizado

Vantagens:

- Não existem exigências quanto ao número de tratamentos e repetições;
- É o delineamento com maior valor para os graus de liberdade do resíduo.

Vantagens e Desvantagens do delineamento inteiramente casualizado

Vantagens:

- Não existem exigências quanto ao número de tratamentos e repetições;
- É o delineamento com maior valor para os graus de liberdade do resíduo.

Desvantagens:

- Não é fácil conseguir e manter total homogeneidade das condições;

Vantagens e Desvantagens do delineamento inteiramente casualizado

Vantagens:

- Não existem exigências quanto ao número de tratamentos e repetições;
- É o delineamento com maior valor para os graus de liberdade do resíduo.

Desvantagens:

- Não é fácil conseguir e manter total homogeneidade das condições;
- todas as variações exceto a devida a tratamentos, são consideradas aleatórias. Isto pode acarretar uma estimativa muito alta para o erro experimental.

Para comparar a produtividade de quatro variedades de milho, um agrônomo tomou vinte parcelas similares e distribuiu, inteiramente ao acaso, cada uma das 4 variedades em 5 parcelas experimentais. A partir dos dados experimentais fornecidos, é possível concluir que existe diferença significativa entre as variedades com relação a produtividade, utilizando o nível de significância de 5%?

| Variedades | | | | |
|-------------------|-----|-----|-----|-----|
| | A | B | C | D |
| | 25 | 31 | 22 | 33 |
| | 26 | 25 | 26 | 29 |
| | 20 | 28 | 28 | 31 |
| | 23 | 27 | 25 | 34 |
| | 21 | 24 | 29 | 28 |
| Totais | 115 | 135 | 130 | 155 |
| Médias | 23 | 27 | 26 | 31 |

Referências Bibliográficas I

- A. J. d. A. Calegare. *Introdução ao Delineamento de Experimentos*. Edgard Blucher, São Paulo, 2 edition, 2009.
- A. P. Carneiro, J. I. R. Júnior, e N. T. Santos. Apostila de Estatística Experimental - UFV, 2018. Apostila gentilmente cedida pelos autores para o curso de Estatística Experimental do Campus UFV - Florestal.