

Analiza numeryczna (L) - Lista 9

Magdalena Słonińska

21 grudnia 2021

Zadanie 3

Udowodnij, że wielomiany $B_0^n, B_1^n, \dots, B_n^n$ tworzą bazę przestrzeni Π_n .

Wielomiany Bernsteina to wielomiany postaci $B_k^n(x) = \binom{n}{k} x^k (1-x)^{n-k}$. Skorzystamy z własności $\binom{n-k}{i-k} = \binom{n}{i} \binom{i}{k}$, żeby je przekształcić. Wtedy

$$B_k^n(x) = \binom{n}{k} x^k (1-x)^{n-k} = \binom{n}{k} x^k \sum_{i=0}^{n-k} \binom{n-k}{i} (-1)^i x^i$$

i dalej zmiana indeksów daje nam

$$B_k^n(x) = \sum_{i=0}^n \binom{n-k}{i-k} \binom{n}{i} (-1)^{i-k} x^{i-k+k} = \sum_{i=k}^n \binom{n}{i} \binom{i}{k} (-1)^{i-k} x^i$$

Teraz musimy wykazać, że dla $\sum_{j=0}^n \alpha_j B_j^n = 0$ zachodzi $\forall j \in \{0, 1, \dots, n\} \alpha_j = 0$.

$$\begin{aligned} 0 &= \alpha_0 B_0^n(x) + \alpha_1 B_1^n(x) + \dots + \alpha_n B_n^n(x) \\ 0 &= \alpha_0 \sum_{i=0}^n (-1)^i \binom{n}{i} \binom{i}{0} x^i + \alpha_1 \sum_{i=1}^n (-1)^{i-1} \binom{n}{i} \binom{i}{1} x^i + \dots + \alpha_n \sum_{i=n}^n (-1)^{i-n} \binom{n}{i} \binom{i}{n} x^i \end{aligned}$$

Skoro $x^n, x^{n-1}, \dots, x^1, x^0$ są liniowo niezależne, to zachodzi

$$\beta_n x^n + \dots + \beta_0 x^0 = 0 \Leftrightarrow \beta_n = \dots = \beta_0 = 0$$

Widzimy, że współczynnik przy x^j ma postać $\beta_j = \sum_{i=0}^j \alpha_i \binom{n}{i} \binom{i}{j}$. Łatwo zauważyć, że ten przy x^0 jest bardzo prosty, a mianowicie $\beta_0 = \alpha_0 \binom{n}{0} \binom{0}{0} = \alpha_0$. Stąd $\alpha_0 = 0$.

Możemy tą informację wykorzystać przy wyznaczaniu kolejnych współczynników np. $\beta_1 = \alpha_0 \binom{n}{0} \binom{0}{1} + \alpha_1 \binom{n}{1} \binom{1}{1} = \alpha_1 \binom{n}{1} \binom{1}{1}$. Ale z definicji dwumianu Newtona dla dowolnego n, k mamy $\binom{n}{k} \neq 0$. Stąd $\alpha_1 = 0$. Analogicznie postępujemy dla pozostałych współczynników aż do α_n .

Pokazaliśmy zatem, że $\alpha_0 = \dots = \alpha_n = 0$. Do tego wiadomo, że wielomianów Bernsteina stopnia n jest $n+1$, czyli tworzą one bazę przestrzeni liniowej Π_n .