

ИНСТИТУТ ЗА МАТЕМАТИКУ И ИНФОРМАТИКУ



ПРИРОДНО-МАТЕМАТИЧКИ ФАКУЛТЕТ
УНИВЕРЗИТЕТ У КРАГУЈЕВЦУ

СЕМИНАРСКИ РАД
ПРЕДСТАВЉАЊЕ И ТУМАЧЕЊЕ
СКУПА ПОДАТАКА „DIABETES 012 – HEALTH INDICATORS
(BRFSS 2015)“

Ментор
др Бранко Арсић

Студенти
Магдалена Стаменовић 83/2021
Алекса Радивојевић 76/2021

Садржај

Увод	3
Упознавање података	4
Учитавање скупа података	4
Информисање о скупу података	4
Припрема података за ЕДА	11
Експлоративна анализа података (ЕДА)	13
Униваријантна анализа	13
Анализа	13
Табела закључака	34
Биваријантна анализа	36
Имплементација метода статистичких тестова	37
Однос са циљаном карактеристиком Diabetes_012	38
Однос карактеристика које нису циљане	88
Табеле закључака	108
Чишћење података	114
Трансформација података	115
Инжењеринг карактеристика (Feature Engineering)	115
Инжењеринг карактеристике PhysHlthCat	115
Инжењеринг карактеристике MentHlthCat	116
Инжењеринг карактеристике EducationCat	117
Инжењеринг карактеристике IncomeCat	117
Инжењеринг карактеристике AgeCat	119
Инжењеринг карактеристике CardioRiskScore	120
Инжењеринг карактеристике LifestyleRiskScore	122
Инжењеринг карактеристике HealthScore	124
Инжењеринг карактеристике DietScore	126
Инжењеринг карактеристике SocioEconomicStatus	128
Биваријантна анализа нових карактеристика	131
Однос са циљаном карактеристиком Diabetes_012	131
PhysHlthCat vs Diabetes_012	131
MentHlthCat vs Diabetes_012	133
EducationCat vs Diabetes_012	134
IncomeCat vs Diabetes_012	136
AgeCat vs Diabetes_012	138
CardioRiskScore vs Diabetes_012	140

LifestyleRiskScore vs Diabetes_012	142
HealthScore vs Diabetes_012	143
SocioEconomicStatus vs Diabetes_012	145
Однос карактеристикама које нису циљане.....	147
IncomeCat VS EducationCat.....	147
MentHlthCat VS Stroke	149
PhysHlthCat vs DiffWalk	151
AgeCat vs HealthScore	153
Табела закључака	155
Селекција предиктора (Feature Engeneering)	157
Моделовање	160
Дефинисање тренинг и тест скупа	160
Балансирање података циљане карактеристике Diabetes_012	162
Регуларизација и PCA	163
Тренирање модела	164
Избор модела	164
Унакрсна валидација (k-fold)	165
Финално тренирање	169
Метрике модела	172
Референце	174

Увод

Семинарским радом анализирали смо скуп података „[Diabetes 012 – Health Indicators \(BRFSS 2015\)](#)“ који представља велики статистички скуп здравствених параметара прикупљених у оквиру једног од највећих истраживачких програма о здравственим навикама и стању становништва у Сједињеним Америчким Државама, Behavioral Risk Factor Surveillance System (BRFSS).

У следећем поглављу ће детаљно бити описан садржај скупа, али ево кратак резиме. Подаци из овог скупа обухватају преко 253.000 опсервација, а свака од њих садржи информације о здравственим навикама, присуству хроничних болести, физичкој активности, исхрани, демографским обележјима и општем здравственом стању.

Мотивација за избор овог скупа података **заснива се на** чињеници да дијабетес представља један од најраспрострањенијих глобалних здравствених проблема **данашњице**. Према подацима **Међународне дијабетес федерације, у 2024. години у Србији је процењено 781.500 одраслих особа (старости 20-79 година) болује од дијабетеса**. Истраживање **спроведено** у периоду од 2007. до 2017. године показује учесталост дијабетеса типа 1 код младих **особа (<19 година)** са просеком од 11,82 **оболелих** на 100.000 становника, док је просек за узраст до 14 година **просек 14,28 оболелих** на 100.000 становника. Забрињавајући фактор овог истраживања је повећање учесталости **обољевања** код деце за 5.9% по години, **при чему је** најризичнији период живота од 5 до 14 година. Сматрамо да би примена метода науке о подацима **на** приложеном скупу података, у циљу разумевања фактора ризика и ране предикције дијабетеса допринела смањивању **наведених** стопа.

Циљеви истраживања:

1. Иницијална припрема и чишћење података, укључујући испитивање структуре скупа, анализу нетипичних вредности, трансформацију променљивих.
2. Детаљна униваријантна, биваријантна и описна анализа података у сврху детекције међусобних утицаја главних индикатора на појаву дијабетеса.
3. Одабир и формирање модела машинског учења, а затим испитивање поузданости и робусности на изабраном скупу података.

Commented [MS1]: На сугестију професора додат линк на текст. Линк до скупа је претходно постојао само у референцама

Commented [MS2]: Komentar profesor: nekompletna recenica vec na pocetku. Proverite ceo tekst jos jednom

Commented [MS3R2]: Сажемо се са сугестијом. Формулације реченица су благо имењене како би пренето значење било потпуно.

Упознавање података

Учитавање скупа података

На сајту су доступна три фајла (три скупа података). Разлика између ова три скупа је у расподели и категоријама у карактеристици „Diabetes_012“. Фајл који смо ми изабрали за рад је „diabetes_012_health_indicators_BRFSS2015.csv“, смештен у истом фолдеру као и „R“ скрипта под називом „diabetes_dataset.csv“. Прво смо поставили радни директоријум као директоријум у ком се налази „R“ скрипта.

<pre>radni_direktorijum <- dirname(rstudioapi::getActiveDocumentContext())\$path setwd(radni_direktorijum) cat("Radni direktorijum je postavljen na:", getwd(), "\n")</pre>
Radni direktorijum je postavljen na: E:/FAX/UNP/Семинарски рад

Затим смо читали скуп података у радно окружење под променљивом data.

<pre>data <- read.csv("diabetes_dataset.csv") cat("Skup podataka mozete pogledati u promenljivoj data koja se automatski otvorila u radnom okruzenju", View(data))</pre>
Skup podataka mozete pogledati u promenljivoj data koja se automatski otvorila u radnom okruzenju

Информисање о скупу података

На почетку анализе детаљно смо се информисали о структури скупа података и значењу сваке карактеристике (feature-a). Број карактеристика (feature-a) и број опсервација у скупу података добијени су коришћењем R функције dim(), након чега су вредности исписане командом cat(). На овај начин утврђено је да скуп садржи 22 карактеристике (feature-a) и 253680 опсервација, што је довољно за формирање доброг предиктивног модела.

<pre>dimenzije_skupa = dim(data) cat("Broj featura skupa: ", dimenzije_skupa[2], "\n", "Broj opservacija: ", dimenzije_skupa[1])</pre>
Broj featura skupa: 22 Broj opservacija: 253680

Значење карактеристика (feature-a) смо приказали у следећој табели. На основу доменског знања смо их поделили у категорије како би приликом анализе података лакше испитивали синергијски утицај на предиктивну карактеристику.

Diabetes_012	Означава да ли испитаник има дијабетес, предидијабетес или га нема уопште. Ова карактеристика се узима као предиктивна.
Параметри здравља	

HighBP	Да ли испитаник има висок крвни притисак (хипертензију)
HighChol	Да ли испитаник има висок холестерол.
CholCheck	Да ли је испитаник радио проверу холестерола последњих 5 година
BMI	Индекс телесне масе, који је прорачун тежине и висине.
GenHlth	Како је испитаник оценио генерално своје здравље од 1 до 5 (1 – одлично, 2 – врло добро, 3 – добро, 4 – задовољавајуће, 5 - лоше)
Параметри стања	
HeartDiseaseorAttack	Да ли испитаник има хронично срчано обољење или је имао срчани удар
Stroke	Да ли је испитаник имао мождани удар
MentHlth	Број дана у последњих 30 дана када је испитаник имао менталне проблеме или лоше ментално здравље попут стреса, регулације емоција, депресије.
PhysHlth	Број дана у последњих 30 дана када је испитаник имао физичке проблеме или лоше физички осећао попут болести, повреда.
DiffWalk	Да ли испитаник има потешкоће у кретању или пењању уз степенице.
Параметри исхране	
Fruits	Да ли испитаник једе воће једном или више пута у току дана
Veggies	Да ли испитаник једе поврће једном или више пута у току дана
Параметри животних навика	
Smoker	Да ли је испитаник пушач (сматра се да јесте ако је попушио барем 100 цигара у животу)
HvyAlcoholConsump	Да ли је испитаник зависник од алкохола (више од 14 пића недељно за мушкарце, односно 7 пића за жене)
PhysActivity	Да ли је испитаник имао рекреативну физичку активност последњих 30 дана
Социјално-економски параметри	
AnyHealthcare	Да ли испитаник има некакву врсту здравствене неге укључујући здравствено осигурање или било какво здравствено покриће
NoDocbcCost	Да ли је у последњих 12 месеци испитаник имао потребу за доктором али није могао да приушти због трошкова
Income	Колике приходе има испитаник од 1 до 8 (1 - мање од 10.000 долара, 5 - мање од 35.000 долара, 8 - 75.000 долара или више)
Демографски параметри	

Sex	Ког је пола испитаник
Age	Колико испитаник има година
Education	Који степен едукације има испитаник од 1 до 6 (1 - Никада није ишао у школу или само у вртић 2 - основна школа, 3 – трогодишња средња школа, 4 - четворогодишња средња школа, 5 - факултет 3 године, 6 - факултет 4 године или више

Након што смо стекли увид у значење и контекст сваке појединачне карактеристике (feature-a), приступили смо анализи структуре скупа података. Испитивање структуре података представља један од кључних корака у процесу припреме података, јер нам омогућава да проверимо да ли је скуп података исправно учитан, те да проценимо да ли су све променљиве погодне за даљу статистичку анализу и изградњу модела машинског учења.

Основни циљ ове фазе је да стекнемо следеће увиде:

- Формат и типови података, као и идентификација потенцијалних категоријских променљивих.
- Провера валидности и квалитета података како би установили потенцијалне грешке у уносу, неправилни опсези, неочекиване вредности.
- Информисање о основној расподели и варијабилности вредности.

За иницијално испитивање структуре скупа података користили смо функцију `str()`, која пружа сажет али информативан приказ типа објекта и преглед првих неколико вредности за сваку променљиву.

<code>str(data)</code>
<pre>'data.frame': 253680 obs. of 22 variables: \$ Diabetes_012 : num 0 0 0 0 0 0 0 2 0 ... \$ HighBP : num 1 0 1 1 1 1 1 1 0 ... \$ HighChol : num 1 0 1 0 1 1 0 1 1 0 ... \$ CholCheck : num 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 ... \$ BMI : num 40 25 28 27 24 25 30 25 30 24 ... \$ Smoker : num 1 1 0 0 0 1 1 1 1 0 ... \$ Stroke : num 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ... \$ HeartDiseaseorAttack: num 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 ... \$ PhysActivity : num 0 1 0 1 1 1 0 1 0 0 ... \$ Fruits : num 0 0 1 1 1 1 0 0 1 0 ... \$ Veggies : num 1 0 0 1 1 1 0 1 1 1 ... \$ HvyAlcoholConsump : num 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ... \$ AnyHealthcare : num 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 ... \$ NoDocbcCost : num 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 ... \$ GenHlth : num 5 3 5 2 2 2 3 3 5 2 ... \$ MentHlth : num 18 0 30 0 3 0 0 0 30 0 ... \$ PhysHlth : num 15 0 30 0 0 2 14 0 30 0 ... \$ DiffWalk : num 1 0 1 0 0 0 0 1 1 0 ... \$ Sex : num 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 ... \$ Age : num 9 7 9 11 11 10 9 11 9 8 ...</pre>

```
$ Education      : num 4 6 4 3 5 6 6 4 5 4 ...
$ Income         : num 3 1 8 6 4 8 7 4 1 3 ...
```

Увидели смо да су све карактеристике уčitане као нумеричке, али на основу информација о значењу можемо закључити да нису по природи све нумеричке. HighBP, HighChol, CholCheck, Smoker, Stroke, HeartDiseaseorAttack, PhysActivity, Fruits, Veggies, HvyAlcoholConsump, AnyHealthcare, NoDocbcCost, DiffWalk, Sex оне представљају да/не вредности и модели их третирају као категоријске променљиве. Diabetes_012 такође може бити категоријска променљива, па је проблем који решавамо мултифункционалан, а не бинарни. Поред њих установили увидели смо ординалне скале у карактеристикама GenHlth, Education, Income. Док су карактеристике BMI, MentHlth, PhysHlth, Age континуалне карактеристике. Трансформацију типова ћемо обрадити у [поглављу припрема за експлоративну анализу](#).

Други увид је потврда документације да нема недостајућих вредности, па је следећи корак провера валидности и квалитета података како би установили потенцијалне грешке у уносу, неправилни опсежи, неочекиване вредности. За ту сврху користили смо функцију описне статистике summary(), која уједно даје и информације о основној расподели.

summary(data)			
Diabetes_012	HighBP	HighChol	CholCheck
Min. :0.0000	Min. :0.000	Min. :0.0000	Min. :0.0000
1st Qu.:0.0000	1st Qu.:0.000	1st Qu.:0.0000	1st Qu.:1.0000
Median :0.0000	Median :0.000	Median :0.0000	Median :1.0000
Mean :0.2969	Mean :0.429	Mean :0.4241	Mean :0.9627
3rd Qu.:0.0000	3rd Qu.:1.000	3rd Qu.:1.0000	3rd Qu.:1.0000
Max. :2.0000	Max. :1.000	Max. :1.0000	Max. :1.0000
BMI	Smoker	Stroke	
Min. :12.00	Min. :0.0000	Min. :0.00000	
1st Qu.:24.00	1st Qu.:0.0000	1st Qu.:0.00000	
Median :27.00	Median :0.0000	Median :0.00000	
Mean :28.38	Mean :0.4432	Mean :0.04057	
3rd Qu.:31.00	3rd Qu.:1.0000	3rd Qu.:0.00000	
Max. :98.00	Max. :1.0000	Max. :1.00000	
HeartDiseaseorAttack	PhysActivity	Fruits	
Min. :0.00000	Min. :0.0000	Min. :0.0000	
1st Qu.:0.00000	1st Qu.:1.0000	1st Qu.:0.0000	
Median :0.00000	Median :1.0000	Median :1.0000	
Mean :0.09419	Mean :0.7565	Mean :0.6343	
3rd Qu.:0.00000	3rd Qu.:1.0000	3rd Qu.:1.0000	
Max. :1.00000	Max. :1.0000	Max. :1.0000	
Veggies	HvyAlcoholConsump	AnyHealthcare	
Min. :0.0000	Min. :0.0000	Min. :0.0000	
1st Qu.:1.0000	1st Qu.:0.0000	1st Qu.:1.0000	
Median :1.0000	Median :0.0000	Median :1.0000	
Mean :0.8114	Mean :0.0562	Mean :0.9511	
3rd Qu.:1.0000	3rd Qu.:0.0000	3rd Qu.:1.0000	
Max. :1.0000	Max. :1.0000	Max. :1.0000	
NoDocbcCost	GenHlth	MentHlth	
Min. :0.00000	Min. :1.000	Min. : 0.000	
1st Qu.:0.00000	1st Qu.:2.000	1st Qu.: 0.000	
Median :0.00000	Median :2.000	Median : 0.000	
Mean :0.08418	Mean :2.511	Mean : 3.185	
3rd Qu.:0.00000	3rd Qu.:3.000	3rd Qu.: 2.000	
Max. :1.00000	Max. :5.000	Max. :30.000	

PhysHlth	Diffwalk	Sex
Min. : 0.000	Min. :0.0000	Min. :0.0000
1st Qu.: 0.000	1st Qu.:0.0000	1st Qu.:0.0000
Median : 0.000	Median :0.0000	Median :0.0000
Mean : 4.242	Mean :0.1682	Mean :0.4403
3rd Qu.: 3.000	3rd Qu.:0.0000	3rd Qu.:1.0000
Max. :30.000	Max. :1.0000	Max. :1.0000
Age	Education	Income
Min. : 1.000	Min. :1.00	Min. :1.000
1st Qu.: 6.000	1st Qu.:4.00	1st Qu.:5.000
Median : 8.000	Median :5.00	Median :7.000
Mean : 8.032	Mean :5.05	Mean :6.054
3rd Qu.:10.000	3rd Qu.:6.00	3rd Qu.:8.000
Max. :13.000	Max. :6.00	Max. :8.000

Увиди на основу описне статистике summary() који ће нам помоћи у креирању предиктивних модела су приказани у табели испод.

Diabetes_012	Максимум нам потврђује категоријску класификацију од три категорије. Вредност медијане, првог и трећег квантила је 0, то значи да је више од 75% опсервација нема дијабетес, док средња вредност говори да 29,69% има неки облик дијабетеса. Закључили смо да расподела класа није у равнотежи што је проблематично моделима. У наредним поглављима биће објашњено решење проблема.
Параметри здравља	
HighBP	Средња вредност нам говори да 42,9% опсервација има повишен притисак. Овај податак нам говори и о високој варијанси ($Var=0.429 \cdot (1-0.429)=0.429 \cdot 0.571=0.245$ приближно једнако максимално могућој 0.25)
HighChol	Иста ситуација као код HighBP.
CholCheck	Укупно 96,27% испитаника је проверило ниво холестерола у последњих пет година, што указује на веома малу варијабилност ове променљиве. Ипак, посматрано из угла доменског знања, ова карактеристика је значајна јер омогућава процену валидности податка о високом холестеролу. Наиме, пошто вредност холестерола има значајан утицај на модел (што се види из варијансе ове променљиве), поставља се питање да ли су подаци поуздани у случајевима када испитаник није вршио проверу у последњих пет година. Стога је неопходно испитати бројност таквих “непотврђених” уноса. Уколико их има релативно мало, могли би се искључити да се не би нарушила робусност модела. Међутим, ако су заступљени у већем броју, бољи приступ је додавање нове променљиве која указује на валидност уноса о холестеролу, уместо њиховог уклањања.

BMI	На основу доменског знања, претпостављамо да има аутлајера или грешка у уносу, јер минимална вредност је екстремно низак индекс, као и максимална вредност као екстремно висок. У даљем раду смо детаљније испитали. Већина испитаника је преко нормалне тежине, а како је средња вредност већа од медијане то нам говори да постоје веома високе вредности.
GenHlth	На основу медијане закључујемо да више од половине испитаника сматра да је њихово здравље врло добро или боље, а по трећем квантилу са категоријом добро достиже и 75%. Да би расподела била равномернија разматраћемо о прегруписању постојећих категорија.
Параметри стања	
HeartDiseaseorAttack	На основу средње вредности закључујемо да 9,4% опсервација има хронично срчано обољење или је имао срчани удар. На основу доменског знања закључили смо да је однос реалан и смислен.
Stroke	Променљива Stroke показује да је мождани удар изузетно ретка појава у анализираном узорку, будући да је само 4,06% испитаника пријавило да је икада имало мождани удар. Јасно је видљиво кроз податак да су први квантил, медијана и трећи квантил једнаки нули па је варијабилност мала. Овим се очекује да ће њен индивидуални утицај на модел бити ограничен, променљива и даље има потенцијалну релевантност због добро познате повезаности можданог удара са метаболичким поремећајима, укључујући дијабетес. Стога ћемо у наставку рада посебно анализирати синергијски утицај ове променљиве у комбинацији са другим здравственим индикаторима.
MentHlth	На основу медијане закључујемо да је најмање пола опсервација рекло да ниједан дан није имало стрес последњих месец дана. У просеку имали су око 3 дана са менталним потешкоћама што је на основу опсега до 30 тежња података ка нижим вредностима. Вредности су у опсегу по документацији (минимум и максимум). Закључујемо да треба графички испитати дистрибуцију па груписати вредности по категоријама у уоченим опсезима.
PhysHlth	Подаци нам говоре слично као и код карактеристике MentHlth. У овом случају просек је око 4 дана са физичким потешкоћама, али исто имамо дистрибуцију података ка нижим вредностима опсега. Закључак је испитати графички детаљније.
DiffWalk	На основу анализе закључујемо да постоје опсервације са и без потешкоћа. Расподела тих

	вредности није равномерна. У просеку 16,82% опсервација има потешкоће. Ово не чини њену варијансу велико, али на основу доменског знања закључујемо да је повезана са другим здравственим карактеристикама. У даљем раду ћемо испитивати њен синергијски утицај.
Параметри исхране	
Fruits	63.4% опсервација једе воће једном или више пута у току дана, што чини високу варијансу карактеристике.
Veggies	81.1% опсервација једе поврће једном или више пута у току дана. Висок проценат нам говори о мањој варијанси.
Параметри животних навика	
Smoker	Средња вредност нам говори да је 43,3% опсервација пушач, што чини добру варијабилност.
HvyAlcoholConsump	5.6% опсервација спада у алкохоличаре, што чини веома малу варијансу и неравномерну расподелу.
PhysActivity	Видимо да је 75,6% опсервација физички активно. На основу доменског знања овај податак нам се учинио сумњивим па смо га у даљем раду детаљније анализирали у биваријантној анализи.
Социјално-економски параметри	
AnyHealthcare	95% испитаника има неки вид здравствене заштите. Висок проценат је и знак мале варијабилности, па претпостављамо да овај параметар неће бити од великог значајан за модел.
NoDocbcCost	8,41% опсервација у последњих 12 месеци имао је потребу за доктором али није могао да приушти због трошкова.
Income	Као ординална категорија варијанса зависи од расподела. Видимо тенденцију као вишим категоријама прихода, тако да смо узели у даље испитивање, како би равномерно биле заступљене групе.
Демографски параметри	
Sex	Видимо равномерну расподелу, однос 44% мушкараца и 56% жена. А самим тим по формули даје високу варијансу.
Age	Медијана и средња вредност су приближно једнаке па можемо закључити симетричну расподелу. Распон вредности је од 1 до 13, па на основу доменског знања закључујемо да се ради о старосним групама. За формирање група у расподели која би користила моделу користили смо вредности квантила. Биће објашњено у поглављу трансформације података.
Education	Већина опсервација је концентрисана у мањем опсегу виших категорија образовања (1st Qu. = 4 (завршену четворогодишњу средњу школу), а 50% има већу од 5 (трогодишњи факултет). Закључили

	смо да можемо прегруписати постојеће категорије како би добили равномернију расподелу.
--	--

Након детаљног упознавања са значењем променљивих и анализе њихових расподела, као и формулисаних почетних закључака, приступили смо процесу припреме података за експлоративну анализу података (EDA).

Припрема података за ЕДА

У прошлој фази установили смо да у скупу података нема недостајућих вредности. С обзиром на то, у овој припремној фази фокус је на дефинисању исправних типова карактеристика и факторизацији категоријских променљивих.

Факторизација је поступак претварања променљивих које представљају категорије у посебан тип података факторе. Фактор је структура података која садржи ограничен број категорија и користи се када променљива не представља непрекидну нумеричку вредност, већ одређене класе или редослед класа. Иако су све променљиве у оригиналном скупу података биле учитане као нумеричке, током прегледа структуре података (`str()`) и описних статистика (`summary()`) установљено је да велики број њих садржи вредности у опсегу 0/1 или у малом дискретном скупу бројева (0,1,2,...). Факторизација је спроведена како би се ове вредности правилно третирале у статистичкој анализи и визуелизацији, јер би њихово задржавање као `numeric` довело до погрешног тумачења.

Следећим R кодом реализовали смо [закључке](#) о факторизацији:

Факторизација бинарних карактеристика у категорије не/да.
<pre>daNe_kategorije = c("HighBP", "HighChol", "CholCheck", "Smoker", "Stroke", "HeartDiseaseorAttack", "PhysActivity", "Fruits", "Veggies", "HvyAlcoholConsump", "AnyHealthcare", "NoDocbcCost", "DiffWalk") data[daNe_kategorije] = lapply(data[daNe_kategorije], factor, levels = c(0,1), labels = c("Ne","Da"))</pre>
Факторизација бинарне карактеристике Sex у категорије: женско / мушко.
<pre>data\$Sex = factor(data\$Sex, levels = c(0,1), labels = c("zensko","musko"))</pre>
Факторизација карактеристике Diabetes_012 у категорије: нема дијабетес / преддијабетес / дијабетес.
<pre>nivoi_Diabetes_012 = sort(unique(data\$Diabetes_012)) data\$Diabetes_012 = factor(data\$Diabetes_012, levels = nivoi_Diabetes_012, labels = c("nema dijabetes", "predijabetes", "dijabetes"))</pre>
Конверзија променљивих GenHlth, Education и Income у ординалне факторе, односно категорије са дефинисаним редоследом.
<pre>ordinalne_kategorije = c("GenHlth", "Education", "Income") nivoi_GenHlth = sort(unique(data\$GenHlth), decreasing = TRUE) data\$GenHlth = factor(data\$GenHlth, levels = nivoi_GenHlth, labels = c("Odlično", "Vrlo dobro", "Dobro", "Zadovoljavajuće", "Loše"), ordered = TRUE)</pre>

```

)

nivoi_Income = sort(unique(data$Income))
data$Income = factor(data$Income, levels = nivoi_Income,
  ordered = TRUE,
  labels = c("<10.000$",
    "10.000-14.999$",
    "15.000-19.999$",
    "20.000-24.999$",
    "25.000-34.999$",
    "35.000-49.999$",
    "50.000-74.999$",
    ">=75.000$"))

nivoi_Education = sort(unique(data$Education))
data$Education<- factor(data$Education, levels = nivoi_Education,
  ordered = TRUE,
  labels = c("bez skole/isao u vrtic",
    "osnovna skola",
    "3-god srednja",
    "4-god srednja",
    "3-god fakultet",
    "4-god fakultet"))

```

Након тога смо функцијом `str()` поново добили увид у типове карактеристика.

```

> str(data)
'data.frame': 253680 obs. of 22 variables:
 $ Diabetes_012 : Factor w/ 3 levels "nema dijabetes",...: 1 1 1 1 1 1 1 1 3 1 ...
 $ HighBP : Factor w/ 2 levels "Ne","Da": 2 1 2 2 2 2 2 2 1 ...
 $ HighChol : Factor w/ 2 levels "Ne","Da": 2 1 2 1 2 2 1 2 2 1 ...
 $ CholCheck : Factor w/ 2 levels "Ne","Da": 2 1 2 2 2 2 2 2 2 ...
 $ BMI : num 40 25 28 27 24 25 30 25 30 24 ...
 $ Smoker : Factor w/ 2 levels "Ne","Da": 2 2 1 1 1 2 2 2 2 1 ...
 $ Stroke : Factor w/ 2 levels "Ne","Da": 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 ...
 $ HeartDiseaseorAttack: Factor w/ 2 levels "Ne","Da": 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 ...
 $ PhysActivity : Factor w/ 2 levels "Ne","Da": 1 2 1 2 2 2 1 2 1 1 ...
 $ Fruits : Factor w/ 2 levels "Ne","Da": 1 1 2 2 2 2 1 1 2 1 ...
 $ Veggies : Factor w/ 2 levels "Ne","Da": 2 1 1 2 2 2 1 2 2 2 ...
 $ HvyAlcoholConsump : Factor w/ 2 levels "Ne","Da": 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 ...
 $ AnyHealthcare : Factor w/ 2 levels "Ne","Da": 2 1 2 2 2 2 2 2 2 ...
 $ NoDocbcCost : Factor w/ 2 levels "Ne","Da": 1 2 2 1 1 1 1 1 1 1 ...
 $ GenHlth : Ord.factor w/ 5 levels "1"<"2"<"3"<"4"<...: 5 3 5 2 2 2 3 3 5 2 ...
 $ MentHlth : num 18 0 30 0 3 0 0 0 30 0 ...
 $ PhysHlth : num 15 0 30 0 0 2 14 0 30 0 ...
 $ DiffWalk : Factor w/ 2 levels "Ne","Da": 2 1 2 1 1 1 1 2 2 1 ...
 $ Sex : Factor w/ 2 levels "zensko","musko": 1 1 1 1 1 2 1 1 2 ...
 $ Age : num 9 7 9 11 11 10 9 11 9 8 ...
 $ Education : Ord.factor w/ 6 levels "bez skole/isao u vrtic"<...: 4 6 4 3 5 6 6 4 5 4 ...
 $ Income : Ord.factor w/ 8 levels "<10.000$"<"10.000-14.999$"<...: 3 1 8 6 4 8 7 4 1 3 ...

```

Сада можемо прећи на детаљнију анализу и припрему података за моделе.

Експлоративна анализа података (ЕДА)

У оквиру експлораторне анализе података детаљније смо испитали све увиде добијене у почетној фази информисања о подацима. На основу резултата ЕДА фазе идентификовани су кључни обрасци, потенцијалне неправилности и потребе за додатним трансформацијама. Сви закључци из ове фазе директно су примењени у наредном кораку припреме и трансформације података. На крају поглавља је приказана табела са коначним трансформацијама које треба извршити за сваку карактеристику и табела са међусобним синергијама.

Процес експлоративне анализе смо спровели у два степена:

- Униваријантна анализа,
- Биваријантна анализа,


Униваријантна анализа

Униваријантна анализа подразумева анализу једне карактеристике (feature-a). Радили смо по систему претпоставки из фазе информисања и доказивали те претпоставке, на крају формирајући закључак.

Анализа


Претпоставка бр. 1: У карактеристици (feature-y) Diabetes_012 расподела класа није у равнотежи.

```
ggplot(data, aes(x = Diabetes_012, fill = Diabetes_012)) +  
  geom_bar() +  
  labs(title = "Distribucija kategorija Diabetes_012", x = "Kategorije", y = "Broj opservacija") +  
  scale_fill_paletteer_d("MetBrewer::Archambault") + theme(legend.position="none")
```



На основу графика потврђујемо да класе у карактеристици (feature-y) Diabetes_012 нису балансиране тј. класе нису равномерно заступљене. Класа „нема дијабетес“ је доминантна, са нешто више од 200 000 опсервација од укупно 253 680, што може изазвати склонност модела да увек предвиђа ову класу. Због тога је потребно применити методе балансирања података, као што су oversampling, undersampling, како би модел боље препознавао и мање заступљене класе. Перформансе модела треба мерити помоћу F1-score и recall по класи, а не само на основу тачности (accuracy), како би се осигурало да све класе буду адекватно предвиђене.

Претпоставка бр. 2: Вредност HighBP за 42,9% опсервација је позитивна тј. да имају повишен крвни притисак.



Графиком потврђујемо претпоставку да је вредност HighBP позитивна код 42,9% опсервација, односно да значајан део испитаника има повишен крвни притисак. Оваква расподела HighBP чини је веома информативном тј. варијанса је висока. Варијанса представља меру распршености података око средње вредности, рачуна се по формули $Var(X) = p(1 - p)$

Commented [MS4]: Иницијално текст је гласио: "Како је HighBP бинарна категоријска карактеристика ово је чини веома утицајном за модел тј. варијанса је висока."
Коментар професора: ово није тачно:

бинарност не имплицира високу варијансу

варијанса зависи од расподеле, не од типа променљиве

Pogresan zakljucak je za sve promenljive ovog tipa sto ste pisali.

Commented [MS5R4]: Слажемо се. Реченицом нисмо мислили да бинарност чини високу варијансу, што није јасно из реченице јер смо користили показну заменицу "ово", која се заправо односила на процентуални однос тј. расподелу. Структура реченице је сада измењена на овом и свим местима са истим разматрањем.


Максимална варијанса код бинарних променљивих (што је и HighBP) износи 0.25 и јавља се када су класе подједнако заступљене ($p = 0.5$). Што је варијанса ближа овој вредности, то је већа информативност променљиве, јер се категорије значајно разликују. Уколико је варијанса ниска то значи да је једна категорија доминантна и да модел на основу променљиве не може ефикасно да учи.

```
> varijansa_highBP = var(as.numeric(data$HighBP))
> cat("Varijansa HighBP: ", varijansa_highBP, "od maksimalne moguće 0.25\n")
Varijansa HighBP: 0.2449601 od maksimalne moguće 0.25
```

У случају променљиве HighBP, добијена варијанса 0.2449601 што је веома близу максималној вредности за бинарне податке.

Претпоставка бр. 3: Вредност HighChol за 42,4% опсервација је позитивна тј. да имају повишен холестерол.

```
ggplot(data, aes(x = HighChol, fill = HighChol)) +
  geom_bar() +
  labs(title = "Distribucija kategorija HighChol", subtitle = "Da li ispitanik ima visok holesterol?", x = "Kategorije", y = "Broj opservacija") +
  scale_fill_paletteer_d("MetBrewer::Archambault") + theme(legend.position="none")
```




Графиком потврђујемо претпоставку. Оваква расподела HighChol чини је веома информативном тј. варијанса је висока. Што потврђује следећи код:

```
> cat("Varijansa HighChol: ", varijansa_highChol, "od maksimalne moguće 0.25\n")
Varijansa HighChol: 0.2442433 od maksimalne moguće 0.25
```


Претпоставка бр. 4: Укупно 96,27% испитаника је проверило ниво холестерола у последњих пет година, што указује на веома малу варијабилност ове променљиве.

Прво смо визуелно представили дистрибуцију ове карактеристике.

```
ggplot(data, aes(x = CholCheck , fill = CholCheck )) +  
  geom_bar() +  
  labs(title = "Distribucija kategorija CholCheck", subtitle = "Da li je ispitanik proverio holesterol  
poslednjih 5 godina?", x = "Kategorije", y = "Broj opservacija") +  
  scale_fill_paletteer_d("MetBrewer::Archambault") + theme(legend.position="none")
```




Графиком потврђујемо претпоставку. Оваква расподела CholCheck чини је неинформативном тј. варијанса је ниска. Што потврђује следећи код:

```
> cat("Varijansa CholCheck: ", varijansa_CholCheck, "od maksimalne moguće 0.25\n")  
Varijansa CholCheck: 0.03593707 od maksimalne moguće 0.25
```


Претпоставка бр. 5: У карактеристици БМИ има аутлајера или грешка у уносу, јер је минимална вредност екстремно низак индекс, као и максимална вредност као екстремно висок.

Прво смо визуелно представили дистрибуцију ове карактеристике.

```
ggplot(data, aes(x = BMI)) +  
  geom_histogram(bins = 50, fill = "#7C4B73FF", color="#381A61FF") +  
  labs(title = "Distribucija BMI", x = "BMI", y = "Broj opservacija")
```



Преко приказане дистрибуције видимо реп ка већим вредностима БМИ. Свака вредност која је значајно удаљена од већине података представља аутлајер, то не значи нужно грешку, може бити екстрем. Како су на графику тешко уочљиви аутлајери, користили смо прецизнији график боксплот.



Тачке које се налазе изван кутије представљају екстремне вредности (аутлајере) према IQR методу. Ови аутлајери указују на испитанике са значајно високим или ниским BMI вредностима, које могу бити природни, али и потенцијално резултат грешке у уносу. Број таквих података добићемо коришћењем IQR методе.

```

> donja_granica <- quantile(data$BMI, 0.25) - 1.5 * IQR(data$BMI)
> gornja_granica <- quantile(data$BMI, 0.75) + 1.5 * IQR(data$BMI)
>
> autlajeri_statisticki <- data %>% filter(BMI < donja_granica | BMI > gornja_granica)
> cat("Po IQR metodu statističkih autlajera ima " , nrow(autlajeri_statisticki), ".Što je",
nrow(autlajeri_statisticki)/nrow(data)*100,"% ukupnog broja opservacija\n")
Po IQR metodu statističkih autlajera ima 9847. Što je 3.881662 % ukupnog broja opservacija

```

На основу IQR методе, идентификовано је 9 847 аутлајера у подацима за променљиву BMI, што чини приближно 3,88 % укупног броја опсервација. Ове вредности могу представљати реалне, али ретке случајеве као и потенцијалне грешке у уносу.

Да би тачно дефинисали прво смо се водили доменским знањем. По таблицама вредности између 12 -14 или 60 - 70 могу бити екстремне, али потенцијално реалне. Тако да смо све вредности преко окарактерисали као доменске аутјлајере.

```

> autlajeri_domenski <- data %>% filter(BMI < 12 | BMI > 70)
> cat("Po domenskom znanju autlajera ima " , nrow(autlajeri_domenski), ".Što je",
nrow(autlajeri_domenski)/nrow(data)*100,"% ukupnog broja opservacija\n")
Po domenskom znanju autlajera ima 584 .Što je 0.2302113 % ukupnog broja opservacija

```


Закључак је да 0.2302113% представља мали проценат од укупног броја података .

Претпоставка бр. 6: GenHelt нема равномерну расподелу класа, 75% испитаника сматра своје здравље 1 – одлично, 2 – врло добро, 3 – добро, чиме се остале класе свести у једну.

```

ggplot(data, aes(x = GenHlth , fill = GenHlth )) +
  geom_bar() +
  labs(title = "Distribucija kategorija GenHlth", subtitle = "Kako ispitanik ocenjuje svoje opste
zdravlje?", x = "Kategorije", y = "Broj opservacija") +
  scale_fill_paletteer_d("MetBrewer::Archambault") + theme(legend.position="none")

```



На основу графика потврђујемо неуравнотежену расподелу. Испитали смо и тачну процентуалну расподелу сваке класе.

```
data %>% group_by(GenHlth) %>%
  summarise(
    Broj_opservacija = n(),
    Procenat_opservacija = round(n() / nrow(data) * 100, 2)
  )
```

A tibble: 5 × 3


GenHlth	Broj_opservacija	Procenat_opservacija
Odlično	45299	17.9
Vrlo dobro	89084	35.1
Dobro	75646	29.8
Zadovoljavajuće	31570	12.4
Loše	12081	4.76

На основу процентуалне расподеле класа закључујемо да класе задовољавајуће и лоше спојимо под једну класу која означава лошије здравствено стање.

Претпоставка бр. 7: Средња вредност HeartDiseaseorAttack карактеристике показује да 9,4% опсервација има хронично срчано обољење или је имао срчани удар. Што чини променљиву неуравнотеженом.

На основу доменског знања закључили смо да је овака однос у узорку реалан и смислен. Како би добили бољи увид у расподелу података користићемо стубичасти график.

```
ggplot(data, aes(x = HeartDiseaseorAttack , fill = HeartDiseaseorAttack )) +
  geom_bar() +
  labs(title = "Distribucija kategorija HeartDiseaseorAttack ", subtitle = "Da li je ispitanik imao srčani udar ili ima bolest srca?", x = "Kategorije", y = "Broj opservacija") +
  scale_fill_paletteer_d("MetBrewer::Archambault") + theme(legend.position="none")
```




Графиком потврђујемо претпоставку. Оваква расподела HeartDiseaseorAttack чини је неинформативном тј. варијанса је ниска. Што потврђује следећи код:

```
> varijansa_HeartDiseaseorAttack = var(as.numeric(data$HeartDiseaseorAttack))
> cat("Varijansa HeartDiseaseorAttack : ", varijansa_HeartDiseaseorAttack, "od maksimalne
moguce 0.25\n")
Varijansa HeartDiseaseorAttack : 0.085315 od maksimalne moguce 0.25
```

Претпоставка бр. 8: Променљива Stroke показује да је мождани удар изузетно ретка појава.

```
ggplot(data, aes(x = Stroke , fill = Stroke )) +
  geom_bar() +
  labs(title = "Distribucija kategorija Stroke ", subtitle = "Da li je ispitanik imao moždani udar?", x
= "Kategorije", y = "Broj opservacija") +
  scale_fill_paletteer_d("MetBrewer::Archambault") + theme(legend.position="none")
```




Графиком потврђујемо претпоставку. Оваква расподела Stroke чини је неинформативном тј. варијанса је ниска. Што потврђује следећи код:

```
> varijansa_Stroke = var(as.numeric(data$Stroke))
> cat("Varijansa Stroke : ", varijansa_Stroke , "od maksimalne moguće 0.25\n")
Varijansa Stroke : 0.03892496 od maksimalne moguće 0.25
```


Претпоставка бр. 9: MentHlth указује да већина испитаника није имала менталне потешкоће током већег дела последњих 30 дана, при чему је расподела броја дана са стресом концентрисана ка нижим вредностима.

```
ggplot(data, aes(x = MentHlth)) +
  geom_histogram(bins = 50, fill = "#7C4B73FF", color="#381A61FF") +
  labs(title = "Distribucija MentHlth", x = "MentHlth", y = "Broj opservacija",
  subtitle = "Koliko dana u poslednjih mesec dana je ispitanik imao stres?")
```




На основу графика видимо неравномерну расподелу одговора. Закључујемо да треба свести одговоре на класе “да” и “не” (имали су потешкоће са менталним здрављем / нису имали потешкоће са менталним здрављем).

Претпоставка бр. 10: PhysHlth указује да већина испитаника није имала физичке потешкоће током већег дела последњих 30 дана, при чему је расподела броја дана са физичким потешкоћима концентрисана ка нижим вредностима.



На основу графика видимо неравномерну расподелу одговора. Закључујемо да треба свести одговоре на класе “да” и “не” (имали су потешкоће са физичким здрављем / нису имали потешкоће са физичким здрављем).

Претпоставка бр. 11: 63.4% опсервација једе воће једном или више пута у току дана, што чини високу варијансу карактеристике Fruits.




Графиком потврђујемо претпоставку. Оваква расподела Fruits чини је веома информативном тј. варијанса је висока. Како је Fruits бинарна категоријска карактеристика ово је чини веома утицајном за модел тј. варијанса је висока. Што потврђује следећи код:

```
> varijansa_fruits = var(as.numeric(data$Fruits))
> cat("Varijansa Fruits: ", varijansa_fruits, "od maksimalne moguće 0.25\n")
Varijansa Fruits: 0.2319763 od maksimalne moguće 0.25
```

Претпоставка бр. 12: Расподела категорија није равномерна у променљивој DiffWalk.

```
ggplot(data, aes(x = DiffWalk , fill = DiffWalk )) +
  geom_bar() +
  labs(title = "Distribucija kategorija DiffWalk ", subtitle = "Da li je ispitanik ima poteškoće u kretanju ili penjanju uz stepenice?", x = "Kategorije", y = "Broj opservacija") +
  scale_fill_paletteer_d("MetBrewer::Archambault") + theme(legend.position="none")
```





Овакав визуелни однос не чини њену варијансу великом, али на основу доменског знања закључујемо да је повезана са другим здравственим карактеристикама. У даљем раду ћемо испитивати њен синергијски утицај. Потврда ниже варијабилности:

```
> varijansa_DiffWalk = var(as.numeric(data$DiffWalk))
> cat("Varijansa DiffWalk : ", varijansa_DiffWalk, "od maksimalne moguće 0.25\n")
Varijansa DiffWalk : 0.1399251 od maksimalne moguće 0.25
```

Претпоставка бр. 13: 81.1% опсервација једе поврће једном или више пута у току дана. Висок проценат нам говори о мањој варијанси Veggies.

```
ggplot(data, aes(x = Veggies , fill = Veggies )) +
  geom_bar() +
  labs(title = "Distribucija kategorija Veggies", subtitle = "Da li ispitanik jede jednu porciju ili
više povrća u toku dana?", x = "Kategorije", y = "Broj opservacija") +
  scale_fill_paletteer_d("MetBrewer::Archambault") + theme(legend.position="none")
```




Графиком потврђујемо претпоставку. Оваква расподела Veggies чини је неинформативном тј. варијанса је ниска. Што потврђује следећи код:

```
> varijansa_veggies = var(as.numeric(data$Veggies))
> cat("Varijansa Veggies: ", varijansa_veggies, "od maksimalne moguće 0.25\n")
Varijansa Veggies: 0.1530182 od maksimalne moguće 0.25
```

Претпоставка бр. 14: 43,3% опсервација пушач, што је чини утицајном на модел тј. висок проценат нам говори о високој варијанси Smoker.

```
ggplot(data, aes(x = Smoker , fill = Smoker )) +
  geom_bar() +
  labs(title = "Distribucija kategorija Smoker", subtitle = "Da li je ispitanik konzumirao
minimalno 100 cigareta u toku zivota?", x = "Kategorije", y = "Broj opservacija") +
  scale_fill_paletteer_d("MetBrewer::Archambault") + theme(legend.position="none")
```




Графиком потврђујемо претпоставку. Оваква расподела Smoker чини је веома информативном тј. варијанса је висока. Што потврђује следећи код:

```
> varijansa_smoker = var(as.numeric(data$Smoker))
> cat("Varijansa Smoker: ", varijansa_smoker, "od maksimalne moguće 0.25\n")
Varijansa Smoker: 0.2467712 od maksimalne moguće 0.25
```

Претпоставка бр. 15: 5.6% опсервација спада у алкохоличаре. Расподела је неравномерна тј. оријентисана ка једној класи, па карактеристика HvyAlcoholConsump није утицајна за модел тј. нема високу варијансу.

```
ggplot(data, aes(x = HvyAlcoholConsump , fill = HvyAlcoholConsump )) +
  geom_bar() +
  labs(title = "Distribucija kategorija HvyAlcoholConsump", subtitle = "Da li je ispitanik
konzumirao 7 ili više pića u toku nedelje?", x = "Kategorije", y = "Broj opservacija") +
  scale_fill_paletteer_d("MetBrewer::Archambault") + theme(legend.position="none")
```




Графиком потврђујемо претпоставку. Оваква расподела HvyAlcoholConsump чини је неинформативном тј. варијанса је ниска. Како је бинарна категоријска карактеристика ово је чини неутцајном за модел тј. варијанса је мала. Што потврђује следећи код:

```
> varijansa_hvyAlcoholConsump = var(as.numeric(data$HvyAlcoholConsump))
> cat("Varijansa HvyAlcoholConsump: ", varijansa_hvyAlcoholConsump, "od maksimalne
moguce 0.25\n")
Varijansa HvyAlcoholConsump: 0.05303891 od maksimalne moguce 0.25
```

Претпоставка бр. 16: Већина опсервација је имало рекреативну физичку активност последњих 30 дана (PhysActivity).

```
ggplot(data, aes(x = PhysActivity , fill = PhysActivity )) +
  geom_bar() +
  labs(title = "Distribucija kategorija PhysActivity ", subtitle = "Da li je ispitanik imao rekreativnu
fizičku aktivnost poslednjih 30 dana?", x = "Kategorije", y = "Broj opservacija") +
  scale_fill_paletteer_d("MetBrewer::Archambault") + theme(legend.position="none")
```




Графиком потврђујемо претпоставку. Оваква расподела PhysActivity чини је неинформативном тј. варијанса је ниска. Што потврђује следећи код:

```
> varijansa_PhysActivity = var(as.numeric(data$PhysActivity))
> cat("Varijansa PhysActivity : ", varijansa_PhysActivity, "od maksimalne moguće 0.25\n")
Varijansa PhysActivity : 0.1841861 od maksimalne moguće 0.25
```

Претпоставка бр. 17: 95% испитаника има неки вид здравствене заштите. Висок проценат је и знак мале варијабилности тиме AnyHealthcare карактеристика неће бити од великог значајан за модел.

```
ggplot(data, aes(x = AnyHealthcare, fill = AnyHealthcare)) +
  geom_bar() +
  labs(title = "Distribucija kategorija AnyHealthcare", subtitle = "Da li ispitanik ima neki vid
zdravstvene zastite?", x = "Kategorije", y = "Broj opservacija") +
  scale_fill_paletteer_d("MetBrewer::Archambault") + theme(legend.position="none")
```




Графиком потврђујемо претпоставку. Оваква расподела AnyHealthcare чини је неинформативном тј. варијанса је ниска. Што потврђује следећи код:

```
> varijansa_anyHealthcare = var(as.numeric(data$AnyHealthcare))
> cat("Varijansa AnyHealthcare: ", varijansa_anyHealthcare, "od maksimalne moguće 0.25\n")
Varijansa AnyHealthcare: 0.04655182 od maksimalne moguće 0.25
```

Претпоставка бр. 18: 8,41% опсервација у последњих 12 месеци имао је потребу за доктором али није могао да приушти због трошкова. Ова статистика показује NoDocbcCost као ниско варијабилну карактеристику.

```
ggplot(data, aes(x = NoDocbcCost, fill = NoDocbcCost)) +
  geom_bar() +
  labs(title = "Distribucija kategorija NoDocbcCost", subtitle = "Da li ispitanik imao potrebu za doktorom, a nije moga to da priušti?", x = "Kategorije", y = "Broj opservacija") +
  scale_fill_paletteer_d("MetBrewer::Archambault") + theme(legend.position="none")
```



Графиком потврђујемо претпоставку. Оваква расподела NoDocbcCost чини је неинформативном тј. варијанса је ниска. Што потврђује следећи код:

```
> varijansa_noDocbcCost = var(as.numeric(data$NoDocbcCost))
> cat("Varijansa NoDocbcCost: ", varijansa_noDocbcCost, "od maksimalne moguće 0.25\n")
Varijansa NoDocbcCost: 0.07709147 od maksimalne moguće 0.25
```


Претпоставка бр. 19: Income као ординална категорија има тенденцију као вишим категоријама прихода, уз асиметричну расподелу категорија.

```
Дефинисали смо вектор боја како би покрили све категорије на графику.
colorS <- c("#88A0DCFF", "#381A61FF", "#7C4B73FF", "#ED968CFF", "#AB3329FF",
"#E78429FF", "#F9D14AFF", "#73652DFF")
График приказа расподеле променљиве lcome
ggplot(data, aes(x = Income, fill = Income)) +
  geom_bar() +
  labs(
    title = "Distribucija kategorija Income",
    y = "Broj opservacija",
  ) +
  geom_text(stat = "count", aes(label = ..count..), vjust = -0.5) +
  scale_fill_manual(values = colorS)+
  theme(legend.position = "bottom",
    axis.text.x = element_blank())
```

Commented [MS6]: Иницијална претпоставка гласила је "Income као ординална категорија има тенденцију као вишим приходима, расподела није равномерна па неће имати утицај на модел."

Коментар професора: "odakle vam ovo? Nije tacna tvrdnja "

Commented [MS7R6]: Претпоставка бр. 19. изведена је из дела основног информисања о подацима конкретно тумачење функције summary(data). Карактеристика Income има следеће резултате Min. 1st Qu. Median Mean 3rd Qu. Max. 1.000 5.000 7.000 6.054 8.000 8.000 Сматрамо коректну сугестију професора. Да, формулација није била прецизна. Не тенденцију ка вишим приходима, већ тенденцију ка вишим категоријама прихода (медијана износи 5 од 8 категорија). Слажемо се да на основу само ових података не можемо претпоставити неуравнотежену расподелу или утицај на модел (то је део биваријантне анализе). Више смо мислили на асиметричну расподелу.



На основу графика видимо тенденцију података ка вишим категоријама прихода (90385 опсервација има 75000+ приходе). Да би нам однос био јаснији, испитали смо процентуалну заступљеност категорија помоћу функције `prop.table()`. Пошто ова функција ради над табелама броја појављивања категорија, ординалну променљиву *Income* смо проследили у виду табеле.

```
> prop.table(table(data$Income))*100
```

```

<10.000$ 10.000-14.999$ 15.000-19.999$ 20.000-24.999$ 25.000-34.999$ 35.000-49.999$
 3.867471  4.644828  6.304793  7.937165 10.203012 14.376380
50.000-74.999$ >=75.000$
17.036818 35.629533

```

Највећи удео испитаника припада највишој приходној категорији ($\geq 75.000\$$), која обухвата око 35,6% укупних опсервација. Уколико се посматрају заједно категорије са приходима већим од 50.000\$, може се закључити да више од половине испитаника (преко 52%) остварује високе приходе ($\geq 50.000\$$).


Са аспекта доменског знања, приходи су повезани са бројним аспектима живота појединца, укључујући квалитет живота, приступ здравственој заштити и здраве животне навике. Стога се може претпоставити да променљива *Income* има потенцијалну индиректну повезаност са појавом дијабетеса, због чега је њено даље разматрање и трансформација категорија у мањи број група оправдана у наставку рада.

На основу дистрибуције категорија по количини примања јасно је да постоји асиметрија међу њима, зато ћемо у даљим корацима направити нову варијаблу на основу ове и

доменског знања о категоријама становништва по основу годишњих примања где ће ових 8 категорија бити барем преполовљено, што ће допринети умањењу асиметрије међу њима.

Претпоставка бр. 20: Категорија која одређује пол испитаника (Sex) има равномерну расподелу што чини утицајном за модел.

```
ggplot(data, aes(x = Sex, fill = Sex)) +
  geom_bar() +
  labs(title = "Distribucija kategorija Sex", subtitle = "Kol pola je ispitanik?", x = "Kategorije", y =
"Broj opservacija") +
  scale_fill_paletteer_d("MetBrewer::Archambault") + theme(legend.position="none")
```



Графиком потврђујемо претпоставку. Оваква расподела Sex чини је веома информативном тј. варијанса је висока. Што потврђује следећи код:


```
> varijansa_sex = var(as.numeric(data$Sex))
> cat("Varijansa Sex: ", varijansa_sex, "od maksimalne moguće 0.25\n")
Varijansa Sex: 0.2464419 od maksimalne moguće 0.25
```

Претпоставка бр. 21: Расподела категорије Age је симетрична, са распоном вредности од 1 до 13.

```
ggplot(data, aes(x = Age)) +
  geom_histogram(bins = 50, fill = "#7C4B73FF", color = "#381A61FF") +
  labs(title = "Distribucija Age", x = "Age", y = "Broj opservacija",
  subtitle = "Starost ispitanika")
```

Commented [MS8]: Коментар професора: zasto je bin 50?

Commented [MS9R8]: Опсег вредности карактеристике Age чине дискретне, целобројне вредности од 1 до 13, што је наведено у документацији скупа података. С обзиром на то да се променљива понаша као категоријска, избор броја бинова у хистограму не утиче на закључке о расподели, већ искључиво на визуелни приказ, односно на већу или мању међусобну удаљеност стубића. Конкретно број 50 је био у примеру синтаксе коју смо имали у личним скриптама.



Age је нумеричка променљива (показано у делу информисања о скупу података), па смо за приказ дистрибуције исте користили хистограм. На основу овог графика уочавамо симетрију у расподели, чиме потврђујемо претпоставку.


Као што је речено у поглављу информисања о структури података вредности су целобројне у распону од 1 до 13, на основу доменског знања закључујемо да се не ради о тачном броју година већ о старосној групи. Све категорије су довољно заступљене што чини расподелу стабилном.

Обзиром на наведено, а у циљу примене у моделу, потребно је извршити трансформацију ове променљиве формирањем ординалних категорија које ће омогућити уравнотеженију и интерпретабилнију расподелу. Пре категоризације, у биваријантној анализи се могу додатно испитати интервали, како би се потенцијално смањио број група и поједноставила интерпретација модела.

На основу хистограма види се да ће постојати доста категорија, тј 13, што је много, а притом иако је дистрибуција међу вредностима задовољавајућа, потребно је напоменути да би по модел било боље дистрибуцију мало побољшати, а притом је потребно и смањити број категорија, што ће се према даљим истраживањима и утврдити на колико категорија свести ову варијаблу, а да се притом побољша дистрибуција.

Претпоставка бр. 22: Већина вредности у категорији Education има тенденцију ка вишим категоријама образовања, што чини расподелу неуравнотеженом и губи значајност за модел.

```
ggplot(data, aes(x = Education, fill = Education)) +
  geom_bar() +
  labs(
    title = "Distribucija kategorija Education",
    y = "Broj opservacija",
  ) +
  geom_text(stat = "count", aes(label = ..count..), vjust = -0.5) +
```



Графиком смо потврдили претпоставку. Закључили смо да можемо прегруписати постојеће категорије како би добили равномернију расподелу.

Табела закључака

Diabetes_012	Потребно применити методе балансирања података, као што су oversampling (SMOTE), undersampling.
Параметри здравља	
HighBP	Варијанса износи 0,2449 од максимални 0,25 што је чини веома информативном.
HighChol	Варијанса износи 0,2424 од максимални 0,25 што је чини веома информативном.
CholCheck	Варијанса износи 0.03593707 од максимални 0,25 што је не чини информативном.
BMI	Уочавају се екстремне вредности од којих су <12 и >70 окарактерисани као доменски аутлајери и чине 0.2302113% опсервација. Утицај аутлејера треба испитати биваријантном анализом.
GenHlth	На основу процентуалне расподеле класа закључујемо да класе задовољавајуће и

Commented [MS10]: Коментар професора: Vecina zakljucaka u tabeli nije tacna

Commented [MS11R10]: Слажемо се са сугестијом. Неки закључци нису били оправдани, тако да су уклоњени.

	лоше спојимо под једну класу која означава лошије здравствено стање.
Параметри стања	
HeartDiseaseorAttack	На основу средње вредности закључујемо да 9,4% опсервација има хронично срчано обољење или је имао срчани удар. На основу доменског знања закључили смо да је однос реалан и смислен. Варијанса износи 0.085315 од максимални 0,25 што је не чини информативном.
Stroke	Варијанса износи 0.03892496 од максимални 0,25 што је не чини информативном. Променљива и даље има потенцијалну релевантност због добро познате доменске повезаности могућег удара са метаболичким поремећајима, укључујући дијабетес.
MentHlth	Највећа концентрација одговора је за вредност 0 тј. да испитаник није имао стрес у последњих 30 дана, стварајући неуравнотежену расподелу. Закључујемо да треба испитати потенцијалне категорије.
PhysHlth	Највећа концентрација одговора је за вредност 0 тј. да испитаник није имао физичких потешкоћа у последњих 30 дана, стварајући неуравнотежену расподелу. Закључујемо да треба испитати потенцијалне категорије.
DiffWalk	Варијанса износи 0.03892496 од максимални 0,25 што је не чини информативном. У даљем раду ћемо испитивати њен синергијски утицај.
Параметри исхране	
Fruits	Варијанса износи 0.2319763 од максимални 0,25 што је чини информативном.
Veggies	Варијанса износи 0.1530182 од максимални 0,25 што је не чини информативном.
Параметри животних навика	
Smoker	Варијанса износи 0.2467712 од максимални 0,25 што је чини информативном.
HvyAlcoholConsump	Варијанса износи 0.05303891 од максимални 0,25 што је не чини информативном.
PhysActivity	Велика већина опсервација је имало рекреативну физичку активност последњих 30 дана. Варијанса износи 0.1841861 од максимални 0,25 што је не чини много информативном. На основу доменског

	знања сматрамо да ова карактеристика има везе са потешкоћама у кретању DiffWalk.
Социјално-економски параметри	
AnyHealthcare	Варијанса износи 0.04655182 од максимални 0,25 што је не чини информативном.
NoDocbcCost	Варијанса износи 0.07709147 од максимални 0,25 што је не чини информативном.
Income	Уочава се јасна тенденција ка вишим категоријама прихода (преко 52%) остварује високе приходе. Са аспекта доменског знања, приходи су повезани са бројним аспектима живота појединца, укључујући квалитет живота, приступ здравственој заштити и здраве животне навике, због чега је њено даље разматрање и трансформација категорија у мањи број група оправдана у наставку рада.
Демографски параметри	
Sex	Варијанса износи 0.2464419 од максимални 0,25 што је чини информативном.
Age	Расподела категорије Age је симетрична, са распоном вредности од 1 до 13 на основу доменског знања закључујемо да се не ради о тачном броју година већ о старосној групи. Потребна је категоризација.
Education	Већина вредности у категорији Education има тенденцију ка вишим категоријама образовања, што чини расподелу неуравнотеженом и губи значајност за модел, с тога прегруписавање је оправдано.

Биваријантна анализа

Биваријантна анализа обухвата визуелну и статистичку анализу две карактеристике у циљу добијања закључака и њиховом односу и зависностима. Испитивали смо постојање образаца, повезаности, али и јачине те повезаности.

У зависности од типа карактеристика које се међусобно анализирају, визуелно биваријантном анализом обухватили смо:

- однос категоријске и нумеричке преко бокс плот дијаграма и density дијаграма,
- однос категоријске и категоријске карактеристике преко стубичастог дијаграма и топлотне мапе.

Добијене претпоставке смо тестирали статистички, опет у зависности од типа типа карактеристика које се међусобно анализирају:

- однос категоријске (са више од две категорије) и нумеричке преко анова теста и post-hoc анализе ми смо изабрали Tukey HSD тест,
- однос категоријске и категоријске карактеристике преко χ^2 теста и Крамеровог коефицијента.

Статистички тестови имплементирани су у функцијама `anova_test`, `tukey_fun`, `chi_sq_test`, `cramer_v`.

Имплементација метода статистичких тестова

АНОВА *ѡесѡ* (Analysis of Variance)

АНОВА тест се користи за испитивање да ли постоји статистички значајна разлика у средњим вредностима нумеричке променљиве између три или више категорија категоријске променљиве. Уколико бар једна категорија задовољава разлику тест показује статистички значај, али не показује између којих категорија постоји разлика. Зато се приступа post-hoc анализама. Ако у резултатима добијемо да је „p-value“ < 0.05, бар једна група се значајно разликује од осталих.

Имплементација:

```
anova_test <- function(numericka_var, grupna_var) {
  model <- aov(numericka_var ~ as.factor(grupna_var))
  return(summary(model))
}
```

Tukey HSD *ѡесѡ* (Honestly Significant Difference)

Tukey HSD тест представља накнадни тест који се примењује након статистички значајног АНОВА теста. Обим тестом се омогућава поређење свих парова категорија и утврђивање између који парова постоји статистички значајна разлика у средњим вредностима. Тај резултат можемо видети у табели у првој колони која нам говори за колико јединица је разлика између категорија.

Имплементација:

```
tukey_fun <- function(numericka_var, grupna_var) {
  model <- aov(numericka_var ~ as.factor(grupna_var))
  rezultat <- TukeyHSD(model)
  return(rezultat)
}
```

χ^2 *ѡесѡ независносѡи*

χ^2 тест независности се користи за испитивање да ли постоји статистички значајна повезаност између две категоријске променљиве. Тестира се хипотеза да су посматране променљиве независне једна од друге, на основу упоређивања очекиваних и посматраних фреквенција. Ако у резултатима добијемо да је „p-value“ < 0.05, постоји статистички значајна повезаност, а све преко се сматра независним карактеристикама.

Имплементација:

```
chi_sq_test <- function(var1, var2) {
  tabela <- table(var1, var2)
  rezultat <- chisq.test(tabela)
```

```
return(rezultat)
}
```

Крамеров коефицијент

Крамеров коефицијент представља меру јачине повезаности између две категоријске променљиве и користи се након χ^2 теста, у случају када је утврђена статистички значајна повезаност. Вредности коефицијента су од 0 до 1, где тежња ка 1 указује на јаку повезаност.

Имплементација:

```
cramer_v <- function(var1, var2) {
  tabela <- table(var1, var2)
  chi2 <- chisq.test(tabela)$statistic
  n <- sum(tabela)
  phi2 <- chi2 / n
  r <- nrow(tabela)
  k <- ncol(tabela)
  v <- sqrt(phi2 / min(r - 1, k - 1))
  return(as.numeric(v))
}
```

Пирсонов коефицијент корелације

Коефицијент нам квантификује линеарност између две нумеричке варијабле, реалном вредношћу која се креће између -1 и 1. У случају да је на коефицијент на -1 имамо негативну линеарност међу варијаблама, како се креће ка 0 она је све слабија, на 0 ће бити непостојећа, док ће како се креће ка 1 постајати све јача и биће позитивна линеарност.

Имплементација:

```
pearson_funkcija <- function(x, y) {
  if(length(x) != length(y)) stop("Vektori moraju biti iste dužine")
  mean_x <- mean(x)
  mean_y <- mean(y)
  brojilac <- sum((x - mean_x) * (y - mean_y))
  imenilac <- sqrt(sum((x - mean_x)^2) * sum((y - mean_y)^2))
  return(brojilac / imenilac)
}
```

Однос са циљаном карактеристиком Diabetes_012

У овом поглављу испитана је повезаност сваке карактеристике са циљном променљивом Diabetes_012. Резултати ових анализа пружају увид у то које карактеристике имају самостални утицај на стање дијабетеса.

HighBP vs Diabetes_012

Анализирамо учесталост испитаника са високим крвним притиском (HighBP) у односу на резултате дијабетичког стања (Diabetes_012). Тип карактеристике HighBP је динарна категоријска променљива са категоријама Да (има повишен крвни притисак), Не (нема повишен крвни притисак). Дистрибуцију повишеног крвног притиска унутар сваке класе дијабетеса приказали смо стубичастим дијаграмом и топлотним дијаграмом.



```
ggplot(data, aes(x = Diabetes_012, fill = HighBP)) +
  geom_bar(position = "dodge") +
  labs(
```

```

title = "Distribucija kategorija HighBP po kategorijama Diabetes_012",
y = "Broj opservacija",
fill = "Povišen krvni pritisak"
) + scale_fill_paletter_d("MetBrewer::Archambault") +
geom_text(
stat = "count",
aes(label = ..count..),
position = position_dodge(width = 0.8),
vjust = -0.3
)

data %>%
count(Diabetes_012, HighBP) %>%
group_by(Diabetes_012) %>%
mutate(percent = n / sum(n) * 100) %>%
ggplot(aes(x = Diabetes_012, y = HighBP, fill = percent)) +
geom_tile() +
geom_text(aes(label = paste0(round(percent, 1), "%")), color = "white") +
labs(
title = "Distribucija kategorija HighBP po kategorijama Diabetes_012",
x = "Diabetes_012",
y = "HighBP",
fill = "Procenat (%)"
) +
scale_fill_gradient(low = colorS[1], high = colorS[2])

```



Са стубичастог графика визуелно је јасно да код особа без дијабетеса доминирају испитаници који немају повишен крвни притисак, док код особа са неким стањем дијабетеса доминирају они са повишеним крвним притиском. Ако обратимо пажњу на градијент топлотног дијаграма, уочавамо да има променљивог односа у распореду који потврђује образац уочен на стубичастом дијаграму. Указујући да је повишен крвни притисак значајно повезан са статусом дијабетеса и има аналитичку вредност у односу на циљану променљиву Diabetes_012.

Претпоставку ћемо испитати статистички преко Крамеровог коефицијента и χ^2 теста, наравно обе методе смо већ предефинисали и имплементирали па их онда једноставно позивамо.

```

chi_sq_test(data$HighBP, data$Diabetes_012)
cramer_v(data$HighBP, data$Diabetes_012)

```

Commented [MS12]: Коментар професора:
Исправити легенду код хеатмапа на којима се не види опсег

Commented [MS13R12]: Исправљено тако што је стављена да буде са десне стране. Додатно на основу касније сугестије професора стављени су проценти како би односи били уочљивији.


```
Pearson's Chi-squared test

data: tabela
X-squared = 18795, df = 2, p-value < 2.2e-16

> chi_sq_test(data$HighBP, data$Diabetes_012)

Pearson's Chi-squared test

data: tabela
X-squared = 18795, df = 2, p-value < 2.2e-16

> cramer_v(data$HighBP, data$Diabetes_012)
[1] 0.2721911
```


χ^2 тест независности показује статистички значајну повезаност између променљивих Diabetes_012 и HighBP $\chi^2 = 18795$, а $p\text{-value} < 0,00000000000000022$ што је доста испод границе статистичке значајности од 0,05. Јачина ове повезаности износи 0,27 (Крамеров коефицијент) што је слаба јачина везе али веома близу границе са умереном. Овај самостални утицај нећемо разматрати, али због постојања статистички значајне везе (χ^2 тест) узећемо у разматрање мултиваријантне анализе.

HighChol vs Diabetes_012

Анализирамо учесталост испитаника са високим холестеролом (HighChol) у односу на резултате дијабетичког стања (Diabetes_012). Тип карактеристике HighChol је бинарна категоријска променљива са категоријама Да (има повишен холестерол), Не (нема повишен холестерол). Дистрибуцију повишеног холестерола унутар сваке класе дијабетеса приказали смо стубичастим дијаграмом и топлотним дијаграмом.

```
ggplot(data, aes(x = Diabetes_012, fill = HighChol)) +
  geom_bar(position = "dodge") +
  labs(
    title = "Distribucija kategorija HighChol po kategorijama Diabetes_012",
    y = "Broj opservacija",
    fill = "Povišen holesterol"
  ) + scale_fill_paletteer_d("MetBrewer::Archambault") +
  geom_text(
    stat = "count",
    aes(label = ..count..),
    position = position_dodge(width = 0.8),
    vjust = -0.3
  ) +
  theme(legend.position="bottom")

data %>%
  count(Diabetes_012, HighChol) %>%
  group_by(Diabetes_012) %>%
  mutate(percent = n / sum(n) * 100) %>%
  ggplot(aes(x = Diabetes_012, y = HighChol, fill = percent)) +
  geom_tile() +
  geom_text(aes(label = paste0(round(percent, 1), "%")), color = "white") +
  labs(
    title = "Distribucija kategorija HighChol po kategorijama Diabetes_012",
    x = "Diabetes_012",
    y = "HighChol",
    fill = "Procenat (%)"
  ) +
```



Са стубичастог графика визуелно је јасно да код особа без дијабетеса доминирају испитаници који немају повишен холестерол (132 673 испитаника), док код особа са неким стањем дијабетеса доминирају они са повишеним холестеролом. Ако обратимо пажњу на градијент топлотног дијаграма, уочавамо да има променљивог односа у распореду који потврђује образац уочен на стубичастом дијаграму. Указујући да је повишен крвни притисак значајно повезан са статусом дијабетеса и има аналитичку вредност у односу на циљану променљиву Diabetes_012.

Претпоставку ћемо испитати статистички преко Крамеровог коефицијента и χ^2 теста, наравно обе методе смо већ предефинисали и имплементирали па их онда једноставно позивамо.

```
chi_sq_test(data$HighChol, data$Diabetes_012)
cramer_v(data$HighChol, data$Diabetes_012)
> chi_sq_test(data$HighChol, data$Diabetes_012)
```

Pearson's Chi-squared test

data: tabela
X-squared = 11259, df = 2, p-value < 2.2e-16

```
> cramer_v(data$HighChol, data$Diabetes_012)
[1] 0.2106712
```

χ^2 тест независности показује статистички значајну повезаност између променљивих Diabetes_012 и HighChol $\chi^2 = 11259$, а p-value < 0,00000000000000022 што је доста испод границе статистичке значајности од 0,05. Јачина ове повезаности износи 0,21 што је слаба повезаност. Овај самостални утицај нећемо разматрати, али због постојања статистички значајне везе (χ^2 тест) узећемо у разматрање мултиваријантне анализе.


CholCheck vs Diabetes_012

Анализирамо учесталост испитаника са провером холестерола у последњих 5 година (CholCheck) у односу на резултате дијабетичког стања (Diabetes_012). Тип карактеристике CholCheck је бинарна категоријска променљива са категоријама Да (има проверен холестерол), Не (нема проверен холестерол). Дистрибуцију провере холестерола унутар сваке класе дијабетеса приказали смо стубичастим дијаграмом и топлотним дијаграмом.

Претпоставку ћемо испитати статистички преко Крамеровог коефицијента и χ^2 теста, наравно обе методе смо већ предефинисали и имплементирали па их онда једноставно позивамо.

```
ggplot(data, aes(x = Diabetes_012, fill = CholCheck)) +
  geom_bar(position = "dodge") +
  labs(
    title = "Distribucija kategorija CholCheck po kategorijama Diabetes_012",
    y = "Broj opservacija",
    fill = "Proveren holesterol poslednjih 5 godina"
  ) + scale_fill_paletteer_d("MetBrewer::Archambault") +
  geom_text(
    stat = "count",
    aes(label = ..count..),
    position = position_dodge(width = 0.8),
    vjust = -0.3
  ) +
  theme(legend.position="bottom")
```

```
data %>%
  count(Diabetes_012, CholCheck) %>%
  group_by(Diabetes_012) %>%
  mutate(percent = n / sum(n) * 100) %>%
  ggplot(aes(x = Diabetes_012, y = CholCheck, fill = percent)) +
  geom_tile() +
  geom_text(aes(label = paste0(round(percent, 1), "%")), color = "white") +
  labs(
    title = "Distribucija kategorija CholCheck po kategorijama Diabetes_012",
    x = "Diabetes_012",
    y = "CholCheck",
    fill = "Procentat (%)"
  ) +
  scale_fill_gradient(low = colorS[1], high = colorS[2])
```



Са стубичастог графика визуелно је јасно да код особа без дијабетеса доминирају испитаници који су проверили холестерол последњих 5 година, код особа са неким стањем

дијабетеса такође доминирају они који су проверили холестерол последњих 5 година. Градијент на топлотном дијаграму показује променљив однос, али распоред не открива јасан образац међу класама дијабетеса. То указује да провера холестерола није самостално повезана са статусом дијабетеса и нема аналитичку вредност у односу на циљану променљиву Diabetes_012.

Претпоставку ћемо испитати статистички преко Крамеровог коефицијента и χ^2 теста, наравно обе методе смо већ предефинисали и имплементирали па их онда једноставно позивамо.

```
chi_sq_test(data$CholCheck, data$Diabetes_012)
cramer_v(data$CholCheck, data$Diabetes_012)
> chi_sq_test(data$CholCheck, data$Diabetes_012)

Pearson's Chi-squared test

data: tabela
X-squared = 1173.7, df = 2, p-value < 2.2e-16
> cramer_v(data$CholCheck, data$Diabetes_012)
[1] 0.06802124
```

χ^2 тест независности показује статистички значајну повезаност између променљивих Diabetes_012 i CholCheck $\chi^2 = 1173$, а p-value < 0,00000000000000022 што је доста испод границе статистичке значајности од 0,05. Међутим, графички преглед не открива јасан образац, а Крамеров коефицијент $V = 0.068$ указује на веома слабу повезаност. Стога се може закључити да променљива CholCheck нема практичан самостални ефекат на статус дијабетеса. Ова променљива ће бити разматрана само ако други фактори указују на могућу интеракцију или контролни ефекат.

BMI vs Diabetes_012

Анализирамо расподелу вредности индекса телесне масе (BMI) у односу на резултате дијабетичког стања (Diabetes_012). Променљива BMI је нумеричка карактеристика, која описује однос телесне масе и висине испитаника. Да бисмо испитали везу између BMI и дијабетичког статуса, анализирали смо дистрибуцију BMI вредности унутар сваке класе дијабетеса, користећи боксплот дијаграм, ради поређења медијана, интерквartilних опсега и присуства екстремних вредности и density дијаграм, ради увида у облик расподеле BMI у свакој групи.

```
vrenostiBoxPlot <- data%>%
  group_by(Diabetes_012)%>%
  summarise(
    Q1 = quantile(BMI, 0.25),
    median = median(BMI),
    Q3 = quantile(BMI, 0.75),
  )%>%
  pivot_longer(
    cols = c(Q1, median, Q3)
  )

ggplot(data, aes(x = Diabetes_012, y = BMI, fill = Diabetes_012))+
  geom_boxplot()+
  geom_point(
    data = vrenostiBoxPlot,
```


Commented [MS14]: Коментар професора: размислити i proveriti domensko znanje. Ako se dosta kontrolisu, mozda imaju neku osnovanu sumnju u pojavu dijabetesa - cisto kao ideja, nije obaveza da se uzme. Kao sto ste napisali ispod, ова променљива ће бити разматрана само ако други фактори указују на могућу интеракцију или контролни ефекат

Commented [MS15R14]: Само значење ове карактеристике нам говори да ли је испитанк проверио холестерол последњих година. Тако да нам не говори колико се често испитаник испитује. Оно што смо у даљем раду испитивали је однос са тврђом испитаника да има повишен холестерол HighChol. Што можете погледати у наредном подпоглављу биваријантне анализе "Однос карактеристика које нису циљане".

```

aes(x = Diabetes_012, y = value),
shape = 22,
size = 5,
fill = "white",
color = "#E78429FF"
)+
geom_text(
data = vrenostiBoxPlot,
aes(x = Diabetes_012, y = value, label = round(value, 1)),
size = 3
)+
labs(
title = "Raspodela BMI po kategorijama Diabetes_012",
x = "Diabetes_012",
y = "BMI"
)+
scale_fill_paletteer_d("MetBrewer::Archambault")+
theme(legend.position = "none")
ggplot(data, aes(x = BMI, fill = Diabetes_012)) +
geom_density(alpha = 0.6) +
labs(
title = "Gustina raspodele BMI po kategorijama Diabetes_012",
x = "BMI",
y = "Gustina",
fill = "Diabetes_012"
) +
scale_fill_paletteer_d("MetBrewer::Archambault")


```



На основу бокс плота уочавамо јасан тренд раста БМИ, код испитаника без дијабетеса прва половина података се креће око 24 до 27, код преддијабетеса од 26 до 30, а са дијабетесом још више од 27 до 31. Ово указује на позитивну повезаност између БМИ и дијабетеса. Код дијабетичара је расподела шире растегнута што указује на већу хетерогеност телесне масе.

На другом графику можемо видети да крива за „нема дијабетес“ је концентрисана око нижих БМИ вредности. Преддијабетес и дијабетес је померен удесно у односу на здраве. Иако је помак вредности приметан графици се у великој мери преклапају у опсегу вредности,

дакле нема јасног раздвајања, што БМИ чини визуелно слабиим предиктором. Тумачење је приказано визуелно на следећем графику:



```
ggplot(data, aes(x = BMI, fill = Diabetes_012)) +
  geom_density(alpha = 0.6) +
  labs(
    title = "Gustina raspodele BMI po kategorijama Diabetes_012",
    x = "BMI",
    y = "Gustina",
    fill = "Diabetes_012"
  ) +
  scale_fill_paletteer_d("MetBrewer::Archambault")+
  geom_vline(xintercept = c(25, 30), linetype = "dashed", color = "black", size = 1)
```

Ако испратимо криву групе „нема дијабетес“ видимо доста осцилација што указује на неравномерну расподелу, дакле у овој групи постоје подгрупе испитаника са различитим БМИ. Предијабетес и дијабетес имају један доминантан врх.

Као што је утврђено у униваријантној анализи, статистички аутлајери су присутни у расподели променљиве BMI. На боксплот дијаграму уочава се да су аутлајери заступљени у свим категоријама дијабетеса. Како би се проценио њихов утицај на категорије циљане променљиве, спроведена је даља анализа. Поред оригиналне визуелне репрезентације расподеле, анализирана је и расподела скупа података без доменских и додатно без статистичких аутлајера, дефинисаних у оквиру униваријантне анализе.

Формирани скупови потребни за визуелну репрезентацију:

```
BMI_bezdomeskihAutlajera = data %>%
  filter(BMI >= 12 & BMI <= 70)

BMI_bezStatistickihAutlajera = data %>%
```

```
filter(BMI >= donja_granica & BMI <= gornja_granica)
```


donja_granica и gornja_granica дефинисане су у униваријантној анализи следећим кодом:

За анализу утицаја доменских аутлејера формирали смо збирни скуп да подацима који имају аутлејере, како би омогућили facet wrap:

```
BMI_bezdomenskih_sabrani <- bind_rows(  
  data %>%  
    select(BMI, Diabetes_012) %>%  
    mutate(Skup = "originalni skup"),  
  
  BMI_bezdomenskihAutlejera %>%  
    select(BMI, Diabetes_012) %>%  
    mutate(Skup = "bez domenskih autlejera"),  
)
```

Затим смо нацртали графике са исписаним вредностима медијана, првог и трећег кватила како би јасније уочили да ли је дошло до утицаја аутлајера:

```
statistickeVrednostiBezDomenskih = BMI_bezdomenskih_sabrani %>%  
  group_by(Skup, Diabetes_012) %>%  
  summarise(  
    Q1 = quantile(BMI, 0.25),  
    Median = quantile(BMI, 0.5),  
    Q3 = quantile(BMI, 0.75)  
  )  
  
ggplot(BMI_bezdomenskih_sabrani, aes(x = Diabetes_012, y = BMI, fill = Diabetes_012)) +  
  geom_boxplot(outlier.alpha = 0.3) +  
  facet_wrap(~ Skup) +  
  geom_text(  
    data = statistickeVrednostiBezDomenskih,  
    aes(x = Diabetes_012, y = Q1, label = round(Q1, 1)),  
    vjust = 1.5, color = "blue", size = 3,  
  ) +  
  geom_text(  
    data = statistickeVrednostiBezDomenskih,  
    aes(x = Diabetes_012, y = Median, label = round(Median, 1)),  
    vjust = -0.5, color = "red", size = 3,  
  ) +  
  geom_text(  
    data = statistickeVrednostiBezDomenskih,  
    aes(x = Diabetes_012, y = Q3, label = round(Q3, 1)),  
    vjust = -1.5, color = "darkgreen", size = 3,  
  ) +  
  labs(  
    title = "Uporedjivanje uticaja domenskih autlejera karakteristike BMI na Diabetes_012",  
    y = "BMI",  
    x = "Dijabetes"  
  ) +
```



Kao što vidimo po ivicama kutija, ali i po numeričkim pokazateljima može se uočiti da domeniski autlajeri nemaju uticaj na kategorije dijaabetesa. Dodatno sa domeniskog aspekta ne predstavljaju realne vrednosti pa nisu reprezentativne za većinu populacije, zato zaključujemo da ih u poglavљу čišćenja podataka uklonimo.

Za analizu uticaja statističkih autlejera formirali smo zbirni skup sa podacima koji imaju autlejer, kako bi omogućili facet wrap:

```
BMI_bezstatistickih_sabrani <- bind_rows(
  data %>%
    select(BMI, Diabetes_012) %>%
    mutate(Skup = "originalni skup"),

  BMI_bezStatistickihAutlajera %>%
    select(BMI, Diabetes_012) %>%
    mutate(Skup = "bez statistickih autlajera"),
)
```

Zatim smo nacrtali grafike sa ispisanim vrednostima medijana, prvog i trećeg kvatila kako bi jasnije uočili da li je došlo do uticaja autlajera:

```
statistickeVrednostiBezStatistickih <- BMI_bezstatistickih_sabrani %>%
  group_by(Skup, Diabetes_012) %>%
  summarise(
    Q1 = quantile(BMI, 0.25),
    Median = quantile(BMI, 0.5),
    Q3 = quantile(BMI, 0.75)
  )


ggplot(BMI_bezstatistickih_sabrani, aes(x = Diabetes_012, y = BMI, fill = Diabetes_012)) +
  geom_boxplot(outlier.alpha = 0.3) +
  facet_wrap(~ Skup)
```



```

geom_text(
  data = statistickeVrednostiBezStatistickih,
  aes(x = Diabetes_012, y = Q1, label = round(Q1, 1)),
  vjust = 1.5, color = "blue", size = 3,
) +
geom_text(
  data = statistickeVrednostiBezStatistickih,
  aes(x = Diabetes_012, y = Median, label = round(Median, 1)),
  vjust = -0.5, color = "red", size = 3
) +
geom_text(
  data = statistickeVrednostiBezStatistickih,
  aes(x = Diabetes_012, y = Q3, label = round(Q3, 1)),
  vjust = -1.5, color = "darkgreen", size = 3
) +
labs(
  title = "Uporedjivanje uticaja statistickih autlejera karakteristike BMI na Diabetes_012",
  y = "BMI",
  x = "Dijabetes"
)+
theme(legend.position = "none")+
scale_fill_paletteer_d("MetBrewer::Archambault")

```



Са упоредних дијаграма може се уочити да уклањање статистичких аутлајера не доводи до значајних промена медијана и интерквартилних распона, при чему је однос између вредности BMI и категорија дијабетеса задржан. Статистички аутлајери, иако екстремни са статистичког становишта, представљају реалне вредности гојазности у доменском смислу. С обзиром на то да њихово уклањање не утиче на анализирани однос, донета је одлука да се задрже у даљој анализи.

На основу претходних тумачења претпостављамо да је BMI има статистички значајан, али нејасан и самосталан ефекат, што ћемо статистички потврдити са анова тесту. Анова је већ имплементирана функција раније у коду, па смо је само позвали.

```
anova_test(data$BMI, data$Diabetes_012)
> anova_test(data$BMI, data$Diabetes_012)
      Df Sum Sq Mean Sq F value Pr(>F)
as.factor(grupna_var)    2   561268   280634    6768 <2e-16 ***
Residuals              253677  10518121     41
---
Signif. codes:  0 '***' 0.001 '**' 0.01 '*' 0.05 '.' 0.1 ' ' 1
```

F value = 6768, $Pr(>F) < 2e-16$ означава да је п вредност практично 0 тј. постоји статистички значајна разлика између просечног BMI у бар две категорије Diabetes_012. Уз то стоји и *** што нам потврђује визуелну претпоставку да BMI има утицај на категорије дијабетеса.

Ипак, сам анова тест не указује које тачно групе се разликују. Због тога смо користили post-hoc тест (Tukey HSD), који нам омогућава да за све парове утврдимо између којих група постоји статистички значајна разлика. Методу за тест смо већ предефинисали и имплементирали па је онда једноставно позивамо:

```
tukey_fun(data$BMI, data$Diabetes_012)
> tukey_fun(data$BMI, data$Diabetes_012)
Tukey multiple comparisons of means
 95% family-wise confidence level

Fit: aov(formula = numericka_var ~ as.factor(grupna_var))

$`as.factor(grupna_var)`
      diff      lwr      upr p adj
predijabetes-nema dijabetes 2.981944 2.7577893 3.206100 0
dijabetes-nema dijabetes 4.201489 4.1148337 4.288145 0
dijabetes-predijabetes 1.219545 0.9836992 1.455391 0
```

На основу резултата видимо преддијабетес има значајно виши BMI од здравих (diff = 2.98), дијабетес има још већи BMI у поређењу са здравима (diff = 4.20) и између преддијабетеса и дијабетеса постоји значајна разлика (diff = 1.22), иако мања него у односу на здраве.


Smoker vs Diabetes_012

Анализирамо учесталост испитаника који су пушачи (Smoker) у односу на резултате дијабетичког стања (Diabetes_012). Тип карактеристике Smoker је бинарна категоријска променљива са категоријама Да (да испитаник је пушач), Не (испитаник није пушач). Дистрибуцију зависности пушења унутар сваке класе дијабетеса приказали смо стубичастим дијаграмом и топлотним дијаграмом.

```
ggplot(data, aes(x = Diabetes_012, fill = Smoker)) +
  geom_bar(position = "dodge") +
  labs(
    title = "Distribucija kategorija Smoker po kategorijama Diabetes_012",
    y = "Broj opservacija",
    fill = "Pušač"
  ) + scale_fill_paletteer_d("MetBrewer::Archambault")+
  geom_text(
    stat = "count",
    aes(label = ..count..),
    position = position_dodge(width = 0.8),
    vjust = -0.3
  )+
```

```
theme(legend.position = "bottom")
```

```
data %>%
  count(Diabetes_012, Smoker) %>%
  group_by(Diabetes_012) %>%
  mutate(percent = n / sum(n) * 100) %>%
  ggplot(aes(x = Diabetes_012, y = Smoker, fill = percent)) +
  geom_tile() +
  geom_text(aes(label = paste0(round(percent, 1), "%")), color = "white") +
  labs(
    title = "Distribucija kategorija Smoker po kategorijama Diabetes_012",
    x = "Diabetes_012",
    y = "Smoker",
    fill = "Procentat (%)"
  ) +
  scale_fill_gradient(low = colorS[1], high = colorS[2])
```



Са стубичастог графика визуелно је јасно да код особа без дијабетеса доминирају не пушачи, док код особа са дијабетесом има више пушача. Дакле образац постоји, међутим ако обратимо пажњу на градијент топлотног дијаграма, уочавамо да је јако слаб за категорије преддијабетеса и дијабетеса. Претпостављамо да пушење није значајно повезано са статусом дијабетеса и нема снажну или самосталну аналитичку вредност у односу на циљану променљиву Diabetes_012.

Претпоставку ћемо испитати статистички преко Крамеровог коефицијента и χ^2 теста, наравно обе методе смо већ предефинисали и имплементирали па их онда једноставно позивамо

```
chi_sq_test(data$Smoker, data$Diabetes_012)
cramer_v(data$Smoker, data$Diabetes_012)
> chi_sq_test(data$Smoker, data$Diabetes_012)

Pearson's Chi-squared test

data: tabela
X-squared = 1010.5, df = 2, p-value < 2.2e-16

> cramer_v(data$Smoker, data$Diabetes_012)
[1] 0.06311427
```


χ^2 тест независности показује статистички значајну повезаност између променљивих Diabetes_012 и $\chi^2 = 1010$, а p-value < 0,00000000000000022 што је доста испод границе статистичке значајности од 0,05. Међутим, графички преглед показује слабу повезаност (слаб градијент), што потврђује Крамеров коефицијент V = 0.068. Стога се може закључити да променљива Smoker нема практичан самостални ефекат на статус дијабетеса. За мултиваријантну анализу, ова променљива ће бити разматрана само ако други фактори указују на могућу интеракцију или контролни ефекат.

Stroke vs Diabetes_012

Анализирамо појаву можданог удара (Stroke) у односу на резултате дијабетичког стања (Diabetes_012). Тип карактеристике Stroke је бинарна категоријска променљива са категоријама Да (да испитаник је имао мождани удар), Не (испитаник није имао мождани удар). Дистрибуцију зависности појаве можданог удара унутар сваке класе дијабетеса приказали смо стубичастим дијаграмом и топлотним дијаграмом.

```
ggplot(data, aes(x = Diabetes_012, fill = Stroke)) +
  geom_bar(position = "dodge") +
  labs(
    title = "Distribucija kategorija Stroke po kategorijama Diabetes_012",
    y = "Broj opservacija",
    fill = "Moždani udar"
  ) + scale_fill_paletteer_d("MetBrewer::Archambault")+
  geom_text(
    stat = "count",
    aes(label = ..count..),
    position = position_dodge(width = 0.8),
    vjust = -0.3
  )+
  theme(legend.position = "bottom")

data %>%
  count(Diabetes_012, Stroke) %>%
  group_by(Diabetes_012) %>%
  mutate(percent = n / sum(n) * 100) %>%
  ggplot(aes(x = Diabetes_012, y = Stroke, fill = percent)) +
  geom_tile() +
  geom_text(aes(label = paste0(round(percent, 1), "%")), color = "white") +
  labs(
    title = "Distribucija kategorija Stroke po kategorijama Diabetes_012",
    x = "Diabetes_012",
    y = "Stroke",
    fill = "Procenat (%)"
  ) +
  scale_fill_gradient(low = colorS[1], high = colorS[2])
```



Са стубичастог графика визуелно је јасно да код особа без дијабетеса доминирају испитаници који нису имали мождани удар, код особа са неким стањем дијабетеса такође доминирају они који нису имали мождани удар. Градијент на топлотном дијаграму показује променљив однос, али распоред не открива јасан образац међу класама дијабетеса. То указује да мождани удар није самостално повезана са статусом дијабетеса и нема аналитичку вредност у односу на циљану променљиву Diabetes_012.

Претпоставку ћемо испитати статистички преко Крамеровог коефицијента и χ^2 теста, наравно обе методе смо већ предефинисали и имплементирали па их онда једноставно позивамо.

```
chi_sq_test(data$ Stroke, data$Diabetes_012)
cramer_v(data$ Stroke, data$Diabetes_012)
> chi_sq_test(data$ Stroke, data$Diabetes_012)

Pearson's Chi-squared test

data: tabela
X-squared = 2916.8, df = 2, p-value < 2.2e-16
> cramer_v(data$ Stroke, data$Diabetes_012)
[1] 0.1072276
```

χ^2 тест независности показује статистички значајну повезаност између променљивих Diabetes_012 i Stroke $\chi^2 = 1173$, а p-value < 0,0000000000000022 што је доста испод границе статистичке значајности од 0,05. Међутим, графички преглед не открива јасан образац, а Крамеров коефицијент $V = 0.107$ указује на веома слабу повезаност. Стога се може закључити да променљива Stroke нема практичан самостални ефекат на статус дијабетеса. За мултиваријантну анализу, ова променљива ће бити разматрана само ако други фактори указују на могућу интеракцију или контролни ефекат.

HeartDiseaseorAttack vs Diabetes_012

Анализирамо појаву срчаног удара или хипертензије (HeartDiseaseorAttack) у односу на резултате дијабетичког стања (Diabetes_012). Тип карактеристике HeartDiseaseorAttack је бинарна категоријска променљива са категоријама Да (да испитаник је имао срчани удар или хипертензију), Не (испитаник није имао срчани удар или хипертензију). Дистрибуцију зависности појаве срчаног удара или хипертензије унутар сваке класе дијабетеса приказали смо стубичастим дијаграмом и топлотним дијаграмом.


```
ggplot(data, aes(x = Diabetes_012, fill = HeartDiseaseorAttack)) +
```

```

geom_bar(position = "dodge") +
labs(
  title = "Distribucija kategorija HeartDiseaseorAttack po kategorijama Diabetes_012",
  y = "Broj opservacija",
  fill = "Bolest srca/Srčani udar"
) + scale_fill_paletteer_d("MetBrewer::Archambault")+
geom_text(
  stat = "count",
  aes(label = ..count..),
  position = position_dodge(width = 0.8),
  vjust = -0.3
)+
theme(legend.position = "bottom")

data %>%
count(Diabetes_012, HeartDiseaseorAttack) %>%
group_by(Diabetes_012) %>%
mutate(percent = n / sum(n) * 100) %>%
ggplot(aes(x = Diabetes_012, y = HeartDiseaseorAttack, fill = percent)) +
geom_tile() +
geom_text(aes(label = paste0(round(percent, 1), "%")), color = "white") +
labs(
  title = "Distribucija kategorija HeartDiseaseorAttack po kategorijama Diabetes_012",
  x = "Diabetes_012",
  y = "HeartDiseaseorAttack",
  fill = "Procentat (%)"
) +
scale_fill_gradient(low = colorS[1], high = colorS[2])

```



Са стубичастог графика визуелно је јасно да код особа без дијабетеса доминирају испитаници који нису имали срчани удар или хипертензију, код особа са неким стањем дијабетеса такође доминирају они који нису имали срчани удар или хипертензију. Градијент на топлотном дијаграму показује променљив однос, али распоред не открива јасан образац међу класама дијабетеса. То указује да срчани удар или хипертензија није самостално повезана са статусом дијабетеса и нема аналитичку вредност у односу на циљану променљиву Diabetes_012.

Претпоставку ћемо испитати статистички преко Крамеровог коефицијента и χ^2 теста, наравно обе методе смо већ предефинисали и имплементирали па их онда једноставно позивамо.

```
chi_sq_test(data$HeartDiseaseorAttack, data$Diabetes_012)
cramer_v(data$HeartDiseaseorAttack, data$Diabetes_012)
> chi_sq_test(data$HeartDiseaseorAttack, data$Diabetes_012)

Pearson's Chi-squared test

data: tabela
X-squared = 8244.9, df = 2, p-value < 2.2e-16

> cramer_v(data$HeartDiseaseorAttack, data$Diabetes_012)
[1] 0.1802807
```


χ^2 тест независности показује статистички значајну повезаност између променљивих Diabetes_012 i HeartDiseaseorAttack $\chi^2 = 8244,9$, а p-value < 0,00000000000000022 што је доста испод границе статистичке значајности од 0,05. Међутим, графички преглед не открива јасан образац, а Крамеров коефицијент V = 0,18 указује на слабу повезаност. Стога се може закључити да променљива HeartDiseaseorAttack нема практичан самостални ефекат на статус дијабетеса. За мултиваријантну анализу, ова променљива ће бити разматрана само ако други фактори указују на могућу интеракцију или контролни ефекат.

PhysActivity vs Diabetes_012

Анализирамо физичку активност (PhysActivity) у односу на резултате дијабетичког стања (Diabetes_012). Тип карактеристике PhysActivity је бинарна категоријска променљива са категоријама Да (да испитаник је физички активан), Не (испитаник није физички активан). Дистрибуцију зависности физичке активност унутар сваке класе дијабетеса приказали смо стубичастим дијаграмом и топлотним дијаграмом.

```
ggplot(data, aes(x = Diabetes_012, fill = PhysActivity)) +
  geom_bar(position = "dodge") +
  labs(
    title = "Distribucija kategorija PhysActivity po kategorijama Diabetes_012",
    y = "Broj opservacija",
    fill = "Fizička aktivnost"
  ) + scale_fill_paletteer_d("MetBrewer::Archambault")+
  geom_text(
    stat = "count",
    aes(label = ..count..),
    position = position_dodge(width = 0.8),
    vjust = -0.3
  )+
  theme(legend.position = "bottom")

data %>%
  count(Diabetes_012, PhysActivity) %>%
  group_by(Diabetes_012) %>%
  mutate(percent = n / sum(n) * 100) %>%
  ggplot(aes(x = Diabetes_012, y = PhysActivity, fill = percent)) +
  geom_tile() +
  geom_text(aes(label = paste0(round(percent, 1), "%")), color = "white") +
  labs(
```



Са стубичастог графика визуелно је јасно да код особа без дијабетеса доминирају испитаници који имају физичку активност, код особа са неким стањем дијабетеса такође доминирају они који имају физичку активност. Градијент на топлотном дијаграму показује променљив однос, али распоред не открива јасан образац међу класама дијабетеса. То указује да физичка активност није самостално повезана са статусом дијабетеса и нема аналитичку вредност у односу на циљану променљиву Diabetes_012. Податак о физичкој активности не указује на то да ли су испитаници били активни пре развоја дијабетеса. Испитаници су се изјашњавали о физичкој активности последњих 30 дана, а временски податак о дијагнози дијабетеса немамо. Могуће је да се физичка активност наставила или започела након дијагнозе, али из овог сета података то се не може закључити.

Претпоставку ћемо испитати статистички преко Крамеровог коефицијента и χ^2 теста, наравно обе методе смо већ предефинисали и имплементирали па их онда једноставно позивамо.

```

chi_sq_test(data$PhysActivity, data$Diabetes_012)
cramer_v(data$PhysActivity, data$Diabetes_012)
> chi_sq_test(data$PhysActivity, data$Diabetes_012)

Pearson's Chi-squared test

data: tabela
X-squared = 3789.3, df = 2, p-value < 2.2e-16

> cramer_v(data$PhysActivity, data$Diabetes_012)
[1] 0.1222184

```


χ^2 тест независности показује статистички значајну повезаност између променљивих Diabetes_012 i PhysActivity $\chi^2 = 3789$, а p-value < 0,00000000000000022 што је доста испод границе статистичке значајности од 0,05. Међутим, графички преглед не открива јасан образац, а Крамеров коефицијент $V = 0.122$ указује на слабу повезаност. Стога се може закључити да променљива PhysActivity нема практичан самостални ефекат на статус дијабетеса. За мултиваријантну анализу, ова променљива ће бити разматрана само ако други фактори указују на могућу интеракцију или контролни ефекат.

Fruits vs Diabetes_012

Анализирамо учесталост испитаника који су конзумирају воће (Fruits) у односу на резултате дијабетичког стања (Diabetes_012). Тип карактеристике Fruits је бинарна категоријска променљива са категоријама Да (испитаник конзумира воће једном или више пута у току дана), Не (испитаник не конзумира воће једном или више пута у току дана). Дистрибуцију конзумације воћа унутар сваке класе дијабетеса приказали смо стубичастим дијаграмом и топлотним дијаграмом.

```
ggplot(data, aes(x = Diabetes_012, fill = Fruits)) +
  geom_bar(position = "dodge") +
  labs(
    title = "Distribucija kategorija Fruits po kategorijama Diabetes_012",
    y = "Broj opservacija",
    fill = "Konzumacija voća"
  ) + scale_fill_paletteer_d("MetBrewer::Archambault")+
  geom_text(
    stat = "count",
    aes(label = ..count..),
    position = position_dodge(width = 0.8),
    vjust = -0.3
  )+
  theme(legend.position = "bottom")

data %>%
  count(Diabetes_012, Fruits) %>%
  group_by(Diabetes_012) %>%
  mutate(percent = n / sum(n) * 100) %>%
  ggplot(aes(x = Diabetes_012, y = Fruits, fill = percent)) +
  geom_tile() +
  geom_text(aes(label = paste0(round(percent, 1), "%")), color = "white") +
  labs(
    title = "Distribucija kategorija Fruits po kategorijama Diabetes_012",
    x = "Diabetes_012",
    y = "Fruits",
    fill = "Procenat (%)"
  ) +
  scale_fill_gradient(low = colorS[1], high = colorS[2])
```



Са стубичастог графика визуелно је јасно да код особа без дијабетеса доминирају испитаници који конзумирају воће, код особа са неким стањем дијабетеса такође има више оних који конзумирају воће. Градијент на топлотном дијаграму показује променљив однос, али распоред не открива јасан образац међу класама дијабетеса. То указује да конзумација воћа није самостално повезана са статусом дијабетеса и нема аналитичку вредност у односу на циљану променљиву Diabetes_012.

Претпоставку ћемо испитати статистички преко Крамеровог коефицијента и χ^2 теста, наравно обе методе смо већ предефинисали и имплементирали па их онда једноставно позивамо.

```
chi_sq_test(data$Fruits, data$Diabetes_012)
cramer_v(data$Fruits, data$Diabetes_012)
> chi_sq_test(data$Fruits , data$Diabetes_012)
```

Pearson's Chi-squared test

data: tabela
X-squared = 454.35, df = 2, p-value < 2.2e-16

```
> cramer_v(data$Fruits , data$Diabetes_012)
[1] 0.0423205
```

χ^2 тест независности показује статистички значајну повезаност између променљивих Diabetes_012 i Fruits $\chi^2 = 454,35$, а p-value < 0,00000000000000022 што је доста испод границе статистичке значајности од 0,05. Међутим, графички преглед не открива јасан образац, а Крамеров коефицијент $V = 0.042$ указује на веома слабу повезаност. Стога се може закључити да променљива Fruits нема практичан самостални ефекат на статус дијабетеса. За мултиваријантну анализу, ова променљива ће бити разматрана само ако други фактори указују на могућу интеракцију или контролни ефекат.

Veggies vs Diabetes_012

Анализирамо учесталост испитаника који су конзумирају поврће (Veggies) у односу на резултате дијабетичког стања (Diabetes_012). Тип карактеристике Veggies је бинарна категоријска променљива са категоријама Да (испитаник конзумира поврће једном или више пута у току дана), Не (испитаник не конзумира поврће једном или више пута у току дана). Дистрибуцију конзумације воћа унутар сваке класе дијабетеса приказали смо стубичастим дијаграмом и топлотним дијаграмом.


```
ggplot(data, aes(x = Diabetes_012, fill = Veggies)) +
```

```

geom_bar(position = "dodge") +
labs(
  title = "Distribucija kategorija Veggies po kategorijama Diabetes_012",
  y = "Broj opservacija",
  fill = "Konzumacija povrća"
) + scale_fill_paletteer_d("MetBrewer::Archambault")+
geom_text(
  stat = "count",
  aes(label = ..count..),
  position = position_dodge(width = 0.8),
  vjust = -0.3
)+
theme(legend.position = "bottom")

data %>%
count(Diabetes_012, Veggies) %>%
group_by(Diabetes_012) %>%
mutate(percent = n / sum(n) * 100) %>%
ggplot(aes(x = Diabetes_012, y = Veggies, fill = percent)) +
geom_tile() +
geom_text(aes(label = paste0(round(percent, 1), "%")), color = "white") +
labs(
  title = "Distribucija kategorija Veggies po kategorijama Diabetes_012",
  x = "Diabetes_012",
  y = "Veggies",
  fill = "Procentat (%)"
) +
scale_fill_gradient(low = colorS[1], high = colorS[2])

```



Са стубичастог графика визуелно је јасно да код особа без дијабетеса доминирају испитаници који конзумирају поврће, код особа са неким стањем дијабетеса такође има више оних који конзумирају поврће. Градијент на топлотном дијаграму показује променљив однос, али распоред не открива јасан образац међу класама дијабетеса. То указује да конзумација поврћа није самостално повезана са статусом дијабетеса и нема аналитичку вредност у односу на циљану променљиву Diabetes_012.

Претпоставку ћемо испитати статистички преко Крамеровог коефицијента и χ^2 теста, наравно обе методе смо већ предефинисали и имплементирали па их онда једноставно позивамо.

```
chi_sq_test(data$Veggies, data$Diabetes_012)
cramer_v(data$Veggies, data$Diabetes_012)
> chi_sq_test(data$Veggies, data$Diabetes_012)

Pearson's Chi-squared test


data:  tabela
X-squared = 893.84, df = 2, p-value < 2.2e-16
> cramer_v(data$Veggies, data$Diabetes_012)
[1] 0.05935909
```

χ^2 тест независности показује статистички значајну повезаност између променљивих Diabetes_012 i Veggies $\chi^2 = 893,84$, а $p\text{-value} < 0,00000000000000022$ што је доста испод границе статистичке значајности од 0,05. Међутим, графички преглед не открива јасан образац, а Крамеров коефицијент $V = 0.059$ указује на веома слабу повезаност. Стога се може закључити да променљива Veggies нема практичан самостални ефекат на статус дијабетеса. За мултиваријантну анализу, ова променљива ће бити разматрана само ако други фактори указују на могућу интеракцију или контролни ефекат.

HvyAlcoholConsump vs Diabetes_012

У овој анализи ће се посматрати колика је учестаност људи који често конзумирају, односно ретко конзумирају алкохол а да притом имају неки вид дијабетеса. То радимо анализом мултикласне променљиве Diabetes_012, која нам говори да ли испитаник има дијабетес/предијабетес или га нема, и бинарне категоријске променљиве HvyAlcoholConsump која нам говори да ли испитаник има тенденције да често конзумира алкохол, односно да ли конзумира више од 14 пића на недељном нивоу за мушкарце и 7 за жене, наравно ова променљива је факторизована на једноставније „Да и не“. Одговор о пропорционалности класа ћемо добити употребом сложеног стубичног дијаграма добијеног из датог кода:


```
ggplot(data, aes(x = Diabetes_012, fill = HvyAlcoholConsump)) +
  geom_bar(position = "dodge") +
  geom_text(stat = "count",
    aes(label = ..count..),
    vjust = -0.5,
    position = position_dodge(width = 0.9),
    size = 3) +
  scale_fill_manual(values = colors)+
  labs(title = "Distribucija HvyAlcoholConsump u odnosu na Diabetes_012",
    x = NULL,
    y = "Broj ispitanika",
    fill = "Konzumira dosta alkohola")
```



На основу датог дијаграма оно што се да видети јесте да немамо нарочиту пропорцију узорака за групе људи који су већи конзументи и оних који то нису, што је и очекивано јер је у униваријантној анализи доказано да од укупног броја испитаника, преко 90% њих није тежак конзумент алкохола. Међутим оно што је евидентно јесте да за све класе дијабетеса конзументи и неконзументи алкохола имају пропорционално исти однос, што би значило да нема веће зависности.

Са друге стране да бисмо утврдили да ли постоји корелација између варијабли употребићемо топлотну мапу (heat map) на основу приложеног кода:

```
data %>%
  count(Diabetes_012, HvyAlcoholConsump) %>%
  group_by(Diabetes_012) %>%
  mutate(percent = n / sum(n) * 100) %>%
  ggplot(aes(x = Diabetes_012, y = HvyAlcoholConsump, fill = percent)) +
  geom_tile() +
  geom_text(aes(label = paste0(round(percent, 1), "%")), color = "white") +
  labs(
    title = "Distribucija kategorija HvyAlcoholConsump po kategorijama Diabetes_012",
    x = "Diabetes_012",
    y = "HvyAlcoholConsump",
    fill = "Procenat (%)"
  ) +
  scale_fill_gradient(low = colorS[1], high = colorS[2])
```



Иако је пропорција међу групама лоша, визуалним посматрањем топлотне мапе видимо да нема неке релације између оболелих који конзумирају и не конзумирају алкохол, што ће рећи да, барем по топлотној мапи, нема релације између датих варијабли.

Међутим, иако нам график говори да нема неке нарочите релације међу датим варијаблама, сама визуелна инспекција нам није довољан доказ, па како бисмо потврдили оно што нам график говори, употредићемо Крамеров „V“ коефицијент и χ^2 тест, наравно обе методе смо већ предефинисали и имплементирали па их онда једноставно позивамо:


```
chi_sq_test(data$HvyAlcoholConsump, data$Diabetes_012)
cramer_v(data$HvyAlcoholConsump, data$Diabetes_012)
```

χ^2 тест је израчунао $\chi^2 = 850.32$, $df = 2$, $p\text{-value} < 2.2e-16$, што би рекло да по вредност „p” са математичке стране постоји статистичка повезаност између употребе алкохола и дијабетеса, X-squared има релативно нижу вредност, што ће рећи да су ове две варијабле независне. Са друге стране иако нам је „chi” тест дао одговор да употреба алкохола има повезаност са дијабетесом, Крамеров коефицијент нам је дао релативно ниску вредност од 0.0579, што ће рећи да у пракси нема готово никакав утицај на сам исход да ли особа има дијабетес или не, па се слободно може рећи да је ова варијабла занемарива при превиђању типа дијабетеса код особе.

AnyHealthcare vs Diabetes_012

У овој анализи ће се посматрати колика је учестаност људи који имају било какав вид здравствене неге, односно немају, а да притом имају неки вид дијабетеса. То радимо анализом мултикласне променљиве Diabetes_012, која нам говори да ли испитаник има дијабетес/преддијабетес или га нема, и бинарне категоријске променљиве AnyHealthcare која нам говори да ли испитаник има неки вид здравствене неге, наравно ова променљива је факторизована на једноставније „Da” и „Ne”, као што је случај код анализе са HvyAlcoholConsump . Одговор ћемо добити употребом сложеног стубичног дијаграма добијеног из датог кода:

```
ggplot(data, aes(x = Diabetes_012, fill = AnyHealthcare)) +
  geom_bar(position = "dodge") +
  geom_text(stat = "count",
    aes(label = ..count..),
    vjust = -0.5,
```



Commented [MS16]: Коментар професора: skoro svi imaju zdravstvenu negu?

Commented [AR17R16]: Требало је напоменути контекст самих опсервација да би било јасно зашто готово све опсервације имају здравствену негу,


Према визуелној инспекцији добијеног графика, опет видимо да нам је број испитаника према приступу здравственој нези непропорционалан, исто као што је било при анализи са алкохолом, са тим што у овом случају 95% испитаника има приступ неком виду здравствене неге. На основу података рекло се види да готово све опсервације имају здравствену заштиту, што и не чуди с обзиром да је испитивање вршено у САД, једној од најразвијенијих држава света. Оно што је такође уочљиво јесте да пропорционално постоје исти трендови при посматрању да ли различите класе дијабетеса имају приступ здравственој заштити или не.

Да бисмо визуелно утврдили да ли постоји корелација опет ћемо се послужити топлотном мапом:

```

data %>%
count(Diabetes_012, AnyHealthcare) %>%
group_by(Diabetes_012) %>%
mutate(percent = n / sum(n) * 100) %>%
ggplot(aes(x = Diabetes_012, y = AnyHealthcare, fill = percent)) +
geom_tile() +
geom_text(aes(label = paste0(round(percent, 1), "%")), color = "white") +
labs(
title = "Distribucija kategorija AnyHealthcare po kategorijama Diabetes_012",
x = "Diabetes_012",
y = "AnyHealthcare",
fill = "Procenat (%)")
) +
scale_fill_gradient(low = colorS[1], high = colorS[2])

```



Иако је пропорција међу чланова група лоша, визуалном инспекцијом топлотне мапе видимо да је повезаност између оних који имају приступ здравственој нези са и без дијабетеса непостојећа у односу на оне који немају здравствену негу, што ће рећи да нам визуелна инспекција даје основну хипотезу да релације између датих променљивих нема.

Међутим, као и код конзумирања алкохола, преглед графика нам није довољан како бисмо могли да потврдимо хипотезу о неповезаности између приступа здравственој нези и дијабетесу, те нам је потребно да опет израчунамо Крамеров „V” коефицијент, као и χ^2 тест, који нам оквирно дају колико је јака релација између две променљиве, као и то да ли уопште постоји и зато ћемо их сада израчунати:

```
chi_sq_test(data$AnyHealthcare, data$Diabetes_012)
cramer_v(data$AnyHealthcare, data$Diabetes_012)
```


Напокон, када извршимо дате функције за χ^2 тест смо добили следећи резултат:

χ^2 тест = 69.078, df = 2, p-value = 9.998e-16. За дати резултат на основу параметара p који је практично 0, може се закључити да постоји статистичка повезаност између двеју варијабли, а вредност χ^2 , која је релативно ниска у односу на скуп података нам говори да је одступање независности од приступа здравственој нези од тога да ли неко има дијабетес занемарива. Стога нам је потребан Крамеров коефицијент да нам каже да ли приступ здравственој нези уопште има било какав утицај на то да ли неко има дијабетес или не. За Крамеров коефицијент смо добили вредност од 0.01650162, која нам говори да у пракси и за модел који би предвидео да ли неко има дијабетес или не, приступ здравственој нези нема готово никакав утицај.

NoDocbcCost vs Diabetes_012

Следећа анализа нам треба дати одговор на постојање повезаности између појаве дијабетеса и немогућности одласка лекару услед недостатка финансијских средстава. NoDocBcCost нам говори да ли је испитаник у претходних месец дана имао средства да оде у посету лекару. Као и код претходне две анализе и ова варијабла има два нивоа „Да” и „Не”. Одговор о пропорционалности класа добити употребом сложеног стубастог дијаграма:

```
ggplot(data, aes(x = Diabetes_012, fill = NoDocbcCost)) +
  geom_bar(position = "dodge") +
```

Kao i kod prethodne dve analize, i u ovoj je broj ispitanika prema mogućnosti odlaska lekaru neproporcionalan, svega 8.7% nije imalo mogućnost odlaska lekaru, što čini ovu varijablu pristrasnom. Isto se može reći da proporcionalno imamo gotovo identične odnose između onih koji su imali mogućnosti da odu lekari, i onih koji to nisu imali, bez obzira da li je u pitanju неко ко има дијабетес или не.

Визуално утврђујемо постојаност повезаности између датих променљивих употребом топлотне мапе:


```
data %>%
count(Diabetes_012, NoDocbcCost) %>%
group_by(Diabetes_012) %>%
mutate(percent = n / sum(n) * 100) %>%
ggplot(aes(x = Diabetes_012, y = NoDocbcCost, fill = percent)) +
geom_tile() +
geom_text(aes(label = paste0(round(percent, 1), "%")), color = "white") +
labs(
title = "Distribucija kategorija NoDocbcCost po kategorijama Diabetes_012",
x = "Diabetes_012",
y = "NoDocbcCost",
fill = "Procenat (%)")
)+
```

Commented [MS18]: Коментар професора:
Gore svi imaju zdravstvenu negu, a ovde niko nema novca za troskove lecenja? Skroz suprotni grafici

Commented [MS19R18]: Карактеристика NoDocbcCost нам говори следеће: Да ли је у последњих 12 месеци испитаник имао потребу за доктором али није могао да приушти због трошкова.

Што значи да одговор НЕ - није имао потребу за доктором тј. ДА - имао је потребу за доктором и није могао да приушти. Закључак је да смо погрешно формирали лателе које нам тумаче график. Биће исправљено.

Commented [MS20R18]: Исправљено.



Визуалном инспекцијом дате топлотне мапе јасно је уочљиво да не постоји нарочита повезаност између класа, иако је пропорционалност броја испитаника у односу на класе дијабетеса лоша, видимо да за сваку класу дијабетеса имамо практично исти однос. Свакако радимо Крамеров коефицијент и χ^2 тест како бисмо одбранили тезу о неповезаности.

```
chi_sq_test(data$NoDocbcCost, data$Diabetes_012)
cramer_v(data$NoDocbcCost, data$Diabetes_012)

chi_sq_test(data$NoDocbcCost, data$Diabetes_012)
X-squared = 396.08, df = 2, p-value < 2.2e-16


> cramer_v(data$NoDocbcCost, data$Diabetes_012)
[1] 0.03951385
```

Извршавањем датих функција, поново добијамо сличну ситуацију, χ^2 тест нам кроз параметре "p" које је готово 0 и χ^2 које је око 396 нам говори да постоји статистичка повезаност која до душе је међу класама које су независне. Вредност Крамеровог коефицијента која износи приближних 0.0395 нам говори и да је ова повезаност занемарива, тј. да је утицај ове варијабле над будућом предвидивом варијаблом Diabetes_012 заправо занемарива, и неће представљати битан фактор за предикцију модела.

GenHlth vs Diabetes_012

У овој анализи ћемо се бавити повезаношћу оцено самих испитаника у вези са њиховим здрављем на скали од 1 до 5 у односу на предиктивну варијаблу Diabetes_012. Ради се о категоријској променљивој тако да се опет служимо стубастим графиком као и топлотном мапом за визуелизацију:

```
ggplot(data, aes(x = Diabetes_012, fill = GenHlth)) +
  geom_bar(position = "dodge") +
  geom_text(stat = "count",
```



У односу на претходне 3 анализе, овде јасно видимо да постоје разлике у дистрибуцији између класа. Док код опсервација у којима испитаници нису имали дијабетес превладавају оцене о општем здрављу које су биле већином Добре, Врло добре и Одлично, то није нарочит случај код друга два стања, односно где су испитаници имали дијагностикован преддијабетес/дијабетес. Наравно овде се може уочити и да имамо највише опсервација код којих испитаници немају дијабетес, али се такође може рећи да је број оцена које говоре да испитанику није добро пропорционално највећи управо код испитаника који имају дијабетес, што ће рећи да је ова варијабла потенцијални предиктор за наш модел, али остаје да се види са још неким мерилима о којима више у наставку.

Како имамо доста нивоа оцена здравља, било би пожељно урадити и box plot који ће нам боље дати увид у дистрибуцију оцена међу типовима дијабетеса:

```


ggplot(data, aes(x = Diabetes_012, y = as.numeric(GenHlth), fill = Diabetes_012)) +
  geom_boxplot() +
  scale_fill_manual(values=colors)+
  labs(title = "Distribucija ocena zdravlja po tipovima dijabetesa",
y = "Ocena zdravlja (1-Odlično, 5-Loše)",
x = "Dijabetes status")

```

Commented [MS21]: Коментар професора: овде би додатно boxplot mogao da se nacрта ako se jedna gleda kao numericka

Commented [AR22R21]: На основу професоровог предлога, јасно је да би се боље увидела дистрибуција оцена здравственог стања професора на основу BoxPlot-a који нам даје евидентно бољу слику.


Commented [AR23R21]:



На основу box plotа јасно је да постоје разлике у дистрибуцији оцена здравља на основу типова дијабетеса, тј. евидентно је да како се дијабетес појављује, тако је дистрибуција оцена на све нижем нивоу у односу на оне који немају дијабетес.

Како бисмо утврдили да ли има релације визуално, служимо се топлотном мапом.

```
data %>%
  count(Diabetes_012, GenHlth) %>%
  group_by(Diabetes_012) %>%
  mutate(percent = n / sum(n) * 100) %>%
  ggplot(aes(x = Diabetes_012, y = GenHlth, fill = percent)) +
  geom_tile() +
  geom_text(aes(label = paste0(round(percent, 1), "%")), color = "white") +
  labs(
    title = "Distribucija kategorija GenHlth po kategorijama Diabetes_012",
    x = "Diabetes_012",
    y = "GenHlth",
    fill = "Procentat (%)"
  ) +
  scale_fill_gradient(low = colorS[1], high = colorS[2])
```



Kao što se dalo predочити са стубичастим графиком, овде постоје већи помаци у повезаности у односу на претходне 3 анализе. Евидентно је да пропорционално, иако имамо мање опсервација са дијабетесом него оних без, ми можемо утврдити да пропорционално највише резултата где је некоме лоше има управо у опсервацијама са дијабетесом, у односу на онима који се генерално осећају здраво, а којих највише пропорционално има без дијабетеса.

Међутим као и пре, није нам довољан само визуални приказ да би утврдили да ли је нешто повезано или не, потребно је употребити и математичко-статистичке методе како бисмо дошли до мерила да ли је нешто повезано, зато поново користимо χ^2 тест, као и “V” коефицијент.

```
chi_sq_test(data$GenHlth, data$Diabetes_012)
X-squared = 24248, df = 8, p-value < 2.2e-16


cramer_v(data$GenHlth, data$Diabetes_012)
0.2186154
```

Ове бројке нам говоре да је статистичка повезаност итекако постојећа, то нам говори вредност „p“, која је готово 0, међутим оно што је интересантније, јесте да је вредност χ^2 поприлично висока, што нам говори да статистички то није случајно, и да постоје међузависности варијабли. Наравно како би потврдили утицај ту је Крамеров коефицијент који је овог пута нешто виши, односно већи је од 0.1, што је релативна вредност да ли нешто има неки утицај или не, стога можемо донети закључак да ће ова варијабла утицати на то да ли неко има дијабетес или не, али више ће се показати у мултиваријатној анализи.

MentHlth vs Diabetes_012

У овој анализи ће се говорити о повезаности између менталног здравља испитаника са и без дијабетеса. MentHlth нам говори о менталним проблемима испитаника, односно да ли је испитаник у претходних 30 дана имао неки психички проблем и када. Потребно је утврдити да ли појава менталних проблема прати дијабетес. За разлику од претходне 4 анализе, у овој учествује нумеричка варијабла, те нам је потребно употреби други тип графика, односно „Box plot” и „Density plot”

```
ggplot(data, aes(x = as.factor(Diabetes_012), y = MentHlth, fill = as.factor(Diabetes_012))) +
```



Шта нам говори дати „Box plot“? Па као прво видимо да су нам за све три групе медијане готово на 0 што нам говори да преко половине испитаника није осећало било какве менталне потешкоће. Наравно за све три групе можемо видети и солидан број изузетака (outliera), што значи да постоје екстремне вредности за све 3 групе испитаника, што значи да екстремни случајеви не зависе од саме групе. Са друге стране види се да су интерквartilни опсези група предидијабетес и дијабетес нешто већи од групе која нема дијабетес, што значи да постоји потенцијална повезаност ових двеју варијабли, али наравно ово је само претпоставка, остаје се утврдити другим методама.

Хистограм ћемо употребити да би видели колика је тачна учестаност испитаника који нису осетили било какве менталне потешкоће у периоду од месец дана:

```
ggplot(data, aes(x = MentHlth, fill = Diabetes_012)) +
geom_histogram(binwidth = 1, position = "dodge", alpha = 0.8) +
scale_fill_manual(values = colors) +
labs(title = "Histogram MentHlth u odnosu na Diabetes_012",
y = "Broj opservacija",
fill = "Dijabetes")
```




Commented [MS24]: Коментар професора: nejasan grafik

Commented [AR25R24]: Коментар је на месту, иако је хистограм требао да нам да увид у појаву проблема по данима према типу дијабетеса, то се није нарочито обистинило услед дисбаланса међу опсервацијама, па ћемо употребити мапу густине да бисмо боље одредили дистрибуцију...

Дакле наше сумње су се обистиниле, велика већина опсервација из скупа података није имала никакве менталне потешкоће, и то су готово све опсервације без дијабетеса. Једина већа група, мада занемарива у односу на прво поменуто су људи који нису имали проблема али имају дијабетес, што нам даје слабе назнаке да овде постоји повезаност. Наравно пре свега ћемо употребити мапу густине како бисмо добили мало бољу представу о дистрибуцији типова дијабетеса према броју дана са менталним потешкоћама.

```
ggplot(data, aes(x = MentHlth, color = Diabetes_012, fill = Diabetes_012)) +  
  geom_density(alpha = 0.2) +  
  scale_fill_manual(values=colors)+  
  labs(title = "Gustina MentHlth po tipu dijabetesa")
```



На основу мапе густине јасно је да већина опсервација тежи ка 0, небитно од типа дијабетеса, мада оно што је добро истаћи јесте да ако се погледају појаве репова на одређеним данима, евидентно је да не постоје неке значајне разлике у промени густине оних који имају дијабетес/преддијабетес односно немају га.

Ову асиметричност карактеристике *MentHlth* смо увидели и у униваријантној анализи, а сада у биваријантној потврдили. Када узмемо у обзир додатне закључке идентичне расподеле по групама дијабетеса. Разлике између група се пре свега виде у учесталости већих вредности, а не у главној тенденцији ка 0, што додатно указује да променљива *MentHlth* нема снажну дискриминаторну моћ када се посматра у свом континуалном облику.

Анализа хистограма показује да вредност 0 значајно доминира у односу на све остале вредности, те је она издвојена као посебна категорија која означава одсуство менталних проблема. За вредности веће од 0 уочава се нагли пад броја посматрања у интервалу од 1 до 5 дана, након чега следи стабилнији, али значајно ређи распон вредности. Овај интервал интерпретиран је као период благих менталних потешкоћа. Даљи ток хистограма показује да се вредности од 6 до 15 дана јављају ређе, али континуирано, што указује на учесталије и умерено изражене менталне тешкоће током месеца. Вредности изнад 15 дана налазе се у десном репу расподеле и јављају се код мањег броја испитаника.

Додатно, дијаграм густине потврђује овакву поделу, показујући доминантну концентрацију вредности у близини нуле, стрм пад густине за мање вредности, као и дугачак десни реп расподеле. Иако се на дијаграмима не могу јасно уочити оштре границе између појединих категорија, изабрана подела омогућава да се подаци групишу на начин који је у складу са уоченом расподелом и истовремено олакшава даљу анализу и тумачење резултата, посебно у примени непараметарских статистичких метода. На основу претходног тумачења расподела је:

Категорија	Опис
0	нема проблема
1-5	благих проблема
6-15	умерени проблеми
16-30	тешки проблеми

Commented [MS26]: Коментар професора: ја ово не видим са горње слике

Commented [MS27R26]: Слажемо се са сугестијом, требало је детаљније образложити поделу. Објашњење је додатно изнад табле. Додатно смо искористили и тумачење дијаграма густине.

Претпоставку да *MentHlth* у свом нумеричком облику није утицајна испитаћемо статистички. Како се ради о нумеричкој варијабли овде ћемо користити “anova test” и “tukey test”. Путем анове дознајемо да ли је просек лоших дана исти у свим групама, док је „Tukey” ту да нам каже које су то групе које садрже разлику.

```
anova_test(data$MentHlth,data$Diabetes_012)
              Df Sum Sq Mean Sq F value Pr(>F)
as.factor(grupna_var)  2  78369  39185  717.1 <2e-16 ***
Residuals      253677 13861367   55
---
Signif. codes:  0 '***' 0.001 '**' 0.01 '*' 0.05 '.' 0.1 ' ' 1
> tukey_fun(data$MentHlth,data$Diabetes_012)
Tukey multiple comparisons of means
 95% family-wise confidence level

Fit: aov(formula = numericka_var ~ as.factor(grupna_var))
```



```
$`as.factor(grupna_var)`
      diff    lwr    upr p adj
predijabetes-nema dijabetes  1.585503 1.3281776 1.8428284 0.000000
dijabetes-nema dijabetes    1.517402 1.4179230 1.6168810 0.000000
dijabetes-predijabetes    -0.068101 -0.3388471 0.2026451 0.825752
```


Из добијених резултата урађених тестова може се закључити следеће:

Код анова теста значајна нам је вредност F и p , која је релативно висока, говори да постоји разлика у просеку менталног здравља међу испитаницима који имају, односно немају некакав тип дијабетеса. Међутим да би се открило код којих класа испитаника постоји пораст у просеку дана са менталним потешкоћама нам је потребна употреба „Tukey” теста. Његови резултати нам говоре да у просеку људи без дијабетеса имају за око 1.5 дана мање са менталним потешкоћама него они који имају дијабетес/преддијабетес, док је однос између дијабетеса/преддијабетеса у основи занемарив јер му је разлика око 0.5. Иако делује да постоји статистичка значајност на ментално здравље буде предиктор, у пракси при предикцији он нема високи потенцијал да буде предиктор, тј. занемарив је.

PhysHlth vs Diabetes_012

У овој анализи ћемо испитати да ли варијабла PhysHlth има икакву повезаност са варијаблом Diabetes_012. У основи прво поменута варијабла нам говори да ли је испитаник имао икаквих физичких потешкоћа у претходних месец дана, слично као и код варијабле MntHlth. Структурно гледано и ова варијабла је нумеричка, па ћемо се опет служити бокс плотом и хистограмом:


```
ggplot(data, aes(x = Diabetes_012, y = PhysHlth, fill = Diabetes_012)) +
  geom_boxplot(alpha = 0.7) +
  scale_fill_manual(values=colors) +
  labs(title = "Distribucija PhysHlth po tipovima Diabetes_012",
       fill = "Dijabetes")
```



Овде се може видети да постоји одређени растући тренд, док је кутија за нема дијабетес најмања, готово равномерно кутија расте са сваком следећом класом типа дијабетеса. Посебно је интересантно то што се медијана коначно одлепљује од нуле код опсервација са

дијабетесом, што ће рећи да постоји осетно више физичких тегоба код људи са дијабетесом него код оних без њега. Такође је лако учљиво да изузетака код опсервација са дијабетесом нема, што ће рећи да постоји извесан образац тегоба код људи који имају дијабетес. Ово нам даје индикацију да ће се ова варијабла наћи међу предикторима у нашем моделу, али наравно још је рано о томе говорити, па ћемо се послужити још неким техникама како бисмо то утврдили.

```
ggplot(data, aes(x = PhysHlth, fill = Diabetes_012)) +
  geom_histogram(binwidth = 1, position = "dodge", alpha = 0.8) +
  scale_fill_manual(values = colors) +
  labs(title = "Histogram PhysHlth u odnosu na Diabetes_012",
        y = "Broj opservacija",
        fill = "Dijabetes")
```




Хистограм нам пак даје мало обесхрабрујућу слику јер нам говори да у скупу података највише има испитаника без физичких потешкоћа, и притом најбројнији скуп опсервација је управо онај где испитаник нема дијабетес. Наравно пре свега ћемо употребити мапу густине како бисмо добили мало бољу представу о дистрибуцији типова дијабетеса према броју дана са физичким потешкоћама.

```
ggplot(data, aes(x = PhysHlth, color = Diabetes_012, fill = Diabetes_012)) +
  geom_density(alpha = 0.2) +
  scale_fill_manual(values = colors) +
  labs(title = "Gustina PhysHlth po tipu dijabetesa")
```

Commented [MS28]: Коментар професора: nejasan grafik, исто и за поделу

Commented [AR29R28]: Што се графика тиче, опет не можемо добити јасну слику о дистрибуцији дана са физичким потешкоћама у односу на класе дијабетеса, услед слабе симетричности међу бројевима дана са потешкоћама, па ћемо за бољу слику употребити и мапу густине.

Commented [MS30R28]: Као и код менталног здравља. Слажемо се са сугестијом, требало је детаљније образложити поделу. Искористили смо нови дијаграм густине, јер је учљивије.



На основу мапе густине јасно је да не постоји нарочитих промена према данима са физичким потешкоћама осим када је у питању свих 30 дана у месецу када је јасно да густина све 3 групе одједном расте, односно постоји већа шанса да ће испитаник пријавити да је имао физичке потешкоће цео месец у односу на мањи број дана у истом. Наравно и даље је евидентна асиметрија у броју опсервација са и без икаквих потешкоћа где се види да већина опсервација неvezано за класу припада без икаквих потешкоћа у току месеца.

Такву асиметричност смо увидели и у униваријантној анализи. Разлике између група се показује у промени структуре и већем броју дана са потешкоћама, што додатно указује да променљива PhysHlth имати већу значајност у категоријском облику.

На дијаграму густине уочава се изразито асиметрична расподела са доминантним пиком код вредности 0, што указује да већина испитаника није имала физичке здравствене проблеме у посматраном периоду. Због тога је вредност 0 издвојена као посебна категорија која означава одсуство проблема. За вредности од 1 до 5 дана приметан је нагли пад густине у односу на вредност 0, али и даље постоји јасна концентрација података у овом интервалу. Овај део расподеле указује на повремене и мање изражене физичке проблеме, због чега је интервал 1–5 дефинисан као категорија блаких проблема. У интервалу од 6 до 15 дана густина је значајно нижа, али релативно равномерна, без изражених врхова. Вредности између 16 и 30 дана налазе се у десном репу расподеле и јављају се код мањег броја испитаника. На основу претходног тумачења расподела је:

Категорија	Опис
0	нема проблема
1-5	благи проблеми
6-15	умерени проблеми
16-30	тешки проблеми

Наравно остаје да се даље утврђује употребом математичко-статистичких метода да ли ова варијабла има предикаторски потенцијал као нумеричка, те из тог разлога користимо анова и “Tukey” тест.

```
anova_test(data$PhysHlth,data$Diabetes_012)
      Df Sum Sq Mean Sq F value Pr(>F)
as.factor(grupna_var)  2  600673  300337  4079 <2e-16 ***
Residuals            74
---
Signif. codes:  0 '***' 0.001 '**' 0.01 '*' 0.05 '.' 0.1 ' ' 1

> tukey_fun(data$PhysHlth,data$Diabetes_012)
Tukey multiple comparisons of means
95% family-wise confidence level

Fit: aov(formula = numericka_var ~ as.factor(grupna_var))

$`as.factor(grupna_var)`
      diff      lwr      upr p adj
predijabetes-nema dijabetes 2.765889 2.467170 3.064609  0
dijabetes-nema dijabetes  4.372063 4.256581 4.487544  0
dijabetes-predijabetes  1.606174 1.291875 1.920473  0
```

Дакле након извршених тестова добијамо јаснију слику. Анова тест нам је дао поприличну високу вредност параметра $F=4079$, што ће рећи да међу групама итекако постоји разлика међу групама дијабетичара и њихових физичких потешкоћа, чиме параметар “p” потврђује нам на значајности ове разлике. Наравно да би видели међу којим класама разлика постоји користиће нам други обављени тест, односно „Tukey”, који нам говори да је од особе која нема дијабетес до особе која га има, просечан број дана са физичким потешкоћама у просеку износи 4.37 дана, наравно ни остале разлике нису занемариве, што није био случај код менталних потешкоћа, па тако разлика између особа са дијабетесом и преддијабетесом износи 1.6 дана, док код преддијабетеса и оних који га немају износи 2.8 дана, што нису занемариви бројеви, те је безбедно рећи да физичке потешкоће имају утицаја на то да ли неко има дијабетес или не.

Ово иде у прилог о одлуци регрупације, која ће очувати значајност, а истовремено редуковати асиметричност.

DiffWalk vs Diabetes_012


Садашња анализа ће нам дати повезаност између варијабле DiffWalk и Diabetes_012. Ова варијабла нам говори да ли испитаник има потешкоће у кретању, те је ово класна варијабла са два нивоа, односно „Да“ и „Не”, наравно како то бива са класним варијаблама употребљавамо стубичасти дијаграм и топлотну мапу ради добијања хипотезе:

```
ggplot(data, aes(x = Diabetes_012, fill = DiffWalk )) +
  geom_bar(position = "dodge") +
  geom_text(stat = "count",
    aes(label = ..count..),
```

```

vjust = -0.5,
position = position_dodge(width = 0.9),
size = 3) +
scale_fill_manual(values = colors) +
labs(title = "Distribucija DiffWalk u odnosu na tipove Diabetes_012",
x = NULL,
y = "Broj opservacija",
fill = "Ima poteškoća")

```




Према графику може се уочити, да нам пропорционалност потешкоћа и није баш најбоља, али је лако уочљиво да нам број људи са потешкоћама пропорционално расте са појавом дијабетеса, што би рекло да постоји повезаност, мада је потребно то додатно утврдити.

```

data %>%
count(Diabetes_012, DiffWalk) %>%
group_by(Diabetes_012) %>%
mutate(percent = n / sum(n) * 100) %>%
ggplot(aes(x = Diabetes_012, y = DiffWalk, fill = percent)) +
geom_tile() +
geom_text(aes(label = paste0(round(percent, 1), "%")), color = "white") +
labs(
title = "Distribucija kategorija DiffWalk po kategorijama Diabetes_012",
x = "Diabetes_012",
y = "DiffWalk",
fill = "Procenat (%)")
) +
scale_fill_gradient(low = colorS[1], high = colorS[2])

```



Топлотна мапа нам засигурно даје ширу слику. Дефинитивно број потешкоћа пропорционално расте у односу на класе дијабетеса. Са тим у вези валидно је дати претпоставку да постоји повезаност између потешкоћа у кретању са стањима дијабетеса, наравно ово је потребно додатно математички доказати.

```
chi_sq_test(data$DiffWalk, data$Diabetes_012)
data: tabela
X-squared = 12777, df = 2, p-value < 2.2e-16


cramer_v(data$DiffWalk, data$Diabetes_012)
0.2244245
```

Дефинитивно се може рећи да имамо повезаност сада, χ^2 тест нам говори да постоји статистичка повезаност између датих варијабли, то нам говори параметар “p” који је готово једнак 0, са друге стране χ^2 тест вредност која је поприлично висока, нам говори да постоји јака корелација међу датим варијаблама. Са друге стране како бисмо добили тачну јачину повезаности. Зато имамо Крамеров коефицијент који је у овом случају висок, односно 0.2244, што је у односу на релативну вредност већи, па се дефинитивно може потврди да овде постоји повезаност, али да је боље употребити је у мултиваријантној анализи него је држати под самостални предиктор.

Sex vs Diabetes_012

Сада ћемо да истражујемо повезаност појаве дијабетеса и полова. Пол је у овом случају категоријска променљива са две вредности, односно „zensko“ и „musko“, те и овде употребљавамо методе као и код категоријских променљивих. Прво ћемо све визуализовати:

```
ggplot(data, aes(x = Diabetes_012, fill = Sex)) +
  geom_bar(position = "dodge") +
  geom_text(stat = "count",
    aes(label = ..count..),
    vjust = -0.5,
    position = position_dodge(width = 0.9),
    size = 3) +
  scale_fill_manual(values = colors) +
```




Овде увиђамо да не постоји нарочито одступање по половима у односу на појаву дијабетеса, што би рекло да вероватно не постоји нарочита повезаност. Наравно сам преглед стубичастог графика нам не може засигурно рећи о постојању повезаности датих варијабли, зато ћемо извршити додатне анализе.

```
data %>%
  count(Diabetes_012, Sex) %>%
  group_by(Diabetes_012) %>%
  mutate(percent = n / sum(n) * 100) %>%
  ggplot(aes(x = Diabetes_012, y = Sex, fill = percent)) +
  geom_tile() +
  geom_text(aes(label = paste0(round(percent, 1), "%")), color = "white") +
  labs(
    title = "Distribucija kategorija Sex po kategorijama Diabetes_012",
    x = "Diabetes_012",
    y = "Sex",
    fill = "Procenat (%)"
  ) +
  scale_fill_gradient(low = colorS[1], high = colorS[2])
```

Commented [MS31]: Коментар професора на дијаграм топлотне мапе: *bolje je kroz procenat, lakse se vide razlike*

Commented [MS32R31]: Слажемо се са сугестијом. Истраживањем праксе оваквих пројекта нашли смо информацију да је пракса изражавање у процентима. Сви графици топлотних мапа су промењени, али закључци из њих остају исти.



Ovde je uočljivo da nema naročitih promena u odnosu između polova u odnosu na tip dijaabetesa, što bi nam u osnovi moglo dati hipotezu da ne postoji naročita povezanost između pola ispitanika i dijaabetesa, ali da bismo to potvrdili radimo testove.

```
chi_sq_test(data$Diabetes_012,data$Sex)
X-squared =250.85, df = 2, p-value < 2.2e-16
```


```
cramer_v(data$Diabetes_012,data$Sex)
0.03144593
```

Iako je vrednost parametra p u χ^2 testu govori da postoji statistička značajnost, ali da je odstupanje od nezavisnosti zanemarljivo što nam govori χ^2 vrednost. Naravno samu jačinu uticaja utvrđujemo Kramеровим коефицијентом који нам govori da je ova povezanost zanemarljiva sa vrednošću od 0.031, pa je bezbedno reći da data varijabla nema prediktivnu vrednost, bar ne samostalno.

Age vs Diabetes_012


U ovoj analizi ćemo se baviti povezanošću između starosti ispitanika i pojave dijaabetesa. Starosna dob je numerička vrednost, i predstavlja redni broj starosne grupe kojoj ispitanik pripada (zaključeno u univariјantnoj analizi). U ovom slučaju se služimo histogramom i bar plotom da bismo izvukli pretpostavke o zavisnosti:

```
ggplot(data, aes(x = Diabetes_012, y = Age, fill = Diabetes_012)) +
  geom_boxplot(alpha = 0.7) +
  scale_fill_manual(values=colors) +
  labs(title = "Distribucija godina po tipovima Diabetes_012",
        fill = "Dijabetes")
```

На основу бокс плота видимо да је појава преддијабетеса и дијабетеса учесталија код испитаника који су у просеку старији од испитаника из групе који немају дијабетес. Наравно иако постоји јасан растући тренд код година у односу на појаву дијабетеса, постоји неколико изузетака у групи са дијабетесом, што је са доменског знања очекивано услед гојазности (висок БМИ) или генетике испитаника.

```
ggplot(data, aes(x = Age, fill = Diabetes_012)) +
  geom_histogram(binwidth = 1, position = "dodge", alpha = 0.8) +
  scale_fill_manual(values = colors) +
  labs(title = "Histogram godina u odnosu na Diabetes_012",
       y = "Broj opservacija",
       fill = "Dijabetes")
```



На основу прегледа хистограма увидено је да број оболелих од дијабетеса креће експоненцијално да расте од старосне доби 7, што ће рећи да постоји хипотеза која нам тврди да су старосна доб и појава дијабетеса повезани, зато ћемо урадити тестове како бисмо ово потврдили.

```
anova_test(data$Age, data$Diabetes_012)
Df Sum Sq Mean Sq F value Pr(>F)
```

```

as.factor(grupna_var)  2 82130 41065 4560 <2e-16 ***
Residuals      253677 2284255   9
---
Signif. codes:  0 '***' 0.001 '**' 0.01 '*' 0.05 '.' 0.1 ' ' 1
tukey_fun(data$Age,data$Diabetes_012)
Tukey multiple comparisons of means
95% family-wise confidence level

Fit: aov(formula = numericka_var ~ as.factor(grupna_var))

$`as.factor(grupna_var)`
      diff      lwr      upr p adj
predijabetes-nema dijabetes 1.2967924 1.1923320 1.401253  0
dijabetes-nema dijabetes   1.5924939 1.5521107 1.632877  0
dijabetes-predijabetes    0.2957015 0.1857929 0.405610  0

```

На основу анаова теста евидентно је да постоји разлика у старосној доби између оних који имају неки облик дијабетеса и оних који га немају. То је евидентно услед високе вредности $F=4560$, а додатно на значајности ове разлике нам потврђује параметар „ p ”= $2e-16$. **Tukey** нам није дао нарочиту разлику међу класама па се може слободно рећи да је варијабала *Age* у слабој релацији са *Diabetes_012*.


Education vs Diabetes_012

Сада ћемо анализирати повезаност појаве дијабетеса са нивоом образовања испитаника. У овом случају ради се о категоријској варијабли па ћемо употребити стубасти дијаграм и топлотну мапу ради утврђивања основне сумње да ли повезаност постоји, као и саму дистрибуцију међу класама:

```

ggplot(data, aes(x = Diabetes_012, fill = Education )) +
  geom_bar(position = "dodge") +
  geom_text(stat = "count",
    aes(label = ..count..),
    vjust = -0.5,
    position = position_dodge(width = 0.9),
    size = 3) +
  scale_fill_manual(values = colorS) +
  labs(title = "Distribucija klasa Education u odnosu na tipove Diabetes_012",
    y = "Broj opservacija",
    fill = "Nivo obrazovanja")

```




Иако имамо доста мање опсервација где испитаник има неку врсту дијабетеса, јасно је да са пропорционалне стране постоји утицај образовања на појаву дијабетеса, то је нарочито уочљиво у класи где испитаници имају дијабетес, јер је евидентно да постоји разлика у пропорцији расподеле типова образовања у односу на то да ли испитаник има дијабетес или не. Наравно пропорције би се доста боље увиделе на графику са процентима, па ћемо то и учинити.

```
ggplot(data, aes(x = Diabetes_012, fill = Education)) +
  geom_bar(position = "fill") +
  geom_text(stat = "count",
    aes(label = scales::percent(after_stat(count) / ave(after_stat(count), after_stat(x), FUN =
sum))),
    position = position_fill(vjust = 0.5),
    size = 3) +
  scale_y_continuous(labels = scales::percent) +
  scale_fill_manual(values = colorS) +
  labs(title = "Relativni udeo nivoa obrazovanja po grupama Diabetes_012",
    y = "Procenat u okviru grupe (%)",
    x = "Status dijabetesa",
    fill = "Nivo obrazovanja")
```


Commented [MS33]: Коментар професора: procenti
Na mnogo mesta ovo nece da pije vodu na ovaj nacin, nego se dodatno napravi grafik sa procentima

Commented [AR34R33]: Сугестија професора на месту, јер је циљ овог графика да покаже пропорционалност опсервација међу типовима дијабетеса.



Евидентно је да према класама дијабетеса имамо све мањи удео особа које су завршиле факултет, а да удео оних који га нису завршили расте са појавом дијабетеса, па би се рекло да постоји одређена повезаност,наравно боље ћемо то видети на топлотној мапи.

```
data %>%
  count(Diabetes_012, Education) %>%
  group_by(Diabetes_012) %>%
  mutate(percent = n / sum(n) * 100) %>%
  ggplot(aes(x = Diabetes_012, y = Education, fill = percent)) +
  geom_tile() +
  geom_text(aes(label = paste0(round(percent, 1), "%")), color = "white") +
  labs(
    title = "Distribucija kategorija Education po kategorijama Diabetes_012",
    x = "Diabetes_012",
    y = "Education",
    fill = "Procentat (%)"
  ) +
  scale_fill_gradient(low = colorS[1], high = colorS[2])
```



На основу топлотне мапе уочљиво је да постоји повезаност нивоа образовања са дијабетесом, услед чињенице да постоји другачији поредак између класа дијабетеса, а у односу на ниво образовања. Нарочито уочљиво код класе дијабетес, где се јасно види да је поредак нивоа образовања другачији у односу на испитанике без дијабетеса и њиховог нивоа образовања. Сада имамо довољно доказа да је хипотеза о повезаности нивоа образовања постојана са класом дијабетеса.

Наравно то све доказујемо статистички.

```
chi_sq_test(data$Diabetes_012,data$Education)
X-squared = 4560.6, df = 10, p-value < 2.2e-16

cramer_v(data$Diabetes_012,data$Education)
0.09481014
```

На основу χ^2 теста рекло би се да постоји статистичка повезаност и да она одступа од независности, јер χ^2 има солидну вредност. Међутим јачина утицаја нивоа образовања на појаву дијабетеса се показала слабом са ниском вредношћу Крамеровог коефицијента од свега 0.0948, па се опет може речи да неће имати неки значајнији утицај на модел, мада се може показати значајнија у мултиваријантној анализи.

Ако поново погледамо графике изнад можемо да уочимо да у свакој групи дијабетеса има неуравнотежену расподелу тј. тенденцију ка вишим групама образовања. Овај увид смо имали и униваријантној анализи, тако да је регрупација оправдана. Оно што је више уочљивије на топлотној мапи како да формирамо нове категорије. Видимо је да у све три категорије дијабетеса категорије образовања „без школе/вртић“ и „основна школа“ имају приближан однос (јако слаб уочљив градијент). Додатно гледајући са доменског аспекта могу се сврстати у једну групу као основно образовање. Само ова промена нам неће изменити расподелу значајно, зато ћемо испитати процентуално

```
prop.table(table(data$Education,data$Diabetes_012), margin = 2)*100
```

	nema dijabetes	predijabetes	dijabetes
bez škole/isao u vrtić	0.05849239	0.04318722	0.13297120
osnovna škola	1.26296776	3.47637094	3.34691337
3-god srednja	3.21380608	6.78039300	6.49578453
4-god srednja	23.55324914	29.15137119	31.30764443
3-god fakultet	27.24482108	28.78427985	29.29327222
4-god fakultet	44.66666355	31.76419780	29.42341425


Увидом и тренд података у процентима уз ограничење доменског знања категорије образовања су прегруписане у четири нивоа:

Нове категорије	Опсег старих категорија
Ниско образовање	Без школе/вртић
Основно образовање	Основна школа
Средње образовање	3-годишња и 4-годишња средња школа
Високо образовање	Високо образовање

Income vs Diabetes_012

Сада вршимо анализу над висином примања испитаника у односу на појаву неког типа дијабетеса. Income је категоричка варијабла те ћемо се као и до сада послужити стубастим графиком и топлотном мапом за визуелну анализу дистрибуције и потенцијалне повезаности:

```
ggplot(data, aes(x = Diabetes_012, fill = Income )) +
  geom_bar(position = "dodge") +
  geom_text(stat = "count",
    aes(label = ..count..),
    vjust = -0.5,
    position = position_dodge(width = 0.9),
    size = 3) +
  scale_fill_manual(values = colors) +
  labs(title = "Distribucija nivoa primanja u odnosu na tipove Diabetes_012",
    y = "Broj opservacija",
    fill = "Primanja")
```




Као што је већ случај, број испитаника који немају дијабетес је драстично већи од оних који имају преддијабетес/дијабетес. Међутим на први поглед, свака од класа дијабетеса има сличну расподелу нивоа примања, па би се на први поглед рекло да нема повезаности, наравно ово се мора утврдити, па ћемо се првобитно послужити бокс плотом како бисмо боље утврдили расподелу.

Commented [MS35]: Коментар професора: где имате неку трансформацију, ту би требало да поновите графике како након тога изгледају


Commented [MS36R35]: Категоризација променљивих није извршена изменом постојећих карактеристика, већ су формиране нове категоријске променљиве, како би се очувале оригиналне вредности података. У складу са тим ове категоризације су спроведене у поглављу "Инжењеринг карактеристика". У поглављу су приказани графици, а након тога у поглављу "Биваријантна анализа нових карактеристика" поновљена биваријантна за ове податке који су категоризовани

```
ggplot(data, aes(x = Diabetes_012, y = as.numeric(Income), fill = Diabetes_012)) +
  geom_boxplot(alpha = 0.7) +
  scale_fill_manual(values = colorS) +
  labs(title = "Distribucija primanja po tipu dijabetesa",
       y = "Nivoo primanja (numerička skala)")
```



На основу боксплота, евидентно је да медијане нивоа примања опадају како се дијабетес појављује, као и то да су доње границе квантилних кутија све ниже према појави дијабетеса, што би рекло да постоји нека повезаност, боље ће нам пропорционалност утврдити топлотна мапа.

```
data %>%
  count(Diabetes_012, Income) %>%
  group_by(Diabetes_012) %>%
  mutate(percent = n / sum(n) * 100) %>%
  ggplot(aes(x = Diabetes_012, y = Income, fill = percent)) +
  geom_tile() +
  geom_text(aes(label = paste0(round(percent, 1), "%")), color = "white") +
  labs(
    title = "Distribucija kategorija Income po kategorijama Diabetes_012",
    x = "Diabetes_012",
    y = "Income",
    fill = "Procenat (%)"
  ) +
  scale_fill_gradient(low = colorS[1], high = colorS[2])
```



Када погледамо топлотну мапу за појаву дијабетеса и ниво примања, добијемо другачију слику, наиме уочљиво је да је однос између оних који имају дијабетес а који имају висока примања (преко 75000 долара) са људима који имају ниска примања (мање од 10000 долара) знатно мањи, око 1:3, у односу на однос људи који немају дијабетес, где је однос људи са највишим примањима у односу на оне са најнижим, око 1:12, као што је то случај и са највишим примањима у односу на средња примања, итд. У сваком случају јасно је да су односи примања по класама дијабетеса другачији, па се ипак може сумњати да постоји одређена повезаност двеју варијабли.

Наравно ово ћемо све потврдити тестовима.

```
chi_sq_test(data$Diabetes_012,data$Income)
X-squared = 7816.5, df = 14, p-value < 2.2e-16

cramer_v(data$Diabetes_012,data$Income)
0.1241215
```

Тест χ^2 нам говори да статистичка повезаност постоји вредношћу параметра „p“ која је готово једнака 0 и која је мања од 0.05, а параметар χ^2 нам говори да та повезаност има значаја својом релативно високом вредношћу која износи 7816. Са друге стране Крамеров индекс нам говори да иако постоји статистичка повезаност која има значаја, њен утицај на Diabetes_012 није нарочито јак и може се показати као бољи предиктор у мултиваријантној анализи.

У униваријантној анализи се примећена неуравнотежена расподела са тенденцијом ка вишим вредностима примања, што смо биваријантном анализом и потврдили. Донет је закључак о другачијој подели категорија. Са стубичастог дијаграма увиђамо да сваке две суседне категорије од најмање до претпоследње, имају веома малу разлику посебно за категорије „преддијабетес“ и „дијабетес“. Додатно на топлотној мапи видимо градијенте за исто, који су скоро не приметни. Ово нам говори да нема наглог скока примања у односу на циљ тј. понашају се слично за исту категорију дијабетеса. Ако претпоставимо да статистички ово јесу добри индикатори за спајање, увиђамо да ће и даље бити неуравнотежености у расподели. Како би боље увидели индикаторе погледајмо процентуални удео:


```
tabla_Incom_Diabetes_broj <- table(data$Income, data$Diabetes_012)
prop.table(tabla_Incom_Diabetes_broj, margin = 2) * 100
```


	nema dijabetes	predijabetes	dijabetes
<10.000\$	3.328919	6.780393	6.741923
10.000-14.999\$	3.903080	7.687325	8.730832
15.000-19.999\$	5.617609	9.090909	10.094494
20.000-24.999\$	7.310145	9.911466	11.469473
25.000-34.999\$	9.729391	12.675448	12.742602
35.000-49.999\$	14.239856	16.152019	14.969162
50.000-74.999\$	17.416227	15.871302	14.895603
>=75.000\$	38.454771	21.831138	20.355910

Однос карактеристика које нису циљане

Поред испитивања односа између појединачних карактеристика и циљне променљиве, у овом поглављу анализирани су и односи између карактеристика које нису циљане. Резултат ове анализе идентификација међусобне повезаности предикторских променљивих, потенцијалне интеракције, као и могуће редундантности у подацима. Разумевање ових односа представља основу за даљу мултиваријантну анализу.

Income VS Education

У овој анализи ћемо утврђивати у каквој су релацији варијабле за ниво образовања и примања испитаника. Како су обе категоријске променљиве, тако ћемо користити стубичасти график и топлотну мапу за визуелизацију:




На основу стубичастиг дијаграма евидентно је да једна група одскаче по бројности, а то су опсервације са четворо-годишњим факултетом, међутим ако погледамо трендове распоређивања јасно је да само особе са било каквим факултетом прате растући тренд од најнижег до највишег нивоа примања, док је слика нешто другачији код особа са средњом школом, а без школе је очигледно број опсервација занемарив. **Опет бољу прегледност ћемо имати на боксплоту, услед лоше асиметричности висине примања.**

Commented [MS37]: Коментар професора: boxplot


Commented [MS38R37]: Колега Алекса је додао дијаграм испод.

```
ggplot(data, aes(x = Education, y = as.numeric(Income), fill = Education)) +
  geom_boxplot(alpha = 0.7) +
  scale_fill_manual(values = colorS) +
  labs(title = "Distribucija primanja po nivou obrazovanja",
       x = "Nivo obrazovanja",
       y = "Nivo primanja (numerička skala)")
```



Na boksplotu se jasnije vidi stanje, medijana za nivo primaња u odnosu na nivo obrazovanja je znatno niža kod opservacija koje nemaju ili imaju samo osnovno obrazovanje, dok kako nivo obrazovanja raste, tako raste i medijana primaња, što bi osnovnu pretpostavku iz realnog sveta potvrdilo da postoji znatna povezanost između nivoa primaња i nivoa obrazovanja, mada će nam toplotna mapa reћи malo više o odnosima.

```
data %>%
  count(Education, Income) %>%
  group_by(Education) %>%
  mutate(percent = n / sum(n) * 100) %>%
  ggplot(aes(x = Education, y = Income, fill = percent)) +
  geom_tile() +
  geom_text(aes(label = paste0(round(percent, 1), "%")), color = "white") +
  labs(
    title = "Distribucija visine primanja u odnosu na tipove nivo obrazovanja",
    x = "Education",
    y = "Income",
    fill = "Procenat (%)"
  ) +
  scale_fill_gradient(low = colorS[1], high = colorS[2])
```



На основу топлотне мапе видимо да постоји јасна разлика у поретку примања између људи који су ишли на факултет, и оних који нису. На основу тога се може поставити основна тврдња да постоји одређена повезаност. Наравно да бисмо уопште могли рећи да она постоји потребно је да урадимо тестове.

```
chi_sq_test(data$Education,data$Income)
X-squared = 60337, df = 35, p-value < 2.2e-16
```

```
cramer_v(data$Education,data$Income)
0.2181037
```

Хи тест нам говори да статистичка повезаност постоји, то нам говори мала вредност параметра "p" која је готово приближна нули, што нам даје јасан увид да имамо повезаност али не знамо да ли је утицајна. Наравно Крамеров коефицијент нам говори да иако повезаност постоји, она јесте утицајна међу датим варијабли, али не јако, већ у неком умереном интензитету.


HighChol VS CholCheck

У следећој анализи ћемо утврђивати да ли постоји веза између појаве холестерола и провере холестерола у последњих 5 година код испитаника. Ради се о категоријским променљивима, па на основу тога поново користим топлотну мапу и стубичасти график да бисмо визуелно испитали релацију.

```
ggplot(data, aes(x = CholCheck, fill = HighChol )) +
  geom_bar(position = "dodge")+
  scale_fill_manual(values = colors) +
  labs(title = "Distribucija HighChol u odnosu na CholCheck",
    y = "Broj opservacija",
    fill = "Visok holesterol")
```


Commented [MS39]: Коментар професора: ја појма немам о чему ви пишете овде

Commented [AR40R39]: Коментар Професора је на месту, ни ја нисам тачно сигуран шта сам мислио овде. Оно што је требало рећи јесте да Хи тест даје резултате који нам говоре да постоји статистичка повезаност, а не утицајност коју нам представља заправо Крамеров коефицијент, тако да ће реченица „Као што се види у резултатима, очигледно је да статистичка повезаност и значајно одступање од независности варијабли постоји“ бити измењена али и остатак закључка ће бити преформулисан услед потребе за јаснијим објашњењем.



На основу графика јасно да је јако мало опсервација у којима испитаник није испитивао свој холестерол у претходних 5 година, свакако јасно је да у оба случаја однос људи са холестеролом је готово исти. Међутим однос је боље потврдити топлотном мапом.

```
data %>%
  count(CholCheck, HighChol) %>%
  group_by(CholCheck) %>%
  mutate(percent = n / sum(n) * 100) %>%
  ggplot(aes(x = CholCheck, y = HighChol, fill = percent)) +
  geom_tile() +
  geom_text(aes(label = paste0(round(percent, 1), "%")), color = "white") +
  labs(
    title = "Distribucija HighChol u odnosu na CholCheck",
    fill = "Procenat (%)"
  ) +
  scale_fill_gradient(low = colorS[1], high = colorS[2])
```



На основу топлотне мапе, евидентно је да је удео опсервације у којима испитаници имају холестерол у односи на оне који га немају пропорционално већи код оних који су холестерол контролисали, што нам може дати основну сумњу да нека повезаност постоји, наравно да бисмо ово утврдили користићемо тестове.

```
chi_sq_test(data$CholCheck, data$HighChol)
```

```
X-squared = 1859.7, df = 1, p-value < 2.2e-16
```


```
cramer_v(data$CholCheck,data$HighChol)  
0.08562119
```

На основу тестова χ^2 нам говори да постоји статистичка повезаност, мада и није нарочита, односно одступања од независности двеју варијабли је релативно слаба, наравно и међусобни утицај варијабли је слаб, односно Крамер има релативно слабу вредности, испод 0.1, тако да знамо да не постоји нарочита повезаност између контролисања холестерола у последњих 5 година и његове појаве код опсервације.

DiffWalk vs PhysHlth

У овој анализи утврђујемо да ли постоји повезаност између физичких потешкоћа које је испитаник осећао кроз последњих 30 дана и потешкоћа са кретањем. У овом случају DiffWalk нам је категоријска променљива, док је PhysHlth нумеричка. Зато у овом случају користимо хистограм и боксплот за анализу:

```
ggplot(data, aes(x = DiffWalk, y = PhysHlth, fill = DiffWalk)) +  
  geom_boxplot(alpha = 0.7) +  
  scale_fill_manual(values=colors) +  
  labs(title = "Distribucija PhysHlth u odnosu na DiffWalk",  
        fill = "Poteškoće u kretanju")
```



Дати дијаграм нам даје поприличну читу слику, а то је да они који немају проблема у кретању у просеку нису имали никакве потешкоће, тј. преко 50% испитаника их није имало, што се и види по медијани која је на 0 за оне без потешкоћа у кретању, мада има изузетака. Са друге стране они који су имали потешкоћа у кретању обично су осећали и тегобе, са просеком од око 10 дана. Наравно повезаност нећемо само графиком утврдити, потребно је осматрити још неке анализе.

```
ggplot(data, aes(x = PhysHlth, fill = DiffWalk)) +  
  geom_histogram(binwidth = 1, position = "dodge", alpha = 0.8) +  
  scale_fill_manual(values = colors) +  
  labs(title = "Histogram dana teskoba u odnosu na poteškoće u kretanju",  
        y = "Broj opservacija",  
        fill = "Ima poteškoće")
```



Хистограм нам превасходно говори да у скупу опсервација највише има оних који нису имали никакве тескобе као ни проблема са кретањем, са већину дана евидентан је тренд у ком је већи број испитаника који су имали потешкоће за тај број дана а да су притом имали и потешкоћа у кретању.

Наравно како бисмо јасније одредили повезаност и потврдили потенцијалну повезаност из графика радимо тестове:

```
anova_test(data$PhysHlth,data$DiffWalk)
      Df Sum Sq Mean Sq
as.factor(grupna_var) 1 4412919 4412919
Residuals      253678 14867364  59
      F value Pr(>F)
as.factor(grupna_var) 75296 <2e-16 ***
Residuals
---
Signif. codes:
0 '***' 0.001 '**' 0.01 '*' 0.05 '.' 0.1 ' ' 1
> tukey_fun(data$PhysHlth,data$DiffWalk)
      diff lwr upr p adj
Da-Ne 11.14995 11.07031 11.22959 0
```


Резултати тестова нам дефинитивно потврђују повезаност потешкоћа у кретању са осећајем физичких потешкоћа. Прво нам АНОВА тест даје неуобичајену велику вредност за F што ће рећи да итекако постоје разлике у вредностима потешкоћа у односу на оне који имају потешкоће у кретању и оне који их немају, статистичку повезаност нам потврђује и изузетно мала вредност параметра „p“ која је готово равна 0.

Са друге стране „Tukey“ тест нам говори колика је та разлика у вредностима коју нам АНОВА тест говори да постоји, и разлика је велика, у просеку они без проблема у кретању имају 11 дане мања са осећањем физичких тегоба, тако да дефинитивно можемо закључити повезаност ових двеју варијабли.

HighBP vs HeartDeseaseAttack


Сада ћемо обавити анализу повезаности појаве високог крвног притиска и хроничних срчаних обољења. Обе од две поменуте варијабле су категоријне, па

ћемо употребити топлотну мапу и стибиласти дијаграм ради визуелне анализе повезаности:



Иако би нам доменско знање требало потврдити да постоји директна повезаност између срчаних обољења и хипертензије, график нам даје тоталну другу слику, разлог овоме вероватно лежи у томе што је скуп опсервација такав да је пристрастан, односно постоји далеко више оних који немају срчана обољења од оних који их имају, са тим у вези овај график нам не може нешто пуно осим тога рећи, па ћемо сада да пређемо на друге анализе ради даљег утврђивања.

```
data %>%
  count(HighBP, HeartDiseaseorAttack) %>%
  group_by(HighBP) %>%
  mutate(percent = n / sum(n) * 100) %>%
  ggplot(aes(x = HighBP, y = HeartDiseaseorAttack, fill = percent)) +
  geom_tile() +
  geom_text(aes(label = paste0(round(percent, 1), "%")), color = "white") +
  labs(
    title = "Distribucija pojave srčanih oboljenja u odnosu na hipertenziju",
    fill = "Procenat (%)")
  ) +
  scale_fill_gradient(low = colorS[1], high = colorS[2])
```



Kako smo već i sumњali u stubičasti grafik, sumња je ispada ispravna u ovom slučaju. Ako pogledamo toplotnu mapu jasno je da su odnosi između onih sa srčanim oboljenjima i bez, drugačiji između onih koji imaju i nemaju visok krvni pritisak, jasno je da je odnos kod ljudi sa krvnim pritiskom oko 1:5, dok je kod onih bez hipertenzije taj odnos 1:23, pa se može uzeti u obzir pretpostavka da ovde postoji povezanost, kako nam domenско знање и налаже.

Zato ћемо урадити одговарајуће тестове.

```
chi_sq_test(data$HighBP,data$HeartDiseaseorAttack)
X-squared = 11118, df = 1, p-value < 2.2e-16


cramer_v(data$HighBP,data$HeartDiseaseorAttack)
0.2093476
```

Kao što smo i pretpostavili na osnovu toplotne мапе, имамо повезаност, χ^2 нам је дао потврду да постоји статистичка повезаност, и да постоји високо одступање од независности међу варијаблима, што нам је рекла висока χ^2 вредност и мала вредност p параметра. Крамер је ту да нам каже да ли постоји утицај једне варијабле на другу, и евидентно је да постоји, наравно није баш најјача, тј. умерена је, али довољна за узимање у обзир у мултиваријантним анализама.


BMI vs HeartDiseaseorAttack

Ова анализа ће нам дати одговор на повезаност индекса телесне тежине и појаве срчаних оболјења. Потреба за овом анализом произилази из доменских сазнања. BMI нам представља индекс телесне тежине, нумеричку варијаблу, док је HeartDiseaseorAttack категоријска. Са тим у вези користићемо хистограм и бокс плот за визуалну анализу:

```
ggplot(data, aes(x = HeartDiseaseorAttack, y = BMI, fill = HeartDiseaseorAttack)) +
  geom_boxplot(alpha = 0.7) +
  scale_fill_manual(values=colors) +
  labs(title = "Distribucija BMI u odnosu na srčana oboljenja",
       fill = "Srčane poteškoće")
```

На основу прегледа дијаграма, не видимо нарочито помераје у медијалним вредностима BMI-а у односу на то да ли неко има срчаних тегоба или не, чак су и кварталне кутије готово идентичне, са благим померајем на горе за опсервације са срчаним тескобама, али опет ништа значајно. Оно што је такође уочљиво јесте да имамо доста аутлајера, односно изузетака. Наравно настављамо даље са анализом.



У хистограму видимо да нам је скуп података неравномеран што се тиче појава срчаних потешкоћа, нешто што је било видљиво и у униваријантној анализи. Поред тога видљиво је да оба стања са и без потешкоћа доживљавају свој врхунац у бројности на готово идентичним вредностима BMI-а, што би рекло да нема нарочитих повезаности између овде две варијабле. Наравно да би утврдили то урадићемо одговарајуће тестове.

```
anova_test(data$BMI, data$HeartDiseaseorAttack)
      Df Sum Sq Mean Sq
as.factor(grupna_var) 1 31010 31010
Residuals      253678 11048380 44
```

```

      F value Pr(>F)
as.factor(grupna_var) 712 <2e-16 ***
Residuals
---
Signif. codes:
0 '***' 0.001 '**' 0.01 '*' 0.05 '.' 0.1 ' ' 1

tukey_fun(data$BMI,data$HeartDiseaseorAttack)
      diff   lwr   upr p adj
Da-Ne 1.196998 1.109076 1.284921 0

```

Тестови нам потврђују основну сумњу да нема нарочите повезаности, АНОВА нам говори о постојању статистичке значајности малом вредношћу параметра “p” и вредност F која је свакако велика услед великог скупа податка, али нам говоре да разлика међу класама постоји али не знамо колика је. „Tukey” нам говори колика је разлика, износи свега 1.19 за разлику међу класама што је у овом случају занемарио, па се може рећи да иако статистичка повезаност постоји, она је слаба до занемарива.


DiffWalk vs PhysActivity

Ову анализу спроводимо услед увиђаја у униваријантној анализи и говори нам о повезаност потешкоћа у кретању са питањем да ли се испитаник бавио физичким активностима у претходних 30 дана. Обе од ове варијабле су категоријске, и обе имају вредност „Da” и „Ne”, па на основу тога знамо да је потребно користити стубичасти дијаграм и топлотну мапу:

```

ggplot(data, aes(x = PhysActivity, fill = DiffWalk )) +
  geom_bar(position = "dodge")+
  scale_fill_manual(values = colors) +
  labs(title = "Distribucija DiffWalk u odnosu na PhysActivity",
       y = "Broj opservacija",
       fill = "Ima poteškoća u hodaњу")

```




Иако нам је број опсервација неравномеран по питању физичке активности, може се увидети да су за обе групе број оних који имају потешкоће у кретању идентични, док се за оне који немају потешкоћа ситуација разликује, што је и нормално са обзиром да класе немају исти број записа. Већ овде можемо видети да вероватно

Commented [MS41]: Коментар професора: у статистици ово F је јако велико! Код веома великих узорака, чак и најмања, небитна разлика у просекима ће дати огромно F и сићушно p.

Commented [AR42R41]: Коментар се уважава лоше сам се изразио.

постоји повезаност с обзиром да пропорција за оне који имају и немају потешкоћа у ходању није иста за обе класе, али морамо урадити још анализа.

```
data %>%
  count(PhysActivity, DiffWalk) %>%
  group_by(PhysActivity) %>%
  mutate(percent = n / sum(n) * 100) %>%
  ggplot(aes(x = PhysActivity, y = DiffWalk, fill = percent)) +
  geom_tile() +
  geom_text(aes(label = paste0(round(percent, 1), "%")), color = "white") +
  labs(
    title = "Distribucija pojave srčanih oboljenja u odnosu na hipertenziju",
    fill = "Procentat (%)"
  ) +
  scale_fill_gradient(low = colorS[1], high = colorS[2])
```



Топлотна мапа нам потврђује да постоји разлика у односима оних са потешкоћама у шетању у односу на физичку активност. Јасно се види да се односи разликују, јер код оних који су имали рекреативну физичку активност однос оних са потешкоћама у кретању мањи од односа оних који нису имали рекреативне физичке активности, односно 1:8<1:2. Што би рекло да постоји одређена повезаност, коју ћемо сада утврдити употребом тестова.


```
chi_sq_test(data$PhysActivity,data$DiffWalk)
X-squared = 16259, df = 1, p-value < 2.2e-16

> cramer_v(data$PhysActivity,data$DiffWalk)
0.2531617
```


На основу урађених тестова добили смо потврду да повезаност итекако постоји, χ^2 нам кроз параметар те који је близу 0 говори да постоји статистичка повезаност, док је χ^2 вредност повелика, па би се рекло да постоји зависност између двеју варијабли. Крамеров коефицијент има солидну вредност од 0.25 што нам даје индикације да иако утицај вероватно није велики, довољан је да се узме у разматрање у даљим анализама.


MentHlth VS Stroke

Ову анализу радимо више из доменских сазнања, јер се често дешава у пракси да неко са менталним проблемима доживи шлог. Зато ћемо сада упоређивати променљиве MentHlth и Stroke, MentHlth је променљива која нам говори да ли је испитаник имао менталних потешкоћа тј. колико дана у последњих 30 се осећао ментално запослен и она је нумеричка, док нам Stroke показује да ли је испитаник имао мождани удар и она је категоријска, тако да за визуелизацију користимо хистограм и бокс плот:



Иако су нам медијане на 0 за оба случаја, односно онде где је испитаник имао и немао шлог практично на 0 што би рекло да преко 50% испитаника није имало менталних потешкоћа, јасно је да је квартална кутија за оне који су имали шлог нешто већа у односу на оне који га нису имали, то сугерише да људи који су га имали имају бар неколика дана више под менталним потешкоћама него што је то случај код оних који га нису имали, постоји доста аутлајера што ће рећи да постоји доста испитаника који имају менталне проблеме без обзира да ли је имао шлог или не.





Хистограм нам говори да већина људи из скупа опсервација није имала шлог, и већина није имала менталних потешкоћа, такође се види да је јако мали број оних који су имали шлог у читавом скупу, али то не значи да повезаности нема, како бисмо то утврдили морамо да се позабавимо тестовима који ћемо одрадити.

```
anova_test(data$MentHlth,data$Stroke)
      Df Sum Sq Mean Sq
as.factor(grupna_var)  1  68640  68640
Residuals           253678 13871096   55
      F value Pr(>F)
as.factor(grupna_var) 1255 <2e-16 ***
Residuals
---
Signif. codes:
  0 '***' 0.001 '**' 0.01 '*' 0.05 '.' 0.1 ' ' 1
> tukey_fun(data$MentHlth,data$Stroke)
Tukey multiple comparisons of means
 95% family-wise confidence level

Fit: aov(formula = numericka_var ~ as.factor(grupna_var))


$`as.factor(grupna_var)`
      diff      lwr      upr p adj
Da-Ne 2.636535 2.490686 2.782385   0
```

АНОВА тест нам даје до знања да постоји статистичка повезаност, тиме што је параметар p близу нуле односно $2e-16$, F нам говори да постоји одређена разлика између просечних вредности броја дана у класама, како бисмо видели колика је та разлика користимо се "Tukey"-ем који нам говори да је разлика у бројевима дана са менталним потешкоћама између оних којих су имали и нису имали шлог око 2.63 дана, што представља вредност којом се може окарактерисати постојање везе између шлога и менталних проблема, али не толика да је предиктивна.

HighChol VS Stroke


На основу доменског знања радимо анализу повезаности високог холестерола и шлога. HighChol нам говори о томе да ли испитаник има висок холестерол и она

представља категориčku променљиву, Stroke нам говори да ли је испитаник имао шлог и она је такође категоричка, из тог разлога ћемо употребити субичасти дијаграм и топлотну мапу да утврдимо односе у скупу опсервација:



На основу стубичастих графова иако видимо да се ради о мањку испитаника који су имали шлог, тј. нису већина га није имала, вид се да постоји разлика у односу појаве холестерола међу тим случајевима, наравно боље ћемо ово одредити топлотном мапом.

```
data %>%
  count(Stroke, HighChol) %>%
  group_by(Stroke) %>%
  mutate(percent = n / sum(n) * 100) %>%
  ggplot(aes(x = Stroke, y = HighChol, fill = percent)) +
  geom_tile() +
  geom_text(aes(label = paste0(round(percent, 1), "%")), color = "white") +
  labs(
    title = "Distribucija HighChol u odnosu na Stroke",
    fill = "Procenat (%)"
  ) +
  scale_fill_gradient(low = colorS[1], high = colorS[2])
```



Топлотна мапа нам дефинитивно даје потврду да се поретци појаве холестерола разликују по појави шлога, на основу мапе би већ могло да се каже да постоји веза, али сама визуелизација није довољна, па ћемо сада урадити и тестове који то доказују.

```
chi_sq_test(data$Stroke,data$HighChol)
Pearson's Chi-squared test with Yates'
continuity correction
```

data: tabela

X-squared = 2175.2, df = 1, p-value < 2.2e-16


```
> cramer_v(data$Stroke,data$HighChol)
0.09259986
```

На основу тестова статистичка повезаност постоји, то је јасно на основу “p” параметра из χ^2 теста, тј. његове ниске вредности, χ^2 такође нема баш малу вредност, па се може рећи да су варијабле зависне до неког нивоа једна од друге, али не претерано како делује на Топлотној мапи, Крамеров коефицијент такође нема нешто високу вредност, испод 0.1 је, мада није далоко, што значи да су ове две варијабле слабо повезане, и једино у мултиваријантној анализи би могле да дају нешто јачи резултат.


HighChol VS HeartDiseaseorAttack

Анализа се бави провером да ли висок холестерол утиче на појаву срчаних обољења и удара, иако нам доменско каже да то јесте случај, скуп података такође то мора потврдити. Овде се ради о варијабли HighChol која нам говори о томе да ли испитаник има висок холестерол и она представља категоричку променљиву, са друге стране HeartDiseaseorAttack је такође категоричка променљива и она нам говори о томе да ли је испитаник имао срчани удар или напад. Обе имају две категорије односно “Da” и “Ne”, и зато ћемо да их визуелизујемо употребом стубичастог графа и топлотне мапе:

```
ggplot(data, aes(x = HeartDiseaseorAttack, fill = HighChol )) +
  geom_bar(position = "dodge")+
  scale_fill_manual(values = colors) +
```



На основу графа види се да имамо дефицит у опсервацијама где је испитаник имао неки проблем са срцем у односу на оне који то нису имали, али је пропорционално број оних који имају холестерол већи у односу на број оних који га нису имали у односу на то да ли је било срчаних проблема или не. Наравно трудимо се да додатним анализама добијемо одговор о повезаности.



На основу топлотне мапе видимо да постоји разлика у односима да ли неко има холестерол или не у односу на то да ли пати од срчаних обољења. На основу односа виђених на графику може се рећи да повезаности има, али треба узети у обзир пристрасност скупа опсервација па ће нам тестови дати бољи увид:


```
chi_sq_test(data$HeartDiseaseorAttack,data$HighChol)
```

Pearson's Chi-squared test with Yates' continuity correction

data: tabela

X-squared = 8288, df = 1, p-value < 2.2e-16


```
> cramer_v(data$HeartDiseaseorAttack,data$HighChol)
0.1807517
```

На основу урађених тестова види се да повезаност појаве холестерола и проблема са срцем постоје. χ^2 тест је показао вредностима $\chi^2 = 8288$ и $p\text{-value} < 2.2e-16$ да статистичка повезаност постоји и да постоји одређена међуваријабилна зависност, наравно Крамеров коефицијент нам говори да са вредношћу од 0.1807517 постоји одређени међусобни утицај двеју варијабли али није толики да може бити предикативан, те би било боље ово проверавати у мултиваријатној са још неком варијаблом укљученом.

BMI VS Age

У садашњој анализи ћемо проверавати повезаност индекса телесне тежине и старосне доби. У овој анализи радимо са нумеричким варијаблама, те ћемо се послужити box plotom ради визуелне анализе:

```
ggplot(data, aes(x = as.factor(Age), y = BMI, fill = as.factor(Age))) +
  geom_boxplot(outlier.size = 0.5, alpha = 0.7) +
  labs(title = "Distribucija BMI vrednosti po starosnim grupama",
       x = "Starosna grupa (Age)",
       y = "BMI",
       fill="Starosna grupa")
```



Commented [AR44R43]: Коментар професора је исправан, проблем је што је првобитна замисао била да се употреби скатер плот ради демонстрације употребе више различитих метода приказа података, али испоставља се да је овде боље користити бокс плот, што и треба да буде право решење.

Дакле на основу дате анализе евидентно је да у свакој од старосних доби имамо доменске изузетке за BMI, односно мањи од 12 и већи од 70, са друге стране евидентно је да квантилне кутије се благо повишују са за прве 3 старосне групе, након чега остају на истом нивоу као и њихове медијане, након чега долази до благог опадања са појавом старијих старосних група.


```
pearson_funkcija(data$Age, data$BMI)
-0.03661764
```

На основу урађеног теста евидентно је да немамо корелацију између старосне доби и BMI, чак штавише имају тенденцију да иду супротно једна од друге, па се овде може рећи да нема никакве релације.

BMI VS PhysHlth

У садашњој анализи ћемо обрађивати корелацију између индекса телесне масе и броја дана са физичким потешкоћама код испитаника, пошто је у доменском знању доказано да постоје извесни физички проблеми код гојазних особа. Код ове анализе имамо посла са бројчаним варијаблама па ћемо користити **box plot**:

```
ggplot(data, aes(x = as.factor(PhysHlth), y = BMI, fill = as.factor(PhysHlth))) +
  geom_boxplot(outlier.size = 0.5, alpha = 0.7) +
  labs(title = "Distribucija BMI vrednosti po danima sa fizičkim poteškoćama",
       x = "Broj dana sa poškoćama",
       y = "BMI",
       fill = "Broj dana")
```



Commented [AR46R45]: Као и у претходном примеру, циљ је био употребити још неки алат, али се испоставља да је бокс плот заправо најбоље употребити.

На основу бокс плота евидентно је да имамо доста доменских изузетака за BMI од 12 до 70, са друге стране евидентно је не постоје нарочите разлике међу учестаности дана са физичким потешкоћама и BMI-ем, јер је евидентно да су медијане као и квантилне кутије на мање више истим нивоима што се BMI-а тиче.


```
pearson_funkcija(data$PhysHlth,data$BMI)
0.1211411
```

На основу Пирсоновог теста видимо да је корелација двеју варијабли слаба, те се може рећи да је ова повезаност употребљива само у корелацији са још неком варијаблом.

BMI VS MentHlth

У овој анализи биће упоређивана повезаност међу индексом телесне масе и броја дана са менталним потешкоћама код испитаника. Обе варијабле су нумеричке па ћемо на основу тога употребити **box plot** ради визуализације дистрибуције података:

```
ggplot(data, aes(x = as.factor(MentHlth), y = BMI, fill = as.factor(MentHlth))) +
  geom_boxplot(outlier.size = 0.5, alpha = 0.7) +
  labs(title = "Distribucija BMI vrednosti po danima sa mentalnim poteškoćama",
        x = "Broj dana sa poškoćama ",
        y = "BMI",
        fill="Broj dana")
```



На основу box plot-а видимо да су квантилне кутије на готово истом нивоу као и њихове медијане, што би значило да се BMI не мења нарочито према испитаницима са лошијим менталним здрављем, па се водимо претпоставком да не постоји нарочита повезаност међу њима.

Commented [AR47]: И у овом случају смо заменили scatter са box plotom ради бољег увида у дистрибуцију BMI по броју дана са менталним потешкоћама.


```
pearson_funkcija(data$MentHlth,data$BMI)  
0.08531016
```

Пирсонов тест нам даје до знања да корелација изузетно слаба и готово занемарива, па би се рекло да је корелација непостојећа, иако постоје ситни трендови у праћењу међусобно.

Age VS PhysHlth

У овој релацији ћемо испитати повезаност старосне доби са физичким потешкоћама код испитаника. Обе од ових варијабли су нумеричке па користимо scatter plot како би визуализовали однос:

```
ggplot(data,aes(x=Age,y=PhysHlth))+geom_point()
```



На основу графа види се да су опсервације равномерно распоређене према старосним групама и да нема одређених концентрација опсервација по старосним групама, што би рекло да нема нарочитих повезаности, мада нам је потребно употребити Пирсонов тест да потврдимо ову хипотезу.

```
pearson_funkcija(data$Age,data$PhysHlth)  
0.09912993
```

На основу резултата, постоји слаба повезаност, што би значило да ова повезаност може имати предиктиван однос само уколико се употреби са још неком варијаблом.

Табеле закључака

HighBP vs Diabetes_012	Уочено је да не постоји довољно јака веза између високог крвног притиска и појаве дијабетеса. „chi” тест нам је дао параметре $\chi^2 = 18795$, а $p\text{-value} < 0,00000000000000022$, који представљају постојање везе између поменутих варијабли, али Крамеров коефицијент (0,27) је готово на самој граници како би HighBP био самостални предиктор, што није задовољавајуће, па је потребно употребити га у мултиваријантној анализи.
HighChol vs Diabetes_012	Повезаност двеју варијабли постоји али није претерано јака, „chi” тест нам је дао параметре $\chi^2 = 11259$, а $p\text{-value} < 0,00000000000000022$ који доказују постојање статистичке повезаности и тежњи зависности варијабли, али Крамеров коефицијент у овом случају има оквирну вредност од 0,21 што би рекло да је утицај недовољно јак да би био самостални предиктор, мада ће бити разматран у мултиваријантној анализи.
CholCheck vs Diabetes_012	Повезаност двеју варијабли постоји али је релативно слаба, тестови су нам показали резултате који су уопште не могу поставити CholCheck варијаблу као самосталног предиктора, мада су резултати $\chi^2 = 1173$, а $p\text{-value} < 0,00000000000000022$ такви да говоре о статистичкој значајности, али нам Крамеров коефицијент (0.068) говори да нема неког утицаја, осим ако варијаблу не разматрамо у мултиваријантној анализи.
BMI vs Diabetes_012	Повезаност BMI са предиктивном варијаблом Diabetes_012 према АНОВА тесту постоји, тј говори нам да постоје разлика просечних вредности BMI у класама дијабетеса, тј да постоји повезаност између двеју варијабли са резултатом од $F\text{ value} = 6768$, $Pr(>F) < 2e-16$, мада нам „Tukey” говори да однос разлика није исти за све 3 класе дијабетеса, тј највећа разлика је евидентна код људи који имају у немају дијабетес, што је у просеку 4.20, док је за друге односе то нешто мање. Иако знамо да не може бити чист предиктор, BMI ћемо даље испитати у мултиваријантној.
GenHlth vs Diabetes_012	Анализе и тестови су нам показали да постоји умерена повезаност између GenHlth и Diabetes_012, тј повезаност је

Commented [MS48]: Коментар професора: ovo mi se bas svidja sto imate izdvojeno

Commented [MS49R48]: Хвала. Трудили смо се ради олакшавања нашег даљег рада сумирамо закључке, како неки не би били изостављени.

	довољна да се даље анализира у мултиваријантној анализи, али није довољна да би GenHlth био самостални предиктор, што нам тестови и доказују. ($\chi^2 = 24248$, $df = 8$, $p\text{-value} < 2.2e-16$) и Крамеров коефицијент који је 0.219, а који нам доказују да постоји извесна повезаност.
HeartDiseaseorAttack vs Diabetes_012	Анализе и тестови су у овом случају показали да HeartDiseaseorAttack има умерени утицај над Diabetes_012, тј да он не може бити самостални предиктор, што су тестови потврдили и дали резултате $\chi^2 = 8244,9$, а $p\text{-value} < 0,00000000000000022$, што нам говори да постоји статистичка значајност и тенденције ка повезаношћу, мада је Крамеров коефицијент релативно низак $V = 0,18$, тако да ћемо се и овде ослонити на мултиваријантну анализу.
Stroke vs Diabetes_012	Анализе и тестови су у овом случају показали да Stroke има слабији али не баш безначајан утицај над Diabetes_012, тј да он не може бити самостални предиктор, што су тестови потврдили и дали резултате $\chi^2 = 1173$, а $p\text{-value} < 0,00000000000000022$, што нам говори да постоји статистичка значајност и тенденције ка повезаношћу, мада је Крамеров коефицијент слаб $V = 0.107$, тако да ћемо се овде ослонити на мултиваријантну анализу.
MentHlth vs Diabetes_012	Проблем са MentHlth варијаблом је та што су опсервације асиметричне, тј много мало људи је имало било какве менталне потешкоће, па ћемо прво морати категорисати ову варијаблу како бисмо је употребили у мултиваријантној анализи, пошто се показало кроз тестове да не постоји готово никаква повезаност међу датим варијаблама, тј не може бити предиктор над Diabetes_012, тако да једино где бисмо могли да употребимо ову варијаблу јесте у мултиваријантној анализи.
PhysHlth vs Diabetes_012	Проблем је као и код MentHlth, односно опсервације су тотално асиметричне, па је и овде потребно поделити све по категорији ако би се узимала у обзир кроз мултиваријантну анализу. Разлог зашто не би могла бити самосталан предиктор јесте

	тај што иако је АНОВА дала добру вредност $F=4079$ и $2e-16$, тако да нам АНОВА говори да постоји разлика међу класама, мада нам је „Tukey“ дао одговор на то где је разлика, и проблем је тај што разлике нису исте међу свим класама, тако да се ово може употребити само у мултиваријантној.
DiffWalk vs Diabetes_012	Са становишта анализе и тестова постоји солидна повезаност међу датим варијаблама, тест нам даје резултат $X^2=12777$ $p\text{-value} < 2.2e-16$, што нам говори да постоји статистичка повезаност и висока повезаност класи, мада нам Крамер говори (0.2244245) да немамо нарочити високи утицај, па је боље употребити је у мултиваријантној анализи, него као самостални предиктор.
Fruits vs Diabetes_012	Са становишта тестова и анализе, променљива Fruits нема готово никакву предиктивну моћ над Diabetes_012, што нам потврђују и тестови $\chi^2 = 454,35$, а $p\text{-value} < 0,000000000000000022$, као и низак Крамеров коефицијент $V = 0.042$, па би се она могла употребити само у мултиваријантној анализи, тј по потреби.
Veggies vs Diabetes_012	Са становишта тестова и анализе, променљива Veggies нема готово никакву предиктивну моћ над Diabetes_012, што нам потврђују и тестови $\chi^2=893,84$, а $p\text{-value} < 2.2e-16$, као и низак Крамеров коефицијент $V = 0.059$, па би се она могла употребити само у мултиваријантној анализи, тј по потреби.
Smoker vs Diabetes_012	Са становишта тестова и анализе, променљива Smoker нема готово никакву предиктивну моћ над Diabetes_012, што нам потврђују и тестови $\chi^2=1010$, а $p\text{-value} < 2.2e-16$, као и низак Крамеров коефицијент $V = 0.068$, па би се она могла употребити само у мултиваријантној анализи, тј по потреби.
HvyAlcoholConsump vs Diabetes_012	Са становишта тестова и анализе, променљива HvyAlcoholConsump нема готово никакву предиктивну моћ над Diabetes_012, што нам потврђују и тестови $\chi^2=850.32$, а $p\text{-value} < 2.2e-16$, као и низак Крамеров коефицијент $V = 0.058$, па би се она могла употребити само у мултиваријантној анализи, тј по потреби.
PhysActivity vs Diabetes_012	Овде постоји извесна повезаност, наиме према резултатима тестова и анализе

	графова види се да је повезаност постојана, мада је резултат тестова ($\chi^2 = 3789$, $p\text{-value} < 2.2e$) такав да нам говори да та повезаност није нарочито утицајна, и да је варијаблу PhysActivity потребно употребити једино у мултиваријантној анализи, са другим предикторима, јер релативно нема нарочитог утицаја што нам говори ниска Крамерова вредност коефицијента $V = 0.122$
AnyHealthcare vs Diabetes_012	Са становишта тестова и анализе, променљива AnyHealthcare нема готово никакву предиктивну моћ над Diabetes_012, што нам потврђују и тестови $\chi^2 = 69.078$, а $p\text{-value} < 9.998e-16$, као и занемарив Крамеров коефицијент $V = 0.016$, па би се она могла употребити само у мултиваријантној анализи, тј по потреби.
NoDocbcCost vs Diabetes_012	Са становишта тестова и анализе, променљива NoDocbcCost нема готово никакву предиктивну моћ над Diabetes_012, што нам потврђују и тестови $\chi^2 = 396.08$, а $p\text{-value} < 2.2e-16$, као и занемарив Крамеров коефицијент $V = 0.0395$, па би се она могла употребити само у мултиваријантној анализи, тј. по потреби
Income vs Diabetes_012	На основу тестова види се да постоји умерена повезаност између појаве дијабетеса и нивоа прихода, тест нам је дао резултат $\chi^2 = 7816.5$ и $p\text{-value} < 2.2e-16$, што ће рећи да постоји значајна статистичка повезаност, мада утицај није велики према Крамеровом коефицијенту, тј релативно је низак $V = 0.124$, тако да ћемо њу више анализирати у склопу мултиваријантне анализе.
Sex vs Diabetes_012	Са становишта тестова и анализе, променљива за пол испитаника нема готово никакву предиктивну моћ над Diabetes_012, што нам потврђују и тестови $\chi^2 = 250.85$, а $p\text{-value} < 2.2e-16$, као и занемарив Крамеров коефицијент $V = 0.031$, па би се она могла употребити само у мултиваријантној анализи, тј по потреби.
Age vs Diabetes_012	Старосна доб је како из доменског знања тако и кроз урађене анализе показала да има релативно високу повезаност у односу на појаву дијабетеса, АНОВА тест ($F = 4560$, „ p ” = $2e-16$) нам је показао да у односу на класе дијабетеса постоје разлике у старосним добима испитаника, а “Tukey”

	нам даје увид да су разлике у старосним добима међу класама дијабетеса уочљиве.
Education vs Diabetes_012	Према урађеној анализи,показало се да постоји слаба повезаност између образовања и дијабетеса, тест нам је показао $\chi^2=4560.6$,а $p\text{-value}<2.2e-16$, који нам говоре да постоји статистичка повезаност,али нам Крамер има низак коефицијент $V= 0.095$, па се нека већа значајност може увидети тек у мултиваријантној анализи.
Однос карактеристика које нису циљане	
Income VS Education	На основу анализе утврдило се да постоји извесна повезаност између нивоа образовања и примања испитаника, тест нам је дао поприлично висок резултат $\chi^2=60337$,а $p\text{-value}<2.2e-16$,што би рекло да постоји јасна статистичка повезаност, као и јасно одступање од независности међу варијаблама,мада нам Крамеров коефицијент $V=0.22$, говори да постоји умерени али не и пресудни утицај међу варијаблама,па је најбоље извршити додатну мултиваријантну анализу.
HighChol VS CholCheck	Са становишта тестова и анализе, променљива за CholCheck испитаника нема готово никакву предиктивну моћ над HighChol, што нам потврђују и тестови $\chi^2=1859.7$,а $p\text{-value}<2.2e-16$, као и занемарив Крамеров коефицијент $V = 0.031$,па би се она могла употребити само у мултиваријантној анализи,тј по потреби.
HighBP vs HeartDeseaseAttack	У овој анализи, која је урађена на основу доменског знања евидентно је да постоји повезаност, тест нам је дао следећи резултат: $\chi= 11118$,,а $p\text{-value}<2.2e-16$, који нам говоре да постоји статистичка повезаност и да је значајна, док нам Крамер $V=0.209$ говори да не постоји довољно јак утицај да висок крвни притисак може бити предиктор над срчаним болестима, али у комбинацији са још неким предиктором у мултиваријантној анализи би нам дао прецизнији одговор.
BMI vs HeartDeseaseorAttack	У овој анализи се показало да не постоји нарочита повезаност, тј занемарива је, BMI не утиче нарочито на проблеме са срцем и том нам тестови потврђују,АНОВА (712,<2e-16)нам говори да постоји нека разлика у просеку BMI међу испитаницима који имају и немају срчане проблеме,али нам “Tukey”

	даје занемарујући резултат 1.19, па се ово занемарује.
DiffWalk vs PhysActivity	Потешкоће у кретању и обављање физичких активности према тестовима говоре да постоји повезаност, до душе не довољно велика да DiffWalk буде предиктор PhysActivity, тест нам је дао резултат: $\chi^2 = 16259$, а $p\text{-value} < 2.2 \times 10^{-16}$, па ће рећи да постоји добра статистичка повезаност, док нам утицај повезаности није довољан да би могао да постоји предикаторски однос, већ се може комбиновати са још предиктора у мултиваријантној (Крамер $V = 0.25$).
MentHlth VS Stroke	На основу урађене анализе рекло би се да постоји одређена повезаност између шлога и металних проблема, АНОВА ($1255 < 2 \times 10^{-16}$) нам говори о појави разлике у бројевима дана са менталним потешкоћама код оних који су имали шлог и оних који га нису имали, а „Tukey” нам говори да је та разлика око 2.64 дана, што значи да није нарочито предиктиван однос, али у комбинацији са још неким предиктором може добити на значајности.
HighChol VS Stroke	На основу урађене анализе висок холестерол нема нарочите везе са појавом шлога код испитаника, иако нам тест $\chi^2 = 2175.2$, а $p\text{-value} < 2.2 \times 10^{-16}$ даје резултат који показује статистичку повезаност, утицај је према Крамеровом коефицијенту $V = 0.093$ мали.
HighChol VS HeartDiseaseorAttack	На основу урађене анализе висок холестерол је умерено повезан са срчаним проблемима, тест нам показује ($\chi^2 = 8288$, а $p\text{-value} < 2.2 \times 10^{-16}$) да постоји извесна статистичка повезаност и није занемарива, али њен утицај (Крамер $V = 0.18$) није довољно јак да би могао постојати предиктиван однос, па је најбоље користити у комбинацији са још неким предиктором
BMI vs Age	На основу Пирсоновог теста и дијаграма видимо да нема нарочите повезаности, тј Пирсонов тест нам даје резултат од -0.037 , па је јасно да повезаности у овом случају нема.
BMI vs PhysHlth	На основу Пирсоновог теста и дијаграма се закључује да нема никакве

	повезаности, Пирсонов тест има слаб резултат од 0.12, што јесте веће од 0.1 али недовољно да се каже да су у чистој релацији, већ се мора употребити у комбинацији са још неким варијаблама.
BMI vs MentHlth	Корелација у овом случају је изузетно слаба, Пирсонов тест нам је дао резултат од 0.085 што ће рећи да је повезаност занемарива.
Age vs PhysHlth	У овом случају корелација није нарочито постојана, иако је на scatter plot евидентна добра дистрибуција међу старосним групама и данима са физичким потешкоћама. Пирсонов тест нам даје вредност од 0.099, што је приближно релативној вредности 0.1 па се ова повезаност може користити само у комбинацији са још неким варијаблама.

Чишћење података

Првобитном униваријантном анализом детектовано је постојање екстремних вредности у карактеристици БМИ. Дефинисане су две врсте екстремних вредности (аутлајера):

- Доменски који обухватају вредности БМИ које нису реалне или су веома ретке са медицинске стране па не представљају репрезентативан узорак (БМИ<12 и БМИ>70) са процентуалним уделом 0.2302113% ,
- Статистички који су детектовани применом IQR методе, са процентним уделом од 3.881662 %.

Даље биваријантном анализом испитан је утицај ових аутлајера на циљану карактеристику Diabetes_012. Анализа је показала да аутлајери не утичу на циљану променљиву, али како нису репрезентативне, додатно удео је <0,5%, донет је закључак да се те опсервације уклоне. За статистичке аутлајере је показало да имају занемарљив утицај на циљану променљиву, али како су доменски реалне вредности и показатељ гојазности одлучено је да буду задржане. Чишћење доменских аутлајера приказано је следећим кодом:

```
data_clean <- data[data$BMI >= 12 & data$BMI <= 70, ]
```

Димензионалност скупа пре је била 253 680 опсервација, а сада 253 096.

```
print(data.frame(
  Skup = c("Originalni podaci", "Nakon čišćenja BMI"),
  Broj_opservacija = c(nrow(data), nrow(data_clean))
))
```

	Skup	Broj_opservacija
1	Originalni podaci	253680
2	Nakon čišćenja BMI	253096

Трансформација података

На основу униваријантне и биваријантне анализе закључено је да карактеристика Age представља старосне групе испитаника, те је стога потребно категорисати је. Пошто садржи велики број категорија (0 до 13) које се тумаче у ординалном поретку, најбоље је користити ординалну факторизацију.

Функцијом јединствености извукли смо све вредности из нумеричке променљиве Age, сортирали са sort, и категоризовали са factor:

```
nivoi_Age = sort(unique(data_clean$Age))
data_clean$Age = factor(data_clean$Age, levels = nivoi_Age, ordered = TRUE)
```

Провера типа:

```
> str(data_clean$Age)
Ord.factor w/ 13 levels "1"<"2"<"3"<"4"<...: 9 7 9 11 11 10 9 11 9 8 ...
```

Инжењеринг карактеристика (Feature Engineering)

Инжењеринг карактеристика (Feature Engineering) представља процес трансформације постојећих карактеристика или извлачења нових информација кроз комбинације постојећих карактеристика, тако да се резултат бележи као нова карактеристика. Циљ је повећање информативности података, што побољшава предиктивну способност модела и квалитет статистичке анализе.

У нашем раду дефинисане су нове карактеристике:

- PhysHlthCat
- MentHlthCat
- EducationCat
- IncomeCat
- AgeCat
- CardioRiskScore
- LifestyleRiskScore
- HealthScore
- DietScore
- SocioEconomicStatus

Инжењеринг карактеристике PhysHlthCat

У униваријантној анализи уочено је да нумеричка карактеристика броја дана са физичким потешкоћама у последњих 30 дана (PhysHlth) има неуравнотежену расподелу са јасно уочљивим категоријама. Даље, биваријантном анализом уочена је подела тих категорија, таква да одржава статистички значај и однос на циљану карактеристику Diabetes_012. Подела је следећа:

Категорија	Опис
0	нема проблема
1-5	благи проблеми

Commented [MS50]: Термин који смо искористили "спроведено"
Коментар професора: ?.

Commented [MS51R50]: Слажемо се да термин "спроведене су нове карактеристике" није одговарајући. Измењена је у термин дефинисане

6-15	умерени проблеми
16-30	тешки проблеми

У складу са поделом формирана је карактеристика PhysHlthCat на следећи начин:

```
category_physHlth = c("nema problema", "blagi problemi", "umereni problemi", "teski
problemi")
interval_physHlth = c(0, 5, 15, 30)
data_clean$PhysHlthCat = NA

data_clean$PhysHlthCat[data_clean$PhysHlth == interval_physHlth[1]] =
category_physHlth[1]
data_clean$PhysHlthCat[data_clean$PhysHlth > interval_physHlth[1] & interval_physHlth[2]
<= 5] = category_physHlth[2]
data_clean$PhysHlthCat[data_clean$PhysHlth > interval_physHlth[2] & interval_physHlth[3]
<= 15] = category_physHlth[3]
data_clean$PhysHlthCat[data_clean$PhysHlth > interval_physHlth[3] & interval_physHlth[4]
<= 30] = category_physHlth[4]
```

А затим смо је факторизовали у поретку.

```
data_clean$PhysHlthCat <- factor(data_clean$PhysHlthCat, levels =
category_physHlth, ordered = TRUE)

> str(data_clean$PhysHlthCat)
Ord.factor w/ 4 levels "nema problema"<...: 3 1 4 1 1 2 3 1 4 1 ...
```

Инжењеринг карактеристике MentHlthCat

У униварјантној анализи уочено је да нумеричка карактеристика броја дана са менталним потешкоћама или стресом у последњих 30 дана (MentHlth) има неуравнотежену расподелу са јасно уочљивим категоријама. Даље, биваријантном анализом уочена је подела тих категорија, таква да одржава статистички значај и однос на циљану карактеристику Diabetes_012. Подела је следећа:

Категорија	Опис
0	нема проблема
1-5	благи проблеми
6-15	умерени проблеми
16-30	тешки проблеми

У складу са поделом формирана је карактеристика MentHlthCat на следећи начин:

```
category_mentHlth = c("nema problema", "blagi problemi", "umereni problemi", "teski
problemi")
interval_mentHlth = c(0, 5, 15, 30)
data_clean$MentHlthCat = NA

data_clean$MentHlthCat[data_clean$MentHlth == interval_mentHlth[1]] =
category_mentHlth[1]
data_clean$MentHlthCat[data_clean$MentHlth > interval_mentHlth[1] &
interval_mentHlth[2] <= 5] = category_mentHlth[2]
data_clean$MentHlthCat[data_clean$MentHlth > interval_mentHlth[2] &
interval_mentHlth[3] <= 15] = category_mentHlth[3]
```

```
data_clean$MentHlthCat[data_clean$MentHlth > interval_mentHlth[3] &
interval_mentHlth[4] <= 30] = category_mentHlth[4]
```

А затим смо је факторизовали у поретку.

```
data_clean$MentHlthCat <- factor(data_clean$MentHlthCat, levels =
category_mentHlth, ordered = TRUE)
```

```
> str(data_clean$MentHlthCat)
Ord.factor w/ 4 levels "nema problema"<...: 4 1 4 1 2 1 1 1 4 1 ...
```

Инжењеринг карактеристике EducationCat

У униваријантној анализи уочено је да расподела карактеристике степена образовања испитаника (Education) неуравнотежена па да је потребна другачија структура категорија. Даље, у биваријантној анализи су категорије приказане по категоријама дијабетеса и уочену су границе за спајање категорија. Закључена подела:

Нове категорије	Опсег старих категорија
Ниско	Без школе/вртић
Основно	Основна школа
Средње	3-годишња и 4-годишња средња школа
Високо	Високо образовање

Формирање нове карактеристике EducationCat:

```
nivoi_Education = levels(data_clean$Education)
data_clean$EducationCat = factor(data_clean$Education,
levels = nivoi_Education,
labels = c("Nisko",
"Osnovno",
"Srednje",
"Srednje",
"Visoko",
"Visoko"))
```

Инжењеринг карактеристике IncomeCat

На основу досадашње варијабле Income видимо да постоји много категорија, као и чињеница да број опсервација нису нарочито добро расподељене. На основу свега тога евидентно је да морамо направити категорисјку карактеристику која ће бити заснована на пређашњој Income, која ће бити добро избалансирана и која ће имати мање категорија од садњих 8. Наравно те категорије морају имати смисла, па ћемо се послужити доменским знањем како распоређујемо испитанике по нивоу примања. На основу истраживања за 2015. годину правимо следеће категорије


Нове категорије	Опсег старих категорија
Ниска примања	<10.000\$, 10.000\$-14.999\$, 15.000\$-19.999\$, 20.000\$-24.999\$
Ниско-средња примања	25.000\$-34.999\$, 35.000\$-49.999\$
Средња примања	50.000\$-74.999\$
Висока примања	75.000\$>=

Формирање нове карактеристике IncomeCat:

```
nivoi_Income = levels(data_clean$Income)
data_clean$IncomeCat = factor(data_clean$Income,
                              levels = nivoi_Income,
                              labels = c("Niska",
                                         "Niska",
                                         "Niska",
                                         "Niska",
                                         "Nisko-srednja",
                                         "Nisko-srednja",
                                         "Srednja",
                                         "Visoka"))
```

На графику видимо дистрибуцију опсервација по класама:


```
ggplot(data_clean, aes(x = IncomeCat, fill = IncomeCat)) +
  geom_bar() +
  labs(title = "Distribucija kategorija IncomeCat", x = "Kategorije", y = "Broj opservacija") +
  geom_text(
    stat = "count",
    aes(label = ..count..),
    position = position_dodge(width = 0.8),
    vjust = -0.3 ) +
  scale_fill_paletteer_d("MetBrewer::Archambault") + theme(legend.position="none")
```



На основу графика видимо да највише има оних са високим примањима, док су нижи и средње нижи у близини један са другим, а средња класа је понајмања, што је по доменском знању и очекивано за САД.

Инжењеринг карактеристике AgeCat

Као што је већ виђено у униваријантној анализи, са већ постојећу променљиво Age постоји чак 13 категорија, што је много, а приом дистрибуција ње саме се може побољшати. Зато ћемо креирати нову карактеристику AgeCat која ће сажети Age на свега неколико категорија а да притом начини дистрибуцију категорија бољом. Категорије које креирамо ће бити креиране на основу праћења већ постојећег хистограма тако да имамо следеће категорије:



На основу хистограма правимо следеће категорије:

Новe категорије	Опсег старих категорија
Млади	<=4
Зрели	>=5 && <=8
Старији	>=9 && <=10
Сениори	>10


Формирање нове карактеристике AgeCat:

```
data_clean$AgeCat <- factor(data_clean$Age, levels = 1:13)

levels(data_clean$AgeCat) <- c(rep("Mladi", 4), rep("Zreli", 4), rep("Stariji", 2), rep("Seniori", 3))
```

На графику видимо дистрибуцију опсервација по класама:

```
ggplot(data_clean, aes(x = AgeCat, fill = AgeCat)) +
  geom_bar() +
  labs(title = "Distribucija kategorija AgeCat", x = "Kategorije", y = "Broj opservacija") +
  geom_text(
    stat = "count",
    aes(label = ..count..),
    position = position_dodge(width = 0.8),
    vjust = -0.3 ) +
  scale_fill_paletteer_d("MetBrewer::Archambault") + theme(legend.position="none")
```

Са графика видимо да највећи удео у опсервацијама имају испитаници који припадају зрелој старсној категорији. Док су сениори и старији прижни, а најмање има у категорији где су млади.

Инжењеринг карактеристике CardioRiskScore

На основу биваријантне анализе уочили смо следеће јачине повезаности

Карактеристике	Крамеров коефицијент	Опис везе
HighBP vs Diabetes_012	0,27	умерена
HighChol vs Diabetes_012	0,21	слаба
HeartDiseaseorAttack vs Diabetes_012	0,18	слаба
HighBP vs HeartDiseaseorAttack	0,21	слаба
HighChol vs HeartDiseaseorAttack	0,18	слаба

Дакле, ниједна од ових веза није занемарљива, али ниједна није екстремно јака да би утицала као самостални предиктор. Свака од ових карактеристика (HighBP, HighChol, HeartDisease) мери различити медицински параметар, али заједно чине заједнички здравствени контекст. Зато је одлучено да се на основу њиховог међусобног утицаја формира карактеристика степена кардиолошког ризика (CardioRiskScore).

Карактеристика CardioRiskScore је дефинисана као збир бинарних вредности карактеристика HighBP, HighChol и HeartDiseaseorAttack. Вредности CardioRiskScore крећу се у опсегу од 0 до 3, где већа вредност означава већи број присутних кардиолошких фактора ризика. Изабран је скор приступ уместо бинарне класификације како би се задржала информација о броју присутних фактора ризика.

Формирање је приказано следећим кодом:

```
data_clean$CardioRiskScore = as.numeric(data_clean$HighBP == "Da") +
  as.numeric(data_clean$HighChol == "Da") +
```

```
as.numeric(data_clean$HeartDiseaseorAttack == "Da")
```

Иницијално карактеристике HighBP, HighChol и HeartDiseaseorAttack су бинарне, то значи да категорија „Не“ има вредност 1, а категорија „Да“ има вредност 2. Сабирањем добија се опсег карактеристике CardioRiskScore [3,6], што није интуитивно за ниво ризика. Зато се у коду појављује == "Da", који за категорију „Да“ враћа 1, у супротном („Не“) враћа 0, па је опсег вредности [0,3].

Категоризација у ординарном поретку карактеристике CardioRiskScore:

```
nivoi_CardioRiskScore = sort(unique(data_clean$CardioRiskScore))
category_cardioRiskScore = c("nema rizika", "nizak rizik", "umeren rizik", "visok rizik")
data_clean$CardioRiskScore = factor(data_clean$CardioRiskScore,
                                     levels = nivoi_CardioRiskScore,
                                     labels = category_cardioRiskScore,
                                     ordered = TRUE)
```

Провера резултата:

```
> str(data_clean$CardioRiskScore)
Ord.factor w/ 4 levels "nema rizika"<...: 3 1 3 2 3 3 2 3 4 1 ...
```


Сада за карактеристику CardioRiskScore важи следећа ординална категоризација:

Категорија	Вредност	Опис
нема ризика	1	ниједан од фактора није присутан
низак ризик	2	један од фактора је присутан
умерен ризик	3	два фактора су присутна
јак ризик	4	сва три фактора су присутна

*фактори су HighBP, HighChol и HeartDiseaseorAttack, а присутност значи да је њихова вредност „Да“.

Расподела категоријске карактеристике CardioRiskScore приказана је на следећем графику:

```
ggplot(data_clean, aes(x = CardioRiskScore, fill = CardioRiskScore)) +
  geom_bar() +
  labs(title = "Distribucija kategorija CardioRiskScore", x = "Kategorije", y = "Broj opservacija") +
  geom_text(
    stat = "count",
    aes(label = ..count..),
    position = position_dodge(width = 0.8),
    vjust = -0.3
  ) +
  scale_fill_paletteer_d("MetBrewer::Archambault") + theme(legend.position="none")
```



Са графика видимо да највећи део испитаника има низак и умерен ризик, док је мањи део изложен умереном, а само мало део има висок степен ризика. Ова расподела је у складу са очекивањима наспрам доменског знања.

Инжењеринг карактеристике LifestyleRiskScore

На основу биваријантне анализе карактеристика *Smoker*, *HvyAlcoholConsump* и *PhysActivity* уочено је да свака од ових променљивих има веома слабу, али статистички значајну повезаност са циљном променљивом *Diabetes_012*:

Карактеристике	Крамеров коефицијент	Опис везе
Smoker vs Diabetes_012	0.068	веома слаба
HvyAlcoholConsump vs Diabetes_012	0.058	веома слаба
PhysActivity vs Diabetes_012	0.122	веома слаба

Иако самостално свака од ових променљивих носи ограничену информацију о ризику, са доменског аспекта оне заједно карактеришу животни стил испитаника. Зато је одлучено да се формира нова карактеристика *LifestyleRiskScore*, која представља степен ризика животног стила.

Карактеристика *LifestyleRiskScore* дефинисана је као збир бинарних вредности сваке од три карактеристике. Тако да се вредности *CardioRiskScore* крећу у опсегу од 0 до 3, где већа вредност означава већи број присутних фактора животног стила. Изабран је скор приступ уместо бинарне класификације како би се задржала информација о броју присутних фактора,

Формирање је приказано следећим кодом:

```
data_clean$LifestyleRiskScore = as.numeric(data_clean$Smoker == "Da") +
  as.numeric(data_clean$HvyAlcoholConsump == "Da") +
  as.numeric(data_clean$PhysActivity == "Da")
```

Иницијално карактеристике *Smoker*, *HvyAlcoholConsump* и *PhysActivity* су бинарне, то значи да категорија „Не“ има вредност 1, а категорија „Да“ има вредност 2. Сабирањем добија се опсег карактеристике *LifestyleRiskScore* [3,6], што није интуитивно за ниво ризика. Зато се у коду појављује == "Da", који за категорију „Да“ враћа 1, у супротном („Не“) враћа 0, па је опсег вредности [0,3].

Категоризација у ординарном поретку карактеристике LifestyleRiskScore:

```
nivoi_LifestyleRiskScore = sort(unique(data_clean$LifestyleRiskScore))
category_lifestyleRiskScore = c("nema rizika", "nizak rizik", "umeren rizik", "visok rizik")
data_clean$LifestyleRiskScore = factor(data_clean$LifestyleRiskScore,
                                       levels = nivoi_LifestyleRiskScore,
                                       labels = category_lifestyleRiskScore,
                                       ordered = TRUE)
```

Провера резултата:

```
> str(data_clean$LifestyleRiskScore)
Ord.factor w/ 4 levels "nema rizika"<..: 2 3 1 2 2 3 2 3 2 1 ...
```


Сада за карактеристику LifestyleRiskScore важи следећа ординална категоризација:

Категорија	Вредност	Опис
нема ризика	1	ниједан од фактора није присутан
низак ризик	2	један од фактора је присутан
умерен ризик	3	два фактора су присутна
јак ризик	4	сва три фактора су присутна

*фактори су *Smoker*, *HvyAlcoholConsump* и *PhysActivity*, а присутност значи да је њихова вредност „Да“.

Расподела категоријске карактеристике LifestyleRiskScore приказана је на следећем графику:

```
ggplot(data_clean, aes(x = LifestyleRiskScore, fill = LifestyleRiskScore)) +
  geom_bar() +
  labs(title = "Distribucija kategorija LifestyleRiskScore", x = "Kategorije", y = "Broj opservacija")
+
  geom_text(
    stat = "count",
    aes(label = ..count..),
    position = position_dodge(width = 0.8),
    vjust = -0.3
  ) +
  scale_fill_paletteer_d("MetBrewer::Archambault") + theme(legend.position="none")
```



Са графика видимо да већина испитаника спада у категорије „низак ризик“ и „умерен ризик“, док је мањи број у категорији „нема ризика“, а само мали део испитаника припада категорији „висок ризик“. Ова расподела је у складу са очекивањима на основу доменског знања о факторима животног стила у општој популацији.

Инжењеринг карактеристике HealthScore

На основу биваријантне анализе карактеристика GenHlth, MentHlthCat и PhysHlthCat уочено је да свака од ових променљивих има одређену повезаност са циљном променљивом Diabetes_012:

Карактеристике	Крамеров коефицијент	Опис везе
GenHlth vs Diabetes_012	0.219	слаба
MentHlthCat vs Diabetes_012	0,0540	веома слаба
PhysHlthCat vs Diabetes_012	0,1255	веома слаба

Иако самостално свака од ових променљивих носи ограничену информацију о ризику, са доменског аспекта оне заједно описују опште здравствено стање испитаника. Зато је одлучено да се формира нова карактеристика HealthScore која представља степен општег здравља.

Карактеристика HealthScore дефинисана је као збир вредности сваке од три карактеристике GenHlth, MentHlthCat и PhysHlthCat које су ординалне, што значи да веће вредности указују на лошије здравствено стање.


Формирање је приказано следећим кодом:

```
data_clean$HealthScore = (as.numeric(data_clean$GenHlth) - 1) +
  (as.numeric(data_clean$PhysHlthCat) - 1) +
  (as.numeric(data_clean$MentHlthCat) - 1)
```

Како су карактеристике GenHlth, MentHlthCat и PhysHlthCat вишекатегоријске променљиве, -1 редукује да се категорије рачунају од 0, како би скор био у валиданом опсегу. Да би уочили интервале категоризације приказали смо дистрибуцију вредности:

```
ggplot(data_clean, aes(x = HealthScore)) +
```

```
geom_histogram(bins = 50, fill = "#7C4B73FF", color="#381A61FF") +  
labs(title = "Distribucija HealthScore", x = "HealthScore", y = "Broj opservacija")
```



Уочавамо да се вредности крећу од 0 до 10 (4+2+2), са кораком 1. Са графика видимо да већина испитаника има ниске и умерене вредности скорова (0–6), док је мањи број у категоријама са високим и екстремним скоровима (7–10). Ова расподела је у складу са очекивањима на основу доменског знања о факторима здравља у општој популацији: већина људи има релативно задовољавајуће здравствено стање, док само мали број испитаника показује више присутних фактора ризика. Погледајмо квантиле да би нам границе биле јасније.

```
> summary(data_clean$HealthScore)  
Min. 1st Qu. Median Mean 3rd Qu. Max.  
0.000 3.000 4.000 3.666 4.000 10.000
```

На основу ове расподеле, карактеристика HealthScore је категоризована у четири ординарне групе:


Категорија	Опсег	Опис
низак ризик	0 – 2	мало присутних фактора
умерен ризик	3 - 5	умерен број присутних фактора
висок ризик	6 – 8	већи број присутних фактора
екстремни ризик	9 - 10	Велика већина фактора је присутни

Код:

```
category_HealthScore = c("низак ризик", "умерен ризик", "висок ризик", "екстремни ризик")  
interval_HealthScore = c(-1, 2, 5, 8, 10)  
data_clean$HealthScore <- cut(data_clean$HealthScore,  
  breaks = interval_HealthScore,  
  labels = category_HealthScore,  
  ordered_result = TRUE)
```

Дистрибуција ових категорија је:

```
ggplot(data_clean, aes(x = HealthScore, fill = HealthScore)) +
  geom_bar() +
  labs(title = "Distribucija kategorija HealthScore", x = "Kategorije", y = "Broj opservacija") +
  geom_text(
    stat = "count",
    aes(label = ..count..),
    position = position_dodge(width = 0.8),
    vjust = -0.3
  ) +
  scale_fill_paletteer_d("MetBrewer::Archambault") + theme(legend.position="none")
```



Инжењеринг карактеристике DietScore

На основу биваријантне анализе уочили смо следеће јачине повезаности

Карактеристике	Крамеров коефицијент	Опис везе
Veggies vs Diabetes_012	0.059	слаба
Fruits vs Diabetes_012	0.042	слаба

Иако су појединачне везе између уноса воћа и поврћа и статуса дијабетеса слабе да би деловале као самостални предиктор, χ^2 тест је показао да ове везе имају статистичку значајност. Са доменског аспекта, карактеристике Fruits и Veggies описују навике у исхрани, које саме по себи не делују изоловано, већ у комбинацији. Зато је одлучено да се формира карактеристика DietScore, која представља степен квалитета исхране испитаника.

Карактеристика DietScore је дефинисана као збир бинарних вредности карактеристика Fruits и Veggies. Вредности DietScore крећу се у опсегу од 0 до 2, где већа вредност означава

здравију исхрану. Изабран је скор приступ уместо бинарне класификације како би се задржала информација о броју присутних фактора.

Формирање је приказано следећим кодом:

```
data_clean$DietScore = as.numeric(data_clean$Fruits == "Da") +
  as.numeric(data_clean$Veggies == "Da")
```

Иницијално карактеристике Fruits и Veggies су бинарне, то значи да категорија „Не“ има вредност 1, а категорија „Да“ има вредност 2. Сабирањем добија се опсег карактеристике DietScore [2,4], што није интуитивно за ниво. Зато се у коду појављује == "Da", који за категорију „Да“ враћа 1, у супротном („Не“) враћа 0, па је опсег вредности [0,2].

Категоризација у ординарном поретку карактеристике DietScore:

```
nivoi_DietScore = sort(unique(data_clean$DietScore))
category_DietScore = c("nezdrava", "umereno zdrava", "zdrava")
data_clean$DietScore = factor(data_clean$DietScore,
  levels = nivoi_DietScore,
  labels = category_DietScore,
  ordered = TRUE)
```

Провера резултата:

```
> str(data_clean$DietScore)
Ord.factor w/ 3 levels "nezdrava"<"umereno zdrava"<...: 2 1 2 3 3 3 1 2 3 2 ...
```


Сада за карактеристику DietScore важи следећа ординална категоризација:

Категорија	Вредност	Опис
нездрава	1	ниједан од фактора није присутан
умерено здрава	2	један од фактора је присутан
здрава	3	два фактора су присутна

*фактори су Fruits и Veggies, а присутност значи да је њихова вредност „Да“.

Расподела категоријске карактеристике DietScore приказана је на следећем графику:

```
ggplot(data_clean, aes(x = DietScore, fill = DietScore)) +
  geom_bar() +
  labs(title = "Distribucija kategorija DietScore", x = "Kategorije", y = "Broj opservacija") +
  geom_text(
    stat = "count",
    aes(label = ..count..),
    position = position_dodge(width = 0.8),
    vjust = -0.3
  ) +
  scale_fill_paletteer_d("MetBrewer::Archambault") + theme(legend.position="none")
```

Са графика видимо да највећи део испитаника здраво храни. Однос стубића приказује добру дистрибуцију категорија.

Инжењеринг карактеристике SocioEconomicStatus

На основу биваријантне анализе уочили смо следеће јачине повезаности са циљном променљивом Diabetes_012:

Карактеристике	Крамеров коефицијент	Опис везе
AnyHealthcare vs Diabetes_012	0.016	занемарљива
NoDocbcCost vs Diabetes_012	0.0395	веома слаба
IncomeCat vs Diabetes_012	0.120	слаба
EducationCat vs Diabetes_012	0.079	веома слаба
EducationCat vs IncomeCat	0.21	умерена

Иако појединачне везе ових карактеристика са дијабетесом нису снажне да би деловале као самостални предиктори, χ^2 тест је показао статистичку значајност. Са доменског аспекта IncomeCat указује на економску моћ испитаника, EducationCat на образовни ресурс и AnyHealthcare/NoDocbcCost приступ здравственом систему. Тако да заједно описују структурне услове у којима се здравље одржава или нарушава. Због тога је оправдано третирати IncomeCat и EducationCat као једну променљиву SocioEconomicStatus. Променљиве AnyHealthcare и NoDocbcCost показују занемарљив утицај на дијабетес и због тога нису укључене у формирање SocioEconomicStatus карактеристике

EducationCat има категорије: ниско, основно, средње, високо. IncomeCat има категорије: ниска, ниско-средња, средња, висока. Што је показано следећим кодом:

```
unique(data_clean$EducationCat)
unique(data_clean$IncomeCat)
```


Карактеристика SocioEconomicStatus дефинисана је као збир ове две карактеристике, тако да се вредности крећу у опсегу од 0 до 6.

Формирање је приказано следећим кодом:

```
data_clean$SocioEconomicStatus = (as.numeric(data_clean$EducationCat) - 1) +
(as.numeric(data_clean$IncomeCat) - 1)
```

Како су карактеристике EducationCat и IncomeCat вишекатегоријске променљиве, -1 редукује да се категорије рачунају од 0, како би скор био у валиданом опсегу. Да би уочили интеравле категоризације приказали смо дистрибуцију вредности:

```
ggplot(data_clean, aes(x = SocioEconomicStatus)) +  
  geom_histogram(bins = 50, fill = "#7C4B73FF", color="#381A61FF") +  
  labs(title = "Distribucija SocioEconomicStatus", x = "SocioEconomicStatus", y = "Broj  
  opservacija")
```



Уочавамо да се вредности крећу од 1 до 6, са кораком 1. Иако скуп није такав може да постоји и вредност 0, па ћемо и њу узети у обзир пликом граница. Са графика видимо да већина испитаника има средње вредности економског статуса, али гледајући појединачно доминира највећи економски статус. Да би границе категорија низак, средњи, висок биле јасније анализирамо квантиле:

```
> summary(data_clean$SocioEconomicStatus)  
Min. 1st Qu. Median Mean 3rd Qu. Max.  
0.000 3.000 4.000 4.337 6.000 6.00
```

Оно што је прво уочљиво, а на графику није, да постоји и вредност 0. Гледајући остале вредности уочавамо благо асиметричну расподелу. Већина испитаника се налази између 3 и 6, што значи да доминирају средње и високе вредности социоекономског статуса. Закључујемо следећу категоризацију:

Категорија	Опсег	Опис
низак	0 – 3	до 1st Qu.
средњи	4 – 5	између 1st и 3rd Qu.
висок	6	3rd Qu. и горе

Категоризација у ординарном поретку карактеристике DietScore:

```
category_SocioEconomicStatus = c("nizak", "srednji", "visok")  
interval_SocioEconomicStatus = c(-1, 3, 5, 6)
```

```
data_clean$SocioEconomicStatus <- cut(data_clean$SocioEconomicStatus,
  breaks = interval_SocioEconomicStatus,
  labels = category_SocioEconomicStatus,
  ordered_result = TRUE)
```

Провера резултата:


```
> str(data_clean$SocioEconomicStatus)
Ord.factor w/ 3 levels "nizak"<"srednji"<...: 1 1 2 1 1 3 2 1 1 1 ...
```

Сада за карактеристику DietScore важи следећа ординална категоризација:

Категорија	Вредност	Опис
низак	1	ниједан од фактора (Income и Education) није присутан у средњем/високом нивоу
средњи	2	један од фактора је присутан у средњем/високом нивоу
висок	3	оба фактора су присутна у средњем/високом нивоу

Расподела категоријске карактеристике SocioEconomicStatus приказана је на следећем графику:

```
ggplot(data_clean, aes(x = SocioEconomicStatus, fill = SocioEconomicStatus)) +
  geom_bar() +
  labs(title = "Distribucija kategorija SocioEconomicStatus", x = "Kategorije", y = "Broj
  opservacija") +
  geom_text(
    stat = "count",
    aes(label = ..count..),
    position = position_dodge(width = 0.8),
    vjust = -0.3
  ) +
  scale_fill_paletteer_d("MetBrewer::Archambault") + theme(legend.position="none")
```



Расподела категорија SocioEconomicStatus показује да је највећи број испитаника у средњој категорији, док ниске и високе категорије имају приближно исти број испитаника.

Ово указује на добро избалансиран однос , што омогућава да се различити нивои социоекономског статуса квалитетно анализирају у даљем раду.

Биваријантна анализа нових карактеристика


Однос са циљаном карактеристиком Diabetes_012

Након поглавља инжењерства карактеристика анализирали смо однос тих карактеристика са циљаном променљивом како би добили ове увиде о скупу података.

PhysHlthCat vs Diabetes_012

У оквиру ове биваријантне анализе испитиван је однос између категоријске променљиве PhysHlthCat, која описује ниво физичких здравствених потешкоћа испитаника, и циљне променљиве Diabetes_012, која разликује испитанике без дијабетеса, са преддијабетесом и са дијабетесом. PhysHlthCat садржи категорије „нема проблема“, „благи проблеми“, „умерени проблеми“, „тешки проблеми“. Дистрибуцију степена физичких потешкоћа унутар сваке класе дијабетеса приказали смо стубичастим дијаграмом и топлотним дијаграмом.

```
ggplot(data_clean, aes(x = PhysHlthCat, fill = Diabetes_012)) +  
  geom_bar(position = "dodge") +  
  labs(  
    title = "Distribucija kategorija PhysHlthCat po kategorijama Diabetes_012",  
    y = "Broj opservacija"  
  ) + scale_fill_paletteer_d("MetBrewer::Archambault") +  
  geom_text(  
    stat = "count",  
    aes(label = ..count..),  
    position = position_dodge(width = 0.8),  
    vjust = -0.3  
  ) +  
  theme(legend.position="bottom")  
  
data_clean %>%  
  count(Diabetes_012, PhysHlthCat) %>%  
  group_by(Diabetes_012) %>%  
  mutate(percent = n / sum(n) * 100) %>%  
  ggplot(aes(x = Diabetes_012, y = PhysHlthCat, fill = percent)) +  
  geom_tile() +  
  geom_text(aes(label = paste0(round(percent, 1), "%")), color = "white") +  
  labs(  
    title = "Distribucija kategorija PhysHlthCat po kategorijama Diabetes_012",  
    x = "Diabetes_012",  
    y = "PhysHlthCat",  
    fill = "Procentat (%)"  
  ) +  
  scale_fill_gradient(low = colorS[1], high = colorS[2])
```



Стубичasti дијаграм показује јасну разлику у распдели категорија физичког здравља у односу на статус дијабетеса. Код испитаника без дијабетеса доминира категорија „нема проблема“, са знатно већим бројем посматрања у односу на све остале категорије. Како се ниво физичких проблема повећава (од благих ка тешким), број испитаника без дијабетеса опада. Супротно томе, код испитаника са дијабетесом уочава се веће учешће категорија благи, умерени и тешки проблеми у односу на групу без дијабетеса. Иако је и код ове групе најзаступљенија категорија „нема проблема“, релативни удео тежих физичких потешкоћа је израженији него код недијабетичара. Категорија преддијабетеса бројчано је мање заступљена у целом узорку, али показује сличан образац.

Дијаграм топлотне мапе омогућава јаснији увид у интензитет односа између посматраних категорија. Најтамније поље јавља се код комбинације „нема дијабетеса“ и „нема физичких проблема“, што указује на високу концентрацију испитаника у овој групи. Иако не постоји савршено линеаран градијент кроз све категорије, јасан је образац повећаног присуства физичких потешкоћа код особа са дијабетесом.

На основу претходних тумачења дајемо претпоставку да између физичких потешкоћа и статуса дијабетеса постоји јасна повезаност. Како графичка анализа има само описни карактер потврдићемо претпоставку статистичким моделима.

```
chi_sq_test(data_clean$PhysHlthCat, data_clean$Diabetes_012)
cramer_v(data_clean$PhysHlthCat, data_clean$Diabetes_012)
```

```
> chi_sq_test(data_clean$PhysHlthCat, data_clean$Diabetes_012)
```

Pearson's Chi-squared test

data: tabela

X-squared = 7983.5, df = 6, p-value < 2.2e-16

```
> cramer_v(data_clean$PhysHlthCat, data_clean$Diabetes_012)
```

```
[1] 0.1255858
```


χ^2 тест независности показује статистички значајну повезаност између променљивих Diabetes_012 и PhysHlthCat $\chi^2 = 7983,5$, а p-value < 0,00000000000000022 што је доста испод границе статистичке значајности од 0,05. Јачина ове повезаности износи 0,1255 (Крамеров коефицијент) што је слаба јачина везе. Овај самостални утицај нећемо разматрати, али због постојања статистички значајне везе (χ^2 тест) узећемо у разматрање мултиваријантне анализе.

MentHlthCat vs Diabetes_012

У оквиру ове биваријантне анализе испитиван је однос између категоријске променљиве MentHlthCat, која описује ниво металних здравствених потешкоћа испитаника, и циљне променљиве Diabetes_012, која разликује испитанике без дијабетеса, са преддијабетесом и са дијабетесом. MentHlthCat садржи категорије „нема проблема“, „благи проблеми“, „умерени проблеми“, „тешки проблеми“. Дистрибуцију степена менталних потешкоћа унутар сваке класе дијабетеса приказали смо стубичастим дијаграмом и топлотним дијаграмом.

```
ggplot(data_clean, aes(x = MentHlthCat, fill = Diabetes_012 )) +
  geom_bar(position = "dodge") +
  labs(
    title = "Distribucija kategorija MentHlthCat po kategorijama Diabetes_012",
    y = "Broj opservacija"
  ) + scale_fill_paletter_d("MetBrewer::Archambault") +
  geom_text(
    stat = "count",
    aes(label = ..count..),
    position = position_dodge(width = 0.8),
    vjust = -0.3
  ) +
  theme(legend.position="bottom")
```

```
data_clean %>%
  count(Diabetes_012, MentHlthCat) %>%
  group_by(Diabetes_012) %>%
  mutate(percent = n / sum(n) * 100) %>%
  ggplot(aes(x = Diabetes_012, y = MentHlthCat, fill = percent)) +
  geom_tile() +
  geom_text(aes(label = paste0(round(percent, 1), "%")), color = "white") +
  labs(
    title = "Distribucija kategorija MentHlthCat po kategorijama Diabetes_012",
    x = "Diabetes_012",
    y = "MentHlthCat",
    fill = "Procentat (%)"
  ) +
  scale_fill_gradient(low = colorS[1], high = colorS[2])
```



Стубичасти дијаграм указује на јасне разлике у расподели категорија менталног здравља у односу на статус дијабетеса. Код испитаника без дијабетеса доминира категорија „нема проблема“ (148 972), док се број испитаника постепено смањује са порастом интензитета менталних потешкоћа. Ипак, и у овој групи је присутан значајан број испитаника са благим, умереним и тешким проблемима. Код испитаника са дијабетесом уочава се другачија структура расподеле. Иако је и у овој групи најбројнија категорија „нема проблема“ (23 361), релативно је веће учешће категорија благи, умерени и тешки проблеми у поређењу са испитаницима без дијабетеса. Посебно је приметно да број испитаника са тешким менталним потешкоћама остаје висок и у поређењу са категоријом умерених проблема, што указује на веће оптерећење менталним здрављем код дијабетичара

Дијаграм топлотне мапе визуелно потврђује обрасце уочене на стубичастом дијаграму. Највећи интензитет боје присутан је код комбинације „нема дијабетеса“ и „нема проблема“, што одражава највећи број опсервација у овој групи.

На основу претходних тумачења дајемо претпоставку да између менталних потешкоћа и статуса дијабетеса постоји јасна повезаност. Како графичка анализа има само описни карактер потврдићемо претпоставку статистичким моделима.

```
chi_sq_test(data_clean$MentHlthCat, data_clean$Diabetes_012)
cramer_v(data_clean$MentHlthCat, data_clean$Diabetes_012)

> chi_sq_test(data_clean$MentHlthCat, data_clean$Diabetes_012)

Pearson's Chi-squared test

data:  tabela
X-squared = 1476.6, df = 6, p-value < 2.2e-16

> cramer_v(data_clean$MentHlthCat, data_clean$Diabetes_012)
[1] 0.05401072
```

χ^2 тест независности показује статистички значајну повезаност између променљивих Diabetes_012 и MentHlthCat $\chi^2 = 1476,6$, а p-value < 0,00000000000000022 што је доста испод границе статистичке значајности од 0,05. Јачина ове повезаности износи 0,0540 (Крамеров коефицијент) што је веома слаба јачина везе. Овај самостални утицај нећемо разматрати, али због постојања статистички значајне везе (χ^2 тест) узећемо у разматрање мултиваријантне анализе.

EducationCat vs Diabetes_012

У оквиру ове биваријантне анализе испитиван је однос између категоријске променљиве EducationCat, која представља степен образовања испитаника, и циљне променљиве Diabetes_012, која класификује испитанике на оне без дијабетеса, са преддијабетесом и са дијабетесом. EducationCat садржи категорије „ниско“, „основно“, „средње“, „високо“. Дистрибуцију степена образовања унутар сваке класе дијабетеса приказали смо стубичастим дијаграмом и топлотним дијаграмом.


```
ggplot(data_clean, aes(x = EducationCat, fill = Diabetes_012)) +
  geom_bar(position = "dodge") +
  labs(
    title = "Distribucija kategorija EducationCat po kategorijama Diabetes_012",
    y = "Broj opservacija"
  ) + scale_fill_paletteer_d("MetBrewer::Archambault") +
  geom_text(
```

```

stat = "count",
aes(label = ..count..),
position = position_dodge(width = 0.8),
vjust = -0.3
) +
theme(legend.position="bottom")

data_clean %>%
count(Diabetes_012, EducationCat) %>%
group_by(Diabetes_012) %>%
mutate(percent = n / sum(n) * 100) %>%
ggplot(aes(x = Diabetes_012, y = EducationCat, fill = percent)) +
geom_tile() +
geom_text(aes(label = paste0(round(percent, 1), "%")), color = "white") +
labs(
title = "Distribucija kategorija EducationCat po kategorijama Diabetes_012",
x = "Diabetes_012",
y = "EducationCat",
fill = "Procenat (%)"
) +
scale_fill_gradient(low = colorS[1], high = colorS[2])

```



Дијаграми показују јасну разлику у расподели нивоа образовања у односу на статус дијабетеса. У свим групама доминирају испитаници са средњим и високим образовањем, што је и очекивано с обзиром на структуру узорка. Највећи број испитаника без дијабетеса припада категорији високог образовања, док је нешто мањи, али и даље значајан број присутан у категорији средњег образовања. Код испитаника са дијабетесом приметан је релативно већи удео особа са средњим и основним образовањем у односу на групу без дијабетеса. Иако апсолутно највећи број дијабетичара и даље има високо образовање, у поређењу са недијабетичарима приметна је промена у структури дистрибуције, са већом заступљеношћу нижих нивоа образовања. Категорија ниског образовања је слабо заступљена у узорку и у свим групама има занемарљив број посматрања, те се на основу ове категорије не могу доносити поуздани закључци.

На основу претходних тумачења дајемо претпоставку да између нивоа образовања и статуса дијабетеса постоји јасна повезаност али недовољно јака да се користи као самостални предиктор. Како графичка анализа има само описни карактер потврдићемо претпоставку статистичким моделима.


```
chi_sq_test(data_clean$EducationCat, data_clean$Diabetes_012)
cramer_v(data_clean$EducationCat, data_clean$Diabetes_012)
```

```
> chi_sq_test(data_clean$EducationCat, data_clean$Diabetes_012)

Pearson's Chi-squared test

data:  tabela
X-squared = 3161.1, df = 6, p-value < 2.2e-16

Warning message:
In chisq.test(tabela) : Chi-squared approximation may be incorrect
> cramer_v(data_clean$EducationCat, data_clean$Diabetes_012)
[1] 0.07902491
Warning message:
In chisq.test(tabela) : Chi-squared approximation may be incorrect
>
```


χ^2 тест независности показује статистички значајну повезаност између променљивих Diabetes_012 и EducationCat $\chi^2 = 3161$, а p-value < 0,00000000000000022 што је доста испод границе статистичке значајности од 0,05. Јачина ове повезаности износи 0,079 (Крамеров коефицијент) што је веома слаба јачина везе. Овај самостални утицај нећемо разматрати, али због постојања статистички значајне везе (χ^2 тест) узећемо у разматрање мултиваријантне анализе.

Важно је напоменути да је током примене χ^2 теста добијено упозорење да апроксимација χ^2 расподелом може бити нетачна. Ово упозорење је последица неравномерне расподеле опсервација по категоријама, односно присуства поља контингентне табеле са малим очекиваним фреквенцијама. Међутим, с обзиром на велику величину узорка, резултат теста и даље пружа валидан индикатор постојања зависности.

IncomeCat vs Diabetes_012


У оквиру ове биваријантне анализе ћемо испитивати да ли је ново настала карактеристика IncomeCat добро повезана са Diabetes_012 пошто је варијабла Income дала солидну повезаност са дијабетесом, одлучили смо да је оптимизујемо и сада тестирамо категоричку променљиву IncomeCat:

```
ggplot(data_clean, aes(x = Diabetes_012, fill = IncomeCat )) +
  geom_bar(position = "dodge")+
  scale_fill_manual(values = colors) +
  labs(title = "Distribucija IncomeCat u odnosu na PhysActivity",
       y = "Broj opservacija",
       fill = "Nivo primanja")
```



На основу стубичастог графа, евидентно је да највише опсервација припада испитаницима који немају дијабетес, али је евидентно и то да се пропорционално односи између нивоа примања разликују у односу на то који тип дијабетеса испитаник има. Наравно да бисмо даље одредили однос морамо се послужити и другим анализама.

```
data_clean %>%
  count(Diabetes_012, IncomeCat) %>%
  group_by(Diabetes_012) %>%
  mutate(percent = n / sum(n) * 100) %>%
  ggplot(aes(x = Diabetes_012, y = IncomeCat, fill = percent)) +
  geom_tile() +
  geom_text(aes(label = paste0(round(percent, 1), "%")), color = "white") +
  labs(
    title = "Distribucija kategorija IncomeCat po kategorijama Diabetes_012",
    x = "Diabetes_012",
    y = "IncomeCat",
    fill = "Procenat (%)"
  ) +
  scale_fill_gradient(low = colorS[1], high = colorS[2])
```



Топлотна мапа нам је дала бољи увид у односе, иако је евидентно да су бројеви опсервација по типу дијабетеса различити, евидентно је и то да се односи разликују, тј пропорције опсервација по нивоу примања су другачије по свим типовима дијабетеса што нам даје претпоставку да су солидно повезани, па ћемо употребити тестове за бољу анализу.

```
chi_sq_test(data_clean$IncomeCat, data_clean$Diabetes_012)
```

Pearson's Chi-squared test

data: tabela

X-squared = 7369.1, df = 6, p-value < 2.2e-16

```
cramer_v(data_clean$IncomeCat, data_clean$Diabetes_012)
0.1206558
```


Резултати теста нам говоре да повезаност постоји али није уопште јака, тј слаба је.

χ^2 тест = 7369, $p = 2.2e-16$, на основу Хи теста имамо назнаке о повезаности двеју варијабли, са друге стране Крамер нам даје ниску вредност од 0.12 па се опет ова променљива може употребити само за комбинацију са неком додатном варијаблом за значајнију предикцију.

AgeCat vs Diabetes_012


У овој анализи ћемо одређивати повезаност новонастале варијабле AgeCat, настале из варијабле Age, како би се постигла боља распоређеност уз мање нивоа старосних доби, са варијаблом Diabetes_012. AgeCat је катогоричка варијабла па се служимо стубичним графом и топлотном мапон за визуелну анализу повезаности:

```
ggplot(data_clean, aes(x = Diabetes_012, fill = AgeCat)) +
  geom_bar(position = "dodge") +
  scale_fill_manual(values = colors) +
  labs(title = "Distribucija AgeCat u odnosu na PhysActivity",
       y = "Broj opservacija",
       fill = "Starosna dob")
```



На основу Стубичног графа видимо да се број опсервација знатно разликује између класа дијабетеса, мада оно што је такође уочљиво јесте то да су односи међу старосним групама различити у односу на тип дијабетеса. Зато ћемо урадити још неке анализе да бисмо утврдили да ли повезаност постоји.

```
data_clean %>%
  count(Diabetes_012, AgeCat) %>%
  group_by(Diabetes_012) %>%
  mutate(percent = n / sum(n) * 100) %>%
  ggplot(aes(x = Diabetes_012, y = AgeCat, fill = percent)) +
  geom_tile() +
  geom_text(aes(label = paste0(round(percent, 1), "%")), color = "white") +
  labs(
    title = "Distribucija starosne dobi u odnosu na tipove Diabetes_012",
    x = "Diabetes_012",
    y = "AgeCat",
    fill = "Procenat (%)"
  ) +
  scale_fill_gradient(low = colorS[1], high = colorS[2])
```



На основу топлотне мапе рекло би се да повезаност постоји, јер је евидентна промена односа старосних категорија у односу на типове дијабетеса, рецимо оних који имају дијабетес најмање има међу младима, док највише међу старијима, сениорима и зрелим старосним групама. Користимо статистичке тестове да проверимо претпоставку о повезаности.

```
data: tabela
X-squared = 8705.2, df = 6, p-value < 2.2e-16

> cramer_v(data_clean$AgeCat, data_clean$Diabetes_012)
[1] 0.131139
```

На основу тестова Хи нам говори да статистичка повезаност постоји и да је релативно значајна према вредности χ^2 тест = 8705, $p = 2.2e-16$. Са друге стране Крамеров коефицијент $V = 0.13$ нам ипак каже да чак иако повезаност постоји није довољно јака да буде предиктивна, односно да је потребно користити ову карактеристику у комбинацији са другима како би добили јак предиктиван однос.

CardioRiskScore vs Diabetes_012

У оквиру ове биваријантне анализе испитиван је однос између категоријске променљиве CardioRiskScore, која описује степен кардиолошког ризика испитаника, и циљне променљиве Diabetes_012, која разликује испитанике без дијабетеса, са преддијабетесом и са дијабетесом. CardioRiskScore садржи категорије „нема ризика“, „низак ризик“, „умерен ризик“, „јак ризик“. Дистрибуцију степена кардиолошког ризика унутар сваке класе дијабетеса приказали смо стубичастим дијаграмом и топлотним дијаграмом.


```
ggplot(data_clean, aes(x = CardioRiskScore, fill = Diabetes_012)) +
  geom_bar(position = "dodge") +
  labs(
    title = "Distribucija kategorija CardioRiskScore po kategorijama Diabetes_012",
    y = "Broj opservacija"
```

```

) + scale_fill_paletteer_d("MetBrewer::Archambault") +
geom_text(
  stat = "count",
  aes(label = ..count..),
  position = position_dodge(width = 0.8),
  vjust = -0.3
) +
theme(legend.position="bottom")

data_clean %>%
count(Diabetes_012, CardioRiskScore) %>%
group_by(Diabetes_012) %>%
mutate(percent = n / sum(n) * 100) %>%
ggplot(aes(x = Diabetes_012, y = CardioRiskScore, fill = percent)) +
geom_tile() +
geom_text(aes(label = paste0(round(percent, 1), "%")), color = "white") +
labs(
  title = "Distribucija kategorija CardioRiskScore po kategorijama Diabetes_012",
  x = "Diabetes_012",
  y = "CardioRiskScore",
  fill = "Procentat (%)"
) +
scale_fill_gradient(low = colorS[1], high = colorS[2])

```



Стубичасти дијаграм приказује расподелу категорија CardioRiskScore у односу на статус дијабетеса. Код испитаника без дијабетеса највећи број посматрања је у категорији „нема ризика“, док број испитаника опада како се степен кардиолошког ризика повећава, са најмањим бројем у категорији „висок ризик“. Супротно томе, код испитаника са дијабетесом приметно је учешће категорија „умерен ризик“ и „висок ризик“ у односу на групу без дијабетеса, што указује на присуство више кардиолошких фактора ризика. Испитанци са преддијабетесом имају расподелу између две екстремне групе, са већим учешћем категорије „умерен ризик“ у односу на „нема ризика“.

Топлотна мапа пружа јаснији увид у интензитет односа између категорија. Најтамнија поља јављају се код комбинација „нема дијабетеса“ и „нема ризика“, што указује на високу концентрацију испитаника у овој групи, и код „умерен ризик“ и „дијабетес“, што означава да кардиолошки фактори ризика имају већи удео код особа са дијабетесом. Иако није присутан савршено линеаран градијент, види се јасан образац повећаног кардиолошког ризика са стањем дијабетеса.

На основу графичких анализа можемо претпоставити да постоји повезаност између CardioRiskScore и статуса дијабетеса. Како графичка анализа има описни карактер, потврда ове повезаности биће извршена коришћењем статистичких модела.

```
chi_sq_test(data_clean$CardioRiskScore, data_clean$Diabetes_012)
cramer_v(data_clean$CardioRiskScore, data_clean$Diabetes_012)
```

```
> chi_sq_test(data_clean$CardioRiskScore, data_clean$Diabetes_012)
```

Pearson's Chi-squared test

```
data: tabela
X-squared = 26242, df = 6, p-value < 2.2e-16
```

```
> cramer_v(data_clean$CardioRiskScore, data_clean$Diabetes_012)
[1] 0.2276899
```


χ^2 тест независности показује статистички значајну повезаност између променљивих Diabetes_012 и CardioRiskScore $\chi^2 = 26242$, а $p\text{-value} < 0,00000000000000022$ што је доста испод границе статистичке значајности од 0,05. Јачина ове повезаности износи 0,2276 (Крамеров коефицијент) што је слаба јачина везе.

LifestyleRiskScore vs Diabetes_012

У оквиру ове биваријантне анализе испитиван је однос између категоријске променљиве LifestyleRiskScore, која описује степен ризика животног стила испитаника, и циљне променљиве Diabetes_012, која разликује испитанике без дијабетеса, са преддијабетесом и са дијабетесом. CardioRiskScore садржи категорије „нема ризика“, „низак ризик“, „умерен ризик“, „јак ризик“. Дистрибуцију степена ризика животног стила унутар сваке класе дијабетеса приказали смо стубичастим дијаграмом и топлотним дијаграмом.

```
ggplot(data_clean, aes(x = LifestyleRiskScore, fill = Diabetes_012)) +
  geom_bar(position = "dodge") +
  labs(
    title = "Distribucija kategorija LifestyleRiskScore po kategorijama Diabetes_012",
    y = "Broj opservacija"
  ) + scale_fill_paletteer_d("MetBrewer::Archambault") +
  geom_text(
    stat = "count",
    aes(label = ..count..),
    position = position_dodge(width = 0.8),
    vjust = -0.3
  ) +
  theme(legend.position="bottom")
```

```
data_clean %>%
  count(Diabetes_012, LifestyleRiskScore) %>%
  group_by(Diabetes_012) %>%
  mutate(percent = n / sum(n) * 100) %>%
  ggplot(aes(x = Diabetes_012, y = LifestyleRiskScore, fill = percent)) +
  geom_tile() +
  geom_text(aes(label = paste0(round(percent, 1), "%")), color = "white") +
  labs(
    title = "Distribucija kategorija LifestyleRiskScore po kategorijama Diabetes_012",
    x = "Diabetes_012",
    y = "LifestyleRiskScore",
```



Код испитаника без дијабетеса највећи број посматрања је у категорији „низак ризик“, док су категорије „нема ризика“ и „умерен ризик“ мање заступљене, а категорија „висок ризик“ има најмањи број испитаника. Код испитаника са дијабетесом приметно је учешће категорија „умерен ризик“ и „висок ризик“ у односу на групу без дијабетеса, што указује на присуство више фактора ризичног животног стила. Испитанци са преддијабетесом имају расподелу између категорија „низак ризик“ и „умерен ризик“, са већим учешћем „умерен ризик“ него „низак ризик“.

Топлотна мапа пружа јаснији увид у интензитет односа између категорија. Најтамнија поља јављају се код комбинације „низак ризик“ и „нема дијабетеса“, што указује на високу концентрацију испитаника у овој групи, као и код „умерен ризик“ и „дијабетес“, што означава да фактори ризичног животног стила имају већи удео код особа са дијабетесом. Иако није присутан савршено линеаран градијент, види се јасан образац повећаног ризика животног стила са стањем дијабетеса.

На основу графичких анализа можемо претпоставити да постоји повезаност између LifestyleRiskScore и статуса дијабетеса. Како графичка анализа има описни карактер, потврда ове повезаности биће извршена коришћењем статистичких модела.

```
chi_sq_test(data_clean$LifestyleRiskScore, data_clean$Diabetes_012)
cramer_v(data_clean$LifestyleRiskScore, data_clean$Diabetes_012)

> chi_sq_test(data_clean$LifestyleRiskScore, data_clean$Diabetes_012)

Pearson's Chi-squared test

data: tabela
X-squared = 1546.1, df = 6, p-value < 2.2e-16

> cramer_v(data_clean$LifestyleRiskScore, data_clean$Diabetes_012)
[1] 0.05526669
```

χ^2 тест независности показује статистички значајну повезаност између променљивих Diabetes_012 и LifestyleRiskScore $\chi^2 = 1546,1$, а $p\text{-value} < 0,000000000000000022$ што је доста испод границе статистичке значајности од 0,05. Јачина ове повезаности износи 0,0552 (Крамеров коефицијент) што је веома слаба јачина везе.


HealthScore vs Diabetes_012

У оквиру ове биваријантне анализе испитиван је однос између категоријске променљиве HealthScore, која описује степен општег здравља испитаника, и циљне променљиве

Diabetes_012, која разликује испитанике без дијабетеса, са преддијабетесом и са дијабетесом. HealthScore садржи категорије „низак ризик“, „умерен ризик“, „висок ризик“, „екстремни ризик“. Дистрибуцију степена општег здравља унутар сваке класе дијабетеса приказали смо стубичастим дијаграмом и топлотним дијаграмом.

```
ggplot(data_clean, aes(x = HealthScore, fill = Diabetes_012)) +
  geom_bar(position = "dodge") +
  labs(
    title = "Distribucija kategorija HealthScore po kategorijama Diabetes_012",
    y = "Broj opservacija"
  ) + scale_fill_paletter_d("MetBrewer::Archambault") +
  geom_text(
    stat = "count",
    aes(label = ..count..),
    position = position_dodge(width = 0.8),
    vjust = -0.3
  ) +
  theme(legend.position="bottom")
```

```
data_clean %>%
  count(Diabetes_012, HealthScore) %>%
  group_by(Diabetes_012) %>%
  mutate(percent = n / sum(n) * 100) %>%
  ggplot(aes(x = Diabetes_012, y = HealthScore, fill = percent)) +
  geom_tile() +
  geom_text(aes(label = paste0(round(percent, 1), "%")), color = "white") +
  labs(
    title = "Distribucija kategorija HealthScore po kategorijama Diabetes_012",
    x = "Diabetes_012",
    y = "HealthScore",
    fill = "Procentat (%)"
  ) +
  scale_fill_gradient(low = colorS[1], high = colorS[2])
```



Стубичасти дијаграм приказује јасну разлику у расподели категорија HealthScore у односу на статус дијабетеса. Код испитаника без дијабетеса доминира категорија „умерен ризик“, са убедљиво највећим бројем посматрања, док су категорије „низак ризик“ и „висок ризик“ знатно мање заступљене. Категорија „екстремни ризик“ је код ове групе присутна у занемарљивом броју случајева. Уочава се да са порастом нивоа здравственог ризика опада број испитаника без дијабетеса. Супротно томе, код испитаника са дијабетесом уочава се

релативно веће учешће категорија „висок ризик“ и „екстремни ризик“ у поређењу са групом без дијабетеса. Иако је и у овој групи најзаступљенија категорија „умерен ризик“, приметан је већи број испитаника који припадају здравствено ризичнијим категоријама, што указује на лошији укупни здравствени статус код особа са дијабетесом. Категорија преддијабетеса је бројчано мање заступљена у целом узорку, али показује интермедијаран образац, односно вредности које се налазе између групе без дијабетеса и групе са дијабетесом.

Дијаграм топлотне мапе омогућава јаснији увид у интензитет односа између категорија HealthScore и статуса дијабетеса. Најтамније поље односи се на комбинацију „нема дијабетеса“ и „умерен ризик“, што указује на високу концентрацију испитаника у овој групи. Са преласком ка категоријама „висок“ и „екстремни ризик“, интензитет боје је израженији код дијабетичара него код недијабетичара, што додатно потврђује уочени образац.

Иако расподела није строго линеарна кроз све категорије, приметан је јасан тренд повећаног здравственог ризика код особа са дијабетесом у односу на особе без дијабетеса. На основу графичке анализе може се претпоставити да између HealthScore категорија и статуса дијабетеса постоји значајна повезаност. С обзиром на то да је ова анализа искључиво описног карактера, наведена претпоставка ће бити додатно испитана и потврђена применом одговарајућих статистичких модела.

```
chi_sq_test(data_clean$HealthScore, data_clean$Diabetes_012)
cramer_v(data_clean$HealthScore, data_clean$Diabetes_012)

> chi_sq_test(data_clean$HealthScore, data_clean$Diabetes_012)

      Pearson's Chi-squared test

data:  tabela
X-squared = 4846.8, df = 6, p-value < 2.2e-16

> cramer_v(data_clean$HealthScore, data_clean$Diabetes_012)
[1] 0.09785248
```

χ^2 тест независности показује статистички значајну повезаност између променљивих Diabetes_012 и HealthScore $\chi^2 = 4846,8$, а $p\text{-value} < 0,000000000000000022$ што је доста испод границе статистичке значајности од 0,05. Јачина ове повезаности износи 0,0978 (Крамеров коефицијент) што је веома слаба јачина везе.

SocioEconomicStatus vs Diabetes_012

У оквиру ове биваријантне анализе испитиван је однос између категоријске променљиве SocioEconomicStatus, која описује социјално економски статус, и циљне променљиве Diabetes_012, која разликује испитанике без дијабетеса, са преддијабетесом и са дијабетесом. SocioEconomicStatus садржи категорије „низак“, „средњи“, „висок“. Дистрибуцију социјално економског статуса унутар сваке класе дијабетеса приказали смо стубичастим дијаграмом и топлотним дијаграмом.


```
ggplot(data_clean, aes(x = SocioEconomicStatus, fill = Diabetes_012)) +
  geom_bar(position = "dodge") +
  labs(
    title = "Distribucija kategorija SocioEconomicStatus po kategorijama Diabetes_012",
    y = "Broj opservacija"
  ) + scale_fill_paletteer_d("MetBrewer::Archambault") +
  geom_text(
    stat = "count",
```

```

aes(label = ..count..),
position = position_dodge(width = 0.8),
vjust = -0.3
) +
theme(legend.position="bottom")

data_clean %>%
count(Diabetes_012, SocioEconomicStatus) %>%
group_by(Diabetes_012) %>%
mutate(percent = n / sum(n) * 100) %>%
ggplot(aes(x = Diabetes_012, y = SocioEconomicStatus, fill = percent)) +
geom_tile() +
geom_text(aes(label = paste0(round(percent, 1), "%")), color = "white") +
labs(
title = "Distribucija kategorija SocioEconomicStatus po kategorijama Diabetes_012",
x = "Diabetes_012",
y = "SocioEconomicStatus",
fill = "Procenat (%)"
) +
scale_fill_gradient(low = colorS[1], high = colorS[2])

```



Стубичасти дијаграм приказује јасне разлике у расподели категорија социоекономског статуса у односу на статус дијабетеса. Код испитаника без дијабетеса доминира категорија „средњи“ социоекономски статус, са убедљиво највећим бројем посматрања, док су категорије „низак“ и „висок“ заступљене у нешто мањем, али и даље значајном обиму. Ова расподела указује да је већина испитаника без дијабетеса концентрисана у средњем социоекономском слоју.

Код испитаника са дијабетесом уочава се другачији образац расподеле. Иако је и у овој групи најзаступљенија категорија „средњи“ социоекономски статус, приметно је релативно веће учешће испитаника са „ниским“ социоекономским статусом у поређењу са групом без дијабетеса, док је категорија „висок“ социоекономски статус најмање заступљена. Овакав образац може указивати на повезаност нижег социоекономског статуса са већом учесталошћу дијабетеса. Категорија преддијабетеса је бројчано мање заступљена у целом узорку, али показује интермедијаран образац расподеле. Број испитаника у овој групи налази се између вредности забележених код испитаника без дијабетеса и оних са дијабетесом, при чему је и овде најизраженија категорија „средњи“ социоекономски статус.

Дијаграм топлотне мапе омогућава јаснији увид у интензитет односа између социоекономског статуса и статуса дијабетеса. Најтамнија поља односе се на комбинације „нема дијабетеса“ и „средњи“ социоекономски статус, као и „нема дијабетеса“ и „висок“ социоекономски статус, што указује на високу концентрацију испитаника у овим категоријама. Са преласком ка статусу дијабетеса, интензитет боје је израженији у категорији „низак“ социоекономски статус, што додатно потврђује уочени образац са стубичастог дијаграма.

Иако расподела није строго линеарна кроз све категорије социоекономског статуса, приметан је јасан тренд већег учешћа нижег социоекономског статуса код особа са дијабетесом у односу на особе без дијабетеса. На основу графичке анализе може се претпоставити да између социоекономског статуса и статуса дијабетеса постоји значајна повезаност. С обзиром на то да је анализа описног карактера, ова претпоставка ће бити додатно испитана применом одговарајућих статистичких метода.

```
chi_sq_test(data_clean$SocioEconomicStatus, data_clean$Diabetes_012)
cramer_v(data_clean$SocioEconomicStatus, data_clean$Diabetes_012)

> chi_sq_test(data_clean$SocioEconomicStatus, data_clean$Diabetes_012)

Pearson's Chi-squared test

data: tabela
X-squared = 6876.8, df = 4, p-value < 2.2e-16

> cramer_v(data_clean$SocioEconomicStatus, data_clean$Diabetes_012)
[1] 0.1165559
```


χ^2 тест независности показује статистички значајну повезаност између променљивих Diabetes_012 и SocioEconomicStatus $\chi^2 = 6876,8$, а $p\text{-value} < 0,00000000000000022$ што је доста испод границе статистичке значајности од 0,05. Јачина ове повезаности износи 0,1165 (Крамеров коефицијент) што је слаба јачина везе.

Однос карактеристикама које нису циљане

IncomeCat VS EducationCat


У овој анализи ћемо утврђивати у каквој су релацији новонастале варијабле за ниво образовања и примања испитаника. EducationCat је настао из Education јер је било потребно смањити број нивоа унутар варијабле и притом побољшати баланс међу класама, исто је то случај и код IncomeCat који је настао из Income. Како су обе категоријске променљиве, тако ћемо корисити Стубични граф и топлотну мапу за визуелизацију:

```
ggplot(data_clean, aes(x = EducationCat, fill = IncomeCat )) +
geom_bar(position = "dodge")+ scale_fill_manual(values = colors) +
labs(title = "Distribucija nivoa primanja u odnosu na nivo obrazovanje", y = "Broj opservacija",
fill = "Primanja")
```



На основу графа видимо да број испитаника који имају ниско и основно образовање, је готово занемарљиви, што и не чуди јер је истраживање рађено у развијеној земљи (САД), са друге стране оно што је уочљиво јесте да постоји разлика у односима нивоа примања између средњег и високог нивоа образовања, али за даље утврђивање односа потребне су нам још неке анализе.

```
data_clean %>%
  count(EducationCat, IncomeCat) %>%
  group_by(EducationCat) %>%
  mutate(percent = n / sum(n) * 100) %>%
  ggplot(aes(x = EducationCat, y = IncomeCat, fill = percent)) +
  geom_tile() +
  geom_text(aes(label = paste0(round(percent, 1), "%")), color = "white") +
  labs(
    title = "Distribucija visine primanja u odnosu na tipove nivo obrazovanja",
    x = "EducationCat",
    y = "IncomeCat",
    fill = "Procenat (%)"
  ) +
  scale_fill_gradient(low = colorS[1], high = colorS[2])
```



На основу топлотне мапе видимо да постоје разлике у нивоима примања међу свим нивоима образовања, иако је скуп и даље тесно асиметричан. Како бисмо добили потврду о претпоставци повезаности користимо статистичке тестове:

```
chi_sq_test(data_clean$EducationCat,data_clean$IncomeCat)
data: tabela
X-squared = 35868, df = 9, p-value < 2.2e-16

> cramer_v(data_clean$EducationCat,data_clean$IncomeCat)
0.2173442
```

Као што се види у резултатима, очигледно је да статистичка повезаност и значајно одступање од независности варијабли постоји, то нам говори мала вредност параметра "p", али и висока χ^2 вредност, што нам даје јасан увид да имамо јаку повезаност. Наравно Крамеров коефицијент нам говори да иако повезаност постоји, она јесте утицајна међу датим варијабли, али не јако, већ у неком умереном интензитету па би је опет требало користити са још неким предикторима.

MentHlthCat VS Stroke

У оквиру ове биваријантне анализе испитиван је однос између категоријске променљиве MentHlthCat, која описује ниво менталних потешкоћа укључујући и стрес испитаника, и бинарне категоријске променљиве Stroke, која разликује испитанике који су доживели мождани удар од оних који нису. MentHlthCat садржи категорије „нема проблема“, „благих проблема“, „умерени проблеми“ и „тешки проблеми“. Дистрибуцију степена менталних потешкоћа унутар сваке класе можданог удара приказали смо стубичастим дијаграмом и топлотним дијаграмом.


```
ggplot(data_clean, aes(x = MentHlthCat, fill = Stroke )) +
  geom_bar(position = "dodge") +
  labs(
    title = "Distribucija kategorija MentHlthCat po kategorijama Stroke",
    y = "Broj opservacija"
```

```

) + scale_fill_paletter_d("MetBrewer::Archambault") +
geom_text(
  stat = "count",
  aes(label = ..count..),
  position = position_dodge(width = 0.8),
  vjust = -0.3
) +
theme(legend.position="bottom")

data_clean %>%
count(Stroke, MentHlthCat) %>%
group_by(Stroke) %>%
mutate(percent = n / sum(n) * 100) %>%
ggplot(aes(x = Stroke, y = MentHlthCat, fill = percent)) +
geom_tile() +
geom_text(aes(label = paste0(round(percent, 1), "%")), color = "white") +
labs(
  title = "Distribucija kategorija MentHlthCat po kategorijama Stroke",
  x = "Stroke",
  y = "MentHlthCat",
  fill = "Procentat (%)"
) +
scale_fill_gradient(low = colorS[1], high = colorS[2])

```



Стубичасти дијаграм показује јасну диспропорцију у расподели категорија менталног здравља у односу на статус можданог удара. Код испитаника који нису имали мождани удар (Stroke = "Ne") апсолутно доминира категорија „нема проблема“ (169063), са знатно већим бројем посматрања у односу на све остале категорије. Како се ниво менталних проблема повећава, број испитаника без можданог удара нагло опада.

Код испитаника који су доживели мождани удар (Stroke = "Da"), такође је најзаступљенија категорија оних без менталних проблема (6220), али је приметан другачији образац у репу дистрибуције. Удео испитаника са „тешким проблемима“ (1525) је неочекивано висок у односу на „умерене проблеме“ (1024) и „благих проблема“ (1505) унутар ове групе, што сугерише да особе са историјом можданог удара релативно чешће пријављују озбиљније менталне потешкоће него општа популација.

Дијаграм топлотне мапе омогућава јаснији увид у интензитет ових фреквенција. Најтамније поље јавља се код комбинације нема можданог удара и нема менталних проблема, што

указује на високу концентрацију испитаника у овој групи. Међутим, боја указује и на то да, иако су апсолутне бројке код „Stroke = Da“ мале, постоји конзистентно присуство менталних потешкоћа.

На основу претходних тумачења дајемо претпоставку да између менталних потешкоћа и могућног удара постоји одређена повезаност. Како графичка анализа има само описни карактер, потврдићемо претпоставку статистичким моделима.

```
chi_sq_test(data_clean$MentHlthCat, data_clean$Stroke)
cramer_v(data_clean$MentHlthCat, data_clean$Stroke)
> chi_sq_test(data_clean$MentHlthCat, data_clean$Stroke)

Pearson's Chi-squared test

data:  tabela
X-squared = 1175.9, df = 3, p-value < 2.2e-16

> cramer_v(data_clean$MentHlthCat, data_clean$Stroke)
[1] 0.06816076
```

χ^2 тест независности показује статистички значајну повезаност између променљивих Stroke и MentHlthCat. Вредност χ^2 теста износи 1175,9, а p-value < 0,00000000000000022 што је доста испод границе статистичке значајности од 0,05. Јачина ове повезаности износи 0,0682 (Крамеров коефицијент) што је веома слаба јачина везе.

PhysHlthCat vs DiffWalk


У оквиру ове биваријантне анализе испитиван је однос између категоријске променљиве PhysHlthCat, која описује ниво физичких здравствених потешкоћа испитаника, и променљиве DiffWalk, која указује на то да ли испитаник има озбиљне потешкоће при ходању или пењању уз степенице. PhysHlthCat садржи категорије „нема проблема“, „благи проблеми“, „умерени проблеми“ и „тешки проблеми“. Дистрибуцију степена физичких потешкоћа унутар категорија потешкоћа са кретањем приказали смо стубичастим дијаграмом и топлотним дијаграмом.

```
ggplot(data_clean, aes(x = PhysHlthCat, fill = DiffWalk)) +
  geom_bar(position = "dodge") +
  labs(
    title = "Distribucija kategorija PhysHlthCat po kategorijama DiffWalk",
    y = "Broj opservacija"
  ) + scale_fill_paletteer_d("MetBrewer::Archambault") +
  geom_text(
    stat = "count",
    aes(label = ..count..),
    position = position_dodge(width = 0.8),
    vjust = -0.3
  ) +
  theme(legend.position="bottom")

data_clean %>%
  count(DiffWalk, PhysHlthCat) %>%
  group_by(DiffWalk) %>%
  mutate(percent = n / sum(n) * 100) %>%
  ggplot(aes(x = DiffWalk, y = PhysHlthCat, fill = percent)) +
  geom_tile() +
  geom_text(aes(label = paste0(round(percent, 1), "%")), color = "white") +
```



```
labs(
  title = "Distribucija kategorija PhysHlthCat po kategorijama DiffWalk",
  x = "DiffWalk",
  y = "PhysHlthCat",
  fill = "Procenat (%)"
) +
scale_fill_gradient(low = colorS[1], high = colorS[2])
```



Стубичасти дијаграм показује изузетно снажну диференцијацију у физичком статусу испитаника у зависности од тога да ли имају потешкоће са кретањем. Код испитаника који немају потешкоће са ходом (DiffWalk = "Ne"), доминира категорија „нема проблема“ (148334), док број испитаника експоненцијално опада ка тежим категоријама. Насупрот томе, код групе са потешкоћама у кретању (DiffWalk = "Da"), примећујемо потпуно другачији тренд: категорија „тешки проблеми“ је најбројнија (16573), што је више у односу на испитанике са тешким физичким проблемима који немају потешкоће са ходом (9515).

Дијаграм топлотне мапе додатно наглашава ову корелацију. Док је највећа концентрација података (најтамније поље) очекивано код здраве популације, десна колона графика јасно приказује да се интензитет физичких проблема значајно појачава код особа са дијагнозом DiffWalk. Код здравих људи фреквенција опада са тежином проблема, док код особа са потешкоћама у ходу фреквенција расте са тежином физичких проблема.

На основу претходних тумачења дајемо претпоставку да између физичких потешкоћа и потешкоћа са кретањем постоји веома изражена јака повезаност. Како графичка анализа има само описни карактер, потврдићемо претпоставку статистичким моделима.

```
chi_sq_test(data_clean$PhysHlthCat, data_clean$DiffWalk)
cramer_v(data_clean$PhysHlthCat, data_clean$DiffWalk)
> chi_sq_test(data_clean$PhysHlthCat, data_clean$DiffWalk)

Pearson's Chi-squared test

data: tabela
X-squared = 56980, df = 3, p-value < 2.2e-16

> cramer_v(data_clean$PhysHlthCat, data_clean$DiffWalk)
[1] 0.4744805
```

χ^2 тест независности показује статистички значајну повезаност између променљивих DiffWalk и PhysHlthCat. Вредност χ^2 теста износи изузетно високих 56980, а p-value < 0,00000000000000022, што је знатно испод границе статистичке значајности од 0,05. Јачина ове повезаности износи 0,4745 (Крамеров коефицијент), што указује на јаку повезаност између нивоа физичких потешкоћа и потешкоћа у кретању.


Овакав резултат је у складу са доменским знањем, јер се повећање физичких здравствених проблема природно одражава на способност кретања. Због изражене међусобне повезаности, ове променљиве носе сличну информацију и њихово истовремено укључивање у модел може довести до редундантности. Међутим PhysHlthCat је искључена из даље анализе као засебан предиктор јер је већ укључена у степен здравља (HealthScore).

С друге стране, променљива DiffWalk представља последицу здравља који није директно обухваћен HealthScore-ом и показује јачи самостални утицај на циљну променљиву. С тога ће у даљој анализи бити размотрена могућа синергија променљивих DiffWalk и HealthScore, односно њихов заједнички допринос предикцији статуса дијабетеса.

AgeCat vs HealthScore


У овој анализи ћемо утврђивати повезаност између две новонастале варијабле, односно AgeCat која је настала из Age као потреба за сједињавањем старосних група са 13 на 4, као и HealthScore коју смо добили рачунањем физичке, психичке и генералне оцено стања испитаника. У основи истражујемо повезаност старосне групе и општег здравственог стања испитаника. Обе од ових варијабли су категоричке, тако да користимо стубичасти дијаграм и топлотну мапу за визуализацију односа:

```
ggplot(data_clean, aes(x = AgeCat, fill = HealthScore )) +  
  
  geom_bar(position = "dodge") +  
  
  scale_fill_manual(values = colors) +  
  
  labs(title = "Distribucija zdravstvenog stanja a u odnosu na starosnu grupu",  
  
        y = "Broj opservacija",  
  
        fill = "Zdravstveno stanje")
```



На основу стубичастог графа јасно је да је у свим старосним групама однос броја опсервација готово исти, осим код зреле група која мало предњачи са бројем испитаника са ниским здравственим ризицима. Како бисмо даље утврдили однос користимо додатне анализе.

```
data_clean %>%
  count(AgeCat, HealthScore) %>%
  group_by(AgeCat) %>%
  mutate(percent = n / sum(n) * 100) %>%
  ggplot(aes(x = AgeCat, y = HealthScore, fill = percent)) +
  geom_tile() +
  geom_text(aes(label = paste0(round(percent, 1), "%")), color = "white") +
  labs(
    title = "Distribucija zdravstvenog stanja a u odnosu na starosnu grupu",
    x = "AgeCat",
    y = "HealthScore",
    fill = "Procenat (%)"
  ) +
  scale_fill_gradient(low = colorS[1], high = colorS[2])
```



Топлотна мапа нам указује на то да постоје извесне промене у односу здравственог стања међу старосним групама. Па тако евидентно је да је однос између екстремног ризика и ниског ризика код сениора 1:27,док је код младих 1:46, што ће рећи да одређена повезаност постоји,сада колика тачна остаје да се види статистичким тестовима.

```
chi_sq_test(data_clean$AgeCat,data_clean$HealthScore)
data: tabela
X-squared = 1590.4, df = 9, p-value < 2.2e-16
```

```
cramer_v(data_clean$AgeCat,data_clean$HealthScore)
0.0457672
```

На основу тестова добили смо слабе резултате. Наиме $\chi^2 = 1590$ што говори о неком слабијем одступању од независности варијабли,а p има вредност близу 0,па говори да постоји статистичка значајност. Крамер нам даје много слаб резултат,тј 0.046 па би се рекло да нема готовог никаквог утицаја међу варијаблама,па се ова повезаност занемарује,осим у употреби са још неким предиктором.

Табела закључака

PhysHlthCat vs Diabetes_012	Повезаност ових варијабли није нарочито велика, што показује Хи тест $\chi^2 = 7983,5$,као и $p=2.2e-16$ који говоре да постоји статистичка повезаност,али нема нарочитог утицаја $V=0,12$ па је ово најбоље проверавати даље са другим варијаблама.
MentHlthCat vs Diabetes_012	Повезаност ових варијабли је слаба, иако Хи тест даје резултат од $\chi^2 = 1476$,као и $p=2.2e-16$, што би рекло да постоји статистичка повезаност, Крамер коеф. $V=0.054$ је низак, па остаје само да се

	можда употреби у комбинацији са другим варијаблама.
EducationCat vs Diabetes_012	Повезаност ових варијабли је слаба, иако Хи тест даје резултат од $\chi^2 = 3161$, као и $p=2.2e-16$, што би рекло да постоји статистичка повезаност, Крамер коеф. $V=0,079$ је низак, па остаје само да се можда употреби у комбинацији са другим варијаблама.
IncomeCat vs Diabetes_012	Повезаност ових варијабли постоји, али нема јаке везе за предиктиван однос, што су тестови и показали, Хи је дао $\chi^2 = 7369$, као и $p=2.2e-16$ што показује повезаност, али Крамер $V=0.12$ даје нам објашњење да се мора употребљавати само уз још неку варијаблу.
AgeCat vs Diabetes_012	Повезаност ових варијабли постоји, али нема јаке везе за предиктиван однос, што су тестови и показали, Хи је дао $\chi^2 = 8705$, као и $p=2.2e-16$ што показује повезаност, али Крамер $V=0.13$ даје нам објашњење да се мора употребљавати само уз још неку варијаблу.
CardioRiskScore vs Diabetes_012	Повезаност ових варијабли је умерено јака, тј. нема предиктиван однос, али има добру статистичку повезаност што је Хи тест показао $\chi^2 = 26242$, као и $p=2.2e-16$ што показује повезаност, али Крамер говори да јачина вози није више од умерене (Крамер $V=0.23$)
LifestyleRiskScore vs Diabetes_012	Повезаност ових варијабли је слаба, иако Хи тест даје резултат од $\chi^2 = 1546$, као и $p=2.2e-16$, што би рекло да постоји статистичка повезаност, Крамер коеф. $V=0,055$ је низак, па остаје само да се можда употреби у комбинацији са другим варијаблама.
HealthScore vs Diabetes_012	Повезаност ових варијабли је слаба, иако Хи тест даје резултат од $\chi^2 = 4846$, као и $p=2.2e-16$, што би рекло да постоји статистичка повезаност, Крамер коеф. $V=0,098$ је низак, па остаје само да се можда употреби у комбинацији са другим варијаблама.
SocioEconomicStatus vs Diabetes_012	Повезаност ових варијабли није нарочито велика, што показује Хи тест $\chi^2 = 6877$, као и $p=2.2e-16$ који говоре да постоји статистичка повезаност, али нема

	нарочитог утицаја $V=0,11$ па је ово најбоље проверавати даље са другим варијаблама.
IncomeCat VS EducationCat	Повезаност ових варијабли је умерено јака, тј. нема предиктиван однос, али има добру статистичку повезаност што је Хи тест показао $\chi^2 = 35868$, као и $p=2.2e-16$ што показује повезаност, али Крамер говори да јачина вези није више од умерене (Крамер $V=0.22$)
MentHlthCat VS Stroke	Повезаност ових варијабли је слаба, иако Хи тест даје резултат од $\chi^2 = 1176$, као и $p=2.2e-16$, што би рекло да постоји статистичка повезаност, Крамер коеф. $V=0,068$ је низак, па остаје само да се можда употреби у комбинацији са другим варијаблама.
PhysHlthCat vs DiffWalk	Повезаност између двеју варијабли постоји, и може бити предиктиван, што нам Хи и Крамер доказују, Хи показао $\chi^2 = 56980$, као и $p=2.2e-16$ што је високо и показује да постоји узајамна зависност, а Крамер показује да је веза јака $V=0.47$
AgeCat vs HealthScore	Повезаност ових варијабли је слаба, иако Хи тест даје резултат од $\chi^2 = 1590$, као и $p=2.2e-16$, што би рекло да постоји статистичка повезаност, Крамер коеф. $V=0,046$ је низак, па остаје само да се можда употреби у комбинацији са другим варијаблама.

Селекција предиктора (Feature Engineering)

Селекција скупа предиктора представља кључан корак у процесу припреме података, где се за циљ има смањење димензионалности скупа података уз задржавање релевантних информација за предикцију циљане променљиве (Diabetes_012). Дакле, важи:

$$\{X_1, X_2, \dots, X_p\} \rightarrow \{X_{i1}, X_{i2}, \dots, X_{ik}\}, k < p$$

На основу следећег кода установили смо да data_clean скуп садржи 32 карактеристике, од којих је једна циљана:

```
> dim(data_clean)
[1] 253096 32
```

Списак тих карактеристика је:

```
names(data_clean)
[1] "Diabetes_012" "HighBP"      "HighChol"
[4] "CholCheck"    "BMI"         "Smoker"
[7] "Stroke"       "HeartDiseaseorAttack" "PhysActivity"
[10] "Fruits"       "Veggies"     "HvyAlcoholConsump"
```

[13]	"AnyHealthcare"	"NoDocbcCost"	"GenHlth"
[16]	"MentHlth"	"PhysHlth"	"DiffWalk"
[19]	"Sex"	"Age"	"Education"
[22]	"Income"	"PhysHlthCat"	"MentHlthCat"
[25]	"EducationCat"	"CardioRiskScore"	"LifestyleRiskScore"
[28]	"HealthScore"	"DietScore"	"IncomeCat"
[31]	"SocioEconomicStatus"	"AgeCat"	

То значи да је почетни скуп предиктора $X_1 = \{ \text{HighBP, HighChol, CholCheck, BMI, Smoker, Stroke, HeartDiseaseorAttack, PhysActivity, Fruits, Veggies, HvyAlcoholConsump, AnyHealthcare, NoDocbcCost, GenHlth, MentHlth, PhysHlth, DiffWalk, Sex, Age, Education, Income, PhysHlthCat, MentHlthCat, EducationCat, CardioRiskScore, LifestyleRiskScore, HealthScore, DietScore, IncomeCat, SocioEconomicStatus, AgeCat} \}$, где је $p = 31$.

Селекција карактеристика је извршена на основу претходне биваријантне анализе и доменског знања. Биваријантна анализа је идентификовала карактеристике које показују статистички значајну везу са циљном променљивом *Diabetes_012*, док је доменско знање омогућило елиминисање карактеристика које би могле повећати шум или редувансу у моделу. Алтернативно, могли би се применити формални приступи као што су best subset selection, forward, backward или stepwise selection на почетном скупу од 31 карактеристике. Међутим, због великог броја посматрања и карактеристика, ови приступи би били изузетно компјутерски захтевни и у овом случају нису неопходни. Применом биваријантне анализе и доменског знања обезбеђена је стабилност и интерпретабилност модела, а истовремено задовољен критеријум релевантности предиктора.

Критеријуми за селекцију које смо применили су:

- карактеристике са веома слабом везом (Крамеров коефицијент < 0.05) елиминисане су из даље анализе, како би се смањио шум и избегло укључивање нерелевантних информација у модел
- све карактеристике садржане у некој композитној карактеристици нису задржане као самосталне карактеристике, како би се избегла редувантност и преклапање информација
- карактеристике чијом категоризацијом су добијене нове карактеристике нису задржане

Биваријантна анализа је показала да карактеристике *AnyHealthcare*, *NoDocbcCost*, *Sex* и *DietScore* имају занемарљиву јачину везе са циљном променљивом (Крамеров коефицијент < 0.05) и стога су искључене. Карактеристике садржане у композитним карактеристикама су HighBP, HighChol, GenHlth, HeartDiseaseorAttack, MentHlthCat, PhysHlthCat, Fruits, Veggies, Smoker, HvyAlcoholConsump, PhysActivity, IncomeCat, EducationCat па тако нису задржане у скупу. Карактеристике које су категоризиване MentHlth, PhysHlth, Income, Education, Age нису задржане.

LifestyleRiskScore, CholCheck су карактеристике са веома слабом повезаношћу ($0.05 < \text{Крамеров коефицијент} < 0.1$). Њихово укључивање у модел доводи до увећања шума и потенцијалне редувансе информација, што може смањити стабилност и интерпретабилност модела, стога смо изабрали задржимо само једну. Са аспекта домесног знања LifestyleScore је погоднији за задржавање.

У складу са претходним закључцима следи да се скуп X_1 слика у скуп $X_2 = \{ \text{BMI, Stroke, DiffWalk, CardioRiskScore, LifestyleRiskScore, HealthScore, SocioEconomicStatus, AgeCat} \}$ где је $k=8$ задовољавајући услов $k < p$.

Следећа табела јасније приказује преглед закључака за сваку карактеристику иницијалног скупа X_1 .

Карактеристика	Статистички тест (Крамеров коэффициент / χ^2 тест)	Одлука	Образложење
HighBP	0,27	Одбачен	Садржан у CardioRiskScore
HighChol	0,21	Одбачен	Садржан у CardioRiskScore
CholCheck	0.068	Одбачен	Крамеров коэффициент < 0.05
BMI	$\text{Pr}(> F) < 2e-16$	Задржан	
GenHlth	0.219	Одбачен	Садржан у HealthScore
HeartDiseaseorAttack	0,18	Одбачен	Садржан у CardioRiskScore
Stroke	0.107	Задржан	
MentHlth	$F = 717.1 \text{ Pr}(> F) < 2e-16$	Одбачен	Категоризован у MentHlthCat
PhysHlth	$F = 4079 \text{ Pr}(> F) < 2e-16$	Одбачен	Категоризован у PhysHlthCat
DiffWalk	0.2244245	Задржан	
Fruits	0.042	Одбачен	Садржан у DietScore
Veggies	0.059	Одбачен	Садржан у DietScore
Smoker	0.068	Одбачен	Садржан у LifestyleRiskScore
HvyAlcoholConsump	0.058	Одбачен	Садржан у LifestyleRiskScore
PhysActivity	0.122	Одбачен	Садржан у LifestyleRiskScore
AnyHealthcare	0.016	Одбачен	Крамеров коэффициент < 0.05
NoDocbcCost	0.0395	Одбачен	Крамеров коэффициент < 0.05
Income	0.124	Одбачен	
Sex	0.031	Одбачен	Крамеров коэффициент < 0.05
Age	$F=4560 \text{ Pr}(> F) < 2e-16$	Одбачен	Категоризован у AgeCat
Education	0.095	Одбачен	Категоризован у EducationCat
MentHlthCat	0.054	Одбачен	Садржан у HealthScore
PhysHlthCat	0,12	Одбачен	Садржан у HealthScore

IncomeCat	0,12	Одбачен	Садржан у SocioEconomicStatus
EducationCat	0,079	Одбачен	Садржан у SocioEconomicStatus
AgeCat	0,13	Задржан	
CardioRiskScore	0,23	Задржан	
LifestyleRiskScore	0,055	Задржан	
HealthScore	0,098 $\approx$ 0,1	Задржан	
DietScore	0.04477093	Одбачен	Крамеров коефицијент < 0.05
SocioEconomicStatus	0,11	Задржан	

Код којим је спроведено формирање скупа X_2 :

```
selected_features <- c("BMI", "Stroke", "DiffWalk", "CardioRiskScore",
  "LifestyleRiskScore", "HealthScore",
  "SocioEconomicStatus", "AgeCat", "Diabetes_012")
```

```
data_selected <- data_clean[, selected_features]
```

Прво смо кроз вектор `selected_features` узели све називе колона које желимо да укључимо, а затим из скупа података `data_clean` узели све редове и изабране колоне формирајући скуп података `data_selected`. Димензије скупа су 253096 опсервација са 9 колона:

```
> dim(data_selected)
[1] 253096 9
```

Моделовање

Дефинисање тренинг и тест скупа

У процесу изградње модела за анализу и предикцију, један од кључних корака представља адекватна подела скупа података на тренинг и тест скуп. Циљ ове поделе јесте обезбеђивање поузданог учења модела, као и објективне процене његових перформанси над подацима који нису коришћени током фазе обучавања.

Тренинг скуп користи се за откривање образаца и односа између променљивих, односно за изградњу модела, док тест скуп служи као независна основа за проверу способности модела да генерализује резултате на нове, до тада невидљиве податке тј. да предвиђа.

У ууниверијалној анализи уочена је неуравнотежена расподела класа циљане променљиве `Diabetes_012`. Овде ћемо поновити резултате како би сагледали структуру података и очували односе приликом поделе на тренинг и тест скуп. Код:

```
raspodela_Diabetes_012 = data_selected %>%
  count(Diabetes_012) %>%
  mutate(Udeo = round(n / sum(n) * 100, 2))
print(raspodela_Diabetes_012)
```

.резултат

Diabetes_012	n	Udeo
--------------	---	------

nema dijabetes	213207	84,24
predijabetes	4619	1,82
dijabetes	35270	13,94

Потврдили смо присуство неуравнотежене расподеле категорија, из тог разлога примењена је стратификована подела на тренинг и тест скуп, којом се обезбеђује очување релативне заступљености сваке категорије у оба скупа.

Дефинисали смо семе за генератор случајних бројева чиме обезбеђујемо да при сваком покретању кода буду изабрани исти подаци. Индексом (train_index) одредили смо низ позиција или редова у оригиналном скупу података који ће бити укључени у тренинг скуп. Функција createDataPartition из R пакета caret креира такав индекс на основу циљне променљиве Diabetes_012, водећи рачуна о стратификованој подели тј. очувању процентних удела. На основу добијеног индекса поделили смо скуп за тренинг, а преостали подаци иду у тестни скуп. Опис је реализован следећим код:


```
set.seed(83762021)
train_index <- createDataPartition(
  data_selected$Diabetes_012,
  p = 0.8,
  list = FALSE
)

data_train = data_selected[train_index, ]
data_test = data_selected[-train_index, ]
```

Провера одрживости расподела:

Табеле расподела
<pre>raspodela_trening = data_train %>% count(Diabetes_012) %>% mutate(Udeo = round(n / sum(n) * 100, 2))%>% mutate(Skup = "Trening skup") raspodela_test = data_test %>% count(Diabetes_012) %>% mutate(Udeo = round(n / sum(n) * 100, 2))%>% mutate(Skup = "Test skup") raspodela_Diabetes_012 = data_selected %>% count(Diabetes_012) %>% mutate(Udeo = round(n / sum(n) * 100, 2))%>% mutate(Skup = "Ceo skup") raspodela_tabele = bind_rows(raspodela_trening, raspodela_test, raspodela_Diabetes_012)</pre>

Графички приказ
<pre>ggplot(raspodela_tabele, aes(x = Diabetes_012, y = Udeo, fill = Skup)) + geom_col(position = "dodge") + labs(title = "Uporedna raspodela kategorija po skupovima", y = "Procenat (%)",</pre>



На основу графика јасно се види да смо поделом задржали расподелу почетног скупа.

Балансирање података циљане карактеристике Diabetes_012

У нашем скупу података, циљна променљива Diabetes_012 представља класе које означавају да ли испитаник има дијабетес, преддијабетес или га нема уопште.. Униваријантном анализом закључено је да број опсервација у овим категоријама није равномерно распоређен. Оваква расподела може довести до пристрасности модела тј. модел ће имати тенденцију да боље предвиђа категорију која је више заступљена, док ће ретке категорије бити недовољно предвиђене. Да би модел учио подједнако о свим категоријама циљане променљиве, користе се технике балансирања података, као што су oversampling (понављање или генерисање додатних примера мање заступљених класа) или undersampling (смањење броја примера у доминантној класи).

Користили смо технику која комбинује oversampling мање заступљених класа и undersampling доминантне класе. Oversampling обезбеђује да се за ретке класе креирају нови синтетички примери на основу постојећих, чиме се повећава број примера и омогућава моделу да учи на свим категоријама подједнако. С друге стране, undersampling подразумева смањење броја примера доминантне класе, што може довести до губитка неких информација. Међутим, овај корак је неопходан како би се спречила пристрасност модела ка доминантној класи и обезбедила боља предвидљивост за ретке категорије.

Технике балансирања смо применили на тренинг скуп, како би тест скуп остао репрезентативан и омогућио реалну процену перформанси модела. Тренутна расподела вредности у тренинг скупу је:

```
> print(raspodela_trening)
Diabetes_012  n      Udeo   Skup
1 nema dijabetes 170566 84.24 Trening skup
2 predijabetes  3696   1.83 Trening skup
3 dijabetes     28216 13.94 Trening skup
```

Како је класа предијабетеса веома ретка 1,83% до 15000 примера је довољно да модел научи о овој класи, без претераног генерисања синтетичких података. Класа нема дијабетес је веома бројна 170566, како би је балансирани у односу на остале класе треба да има дупло више узорака у односу на најмању па је можемо је свети на 30000. Реализација балансирања:

```
predijabetes = subset(data_train, Diabetes_012 == "predijabetes")
dijabetes = subset(data_train, Diabetes_012 == "dijabetes")
nemadiabetes = subset(data_train, Diabetes_012 == "nema dijabetes")
set.seed(83762021)

predijabetes_oversampling = predijabetes[sample(nrow(predijabetes), 15000, replace =
TRUE), ]
nemadiabetes_undersampling = nemadiabetes[sample(nrow(nemadiabetes), 30000), ]

data_train_balanced = rbind(predijabetes_oversampling, dijabetes,
nemadiabetes_undersampling)
```

Прво смо издвојили скупове података по класама. Сетовали смо семе за генерисање случајног понављања, обезбеђујући да увек буде исто приликом поновног покретања кода. На скуп са класом предијабетес примењен је oversampling чиме је број приимера повећан на 15000, а за скуп са класом нема дијабетес undersampling чиме је изабрано раддом 30000 примера те класе. За класу дијабетес није рађена техника сходно добром броју примерака. На крају сва три скупа спојена су у балансирани скуп data_train_balanced.

Расподела балансираног скупа је:

```
raspodela_data_train_balanced = data_train_balanced %>%
count(Diabetes_012) %>%
mutate(Udeo = round(n / sum(n) * 100, 2))
```

Diabetes_012	n	Udeo
nema dijabetes	30000	40,97
predijabetes	15000	20,49
dijabetes	28216	38,54

Регуларизација и PCA

Регуларизација и редукција димензија применом анализе главних компоненти (PCA) нису примењене у овом истраживању из више разлога. Пре свега, скуп предиктора је већ редукован на осам карактеристика применом биваријантне анализе и доменског знања, чиме је елиминисан вишак слабо информативних и редундантних променљивих. С обзиром на велики број посматрања и релативно мали број пажљиво одабраних предиктора, ризик од пренаглашавања (overfitting) је значајно умањен, те примена регуларизације није била неопходна.

Такође, примена PCA није разматрана јер би довела до губитка интерпретабилности модела, што је од посебног значаја у контексту анализе фактора ризика за дијабетес. PCA

трансформише оригиналне карактеристике у линеарне комбинације које је тешко директно повезати са конкретним здравственим и социоекономским факторима. С обзиром да је један од циљева рада био разумевање утицаја појединачних предиктора на појаву дијабетеса, задржавање оригиналних карактеристика представља методолошки оправдан избор.

Тренирање модела

У овом поглављу описујемо процес креирања предиктивних модела за циљану променљиву Diabetes_012, користећи претходно одабрани скуп предиктора: {BMI, Stroke, DiffWalk, CardioRiskScore, LifestyleRiskScore, HealthScore, SocioEconomicStatus, AgeCat}.

Процес тренирања модела обухвата три кључна корака:

- Избор модела где дефинишемо који алгоритми ће се користити за предикцију и образлажемо њихов избор.
- Поновно узорковање где примењујемо технике као што су stratified cross-validation или други методи за обезбеђивање стабилних и поузданих резултата модела.
- Финално тренирање где обучавамо коначне моделе на целокупном балансираном тренинг скупу који ће се користити за предвиђање на тест скупу.

Избор модела

Наша предиктивна варијабла јесте Diabetes_012, она је по природи категоријска, јер нам говори да ли испитаник има или нема дијабетес или је у питању предидијабетес. Са тим у вези морамо употребити класификационе моделе. Моделе које ћемо употребити у овом случају су:

- Логистичка регресија- Модел који предвиђа припадност некој класи, поред тога што предвиђа којој класи припада нека опсервација, он рачуна и вероватноћу припадности те опсервације предвиђеној класи. У нашем случају добро је користити логистичку регресију зато што нам може дати увид у то како неки предиктор попут SocioEconomicStatus утиче на повећање односно смањивање вероватноће да нека опсервација припада управо класи за коју модел тврди да припада. Оно што је такође велики плус код овог модела јесте то што су наши подаци приклоњени овом моделу, тј. користили смо се статистичким методама Крамеров коефицијент и χ^2 тест на које се сама Логистичка регресија и ослања за претпоставке о некој варијабли. Овај модел нам даје статистичку чврстину и коефицијенте, и покушава да направи праволонијску границу између класа.
- Classification and Regression Trees (CART)- CART модел у основи представља стабло одлуке, оно функционише по принципу прага, тј ако је нека вредност изнад неке референтне вредности она се сматра припадником неке класе, ако не онда није. Са друге стране CART нам може одлично послужити како би визуализовали кретање опсервације кроз испитивања њених вредности. Овај модел за разлику од логистичке регресије покушава да што боље обликује границу међу класама тако да буде јасно дефинисана. Проблем са CART-ом је такав да се он често превише прилагођава подацима, што доводи до поремећаја прагова унутар стабла, и може

довести до погрешних претпоставки припадности класи. Зато ћемо користити још један алгоритам написан испод.

- Random forest- Овај модел у основи представља скуп CART стабала, са тим што овде не може доћи до нарочитог overfitting-a, тј прилагођавања стабала подацима. Оно за шта је random forest нарочито добар јесте да би открио скривене везе међу предикторима, тј може нам помоћи да одредимо уз коју варијаблу AgeCat може добити на значајности, као на пример AgeCat+LifestyleRiskScore би био критичан фактор. Са друге стране Random forest усредњује одлуке стотине стабала чиме смањује варијансу у подацима, што је свакако добро по наш скуп који носи различите варијансе по свим варијаблама. Овај модел нам је кључан због тачности предикције, тј максимално ће бити оптимизована.

Унакрсна валидација (k-fold)

Да бисмо реално проценили колико добро ће модел предвиђати нове податке, користимо методе поновног узорковања. Тест грешка представља просечну грешку модела приликом предвиђања одговора на новим подацима која нису коришћена приликом обуке. Овим добијамо показатељ колико је модел поуздан када се примени на податке који нису део тренинг скупа.

Применили смо k-fold унакрсну валидацију (k-fold cross-validation). Ова метода подразумева да се тренинг скуп података дели на k подскупова, при чему се модел више пута тренира на $k - 1$ подскупова, а преостали подскуп користи за валидацију. Процена тачности модела добија се просеком резултата из свих k итерација.

За овај скуп података изабрано је $k = 10$ [референца], јер пружа добар компромис између bias-а и варијансе процене. Поред тога, применом стратификоване поделе осигурава се да у сваком скупу пропорције класа циљане променљиве остају приближно једнаке као у целом скупу података.

Избор једначине логистичке регресије

За логистичку регресију, k-fold унакрсну валидацију смо користили не само да проценимо грешку, већ и да изаберемо најбољу комбинацију предиктора и коефицијената, тј. да добијемо оптималну једначину логистичке регресије. Модел који даје најмању просечну тест грешку сматрали смо финалним и користили га за предвиђање на тест скупу. Овај приступ осигурава да модел није прекомерно прилагођен тренинг подацима и има добру предиктивну моћ на новим подацима. Сви изабрани предиктори укључени су у моделе без додатног одбацивања, с обзиром на то да је њихова повезаност са циљаном променљивом потврђена у оквиру биваријантне анализе и поглавља селекције.

Тестирали смо следеће моделе:

- Модел 1 са свим укљученим параметрима без синергија и полиномијалних чланова
- Модел 2 са укљученом синергијом БМИ и HealthScore (доменска хипотеза)
- Модел 3 са БМИ као полиномијалним чланом, испитујући више степена истог Са доменског аспекта однос БМИ и дијабетеса није линеаран, након одређеног прага гојазности ризик расте брже.
- Модел 4 са БМИ као полиномијалним чланом, испитујући више степена истог и синергијским утицајем са HealthScore

Тумачења смо реализовали кроз код:

```

Дефинисање промеливих и подела на подскупове
set.seed(83762021)
k = 10
podskupovi = createFolds(data_train_balanced$Diabetes_012, k = k, list = TRUE, returnTrain = FALSE)

cv_error_multinom_model1 = numeric(k)
cv_error_multinom_model2 = numeric(k)

stepen = 1:4
cv_error_multinom_model3_mean = numeric(length(stepen))
cv_error_multinom_model4_mean = numeric(length(stepen))

cv_error_cart <- numeric(k)
cv_error_rf <- numeric(k)

```

```

Унакрсна валидација модел 1
for(i in 1:k){
  test_idx = podskupovi[[i]]
  train_idx = setdiff(1:nrow(data_train_balanced), test_idx)

  model_multinom = multinom(Diabetes_012 ~ BMI + Stroke + DiffWalk + CardioRiskScore +
    LifestyleRiskScore + HealthScore + SocioEconomicStatus + AgeCat,
    data = data_train_balanced[train_idx, ], trace = FALSE)

  preds = predict(model_multinom, newdata = data_train_balanced[test_idx, ])
  cv_error_multinom_model1[i] = mean(preds != data_train_balanced$Diabetes_012[test_idx])
}

Унакрсна валидација модел 2
for(i in 1:k){
  test_idx = podskupovi[[i]]
  train_idx = setdiff(1:nrow(data_train_balanced), test_idx)

  model_multinom = multinom(Diabetes_012 ~ BMI * HealthScore + Stroke + DiffWalk +
    CardioRiskScore + LifestyleRiskScore + SocioEconomicStatus + AgeCat,
    data = data_train_balanced[train_idx, ], trace = FALSE)

  preds = predict(model_multinom, newdata = data_train_balanced[test_idx, ])
  cv_error_multinom_model2[i] = mean(preds != data_train_balanced$Diabetes_012[test_idx])
}

Унакрсна валидација модел 3
for (s in stepen) {
  cv_error_multinom_modelS = numeric(k)

  for(i in 1:k){
    test_idx = podskupovi[[i]]
    train_idx = setdiff(1:nrow(data_train_balanced), test_idx)

```

Commented [MS52]: Коментар професора: ово ми није јасно. Имае 3 класе а третирате их као 2?

Commented [MS53R52]: Слажемо се са сугестијом. Користили смо glm модел по узору са личних скрипти предмета. У складу са тим нисмо улазили у тумачење како функција ради (да је заправо бинарна логистича регресија). Сада смо то исправили користећи multinomial logistic regression.

Пошто је наша циљана променљива фактор чији се поредак не прати, користили смо функцију multinom. А итерацију валидације радили као и код CART, Random Forest

<https://www.sthda.com/english/articles/36-classification-methods-essentials/147-multinomial-logistic-regression-essentials-in-r/>

```

model_multinom = multinom(Diabetes_012 ~ poly(BMI, s) + Stroke + DiffWalk +
CardioRiskScore + LifestyleRiskScore + HealthScore + SocioEconomicStatus + AgeCat,
data = data_train_balanced[train_idx, ], trace = FALSE)

preds = predict(model_multinom, newdata = data_train_balanced[test_idx, ])
cv_error_multinom_modelS[i] = mean(preds !=
data_train_balanced$Diabetes_012[test_idx])
}
cv_error_multinom_model3_mean[s] = mean(cv_error_multinom_modelS)
}

```

Унакрсна валидација модел 4

```

for (s in stepen) {
  cv_error_multinom_modelS = numeric(k)

  for (i in 1:k) {
    test_idx = podskupovi[[i]]
    train_idx = setdiff(1:nrow(data_train_balanced), test_idx)

    model_multinom = multinom(Diabetes_012 ~ poly(BMI, s)*HealthScore + Stroke + DiffWalk
+ CardioRiskScore + LifestyleRiskScore + SocioEconomicStatus + AgeCat,
data = data_train_balanced[train_idx, ], trace = FALSE)

    preds = predict(model_multinom, newdata = data_train_balanced[test_idx, ])
    cv_error_multinom_modelS[i] = mean(preds !=
data_train_balanced$Diabetes_012[test_idx])
  }
  cv_error_multinom_model4_mean[s] = mean(cv_error_multinom_modelS)
}

```

Резултате смо приказали у табели cv_rezultati_logisticka:

```

cv_rezultati_logisticka = data.frame(
  Model = c(
    "Model 1: linearni",
    "Model 2: BMI x HealthScore",
    paste0("Model 3: poly(BMI,", stepen, ")"),
    paste0("Model 4: poly(BMI,", stepen, ") x HealthScore")
  ),
  CV_Error = c(
    mean(cv_error_multinom_model1),
    mean(cv_error_multinom_model2),
    cv_error_multinom_model3_mean,
    cv_error_multinom_model4_mean)
)
print(cv_rezultati_logisticka)
> print(cv_rezultati_logisticka)

```

	Model	CV_Error
1	Model 1: linearni	0.4132431
2	Model 2: BMI x HealthScore	0.4133387
3	Model 3: poly(BMI,1)	0.4132431
4	Model 3: poly(BMI,2)	0.4127377
5	Model 3: poly(BMI,3)	0.4127923
6	Model 3: poly(BMI,4)	0.4126011
7	Model 4: poly(BMI,1) x HealthScore	0.4133114
8	Model 4: poly(BMI,2) x HealthScore	0.4126967
9	Model 4: poly(BMI,3) x HealthScore	0.4128059
10	Model 4: poly(BMI,4) x HealthScore	0.4123416

Из добијених резултата видимо да сваки од модела показује сличну CV_Error вредност (~0.41). Линеарни модел (модел1) имао је CV_Error од 0,4132, док су модели који укључују полиноме BMI карактеристике (модел3) и полиноме са интеракцијом са HealthScore-ом (модел4) показали благо смањење CV_Error, са најбољом вредношћу 0,4123 :

```
cv_rezultati_logisticka$Model[cv_rezultati_logisticka$CV_Error ==
min(cv_rezultati_logisticka$CV_Error)]
[1] "Model 4: poly(BMI,4) × HealthScore"
```

Ово значи да модел боље хвата нелинеарни однос између BMI и ризика за дијабетес, што је у складу са доменским знањем да се ризик након одређеног прага гојазности држе повећава. Међутим разлика нелинеарних и линеарних модела је веома мала (0,0009015), а интерпретабилност линеарног модела је једноставнија.

С обзиром на то, за финалну једначину логистичке перспективе гласи Diabetes_012 ~ BMI + Stroke + DiffWalk + CardioRiskScore + LifestyleRiskScore + HealthScore + SocioEconomicStatus + AgeCat.

Процена грешке модела CART и Random Forest

У обе валидације смо пролазили к пута, узимали i-ти скуп за тест, а остале за тренинг. Тренирали модел функцијом rpart за модел cart и randomForest за модел Random Forest. Пустили смо предикцију над тестним скупом и памтили у вектор грешака средњу вредност. Реализација кроз код:

```
CART model
for(i in 1:k){
  test_idx <- podskupovi[[i]]
  train_idx <- setdiff(1:nrow(data_train_balanced), test_idx)

  model_cart <- rpart(Diabetes_012 ~ BMI + Stroke + DiffWalk + CardioRiskScore +
    LifestyleRiskScore + HealthScore + SocioEconomicStatus + AgeCat,
    data = data_train_balanced[train_idx, ], method = "class")

  preds <- predict(model_cart, data_train_balanced[test_idx, ], type = "class")
  cv_error_cart[i] <- mean(preds != data_train_balanced$Diabetes_012[test_idx])
}

Random Forest model
for(i in 1:k){
  test_idx <- podskupovi[[i]]
  train_idx <- setdiff(1:nrow(data_train_balanced), test_idx)

  model_rf <- randomForest(Diabetes_012 ~ BMI + Stroke + DiffWalk + CardioRiskScore +
    LifestyleRiskScore + HealthScore + SocioEconomicStatus + AgeCat,
    data = data_train_balanced[train_idx, ],
    ntree = 500)

  preds <- predict(model_rf, data_train_balanced[test_idx, ])
  cv_error_rf[i] <- mean(preds != data_train_balanced$Diabetes_012[test_idx])
}
```

Резултати унакрсне валидације модела CART дати су у облику вектора cv_error_cart који садржи вредности грешке за сваку од десет подскупова подела:

```
> cv_error_cart
[1] 0.4361426 0.4414697 0.4348539 0.4379951 0.4319858 0.4372354 0.4367659 0.4326687
[9] 0.4312252 0.4347173
```

Ови подаци нам показују да CART модел има просечну валидациону грешку од око 0.436, што значи да модел погрешно у предвиђању категорије дијабетеса у приближно 43% случајева на подацима који нису коришћени за тренинг. У поређењу са логистичком регресијом (где смо добили CV грешку око 0.41), CART модел показује већу грешку.

Резултати унакрсне валидације модела Random Forest дати су у облику вектора `cv_error_rf` који садржи вредности грешке за сваку од десет подскупова подела:

```
> cv_error_rf
[1] 0.4032236 0.4174293 0.4045343 0.4049440 0.4038514 0.4039066 0.4057635 0.4030320
[9] 0.4092337 0.4037148
```

Ови подаци показују да Random Forest модел има просечну валидациону грешку око 0.404, што значи да модел погрешно у предвиђању категорије дијабетеса у приближно 40% случајева на независним подацима. У поређењу са CART моделом (CV грешка ~ 0.436) и логистичком регресијом (CV грешка ~ 0.41), Random Forest показује бољу прецизност од CART-а, али и од логистичког модела који користи полиномијалне чланове за BMI. Већа тачност Random Forest-а у односу на CART је очекивана јер Random Forest користи већи број стабала и агрегира предвиђања, што смањује варијансу и чини модел робуснијим.

Финално тренирање

Сада вршимо тренирање сва три модела на основу `data_train` скупа, такво да нам касније на основу `data_test` скупа да резултујуће класификационе метрике и опише колико су одабрани модели истренирани скупом података заправо добри.

Крећемо од логистичке регресије чија једначина гласи:

```
lr_model_function = Diabetes_012 ~ BMI + Stroke + DiffWalk + CardioRiskScore +
LifestyleRiskScore + HealthScore + SocioEconomicStatus + AgeCat
```

Креирамо модел са `glm` функцијом

```
lr_model <- multinom(lr_model_function, data = data_train_balanced, trace = FALSE)
```

Модел смо истренирали са `data_train_balanced` скупом података. Када смо креирали модел, позивамо функцију `summary` која нам даје увид личну карту модела:

```
summary(lr_model)
```

Commented [MS54]: Променили смо једначину модела, обзиром да је иницијално коришћена бинарна логистичка регресија, а ми имамо вишекласну, у унакрсној валидацији се сада ова једначина показала као бољи избор (погледајте поглавље изнад за тумачење избора). У тексту испод променили су се коефицијенти модела па је дато ново тумачење у складу са истим.

```

Coefficients:
(Intercept)      BMI      StrokeDa DiffWalkDa CardioRiskScore.L
predijabetes    -2.965690 0.07108962 0.06304054 0.3038458      0.8564551
dijabetes       -3.238932 0.09101361 0.32336919 0.5833743      1.4241826
CardioRiskScore.Q CardioRiskScore.C LifestyleRiskScore.L LifestyleRiskScore.Q
predijabetes    -0.3027971      -0.05328154      -0.1284486      0.02891131
dijabetes       -0.2549974      -0.06637704      -0.5694120      -0.28202218
LifestyleRiskScore.C HealthScore.L HealthScore.Q HealthScore.C
predijabetes    -0.1053700      -0.5932912      -0.28960348      -0.3385143
dijabetes       -0.1954065      -0.6400455      0.06484718      -0.2981613
SocioEconomicStatus.L SocioEconomicStatus.Q AgeCat.L AgeCat.Q AgeCat.C
predijabetes    -0.4567775      -0.02755193 0.7359606 -0.1430001 0.003067950
dijabetes       -0.4024437      0.02805803 1.0426682 -0.4000698 0.006909903

Std. Errors:
(Intercept)      BMI      StrokeDa DiffWalkDa CardioRiskScore.L
predijabetes    0.09225833 0.001839566 0.05098783 0.02841493      0.03346606
dijabetes       0.07887305 0.001685225 0.04371865 0.02509414      0.02923302
CardioRiskScore.Q CardioRiskScore.C LifestyleRiskScore.L LifestyleRiskScore.Q
predijabetes    0.02682923 0.02027533      0.04995484      0.03874183
dijabetes       0.02366870 0.01801333      0.05216277      0.04008435
LifestyleRiskScore.C HealthScore.L HealthScore.Q HealthScore.C
predijabetes    0.02298210 0.1922744      0.1441059      0.06805488
dijabetes       0.02249111 0.1529255      0.1148317      0.05518557
SocioEconomicStatus.L SocioEconomicStatus.Q AgeCat.L AgeCat.Q AgeCat.C
predijabetes    0.02085811      0.01827039 0.03077117 0.02525056 0.02038087
dijabetes       0.01851166      0.01644015 0.03083992 0.02476230 0.01870481

Residual Deviance: 133653.3
AIC: 133725.3

```

На основу резултата логистичке регресије, видимо како различите карактеристике утичу на вероватноћу појаве предиабетеса и дијабетеса у односу на категорију „нема дијабетес“. Коефицијенти са позитивним вредностима указују да пораст те променљиве повећава шансу за појаву дијабетеса или предиабетеса, док негативни коефицијенти смањују ту вероватноћу. Повећање BMI вредности, срчани удар (StrokeDa), потешкоће у ходу (DiffWalkDa) и већи CardioRiskScore су повезани са већом вероватноћом развоја предиабетеса и дијабетеса. Са друге стране, LifestyleRiskScore и HealthScore имају негативне коефицијенте, што указује на смањење ризика тј. делују као заштитни фактор. Вредности у колони Std. Errors су релативно мале за већину променљивих, што указује на стабилност проценених ефеката. Код AgeCat вредности коефицијената су близу нуле, што указује да старосна категорија у овом моделу нема снажан директан утицај на вероватноћу дијабетеса.

AIC и residual deviance показују да модел добро описује расподелу категорија у тренинг скупу, а посматрано из перспективе предикције, све променљиве које имају велики апсолутни коефицијент имају највећи утицај на исход. Сада је на реду CART модел:

Он ће такође бити трениран скупом података data_train_balanced, креирамо га уз помоћ rpart функције која је део истоимене библиотеке предвиђене управо за креирање CART модела:

```

cart_model <- rpart(Diabetes_012 ~ BMI + Stroke + DiffWalk + CardioRiskScore +
  LifestyleRiskScore + HealthScore + SocioEconomicStatus + AgeCat,
  data = data_train_balanced,
  method = "class")


```

Сада када смо креирали модел, употребићемо функцију rpart.plot из истоименог пакета да добијемо основне податке о самом моделу:

```

rpart.plot(cart_model)

```



CART модел је идентификовао CardioRiskScore као најдоминантнији предиктор. Први праг раздвајања постављен је на вредност 0.5, где је модел са великом сигурношћу (70%) идентификовао здраве појединце. Даља гранања преко BMI и HealthScore параметара додатно су прецизирала групу са дијабетесом, док је класа предидијабетеса остала најтежа за прецизну класификацију.

Сада ћемо истренирати RF модел:

Њега као и друге моделе тренирамо скупом data_train_balanced, креирамо га уз помоћ randomForest функције, која припада истоименој библиотеци, и која је предвиђена за интеракцију са RF моделима:

```
library(randomForest)
rf_model<-randomForest(Diabetes_012 ~ BMI + Stroke + DiffWalk + CardioRiskScore +
  LifestyleRiskScore + HealthScore + SocioEconomicStatus + AgeCat,
  data = data_train_balanced,
  ntree = 500,
  importance = TRUE)
```

У овом случају, до података о утицајности варијабли унутар модела долазимо мало другачијом командом од претходне две, тј конфузионом матрицом:

```
print(rf_model$confusion)
      nema dijabetes predijabetes dijabetes class.error
nema dijabetes    21614      161    8225 0.2795333
predijabetes      4818     2589    7593 0.8274000
dijabetes         6732     177   21307 0.2448611
```

Анализа матрице конфузије Random Forest модела открива значајне разлике у прецизности класификације међу групама. Модел је показао високу успешност у идентификацији особа са дијабетесом (грешка од свега 24.5%) и здравих појединаца (грешка од 28%). Међутим, највећи изазов представља категорија предидијабетеса са стопом

грешке од 82.7%. Већина особа из ове категорије класификована је или као здрава или као оболела, што указује на чињеницу да су биометријске и животне карактеристике (попут БМИ и кардио ризика) код предиабетичара веома сличне граничним вредностима осталих класа. Ово потврђује да је за прецизнију диференцијацију предиабетеса потребно укључити додатне, специфичније клиничке параметре.

Метрике модела

Сада је потребно ова 3 модела упоредити по њиховим перформансама, за то ћемо употребити `data_test` скуп података и употребити стандардне класификационе метрике пошто се ради о класификационим моделима попут Прецизности (Precision), Опозива (Recall), F1 скорa.

Прво је потребно креирати предикције за сваки од модела:

```
lm_preds <- predict(lr_model, newdata = data_test)
cart_preds <- predict(cart_model, newdata = data_test, type = "class")
rf_preds <- predict(rf_model, newdata = data_test)
```

Након креирања датих предикција потребно је креирати конфузиону матрицу на основу њих и правих података:

```
nivoi <- levels(as.factor(data_test$Diabetes_012))

stvarni_f <- factor(data_test$Diabetes_012, levels = nivoi)
cart_f <- factor(cart_preds, levels = nivoi)
rf_f <- factor(rf_preds, levels = nivoi)

lm_f <- factor(lm_preds, levels = nivoi)

library(caret)

izvuci_sve_metrike <- function(pred, stvarni, ime_modela) {

  cm <- confusionMatrix(pred, stvarni, mode = "everything")

  izvestaj <- as.data.frame(cm$byClass[, c("Precision", "Recall", "F1")])
  izvestaj$Model <- ime_modela
  izvestaj$Klasa <- nivoi

  return(izvestaj)
}

finalna_tabela <- rbind(
  izvuci_sve_metrike(glm_f, stvarni_f, "Logisticka Regresija"),
  izvuci_sve_metrike(cart_f, stvarni_f, "Stablo (CART)"),
  izvuci_sve_metrike(rf_f, stvarni_f, "Random Forest")
)
finalna_tabela[is.na(finalna_tabela)] <- 0
```

Commented [MS55]: Уместо:

```
glm_preds_zaokruzeno <- round(lm_preds)
glm_preds_zaokruzeno[glm_preds_zaokruzeno < 0] <- 0
glm_preds_zaokruzeno[glm_preds_zaokruzeno > 2] <- 2
glm_f <- factor(nivoi[glm_preds_zaokruzeno + 1], levels = nivoi)
```

И избачен је део текста у пасусу испод који се односио на ове линије кода

```
print(finalna_tabela)
```

Како би се омогућила објективна компарација перформанси модела који генеришу различите типове излаза, **сви предикти су представљени као фактори са усклађеним нивоима категорија**. Логистичка регресија директно производи категоријске предикције, док су код модела стабала одлучивања (ЦАПТ) и Random Forest-а излазне лабеле усклађене са референтним вредностима из тест скупа. Финална евалуација спроведена је коришћењем функције confusionMatrix из пакета caret, чиме је осигурано да се метрике Precision, Recall и F1-score рачунају на идентичан начин за сваку од три посматране категорије: одсуство дијабетеса, предијабетес и дијабетес.

	Precision	Recall	F1	Model	Klasa
Class: nema dijabetes	0.93445604	0.735231350	0.822958092	Logisticka Regresija	nema dijabetes
Class: predijabetes	0.00000000	0.00000000	0.00000000	Logisticka Regresija	predijabetes
Class: dijabetes	0.30526563	0.738020981	0.431889829	Logisticka Regresija	dijabetes
Class: nema dijabetes1	0.93902775	0.639642598	0.760946894	Stablo (CART)	nema dijabetes
Class: predijabetes1	0.00000000	0.00000000	0.00000000	Stablo (CART)	predijabetes
Class: dijabetes1	0.25820508	0.789622909	0.389156711	Stablo (CART)	dijabetes
Class: nema dijabetes2	0.93706657	0.719331160	0.813888078	Random Forest	nema dijabetes
Class: predijabetes2	0.01162791	0.001083424	0.001982161	Random Forest	predijabetes
Class: dijabetes2	0.29911793	0.754749079	0.428439223	Random Forest	dijabetes

Метрике су показале да је Random Forest најефикаснији модел за класификацију дијабетеса, пружајући најбољи баланс између прецизности и осетљивости ($F1 = 0.428$). Визуелизација стабла одлучивања потврдила је да су кардиоваскуларни ризик и БМИ кључни биолошки маркери који детерминишу исход. Међутим, немогућност сва три модела да прецизно идентификују предијабетес указује на чињеницу да ова прелазна фаза болести захтева много специфичније клиничке параметре који нису обухваћени овим моделом, што представља значајан простор за даља истраживања.

Референце

[Скуп податка](#)

[Подаци о америчким нивоима примања код становништва за 2015. годину](#)

[Подаци истраживања Интернационалне Дијабетес Федерације](#)

[Истраживање распрострањености дијабетеса код деце у Србији](#)

[Информације о значењу карактеристика у скупу података](#)

[Извор боја за графике](#)

[Биваријантна анализа](#)

[Балансирање података](#)

[Избор вредности \$k\$, за \$k\$ унакрну валидацију](#)