


# SR: สิ่งกีดขวางทางเดินหายใจ

## ผู้ใหญ่หรือเด็กที่ยังคงตอบสนอง

ผู้ใหญ่หรือเด็กที่ยังคงตอบสนองไม่สามารถพูด ไอ หรือ  
งำได้ แสดงว่าอาจมีสิ่งกีดขวางทางเดินหายใจ ให้ใช้วิธี  
มลิค แมนูเวอร์ เพื่อกำจัดสิ่งกีดขวางนั้น



1. ตรวจสอบให้แน่ใจว่าผู้ประสบเหตุ  
มีอาการสำลัก



2. หาดำแหน่งสะดือแล้ววางกำปั้นของคุณ  
เหนือสะดือเล็กน้อย



3. จับกำปั้นของคุณด้วยมืออีกข้าง แล้วรัดกระตุก  
หน้าท้องจนกว่าวัตถุจะหลุดออก


ถ้าผู้ประสบเหตุไม่ตอบสนอง ให้จัดท่านอนลงบนพื้น กดหน้าอก 30 ครั้ง ตรวจสอบเช็คในปาก  
แล้วนำสิ่งที่มองเห็นได้ออก จากนั้นพายปอด 2 ครั้ง ถ้าไม่สำเร็จ ให้ทำตามขั้นตอนสำหรับ  
สิ่งกีดขวางทางเดินหายใจในผู้ประสบเหตุที่ไม่ตอบสนอง





# สิ่งกีดขวางทางเดินหายใจ ในทารกที่ยังคงตอบสนอง

หากทารกที่ยังคงตอบสนองไม่สามารถพูด ไอ หรือร้องให้  
ได้แสดงว่าอาจมีสิ่งกีดขวางทางเดินหายใจให้ทำตามขั้นตอน  
ต่อไปนี้:



1. จับที่โหนกแก้มของทารกและคว่ำหน้าของทารกลงบนแขนและขาของคุณ

2. ตบที่หลังระหว่างสะบักทั้งสองข้าง 5 ครั้ง

3. พลิกตัวทารกขึ้นบนแขนอีกข้าง แล้วกดที่หน้าอก 5 ครั้ง

4. มองเข้าไปในปากแล้วนำสิ่งที่มองเห็นได้ออก

ถ้าทารกไม่ตอบสนอง ให้จัดท่านอนลงบนพื้น กดหน้าอก 30 ครั้ง ตรวจเช็คในปาก  
แล้วนำสิ่งที่มองเห็นได้ออก จากนั้นผายปอด 2 ครั้ง ถ้าไม่สำเร็จ ให้ทำตามขั้นตอนสำหรับ  
สิ่งกีดขวางทางเดินหายใจในผู้ประสบเหตุที่ไม่ตอบสนอง

