



有机推断1

日期:	时间:	姓名:	
Date:	Time:	Name:	_

初露锋芒

燃料乙醇

燃料乙醇指以生物物质为原料通过生物发酵等途径获得的可作为燃料用的乙醇。燃料乙醇经变性后与汽油按一定比例混合可制车用乙醇汽油。

燃料乙醇生产技术主要有第一代和第二代两种。第一代燃料乙醇技术是以糖质和淀粉质作物为原料生产乙醇。其工艺流程一般分为五个阶段,即液化、糖化、发酵、蒸馏、脱水。第二代燃料乙醇技术是以木质纤维素质为原料生产乙醇。与第一代技术相比,第二代燃料乙醇技术首先要进行预处理,即脱去木质素,增加原料的疏松性以增加各种酶与纤维素的接触,提高酶效率。待原料分解为可发酵糖类后,再进入发酵、蒸馏和脱水。

我国燃料乙醇的主要原料是陈化粮和以木薯、甜高粱等淀粉质或糖质非粮作物,今后研发的重点主要集中在以木质纤维素为原料的第二代燃料乙醇技术。目前,国家发改委已核准了广西的木薯燃料乙醇、内蒙的甜高粱燃料乙醇和山东的木糖渣燃料乙醇等非粮试点等项目,以农林废弃物等木质纤维素原料制取乙醇燃料的技术也已进入年产万吨级规模的中试阶段。







根深蒂固

一、根据反应条件判断有机反应类型和有机物的类别

类型:	,类别:反应物 A:	; 生成物:	0	
辨析:如果 B	还能与	反应,说明 B 一定是醛,	而 A 一定是伯醇,	否则,说明
·定是酮,而 A	一定是仲醇。			
写出乙醇被氧	化为乙醛的化学方程式:			
2. A 新制Cu(o	$\xrightarrow{OH)_2} \mathbf{B}$			
类型:	, 类别:反应物 A:	,生成物:	o	
写出乙醛和新	制氢氧化铜反应的化学方程式:			
3. A — 浓H ₂ SO ₄	\rightarrow B			
类型 1:	,类别:反应物:	,生成物:	o	
举例:				
类型 2:		,主要生成物:	_ 0	
사는 표기 · 2	와마 C Culo	44 - P. 4 <i>ba</i>		
	; 类别:反应物:			
4. A — NaOH醇	^{溶液} →B			
类型:	; 类别: 反应物:	,生成物:	0	
5. A <u>NaOHτ</u>				
类型 1:	; 反应物:	,生成物:	o	
特点:				
举例.				



类型 2:	; 反应物:	,生成物:	0	
类型 3:	; 反应物:	,生成物:		
特点:				
类型 4:	; 反应物: _	,生成物:		o
举例:				
6. $A \xrightarrow{H_2/N_1} I$				
米刑 1.	; 反应物:		_	
			;	
生成物:				
举例:				
类型 2.	; 反应物:	. 生日	Ե幼.	
	; JX/III-1/J:		NTØ -	°
类型 3:	; 反应物:	, 4	上成物:	0
1 1 1 1 .				
145 에스 8포 그는 344 등	Ab de tale			
推断题中常见	的突破口			
一)根据反应现象	惟知官能团			
1. 能使溴水褪色	2,可推知该物质分子中可能含率	有	o	
2. 能使酸性高铅	孟酸钾溶液褪色 ,可推知该物质。	分子中可能含有		
	o			
4. 加入新制氢氧	【化铜悬浊液,加热,有红色沉液	淀生成 ;或加入银氨	(溶液有银镜生成,	可推知该
。贝	该物质可能为	o		
5. 加入金属 Na	放出 H ₂ ,可推知该物质分子结构	构中含有	0	
6. 加入 NaHCO	溶液产生气体,可推知该物质。	分子结构中含有		o
7. 能与碳酸钠化	E用生成气体的物质,含有)	
8. 加入溴水,出	出现白色沉淀,可推知该物质为_		<u> </u>	



(二)根据反应产物推知官能团位置

1. 若由**醇氧化**得醛或羧酸,可推知-OH-定连接在有2个氢原子的碳原子上,即存在-CH₂OH;由醇

文 (СНОН 氧化为酮,推知—OH 一定连在有 1 个氢原子的碳原子上,即存在 ; 若醇不能在催化剂作用下被氧化,则—OH 所连的碳原子上无氢原子。

- 2. 由消去反应的产物,可确定-OH或-X的位置
- 3. 由**取代反应产物的种数**,可确定碳链结构。如烷烃,已知其分子式和一氯代物的种数时,可推断其可能的结构。有时甚至可以在不知其分子式的情况下,判断其可能的结构简式。

(三)根据反应产物推知官能团个数

- 1. 与银氨溶液反应,若 **1mol 有机物生成 2mol 银**,则该有机物分子中含有______; 若生成 **4mol 银**,则含有 。
- 2. 与金属钠反应,若 **1mol 有机物生成 0.5molH**₂,则其分子中含有一个活泼氢原子,可能为_______, 或 ,也可能为 。
 - 3. 与碳酸钠反应,若 1 mol f机物生成 0.5molCO_2 ,则说明其分子中含有。
 - 4. 与碳酸氢钠反应, 若 1mol 有机物生成 1molCO₂,则说明其分子中含有。

三、掌握重要有机反应类型及原理

$$A_{1}^{1}\underline{x} + B_{1}^{1}Y \rightarrow A-Y + B-x$$

1. 取代反应: 原理可简述为: "有进有出"图示为

包含: 烷烃的卤代(扩展到饱和碳原子的特征反应), 醇和氢卤酸的反应, 苯的溴代、硝化, 苯酚和溴水的反应, 广义说, 酯化、水解也可归属此列。

$$\begin{array}{ccc} A = \stackrel{\nwarrow}{B} + x - \stackrel{\nearrow}{y} \longrightarrow A - \stackrel{\rightharpoonup}{B} \\ \stackrel{\downarrow}{\downarrow} & \stackrel{\downarrow}{y} \end{array}$$

2. 加成反应: 原理可简述为: "有进无出"

包含:烯烃、炔烃、苯环、醛等加 H_2 ,烯烃、炔烃等加 X_2 ,烯烃、炔烃等加HX,烯烃、炔烃等加 H_2O 等等。加成反应是不饱和碳原子的特征反应之一。

$$\begin{array}{ccc}
A & \xrightarrow{-\mathbb{E} \$ + \mathbb{F}} & A = B + x - y \\
\downarrow x & y & & & & \\
X & y & & & & & \\
\end{array}$$

3. 消去反应: 原理可简述为:

包含: 醇分子内脱水生成烯烃, 卤代烃脱 HX 生成烯烃。



0 0 4.酯化反应: R-C+ŌḤ+Ḥ-O-R' ⇌ R-C-O-R' +H₂O


$$A - B + H - OH \longrightarrow A - OH + H - B$$

5. 水解反应:

- 6. 氧化反应
- (1) 定义: 有机化合物分子中增加氧原子或减少氢原子的反应称为氧化反应。
- (2) 举例: 2CH₃CHO + O₂→2CH₃COOH
- 7. 还原反应
 - (1) 定义:有机化合物分子中增加氢原子或减少氧原子的反应称为还原反应。
 - (2) 举例: CH₃CHO + H₂ → CH₃CH₂OH

四、弄清常见有机物之间的相互转化关系,并掌握方程式

掌握各类有机物间的相互联系,使有机化学知识形成体系。各类链烃及其衍生物间的关系可表示如下:







枝繁叶茂

知识点 1: 根据数据处理,进行推断

通过对题目中已知的一些数据,如有机物的分子式、同分异构体的数目、反应时各反应物的个数比等进行处理,来确定有机物的结构简式。

- 【**例1**】某有机物 4.6 克完全燃烧生成标准状况下二氧化碳 2.24 升和 1.8 克水,其蒸气的密度 2.054 克/升(标准 状况),求:
 - (1) 推测该有机物的分子式
 - (2)又知该有机物能与乙醇发生酯化反应,试推测有机物的分子结构,并写出发生酯化反应的化学方程式。

变式 1: 烃的含氧衍生物 A 的分子量是 72,分子里共有 38 个质子,充分燃烧 1 molA 需 3molO_2 , A 可使溴水 褪色,使石蕊试液变红,求有机物的分子式,并写出 A 发生加聚反应的化学方程式。

变式 2: 某有机物 A 中只含碳、氢、氧三种元素,相对分子质量为 102, 氢元素的质量分数为 9.8%, 分子中氢原子个数为氧的 5 倍.

- (1) A 的分子式为 。
- (2) 若 A 为酯类物质,在酸性条件下水解,生成两种相对分子质量相同的有机物,则 A 的结构简式可能为
- (3) 若 A 为羧酸,可由醇 B 氧化得到, A 和 B 可以生成酯 C,符合这些条件的酯只有____种,请写出其中一种酯的结构简式:
- (4) 若 A 中有 2 个不同的含氧官能团,并含有 2 个甲基,不能发生消去反应的结构简式为:



知识点 2: 利用有机物的性质推断

有机物性质是与其所具有的官能团相对应的,可根据有机物的某些性质(如反应对象、反应条件、反应数据、反应特征、反应现象、反应前后分子式的差异等等),首先确定其中的官能团及位置,然后再结合分子式价键规律、取代产物的种类等确定有机物的结构简式,再根据题设要求进行解答。


【例2】有	机物 A(C ₆ H ₈ O ₄)为食	品包装纸的常用防	离剂。A 可以使溴水	褪色,且难溶于水,	但在酸性条件可发
生水解反应	Z, 得到 B(C ₄ H ₄ O ₄)和	1甲醇。通常状况下	B为无色晶体,能与	氢氧化钠溶液发生质	
(1)A □	丁以发生的反应有		_(选填序号)。		
<u> </u>)加成反应	②酯化反应	③加聚反应	④氧化反应	
(2)B 分)子所含官能团的名词	弥是	`	0	
(3)B 分)子中没有支链,其约	吉构简式是	,B 的	具有相同官能团的同	引分异构体的结构简
	0				
(4)由 I	B 制取 A 的化学方程	式是			°
变式 1: 某	有机物 X 的分子式	为C ₄ H ₈ O ₂ ,X在酸	生条件下与水反应,	生成两种有机物Y系	IZ, Y 在铜催化下
被氧化为V	W,W 能发生银镜反	应.			
(1)	X 中所含的官能团是	(填名称).			
(2)	写出符合题意的 X 的	的结构简式		0	
(3)	若Y和Z含有相同	的碳原子数,写出	下列反应的化学方程:	式: Y 与浓硫酸的混	是合物共热发生消去
反应_			o		
W ±	同新制 Cu(OH)₂反应			o	
(4)	若 X 的某种同分异构	7体能使石蕊变红色	,可能有种	0	
变式 2: A	是一种酯,分子式是	E C ₁₄ H ₁₂ O ₂ , A 可以	由醇 B 跟羧酸 C 发生	酯化反应得到。A 不	下能使溴水褪色,氧
化B可得到	刊 C。				
(1)	写出 A、B、C 的结构	勾简式: A		C	
(2)	写出 B 的两种同分	7异构体的结构简	式(它们都可以和	NaOH 反应):	和
	o				



知识点 3: 简单框图类推断题

由一些特殊的反应条件及反应现象入手,推断出对应的反应类型、反应物的官能团,生成物的种类等。

【例3】根据图示完成下列问题。




- (1) 化合物 A 含有的含氧官能团是。
- (2) 1 mol A 与 2 mol H₂ 反应生成 1 mol E, 其反应方程式是
- (3)与 A 具有相同官能团的 A 的同分异构体的结构简式是。
- (4) B 在酸性条件下与 Br₂ 反应得到 D, D 的结构简式是。
- (5) F 的结构简式是 _____。由 E 生成 F 的反应类型是

变式 1: A 是烃的含氧衍生物,能发生以下变化(B中无不饱和键):

现知 12 克 B 与足量金属钠反应,在标准状况下放出 2.24 升氢气,试写出各物质的结构简式

变式 2: 乙烯是一种重要的化工原料,以乙烯为原料衍生出部分化工产品的反应如下(部分反应条件已略去):



请回答下列问题:

- (1) A 的化学名称是____ ;
- (2) B和A反应生成C的化学方程式为

,该反应的



类型为	
∠ EZE TO	
ハエバ	•

(3)	D的结构简式为	; (4) F 的结构简式为	
くりノ	ひ 1012年191月14月21	; (サノ I ロ) (4 7 円 1 円 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	:

(5) D的同分异构体的结构简式为。



瓜熟蒂落

1.	(双选) 某有机物的分子	式为 C ₅ H ₁₀ O,	它能够发生银镜反应和加成反应,	若将它与 H ₂ 加成,	所得产物结
	构简式可能是 ()			

A. (CH₃)₂CHCH(CH₃)OH

B. (CH₃)₂CH CH₂OH

C. $CH_3CH_2C(CH_3)_2OH$

D. CH₃(CH₂)₃CH₂OH

2. 分子式为
$$C_{10}H_{14}$$
 的苯的同系物,其苯环上有 4 个甲基,符合条件的结构有 (

A. 2种

B. 3种

C. 4种

D. 5种

3. 某一有机物 A 可发生下列变化

$$A(C_{\delta}H_{12}O_{2}) \xrightarrow{\text{NaOH} \\ \text{$\stackrel{\sim}{\triangle}$}} B \xrightarrow{\text{HCl}} C$$

已知 C 为羧酸, 且 C、E 不发生银镜反应,则 A 的可能结构有 ()

8A. 4种

B. 3种

C. 2种

D. 1种

4. 某酯的分子式是
$$C_{n+3}H_{2n+4}O_2$$
,它是分子式为 $C_nH_{2n-2}O_2$ 的 A 与有机物 B 反应生成物,B 的分子式是()

A. C₃H₆O

B. $C_3H_6O_2$

 $C. C_3H_8O$

D. C_2H_6O

A. $CH_2 = CHCOOH$

B. $CH_2 = CHCHO$

C. $CH_2 = CHCH_2OH$

D. $CH_2 = CHCOOCH_3$

6. 有 A、B、C 三种有机物, B 用氢气还原生成 D, A 的水解产物之一也是 D, 另一产物与硝酸、硝酸银混和液反应,生成黄色沉淀。B 氧化后生成 E, C 的水解产物之一也是 E, 另一种产物是 D。E 既能与碳酸钠溶液反应,又能与银氨溶液反应。



	(1)结构简式: A 是; B 是; C 是。
	(2)化学方程式:
	B→D 是;
	A 的水解反应是;
	C 的水解反应是。
7.	羧酸 A (分子式为 $C_5H_{10}O_2$)可由醇 B 氧化得到, A 和 B 可以生成酯 C (相对分子质量为 172),符合这些条件的酯只有 4 种。请写出这 4 种酯的结构简式:
	°
8.	有以下一系列反应,最终产物是乙二酸.
	$A \text{$
答]	下列问题:
	(1) C 的结构简式是 B→C 的反应类型是, E→F 的化学方程式是
	· (2) E 与乙二酸发生酯化反应生成环状化合物的化学方程式是


9. A 是一种苯的邻位二取代物,相对分子质量为 180,有酸性。A 水解生成 B 和 C 两种酸性化合物, B 的相对分子质量为 60, C 能溶解于 NaHCO3 溶液,并能使 FeCl3 溶液显紫色(已知酸性大小:羧酸>碳酸>酚>水)。试推断 A、B、C 的结构简式。

10. 已知碳碳双键可以被臭氧氧化,反应如下:




构体的结构简式。

- (2) 这三步反应的反应类型是____、__、__、___、___。
- (3) 写出最后一步反应的反应方程式。
- 11. 环己醇()是一种有机化工基础原料,工业上的主要合成途径及有关反应如下:



已知: A、C 都是芳香族化合物。

- (1) A 的名称是 , 写出 A 在生活或生产中的一种用途(制环己醇除外) 。
- (2) C 的结构简式是______; 反应②的反应类型是______
- (3) 下列检验由反应④制取的环己烯是否纯净的方法中,合理的是。
 - a. 测定沸点 b. 用金属钠 c. 用 FeCl₃ 溶液 d. 用高锰酸钾溶液
- (4) 写出反应⑤和⑥的化学方程式
- 12. 异戊二烯(C₅H₈)是橡胶工业的重要原料。工业上有多种合成方法,其中两种如下:



根据题意回答下列问题:

(1)A的结构简式为____。已知B可作为生产高分子导电材料的原料,则B的名称是

_。反应①的反应类型是____。

- (2)反应②的化学方程式为
- (3)丁基橡胶是由异戊二烯与 2-甲基丙烯共聚生成,写出该橡胶的结构简式____。

还有_____(填结构简式)(已知 > C=C=C < 不稳定)。