


(a)


纯因子协方差
Ledoit–Wolf 协方差
因子数 k 下移一格
因子数 k 上移一格
收缩强度 κ 下移一格
收缩强度 κ 上移一格
风格专属对角方差缩放
并列块潜变量改用平均秩正态得分
化学缺失值编码到最低位
附件 1 替换为附件 8 的 80 个单元格
0.0
0.1
合并两样本分类检验（C2ST）
曲线下面积（AUC）
配对差（敏感性设定 − 基线）
95% 配对区间


(b)


纯因子协方差
Ledoit–Wolf 协方差
因子数 k 下移一格
因子数 k 上移一格
收缩强度 κ 下移一格
收缩强度 κ 上移一格
风格专属对角方差缩放
并列块潜变量改用平均秩正态得分
化学缺失值编码到最低位
附件 1 替换为附件 8 的 80 个单元格
-0.025
0.000
0.025
生成样本训练、真实样本测试（TSTR）
风格判别准确率
配对差（敏感性设定 − 基线）
95% 配对区间


(c)


纯因子协方差
Ledoit–Wolf 协方差
因子数 k 下移一格
因子数 k 上移一格
收缩强度 κ 下移一格
收缩强度 κ 上移一格
风格专属对角方差缩放
并列块潜变量改用平均秩正态得分
化学缺失值编码到最低位
附件 1 替换为附件 8 的 80 个单元格
-0.05
0.00
问题二模块内化合物对
平均 Spearman
配对差（敏感性设定 − 基线）
95% 配对区间


(d)


纯因子协方差
Ledoit–Wolf 协方差
因子数 k 下移一格
因子数 k 上移一格
收缩强度 κ 下移一格
收缩强度 κ 上移一格
风格专属对角方差缩放
并列块潜变量改用平均秩正态得分
化学缺失值编码到最低位
附件 1 替换为附件 8 的 80 个单元格
-0.005
0.000
0.005
风格内相关误差
（Spearman 矩阵
逐元素绝对差均值）
配对差（敏感性设定 − 基线）
95% 配对区间


(e)


删除 4 个综合求和列的对照模型
综合指标只用岭回归预测
候选选择改用生成器后验最大 α
阈值口径改为中位
化学层规则改为严格不增加
感官层规则：连续预测不升高
不设感官层约束
问题 1 映射改为分位数切点
缺失值最低位编码的生成器重跑迁移（11 款啤酒）
附件 8 取值的生成器重跑迁移（11 款啤酒）
平均秩正态得分的生成器重跑迁移（11 款啤酒）
-1.0
-0.5
0.0
11 款啤酒的最大可行迁移强度 α*
中位数
配对差（敏感性设定 − 基线）


(f)


删除 4 个综合求和列的对照模型
综合指标只用岭回归预测
候选选择改用生成器后验最大 α
阈值口径改为中位
化学层规则改为严格不增加
感官层规则：连续预测不升高
不设感官层约束
问题 1 映射改为分位数切点
缺失值最低位编码的生成器重跑迁移（11 款啤酒）
附件 8 取值的生成器重跑迁移（11 款啤酒）
平均秩正态得分的生成器重跑迁移（11 款啤酒）
-0.10
-0.05
0.00
11 款啤酒的目标风格为 Tripel
的概率中位数
配对差（敏感性设定 − 基线）

(g)


删除 4 个综合求和列的对照模型
综合指标只用岭回归预测
候选选择改用生成器后验最大 α
阈值口径改为中位
化学层规则改为严格不增加
感官层规则：连续预测不升高
不设感官层约束
问题 1 映射改为分位数切点
-1.0
-0.5
0.0
462 个风格对的最大可行迁移强度 α*
中位数
配对差（敏感性设定 − 基线）

(h)


删除 4 个综合求和列的对照模型
综合指标只用岭回归预测
候选选择改用生成器后验最大 α
阈值口径改为中位
化学层规则改为严格不增加
感官层规则：连续预测不升高
不设感官层约束
问题 1 映射改为分位数切点
0.00
0.05
0.10
462 个风格对中
约束起作用比例
配对差（敏感性设定 − 基线）