Skema findes og udfyldes i SP

Patientlabel

Hospital_____ Afdeling_____ Dato/år_____ Skema nr._____

Opioid Abstinensskema -

Clinical Opiate Withdrawal Scale (COWS)

Kilde: Sundhedsstyrelsen

Sæt cirkel omkring tallet, der bedst beskriver patientens tegn på symptomer. Bemærk – der kan være tilfælde, hvor scoren kan være kunstig høj – f.eks. pulsen, hvis patienten har været aktiv lige før målingen.

Parameter *Patientens navn:* *Behandlingens startdato:*	*Baseline* *Observation* *Administration af* *1. dosis* *..... mg* *Klokkeslet*	*1. dosis* *1. observation* *..... minutter* *efter 1. dosis*	*1. dosis* *2. observation (om nødvendigt)* *..... minutter* *efter 1. dosis*
HVILEPULSFREKVENS ____ SLAG/MIN *Måles, mens patienten sidder eller ligger ned* *Måletid: 1 minut* 0 Pulsfrekvens 80 eller derunder 1 Pulsfrekvens 81-100 2 Pulsfrekvens 101-120 4 Pulsfrekvens større end 120	0 1 2 4	0 1 2 4	0 1 2 4
SVEDETURE *For de sidste 30 minutter, kan ikke tilskrives rumtemperatur eller patientaktivitet* 0 Ingen kulderystelser eller rødmen 1 Patienten beskriver kulderystelser eller rødmen 2 Rødmen eller synlig fugt i ansigtet 3 Svedperler i øjenbryn eller ansigtet 4 Sveden løber ned over ansigtet	0 1 2 3 4	0 1 2 3 4	0 1 2 3 4
URO/RASTLØSHED *Observation under vurdering* 0 Kan sidde stille 1 Patienten siger, det er svært, men ikke umuligt at sidde stille 3 Hyppige skiftende eller umotiverede bevægelser af ben/arme 5 Kan ikke sidde stille mere end nogle få sekunder	0 1 3 5	0 1 3 5	0 1 3 5
TREMOR/RYSTEN *Observation af udstrakte hænder* 0 Ingen tremor 1 Tremor kan føles, men ikke observeres 2 Synlige tegn på let tremor 4 Udtalt(e) tremor eller muskeltrækninger	0 1 2 4	0 1 2 4	0 1 2 4
PUPILSTØRRELSE 0 Pupiller er sammentrukne eller har normal størrelse for aktuel belysning 1 Pupillerne er muligvis større end normalt for aktuel belysning 2 Pupillerne er moderat dilaterede 5 Pupillerne er så dilaterede, at kun kanten af iris kan ses	0 1 2 5	0 1 2 5	0 1 2 5

Parameter	*Baseline Observation*	*1. dosis 1. observation*	*1. dosis 2. observation*
Mave-TARM-systemet *For de sidste 30 minutter* 0 Ingen mave-tarm-symptomer 1 Mavesmerter 2 Kvalme eller løs afføring 4 Opkastning eller diarré 5 Mange gange med diarré eller opkastning	0 1 2 3 5	0 1 2 3 5	0 1 2 3 5
ÆNGSTELSE ELLER IRRITABILITET 0 Ingen 1 Patienten rapporterer om tiltagende irritabilitet eller ængstelse 2 Patienten er tydeligt irritabel/ængstelig 4 Patienten er så irritabel/ængstelig, at det vanskeliggør vurdering	0 1 2 4	0 1 2 4	0 1 2 4
KNOGLE- ELLER LEDSMERTER *Hvis patienten havde smerter i forvejen, så vurder kun den yderligere del, der kan tilskrives opioidabstinenser* 0 Ingen smerter 1 Mildt diffust ubehag 2 Patienten rapporterer om stærke, diffuse led/muskel-smerter 4 Patienten masserer led eller muskler og kan ikke sidde stille p.g.a. ubehag	0 1 2 4	0 1 2 4	0 1 2 4
GABEN *Observation under hele vurderingen* 0 Ingen gaben 1 Kun gaben en eller to gange under vurderingen 2 Gaben tre gange eller mere under vurderingen 4 Gaben flere gange/minut	0 1 2 4	0 1 2 4	0 1 2 4
LØBENDE NÆSE ELLER TÅREFLÅD *Som ikke kan tilskrives forkølelsessymptomer eller allergi* 0 Forefindes ikke 1 Stoppet næse eller usædvanligt fugtige øjne 2 Løbende næse eller tåreflåd 4 Markant løbende næse eller tårer, der løber ned ad kinderne	0 1 2 4	0 1 2 4	0 1 2 4
GÅSEHUD 0 Huden er glat 3 Let gåsehud eller hårene på armene har rejst sig 5 Markant gåsehud	0 1 5	0 1 5	0 1 5
Samlet score _____ Den samlede score er summen for alle 11 punkter *5 – 12 = milde *13 – 24 = moderate *25 – 36 = svære *>36 = meget svære	_____	_____	_____