

FORSTOPPELSE

NATURLIG BEHANDLING
FOR FORSTOPPELSE



SMÅSPISTE BARN

1-3

FORSTOPPELSE

4

HVOR OFTE SKAL MAN
GÅ PÅ DO

5

HVORFOR BLIR BARN
FORSTOPPET

6

BARNET ER FORSTOPPET, HVA
NÅ?

7

SPISE LITE AV VS SPIS MER AV

8-9

FIBER OG VANN

10-11

BEVEGELSE OG RO

12-14

BEHANDLING

15-16

SMOOTHIE OPPSKRIFTER

17

MASSASJE

FORSTOPPELSE

Hva er egentlig forstoppelse? For barn er denne definisjonen ikke så klar. Et normalt avføringsmønster hos barn er vanskelig å fastlå da det er store variasjoner og både det å gå på do flere ganger daglig sammen med å gå på do 1 gang i uken er ansett som normalt. Helsenorge skriver:

“Avføringsmønsteret avhenger av alder og ernæring, og det er stor variasjon innenfor det som regnes som normalt så lenge barnet ellers er i fin form. Selv ved normalt mønster kan man ikke utelukke forstoppelse fordi konsistens er et vel så viktig tegn.”

Mens NHI skriver

“Det er store forskjeller når det gjelder hvor ofte barn har avføring. Enkelte kan gå flere ganger daglig på do, andre en gang i uken.”

Men du kan tenke deg selv hvordan det føles å skulle gå på do 1 gang i uken..ikke spesielt godt, og det syntes nok heller ikke barnet ditt. Selvom barnet virker i god form og ikke klager på magesmerter så kan det skyldes at barnet ikke kjenner til noe annet og derfor ikke vet at det ikke kjennes ut "riktig". Avføring er kroppens måte å kvitte seg på med avfallstoffer (både gamle celler, matrester og miljøgifter) og blir dette liggende i kroppen over lengre tid vil toksinene kunne vandre tilbake inn i kroppen. En sunn tarm er en tarm med avføring hver dag. Det skal være lett å raskt å gå på do.

DETTE BØR DU TENKE PÅ NÅR DU SKAL SJEKKE OM BARNET ER FORSTOPPET

Hvordan ser avføringen ut
Hvor lang tid tar det å gå på do
Hvor ofte går barnet på do
Hvordan føles det
Hvordan lukter det
Synker eller flyter den
Legger den igjen merker

Avføringen skal se ut som en fin lang pølse, det skal ikke være store synlige klumper av mat

Det skal ikke være anstrengende/smertefullt å gå på do.

Man skal gå på do minst 1 gang pr dag

Det skal ikke ta lang tid

Det skal være minimalt med lukt og lukten skal bli borte relativt raskt

Det skal ikke være større merker i doskålen.

Avføringen skal ikke flyte da det kan være tegn på mye gass, som igjen tyder på problemer med fordøyelsen eller en infeksjon

Bristol Stool chart et et skjema du kan bruke for å se etter hvordan avføringen bør se ut og hva som kategoriserer som forstoppelse eller diare.



Det er også viktig å poengtere at det skal ikke finnes blod i avføringen. Rødt blod tyder på at det er ferskt og kan skyldes rift i enten tarmen eller endetarmsåpningen. Svart avføring eller mørke flekker i avføring kan tyde på størknet blod.

Barn som har først en del fast avføring avsluttet med en del løs/diare eller at avføringen er pølseformet, men med løse kanter kan også ha forstoppelse. Dette kalles da forstoppelsesdiare.

GÅ PÅ DO MINST 1 GANG PR DAG

I tarmen har vi flere bakterier enn celler. Om du har avføring som sitter i tarmen så vil bakteriene spise dette. Når bakteriene metaboliserer dette vil de skille ut gass som et biprodukt. Det vil gjøre oss både fulle av luft som vi må få ut (mye prompting) og magen kan bli oppblåst. Dette i seg selv kan føre til både ubehag og smerter. Bakteriene kan også danne andre metabolitter (altså biprodukter etter at de selv har spist og fordøyd noe) som vil gå lenger ned i tarmen og kan skape inflammasjon. Eks så kan dette føre til en reduksjon i stoffet GABA. lave verdier av GABA kan føre til depresjon, dårlig søvn, angst og uro/mangel på konsentrasjon.

Det kan også føre til at det blir fler metan produserende bakterier som fører til lite bevegelse i tykktarmen som igjen fører til mer forstoppelse. En ond sirkel med andre ord. God bevegelse er helt essensielt for tarmen da det er via sammentrekkbare bevegelser at den får innholdet nedover til sin endestasjon (rektum). Ved mindre bevegelse vil det føre til en lengre passasje tid som igjen fører til mer forstoppelse.

HVORFOR BLIR BARN FORSTOPPET

Det finnes flere grunner til hvorfor barnet ditt kan bli forstoppet, men som oftest er det enten noe med kostholdet som skaper problemer (f eks en allergi eller intoleranse), ubalanse i tarmen pga antibiotikabruk eller for lite fiber og for mye forstoppende mat. Det kan også sees i sammenheng med visse diagnoser, f eks barn på autismespekteret.

DE VANLIGSTE ÅRSAKENE TIL FORSTOPPELSE:

Væsketilførsel → Hvis barnet drikker for lite vil væsken trekkes ut av avføring og urin og føres tilbake til kroppen. Dette kan gjøre avføring tørr og hard og vanskelig å få ut.

Stress → stress påvirker både peristaltikken aka bevegelsen av tarmen og celledaget i tarmen. Dette celledaget er det eneste tynne laget vi har av celler som skiller tarmen fra resten av kroppen og det beskytter fra å få inn fremmedelementer inn i kroppen. Blir dette laget skadet eller svekket får vi det som kalles for lekk tarm. Skade på celledaget kan også komme av miljøgifter vi for i oss.


Emosjonelt → barn kan holde igjen fordi de ikke føler seg komfortable med å gå på do utenfor hjemmet. F eks vanlig å se når barnet går over til å gå på skole. Men for noen barn kan det også være stressende å slutte med bleie og de begynner å holde igjen.

BARNET ER FORSTOPPET, HVA NÅ?

Det viktigste vi som foreldre kan gjøre når barnet vårt har forstoppelse er å :

Finne ut om det er mat barnet ikke tåler (enten allergi eller intoleranse) og dermed fjerne den maten som gir forstoppelse, jobbe med å gjeninnføre gode bakterier til tarmen og fjerne mat som virker forstoppende og legge til mat som hjelper på lettere passasje i tarmen.

På neste side finner du mat som er forstoppende og mat som fremmer fordøyelse. Bruk dette som en veiledning når du gir barnet ditt mat. Mange matvarer er sunne og gode på den listen med forstoppende mat. Det handler ikke om at barnet ikke skal spise noe av disse matvarene, men i den perioden dere jobber med å løse forstoppelsen bør det være et betydelig høyere inntak av maten som ikke er forstoppende.



Spis lite VS Spis mer

Alle former for
meieriprodukter

Banan

Sukker

Stivelsesrikematvarer
(eks ris)

Brød

Stivelsesrike grønnsaker
(potet, søtpotet, squash)

Kjøtt

Hermetisert og høyt
varmebehandlet frukt
(Slik som klemmeposer,
kjøpt smoothie)

Fersken

Plommer

Svisker

Linfrø

Ingefær

Fullkornsprodukter
de fleste grønnsaker

Bær og frukt

Nøtter og frø

Belgfrukter

Kiwi

FIBER & VANN

FIBER

Fiber er viktig fordi det er det som er maten for det vi anser som gode/ fordelaktig bakterier i tarmen. Når vi spiser fiber er dette mat for bakterier som produserer butyrat som en metabolitt. Butyrat er supert fordi det er som en god energi kilde for tarm cellene. Dette vil både hjelpe tarmen og det vil også hjelpe på å normalisere atferdsendringer som mange barn med forstoppelse opplever. Det er nemlig slik at tarmbakterienes endeprodukter etter metabolisering (spising) er kort kjedede fettsyrer og disse påvirker både vår helse også vår atferd. Om det er en positiv eller negativ påvirkning kommer an på hva slags bakterie som produserer hvilken metabolitt.

TILSETT GRØNNSAKER, LINSER OG BØNNER I:

- Pannekaker
- Smoothie
- Muffins
- Sauser
- Lasagne
- Supper



VANN

Nok vann kan av og til løse hele utfodringen med forstoppelse. Vann bør tilbys til alle måltid fremfor annen drikke. Syntes ikke barnet at vann er så spennende?

- Legg til noen dråper stevia i vannet
- Lag isterninger med frukt i
- Lag isterninger med farge i (naturlig ikke konditor farge fra f.eks. rawnice)



BEVEGELSE OG RO

Å bevege seg hjelper for å få i gang bevegelse på tarmen. Gå enten en tur i skogen eller få barnet med på en morsom lek. Hva med å lage en hinderløype i stuen hvor man må sette seg ned (squats), hoppe, krype ect.

Barneyoga kan også være morsomt. Det finnes en del ulike videoer på youtube, disse er ofte på engelsk, men de er fargerike og morsomme og barnet kan følge etter instruktøren.

RO

Vi har frem til nå snakket om kosthold som “bremser” eller senker motiliteten og kosthold som fremmer motilitet. Men motilitete er også drevet/ styrt av hjernen og det er derfor viktig av barnet kan slappe helt av når det skal gå på do.

Har barnet hatt en eneste negativ opplevelse (slik som en veldig smertefull eller stor avføring eller episode med mange dager uten å fått gått på do) kan det ha skapt frykt nok til å gå på do at barnet begynner å holde igjen.

PRØV DETTE.

Barnet kan visualisere seg at det går på do

Bio breathing → puste med magen, dype pust. Sjekk denne videoen for instruks.

Fokuset må være å gå på do. Legg vekk alle distraksjoner som bøker, leker, skjermer, men du kan f eks sette på musikk om barnet syntes det er ok. Det kan føre til enda mer treghet. Ikke vente med å gå på do altså å holde igjen, skap heller gode dorutiner.

Om barnet holder igjen skap en rutine med når barnet har pleid å gå på do, feks på morgenen og la barnet sitte minst 10 min på do. Forsøk å slapp av, demp belysnings ect ikke skap stress rundt situasjonen. Snakk med barnet ditt.

BEHANDLING

Magnesium citrate →

kan hjelpe på bevegelsen i tarmen. Denne formen for magnesium er best å ta kun i tilfellet om barnet har kronisk forstoppelse. Dette bør ikke erstatte de andre forbedringene og kan heller gis som et tillegg når de andre tiltakene er tatt i bruk først, men ikke hjelper tilstrekkelig.

Dosering: 5 x vekten til barnet (i mg).

Gi frem til avføringen har blitt myk og lett å passere.

Probiotika →

Har barnet tatt antibiotika og spesielt flere ganger vil dette her nesten alltid være et problem. Men de aller fleste med forstoppelse trenger tilskudd av probiotika.

Du kan få tak i gode probiotika på helsekost eller så er Ion gut support her veldig fin og effektiv og Dandelion dråper fra Herbharm er også veldig bra for tarmen og lever.

Begge kan kjøpes via Iherb.

Et annet probiotika tilskudd som er et av de beste på markedet er Megasporebiotic. Raw probiotics er også god for en stabil tarm. Bruk dosering som står på pakkene.



BEHANDLING

Vitamin C →

Har barnet kronisk forstoppelse kan man forsøke å gi 250-500 mg C vitamin pr dag. Dette bør ikke gis små babyer.

Gi frem til avføringen har blitt myk og lett å passere. Ikke bruk mer enn 3-4 uker. Ikke alle reagerer på C vitamin, da kan man prøve en klyster.

Linfrø →

Bruk hele linfrø og knus de og strø over youghurt, middag, smoothie ect.

Dosering: start med 1 ts og jobb deg opp mot 1 ss. Bør gis daglig.

Bitterstern →

Disse dråpene hjelper velkdig mye på fordøyelsen og kan gjøre det lettere å fordøye maten. Bruk dosering som står på flasken og gi før måltid.

Epsomsalt bad →

Har du ikke badekar bruk fotbad. Gjør dette 2-3 ganger pr uke.

For barn under 30 kg : Bruk 100 ml epsomsalt

Barn over 30 kg kg: Bruk 200 ml epsomsalt.

BEHANDLING

Urter for bedre tarmpassasje→


Du kan prøve å legge til disse naturlige urtene som bidrar til lettere passasje av tarminnhold. De er ment til barn over 2 år. Følg dosering som står på flasken. De hetter Pottyways og kan bestilles på Iherb.



Klyster→

Av og til når det har vært utfordringer med forstoppelse lenge kan det være nødt til å bruke klyster 1-2 ganger for å få i gang systemet. Etter at klyster har blitt brukt så går man over til de andre formene for behandling nevnt over.

Da er denne fin å bruke til barn : Pedia -Lax enema og får barn over 12 år kan Fleet Saline Enema brukes. Begge kan kjøpes på nett.



OPPSKRIFTER PÅ SMOOTHIER

Smoothie med bær mot forstoppelse →

Passert fra 12 mnd

Gir ca 6 glass

DU TRENGER:

- 120 ml eplejuice
- 2 svsker uten stein
- 4 dadler uten stein
- 120 ml kefir fullfett
- 1/2 ts hampfrø
- 1 ss chia frø
- 200 g blåbær
- 6-8 jorbær
- 1 ss flytende kokosolje
- 1/2 ts kanel
- 3-4 isterninger (kan sløyfes)

FREMGANGSMÅTE

Hell i først det flytende og deretter de harde ingrediensene i en blender. Bland sammen til alt er helt jevnt. Server kaldt om barnet er sensitivt for smak. Server ca 60-80 ml pr gang. Server med en gang eller frys ned til smoothie is. Server ca Gi 1-3 ganger pr dag så lenge dere har problemer med forstoppelse.

OPPSKRIFTER PÅ SMOOTHIER

Sviske smoothie→

Passert fra 12 mnd

Gir ca 2 glass

DU TRENGER:

- 120 ml koksmelk
- 120 ml sviskejuice
- 1 stor blad grønnkål/ eller en håndfull
- 60 g frysste bær
- 200 g blåbær
- 1 ts linfrø knust
- Tilsett probiotika den fra Raw probiotics vist på side 13 er fin, eller bruk fra helsekost.

FREMGANGSMÅTE

Hell i først det flytende og deretter de harde ingrediensene i en blender. Bland sammen til alt er helt jevnt. Server kaldt om barnet er sensitivt for smak. Server ca 60-80 ml pr gang. Server med en gang eller frys ned til smoothie is. Server ca Gi 1-3 ganger pr dag så lenge dere har problemer med forstoppelse.

OPPSKRIFTER PÅ SMOOTHIER

Smoothie mot forstoppelse→

Passert fra 12 mnd

Gir ca 2 glass

DU TRENGER:

- 120 ml kokosmelk
- 120 ml kefir
- 60 g fryste bær (blåbær og jordbær)
- 2 ts chiafrø
- 3 svsker uten stein
- 3 dadler uten stein

FREMGANGSMÅTE

Hell i først det flytende og deretter de harde ingrediensene i en blender. Bland sammen til alt er helt jevnt. Server kaldt om barnet er sensitivt for smak. Server ca 60-80 ml pr gang. Server med en gang eller frys ned til smoothie is. Server ca Gi 1-3 ganger pr dag så lenge dere har problemer med forstoppelse.

MASSASJE

Castroolje magemassasje →

Denne oljen fås tak i på helsekost eller nett.

Ta olje i hendene og varm det opp før du masserer magen med klokken i ca 5 minutter. Deretter masser nederst på magen som vist på bildet i ytterligere noen minutter. Gjenta daglig.

