



IS

HVA ER DET DU EGENTLIG SPISER?

DET HOLISTISKE BARNET

SOMMER


is hefte



Tradisjonelt ble is laget av fløte eller melk, sukker og en smak som sjokolade, jordbær, vanilje osv, av og til også eggeplomme. Men realiteten ser ganske annerledes ut i dag.

Om du ser på ingredienselisten til en isboks i dag vil du bli møtt med noe i denne duren

Vann, sukker, jordbær (16%), kokosolje, glukose, rissiruppulver, risstivelse, stabilisator (e440, e460, e466, e407), rismel, emulgator (e471), hydrolysert erteprotein, naturlig vaniljearoma, salt, surhetsregulerende middel (sitronsyre), fargestoff (e162).



Det vil si at hovedingrediensen er vann og sukker, så har du 16% jordbær og deretter mer sukker (glukose og rissiruppulver) og en del stivelse i form av ris og erter. Her er det ikke mye som minner om is. Når man leser en ingrediens liste er det slik at matprodusenten er pliktet til å oppgi ingrediensene i en rekkefølge som viser den ingrediensen det er mest av først og deretter i synkende rekkefølge. Dermed betaler du først og fremst for vann og sukker når du kjøper denne isen, som er Idyll av Henning Olsen.



Hva er problemet

Det er flere utfordringer her. For det første kan man jo føle seg ganske lurt når du tror at kjøper en is, men egentlig så betaler du ganske mye for sukker, vann og stivelse. For det andre er dette er ultraprosessert produkt som vi vet at skaper en rekke helse utfordringer. Men noe av det som er mest problematisk er at de aller fleste isene vi får tak i butikken i dag inneholder stoffer som er bevist å være helseskadelige.

Betyr det at vi aldri kan spise is igjen?

Neida, heldigvis er det ikke slik at vi ikke kan spise is i blant uten at kroppen vil bli syk av dette, men det å bli bevisst på hva vi faktisk kjøper og betaler for og og kunne unngå stoffer som vi vet skader kroppen er en god deal for helsen.

Det er også forskjell å spise en is i blant kontra en is om dagen hver dag i flere uker (f eks i sommerferier). Is er også en stor sukkerbombe og en is for en voksen person med ca 60-70 kg vekt vs et barn med en vekt på 10 eller 20 kg vil være av stor forskjell. I en gjennomsnitts pinneis er vekten mellom 50-70 gram is. De fleste pinneiser inneholder ca 26 gram sukker (noen mindre og andre mer).

Det vil si at i en is på 70 gram inneholder 19,2 gram sukker
Det er tilsvarer nesten 8 sukker biter.



Og dette er bare sukker fra en is, vi får også i oss sukker fra mange andre kilder ila hverdagen. Dette kan du lese mer om i heftet sukker og atferd som ligger under Helsehjørnet i medlemsportalen.



Det er mengden som teller

Husk det er mengdene du får i deg som vil ha noe å si. Kroppen har evne til å klare å spise mat som er usunt til en viss mengde (rundt 20% av kostholdet) uten at det vil gå hardt utover helsen. Det er derfor lov til å ta seg en is, men tenke over mengdene og velge de isene som ikke inneholder skadelige tilsetningstoffer.



Hva har tarmflora å si for helsen?


Tarmen er en portal mellom det ytre (hva vi spiser og alt annet vi får inn i kroppen) og mellom vårt indre (blodsystemet og alle andre organer). I tarmen finner vi ca 80 % av vårt immunforsvar som sitter å passer på at alle lumskheter skal bli luket ut og fanget opp så tidlig som mulig og ikke spre seg i kroppen. I tarmen har vi også mange ulike bakterier som hjelper oss både med å plukke ut alle nyttige byggeklosser fra maten vi spiser, og de er med på å produsere mange ulike signalstoffer som kroppen bruker.

Det er faktisk en direkte motorvei fra din hjerne og inn til tarmen, en motorvei med trafikk i begge retninger. Signaler kan bli sendt ned fra hjernen og til tarmen, og fra tarmen og opp til hjernen. Motorveien er vagus nerven. En av de 12 hjernenervene. Denne nerven knytter tarmen til sentralnervesystemet.

Hva vi spiser og hva slags bakterier vi har i tarmen avgjør hva slags signal stoffer som blir produsert og sendt opp til toppen og ut i resten av kroppen.



Utfordringene med tilsetningsstoffer



Selvom det sies at tilsetningsstoffer som brukes i mat er testet og trygge i de mengdene de brukes dukker det stadig opp studier og ny kunnskap om at det ikke alltid er så uskyldig som vi først skulle tro.

I 2016 gjennomførte EFSA* en risikovurdering for bruken av titanoksid (e171) som har vært en tilsetningsstoff brukt blant annet i tannkrem, is, godteri, fiskeboller og tannkrem og konkluderte med at det trengs mer kunnskap om hvordan dette stoffet påvirker kroppen og det kunne ikke utelukkes at dette stoffet var gentoksisk (med andre ord hvordan dette kan endre DNA og føre til kreft). Det ble likevel ikke før i midten av 2021 at dette tilsetningsstoffet ble forbudt å bruke i mat i hele Europa (foreløpig mener jeg det fortsatt er tillat i legemidler).

Det er ikke bare titanoksid som har vist uheldige utfall i studier. En rekke andre tilsetningsstoffer som har et utbredt brukt har blitt vist gjennom mange studier å være skadelige på tarmhelse, forårsake inflammasjon og fedme, men er fortsatt tillatt å bruke. Disse stoffene finner du både i en rekke pålegg, drikker og is. Av den grunn, mener jeg man bør ta et føre var prinsipp og unngå disse stoffene i kostholdet, spesielt i kostholdet til våre barn.

Unngå dette

KARRAGENAN E407

Studier viser at dette stoffet endrer tarmflora og skaper inflammasjon når det har vært tilsatt i kosten til marsvin, kaniner, mus og rotter . En humanstudie viste også tilbakefall av kronisk tarmsykdom etter inntak av e407 selv i små mengder.

MONO- OG DIGLYSERIDER AV FETTSYRER E471

En studie undersøkte monolaurin, en forbindelse som kan inngå (i ukjent mengdeforhold) i mono- og diglyserider av fettsyrer (E471), viste endring i tarmfloraen og førte til økt inflammasjon samt metabolsk syndrom hos mus.

POLYSORBAT E433 & KARBOKSYMETYLCELLULOSE E466-E467

Polysorbat 80 (E433) har vist å gi både fedme og metabolsk syndrom hos mus (2). Studier har vist at disse skadene var forårsaket av endringer i tarmfloraen og at konsistensmidlene ga bakterier økt evne til å skape betennelse. Det er også vist at slik betennelse over tid fører til økt forekomst av tarmkreft hos mus. Dette ble funnet ved å bruke også lave doser av tilsetningstoffet. Det er også vist at konsistensmiddelet karboksymetylcellulose (E466) kan gi betennelse i tarmen hos mus

Utfordringene med tilsetningstoffer

For ikke så lenge siden var titanoksid tillatt i både tannkrem, is, godteri, men ble nylig forbudt pga funn om at det er skadelig. Dette hadde mange forskere varslet om i allerede 10 år uten at VKM gjorde noe med det.

Så moralen er selv om noe er tillatt som et tilsetningstoff betyr det ikke at det er trygt. Forskningsmetoder utvikles stadig og vi vet ofte ikke effekten av stoffer før etter en lang periode med eksponering. Godkjenning av slike stoffer er ofte en rakst prosess og med tiden vil man også ofte avdekke nye måter å måle og undersøke effektene på.

Hva bør du se etter når du velger is

- 1 Se etter minst mulig ultraprosessert varer.
Første ingrediensen bør være fløte eller melk.
- 2 Unngå tilsetningstoffer som er bevist skadelige
- 3 Tenk over mengde
- 4 Lag din egen is når du kan



Kilder

Swidsinski A, Ung V, Sydora BC et al. Bacterial overgrowth and inflammation of small intestine after carboxymethylcellulose ingestion in genetically susceptible mice. *Inflamm Bowel Dis* 2009; 15: 359–64.

Chassaing B, Koren O, Goodrich JK et al. Dietary emulsifiers impact the mouse gut microbiota promoting colitis and metabolic syndrome. *Nature* 2015; 519: 92–6.

Chassaing B, Van de Wiele T, De Bodt J et al. Dietary emulsifiers directly alter human microbiota composition and gene expression ex vivo potentiating intestinal inflammation. *Gut* 2017; 66: 1414–27.

Chassaing B, Van de Wiele T, Gewirtz A. O-013 dietary emulsifiers directly impact the human gut microbiota increasing its pro-inflammatory potential and ability to induce intestinal inflammation. *Inflamm Bowel Dis* 2017; 23: S5.

Viennois E, Merlin D, Gewirtz AT et al. Dietary emulsifier-induced low-grade inflammation promotes colon carcinogenesis. *Cancer Res* 2017; 77: 27–40.

Jiang Z, Zhao M, Zhang H et al. Antimicrobial emulsifier – Glycerol monolaurate induces metabolic syndrome, gut microbiota dysbiosis and systemic low-grade inflammation in low-fat diet fed mice. *Mol Nutr Food Res* 2018; 62: 1700547.

Martino JV, Van Limbergen J, Cahill LE. The role of carrageenan and carboxymethylcellulose in the development of intestinal inflammation. *Front Pediatr* 2017; 5: 96.

Younes M, Aggett P, Aguilar F et al. Re-evaluation of celluloses E 460(i), E 460(ii), E 461, E 462, E 463, E 464, E 465, E 466, E 468 and E 469 as food additives. *EFSA J* 2018; 16: e05047.

<https://www.efsa.europa.eu/en/efsajournal/pub/6585>